



بسم اللہ الرحمن الرحیم

حصہ اول علم طب

باب اول

تعریف صحت

جتنی صحت کی حالت سے واقفیت نہیں ہوتی ہے تاکہ کسی حالت
پہچانی نہیں جاسکتی اسلئے پہلے صحت کی تعریف کرنی چاہئے۔ صحت وہ حالت
کو صحت کی حالت سے متعاقد کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی بیماری یا جاتا ہے تب اسکو
بیماری کہتے ہیں۔

پس واضح ہو کہ صحت جسم کی اس حالت ہے جس میں کُل اعضاء اپنا
اپنا کام باقاعدہ کیا کرتے ہیں۔ کُل انسان کی صحت یکساں نہیں ہوتی بلکہ
مختلف بشر کی صحت میں بھی اختلاف ضرور پایا جاتا ہے کیونکہ ہرگز یہ ممکن نہ
ہو کہ کُل درحقیقت جسمانی ایکساں نہیں ہوتی اور نہ ہرگز یہ ممکن نہ ہو کہ
ایک ہی طور پر ہوتی ہے۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی بات خاص ضرور پائی جاتی ہے

شکل کو ٹی تو کسی مرض میں مبتلا ہونے کی خصوصیت رکھتا ہے اور کوئی کسی بیماری میں۔ اور نبض اکثر ایسے بھی ہیں کہ جب انہیں کوئی بیماری ظاہر ہوتی ہے تو برخلاف دوسروں کے اپنا رنگ ترلا بھی کہلاتی ہے۔ پس سخت میں تھیری باتوں سے فرق پڑ جاتا ہے چنانچہ

اول۔ ٹم۔ پے۔ ری۔ منٹ یعنی مزاج کا تجربات وسیع سے یہ بات ثابت ہے کہ مزاج چار قسم کا ہوتا ہے۔

اول سنگوے نمک یعنی مومی۔ وڈوم لفا۔ مک یعنی بلغمی پنڈوم بے۔ لے۔ اثر لینے صفراوی۔ چہارم فزوس یعنی عصبی۔

فقہہ ۱۔ جس شخص کا مزاج مومی ہوتا ہے جسم اس کا فربہ اور عضلات اس کے تھے ہونے ہوتے ہیں۔ بال سرخی مائل اور وہ شخص گرچہ چشم ہوتا ہے رنگ سرخ۔

جلد ملایم اور پتلی۔ دوران خون تیز۔ نبض پُر اور سیل۔ چہرہ پر شجاعت کا نور ہوتا ہے۔ اور وہ شخص نہایت چست و چالاک اور غصہ ور ہوتا ہے اور طبیعت اسکی نہایت تیز ہوتی ہے۔

فقہہ ۲۔ جس کی کا مزاج بلغمی ہوتا ہے گوشت اس کا ویدیا اور جسم شیم ہوتا ہے تو نہ نکلی ہوئی۔ بال بیورے۔ آنکھیں یا تو سر مٹی یا گرچہ چشم۔ جلد کی رنگت پہلکی لب موٹے۔ چہرہ ہوا ہوا۔ دوران خون مست۔ نبض بلی اور کل حرکات جسمانی اور روحانی اسکی مست ہوتی ہیں۔

فقہہ ۳۔ صفراوی مزاج کی پہچان یہ ہے کہ اس مزاج کے آدمی کا گوشت تنہا ہوتا ہے اور صفحہ مزاج پر اس کے مطالب دلی نمایاں ہوتے ہیں۔ بال اور آنکھیں سیاہ رنگت جسم کی سیاہی مائل۔ ورید بیرونی خوب نمایاں اور نبض صبر سخت اور کیتقد ر سریع ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بڑے حوصلہ کے ہوتے ہیں اور نہایت جفاکش

دیس چہ

(طبع چھلما)

میری زبان کو استعد رطافت اور دہن کو طلاقت کہاں کہ میں اُن قدر والوں کا شکریہ ادا کر سکوں جنہوں نے طبع اول سے لیکر آج تک اس کتاب کی قدر وانی فرمائی۔ جب میرے اس کتاب کے چوتھی دفعہ چھپنے کی خبر دور دراز پہنچی ہر چار طرف دھوم مچی۔ درخواستیں ہو تیت پیشگی آنے لگیں۔ بہتیرا زور اس لکھنے پر لگایا کہ جلد ختم ہو۔ تاکہ شایقین کی آرزو پوری ہو۔ راتوں کو کھتے لکھتے صبح کر دی۔ اس سیم بدن کے خفق میں سونا چھوڑ دیا مگر پیش نہ چلی۔ پورا سال لگا گیا تب یہ کتاب ختم ہوئی۔ فان بغیر دیکھے بہائے طبع سوم کو جیون کا تیون چھوڑ دیتا تو وہی تین مہینہ کے اندر یہ کتاب چھپ کر تیار ہو جاتی۔ مگر اپنے قدر دان شایقین کو اُن باتوں سے محروم رکھنا مناسب نہ سمجھا جو اس کتاب کے تیسری دفعہ چھپنے کے بعد ظہور میں آئیں۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ جیسے طبع علم میں ترقی کی گنجائش ہے ویسی کسی اور علم میں نہیں ہے ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات ظاہر ہوتی ہی پس اُن باتوں کو اپنی کتاب میں دبیج نہ کرنا تو یہ کتاب کسی کام کی نہ ہوتی۔ باوجود اُن کے وقت کی کہلاتی اور شایقین جبکہ اس بندہ کی تصنیفات سوائے خاص شمس کا اس ہر طبع کے جب دیکھتے کہ اُن تحقیقات اور مشاہدات کو جو تین چار سال کے عرصہ میں ظاہر ہوئے ہیں اس

کتاب میں جگہ نہیں دی گئی ہے تو یا کوس ہو جائے۔ مگر ایجاوات اور انحرافات جدیدہ کو تلاش کر کے یکجا کرنا اور ان میں سے مستند کو غیر مستند چھان بین کر کے کتاب میں داخل کرنا کچھ تھوڑی بات نہ تھی۔ اس کے کرنے کے لئے بہت سا وقت اور فرصت چاہئے۔ یہاں فرصت کہاں۔ بقول شخصے۔ ایک سرسبز سرسبز سو والا ایک توڑ پھوٹا۔ اور ناسازی طبع۔ دوسری کام کی دہوم کہ ناک میں دم آ رہا ہے۔ پھر ہی ہمت نہ ماری۔ بڑے بڑے استادوں کی جدید تصنیفات پڑھیں۔ ملک ملک کے طبی اخبار دیکھو اور اپنے بھی تجربہ میں جو باتیں اچھی دیکھیں ان کو بھی جمع کر کے اس کتاب میں شامل کیا۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ یہ کتاب دیر سے نکلی اور حجم بھی اس کا ہزاروں سے زیادہ بڑھ گیا۔ اس چوتھی طبع کو بالکل ایک نئی کتاب کہیں تو بجا ہے کیونکہ اگلی طبع اور اس میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں ۛ

بہترین بیماریاں جو پہلی طبع میں شامل ہونے سے رہ گئی تھیں اس میں درج کی گئی ہیں۔ بڑے بڑے استادوں کے مجرب نسخے اور نئی ووائیں بھی درج کی گئی ہیں۔ پتھری پہلی جیاریوں کی مابیت اور علامات اور علاج اور اسباب بموجب مشاہدات اور تحقیقات جدید کے بدل دی گئی ہیں۔ کتاب کی ہر ایک سطر پر غور کیا گیا ہو اور جہاں کہیں کوئی بات نئی پائی ہے اسی وقت درج کر دی ہے۔ اسباب میں زیادہ کہنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اپنے منہ سے میدان مٹھو بنا پڑتا ہوں۔ ناظرین خود دیکھ لیں گے۔ مانتہ کنگن کو آ رہی کیا۔ پھر بھی انسان ہوں کہیں نہ کہیں کچھ نظر رہ گیا ہو گا۔ معاف فرماوین ۛ

رحیم خان

لاہور جنوری ۱۹۵۷ء

اد جب ایسے آدمیوں کا چہرہ بڑبڑا اور منموم ہوتا ہے تب اس مزاج کو
 ۷۔ سن۔ کا۔ ایک۔ ٹم۔ پے۔ رمی۔ ریشٹ یعنی سوداوی مزاج کہتے ہیں۔

فقہہ - ۴ - نر۔ دس مزاج کے آدمیوں کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ ہنگمنے اور دُبلے
 تپنے ہوتے ہیں۔ چہرہ نازک۔ بال ہورے۔ دھمکت جسم کی ہیکلی یا کسقد سرخی
 مائل۔ لبین نازک۔ آنکھیں چکیلی۔ بض ملایم مگر سیرج۔ اور اثر صدات کا اُپنہ فوراً
 ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوگ نہایت خوش مزاج اور عقیل اور فہیم ہوتے ہیں اور
 انکے خیالات دلی اور حرکات جسمانی تیز۔

دوم عشر۔ بیماری کی تشخیص اور علاج کی اسطے عمر کا دریافت کرنا اشد
 ضروریات سے ہے مثلاً نہایت ہنسے بچوں کے باب میں یہ بات یاد رہے کہ ان
 کے دم لینے کی حرکتیں ایک بیک نہیں پیدا ہوتیں بلکہ رفتہ رفتہ بڑھتی جاتی ہیں
 تپس بھی کم نہیں ہوتیں اس واسطے انکو حرارتِ بیرونی کی بہت ضرورت پڑتی ہے
 اور جب انکی عمر کس قدر زیادہ ہو جاتی ہے تب انت نکالنے کی تکلیف میں مبتلا
 ہوتے ہیں اور عہد طفلی میں بچوں کو مہدہ اور امعا اور دماغ کی بیماریوں کے ہونے
 کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے اور چون بچہ کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اور قریب
 جوانی کے آجاتی ہے امراضِ مذکورہ بالا اسکو کم ستاتے اور شاید ہی جہلک
 ہوتے ہیں اور جب ایامِ شباب کا آ جاتا ہے تب اسکے جسم کی ہیئت اور روح کی
 قوت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ انہیں ایامِ میں عورت کو حیض آنا شروع ہوتا ہے اور
 اگر یہ فعل عرصہ تک ملتوی رہ جاوے یا بے قاعدہ ہوتا رہے تو عورت انواع و
 اقسام کی امراضِ دماغی و عصبی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی قابلِ یاد
 رکھنے کے ہے کہ طفولیت میں بچہ کا منہ اور شکم بہ نسبت دیگر اعضا کے جسم کے بڑا
 ہوتا ہے مگر چون بچہ عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے ہر ایک اعضا کے جسم کے اپنی اپنی

معمولی وضع پر آتے جاتے ہیں اور پچیسویں یا تیسویں برس کے اندر نشہ و نما کل اعضا کی کامل ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں امراض لطیفی و عصبی کم پیدا ہوتے ہیں مگر انفلماژ اور بخار کی بیماریوں کی کثرت ہوتی ہے اور سئل کے مرض میں بھی مبتلا ہونے کو اسی عمر میں طبیعت نہایت مائل رہتی ہے ۷

پچیسویں سال سے ۵۴ برس تک انسان کا جسم تو بڑھتا اور نہ گھٹتا ہے بلکہ کھینچا رہتا ہے لیکن لچیم ٹھیسٹرومن نے کی طرف مائل رہتا ہے اور اس ایام کے ابتدائیں بخار اور انفلماژیشن کی بیماریاں اور سئل کے مرض کا نہایت جلد رہتا ہے لیکن جب عمر ۵۰ برس کے قریب آ جاتی ہے تب بھوض انفلماژیشن کے اعضا سے رئیسہ کی ساخت میں تغیر پیدا ہونے لگتا ہے اور آئین خون کے جمع ہوجانے کا اندیشہ ہوتا ہے اسی واسطے اس عمر کے لوگوں کو سکتہ کی بیماری کا بڑا اندیشہ رہتا ہے اور اسی عمر میں حیض کا آنا بھی بند ہو جاتا ہے۔

جب انسان کی عمر ۵۰ سے ۶۰ تک کی ہو جاتی ہے تب کل قوایں جسم کے کمزور ہونے لگتی ہیں چنانچہ حس حرکت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ حافظہ میں مستور رہا ہو جاتا ہے عضلات کمزور ہو جاتے ہیں اور ٹیک لگائے بغیر بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے مولوی نظامی رحمۃ اللہ نے سچ کہا ہے۔

مشنوی

چو عمر زدہ گزشت دیا کہ از بسیت	نمی شاید و گر چون غافلان بسیت
نشاط زیست باشد تا بہی سال	چو چہل آمد سروریند و پرو بال
پس از پنجاہ نباشد تندستی	بصر کند ہی نہ پیرد بسبب مستی
چو شصت آمد نشت آمدیو آ	چو ہفتاد آمد رفت و آواز کا
ہشتاد و نو و چون در رسید	بسی سختی کہ از گیتی کشید

وہ آنجا گریبہ منزل رسا نے ہو و مرگے بصوت زندگانے
 اگر صد سال مانے دریکے روز بباہر رفت نین کاخ دل فروز
 پس آن بہتر کہ خود را شادوارک دران شاد می خند ارا یا دوارک
 اور اس عمر میں جسم کے رطوبات کم ہو جاتے ہیں اور اعضا سے اندرونی ہیٹ ہواؤں
 ہو جاتے ہیں۔

عمر کے باب میں ایک اور بات قابلِ ملاحظہ یہ بھی ہے کہ چون جرن عمر زیادہ ہوتی جاتی
 ہے اعضا سے ریشہ کی ساخت بگڑتی جاتی ہے اس واسطے جب انہیں کوئی بیماری
 ہوتی ہے تو وہ وقت سے منع ہوتی ہے۔ پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ بچوں
 کی بیماریاں بہ نسبت مُسن آدمیوں کے زیادہ تر علاج پذیر اور زودتر رفع ہو جاتی
 ہیں۔

سوم موسم اور ہوا۔ ہوا کا گرم و سرد اور مرطوب اثر انسان کے سارے
 جسم پر پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب یہ ہوا باہر سے جلد پر لگتی ہے اور بذریعہ نفس کے تنفس
 میں جاتی ہے تو خون میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں جبکہ اثر سارے جسم پر ظاہر ہوتا
 ہے کیونکہ ہوا میں مختلف زہروں کے اثر کی آمیزش ہوتی ہے لینے کہیں تو اس
 میں حیوانی زہر ملے ہوئے ہوتے ہیں اور کہیں نباتات کے متعفن ہو جانے سے
 جو زہر پیدا ہوتا ہے وہ بھی ہوا میں مل جاتا ہے۔ غرض جب اس قسم کی زہریلی ہوا
 سونگھنے میں آتی ہے تو اسے انواع و اقسام کی مہلک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور
 متعدّد اُن زہروں کی کم ہوتی تب بھی صحت میں اس قدر فرق پڑ جاتا ہے کہ انسان
 ظاہر اور مکرور ہو جاتا ہے۔ مزید بریں ہوا کے اندر خاک و دھول سنگریزہ اور کافور
 کا دھواں اور ذرات و فاتی بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ غرض جب یہ ہوا سونگھی
 جاتی ہے تو جسم کے اندر مہلک بیماریوں کی بنیاد قائم ہوتی ہے ۛ

ہوا کا گرم و سرد اثر بھی صحت پر بڑا بہا رہی ہوتا ہے کیونکہ ان ملکوں میں کہ جہاں
 موسم اعتدال پر رہتا ہے جون گرمی بڑھتی جاتی ہے بیماری زیادہ ہوتی جاتی ہے
 اور جب سردی کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے تب موت کا بھی بازار گرم ہو جاتا ہے گرمی کی ہلکے
 بیماریاں اسہال پھیشہ - ہیضہ - اور بخار مین اور سردی مین امراض شش مثلاً چھان
 بوڑھوں میں نیو - مونیا پیچڑات الریہ اور برون - کاسی - ٹس کا اس موسم میں بڑا غلبہ
 ہوتا ہے مگر پنجاب اور مالک مغربی کی نسبت یہ بات ضرور یاد رہے کہ ان مقامات میں
 چاہے کیسی ہی شدت کی گرمی بڑھے تاوقتیکہ ایسے رطوبت نہ ہو امراض مذکورہ بالا کا
 غلبہ نہیں ہوتا بلکہ ان ملکوں میں خشک گرمی نہایت صحت بخش ہوتی ہے لیکن جس سال
 گرمی میں بارش زیادہ ہوتی ہے اور اس باعث وہ گرمی مرطوب ہو جاتی ہے اس
 سال تپ نوبی - ہیضہ - اسہال و پھیش کی بیماریوں کا نہایت زور شور ہوتا ہے یہ
 چہارم جا سے سکونت - مثلاً دیہاتی اور شہری کی صحت میں بھی بڑا فرق
 ہے کیونکہ شہر کے باشندے بہ نسبت دیہات کے رہنے والوں کے زیادہ تر
 ضعیف الجسم ہوتے ہیں اور انکی عمر بھی بہ نسبت انکے کم ہوا کرتی ہے لیکن باہمیہ تھانوں
 کی صحت میں بھی فرق ڈالنے کے لئے کئی باتیں موجود ہیں چنانچہ مبدلون میں
 جو کانوں ہو کرتے ہیں وہ بہ نسبت آؤر زمینوں کے بندی پر ہوتے ہیں بارش
 کے موسم میں انکے قریب وجوار میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے مزار جانور اور نباتاتی اجزا
 جو اس پانی میں ہوتے ہیں وہ مٹر جاتے ہیں کہ جسے بھجڑ خشک ہو جانے اس پانی
 کے ایک ذہریلی عفو ت پیدا ہوتی ہے جس سے اس نواح کی ہوا بگڑ جاتی ہے غرض
 اس بگڑی ہوئی ہوا کے سونگھنے سے باشندگان وہ کی صحت میں فرق پڑ جاتا ہے
 اور بڑے شہروں کا یہ حال ہے کہ بسبب گنجان آبادی اور غلات بدروغیرہ
 کے دھان کی چھٹی ہو متعفن ہو جاتی ہے اور بھی ہوا لوگوں کے سونگھنے میں آتی ہے

حال اُنکا یہ ہوتا ہو کہ ہراسے نام وہ تندرست کہلاتے ہیں۔ اُنکے چہرہ کو ملاحظہ کیجئے تو ایسا زرد معلوم ہوتا ہے کہ گو یا کسی نے جب کم سارا خون پھوڑ ڈالا ہے اور اُن کے ہاضمہ کا اس سے بھی بدتر حال ہوتا ہے۔ مضاف کا اس امر میں یہ تجربہ ہے کہ سو میں شاید ایک آدھ کا ہی ہاضمہ درست ہو گا ورنہ سب کسی کسی قسم کی بدہضمی کے مرض میں مبتلا ضرور ہونگے اور ہم اس سبب کو شفا خانجات کی ہیویوں سے بھی ثابت کر سکتے ہیں نتیجہ اسکا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کمزور ہوتے ہیں اور اُن سے باعث سے بیمار ہو جاتے ہیں۔

پہنچم غذا۔ خراب غذا کا بھی اثر جسم انسان پر پڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ بڑے شہر و دیہات میں اکثر یہ بات دیکھو مین آتی ہے کہ جو غریب باہن سبب افلاس کے اُنکو اچھی غذا کہ جس میں کل اجزاء پرورششی موجود ہوں میسر نہیں آتی اس سبب وہ بیمار طرح طرح کی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں خاص کر اسکر۔ وی کی بیماری تو اُنکو اکثر ہو جا یا کہ تپ ہی کیونکہ آدمی کو جب اچھی غذا نہیں ملتی ہو تب خون اچھی طرح پیدا نہیں ہو سکتا بلکہ بدخون جو خون ہوتا ہو وہ بھی متعین ہو جاتا ہو (دیکھو باب حفظ صحت) **ششم۔ پانی**۔ یہ بات ظاہر ہے کہ صاف پانی کا پینا قیام صحت کے لئے اشد ضروریات میں سے ہے اور یہ کہ جب پانی میلا ہوتا ہے تو اُسکے استعمال سے جملہ امراض پیدا ہوتے ہیں (اسکی تفصیل آگے آئیگی)۔

ہفتم۔ پیشہ۔ مختلف پیشہ کے لوگوں کی صحت مختلف طور پر برکت جاتی ہے چنانچہ خیاط کا ہاضمہ۔ گہری ساز کی آنکھیں اور سنگتراش کا شش مجھڑا رہتا ہو علیٰ ہذا القیاس اور پیشہ ور دیکھو یہی کسی کسی بات کی شکایت ہوتی ہو۔

ہشتم۔ عیش و عشرت میں اوقات بسر کرنا بھی ایک بڑا بیماری سبب صحت کے بگاڑنے کا ہو دیکھو وہ لوگ جو ایسے کہلاتے ہیں اور جنکا شب روز عیش میں

گزرتا ہے کسی نے کبھی سنا ہو کہ وہ لوگ ایک دن ہی پہلے رہتے ہیں +
 اوپر کے بیان کا حاصل یہ ہے کہ ایک دوسرے کی صحت میں بڑا فرق ہے اور یہ
 فرق کبھی تو پیدائش سے پڑ جاتا ہے اور کبھی آدمی از خود حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ پیشانی
 اختلافات یہ ہیں۔ مزاج۔ میلانِ طبع۔ ارث۔ اور خصوصیتِ طبع۔ اور عمر۔ اور مرد
 اور عورت کا ہونا۔ اور چنگو آدمی از خود حاصل کرتا ہے وہ یہ ہیں۔ موسمِ مسکن۔
 غذا۔ پانی۔ حادثات۔ پیشہ۔ اور طریقہِ کمران +

جب ہم اختلافاتِ تولیدی کا خیال کرتے ہیں تو یہ باتیں ہر ایک تنفس میں نرالی
 پاتے ہیں اور چونکہ ہر بشر کی صحت میں اختلاف پایا جاتا ہے تو صرف بیماریوں میں ہی نہیں
 بلکہ جسم کے کُل افعال میں بھی مشرقِ ضرور پایا جاتا ہے۔ پس یاد رہے کہ اس واسطے علاج و
 معاالجہ کبھی وقت ہم کو اندھوں کے طور پر ٹٹولنا پڑتا ہے اور اس واسطے جو طبیب جس کیسا
 مزاج دان ہوتا ہے وہ اسکا علاج بہ نسبت دوسرے کے جو اس شخص کے مزاج سے واقف
 نہیں ہوتا اچھے طور پر کر سکتا ہے +

باب دوم

تعریفِ مرض کی

بیماری کے جاننے کے لئے کہ بیماری کسکو کہتے ہیں پہلے حالتِ صحت کا جاننا
 نہایت ضرور ہے کیونکہ جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ صحتِ جسم کی احوال کو کہتے ہیں
 جس میں کل اعضاء سے اپنا اپنا کام باقی عدہ کہا کرتے ہیں تو اس کے خلاف کو بیشک
 مرض کہیں گے۔ پس یاد رہے کہ جب تک صحت دریافت نہ ہوگی تب تک بیماری ہرگز معلوم
 نہیں ہو سکتی + لہذا طبیب کو چاہئے کہ پہلے حالتِ صحت سے اچھے طور پر واقفیت

پیدا کرے تاکہ اُسکا خلاف جبکو مرض کہتے ہیں اُسکی سمجھ میں بخوبی آجاوے۔ ہم سے اگر کوئی مرض کی تعریف پوچھے تو اُسکا جواب اسطور پر دینگے کہ جب جسم کے کسی عضو کی ساخت بگڑ جاوے یا اُسکا فعل صحت کی نسبت زیادہ نیریا سست یا بدل جاوے یا کمزور یا بالکل منفقود ہو جاوے تب اُس عضو کو صحت کے مقابلہ پر بیمار کہینگے۔

دافع ہو کہ کُل بیماریاں ایک ہی قسم کی ہیں ہوتیں یعنی کسی بیماری میں اعضا کی ساخت بگڑ جانی ہو تب اُسکو آر۔ گے۔ بِلٹ ڈیزیز کہتے ہیں۔ کسی میں صرف اُسکے فعل ہی میں دستور پڑتا ہے تب اُسکو فنکٹن۔ شو۔ بِلٹ ڈیزیز بولتے ہیں۔ اور کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے جو کبھی رفع ہی نہیں ہوتی ایک عضو کو چور کر دوسرے میں سرایت کر جاتی ہے جیسے سرطان اور تشکٹ غیرہ ہیں۔ اور بعض بیماریاں ہتھ فہلک ہوتی ہیں جیسے ہیضہ۔ اسکار۔ لٹیفور وغیرہ اور بعض بیماری کا یہ حال ہو کہ وہ اڑخو پیدا ہو جاتی ہے کسی دوسری بیماری سے علاقہ نہیں رکھتی۔ اور بعض ایسی ہی ہیں جنکا پیدا ہونا دوسری بیماری پر حصر رکھتا ہے جیسے قلب اور جگر اور گردن کی بیماری میں استھکا کا ہو جانا۔ اور کسی بیماری کا یہ دستور ہو کہ ابتدا سے اُتھاناک اُنکی علامتیں یکساں رہتی ہیں پر بعض میں یوم راحت ملتا ہے اور بعض کی علامتوں کا یہ قاعدہ ہے کہ کبھی تو وہ زیادہ اور کبھی کم ہوجاتی ہیں لیکن بالکل رفع نہیں ہوتیں اور بعض امراض حاوہوتے ہیں یعنی تھوڑے عرصہ تک رہتے ہیں مگر بہت شدید ہوتے ہیں اُنکو اکیوٹ کہتے ہیں اور بعض مزمن یعنی عرصہ دراز تک ہتی ہیں پر شدید نہیں ہوتیں اُنکو کرائونک بولتے ہیں اور بعض بیماری متعدی ہوتی ہے جیسا کہ انگریزی میں کن۔ لٹے۔ جیس یا ان۔ فاک۔ بخشش کہتے ہیں یعنی اُنکی چھوت ایک سے دوسرے کو لگاتی ہے۔

مگر ان - ٹک - شس بغیر حیوت کے پیدا ہوتی ہے علاوہ ان میں بعض بیماریاں
اپے - ڈے - ٹک اور بعض ان - ڈے - ٹک اور بعض اسپو - ٹک ہوتی ہیں
ان تینوں میں یہ فرق ہے کہ پہلی قسم کی بیماری دماغی اور عالمگیر ہوتی ہے اور
بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسکے ظاہر ہونے کا کوئی وقت
مقرر نہیں ہوتا مثلاً چیچک - ہیضہ اور بعض قسم کے بخار - اور قسم دوم کی جو بیماریاں
ہوتی ہیں وہ کسی خاص جگہ پر محدود اور منحصر ہوتی ہیں - مثلاً گینگہ - ٹپ لہرہ اور
فیلکھا اور بنگالہ کے اندر ہیضہ ہی ان - ڈے - ٹک ہو - سوم یعنی اسپو - ٹک
لفظ دونوں ان - ڈے - ٹک اور اپے - ڈے - ٹک بیماری کی نسبت کہا جاتا
ہے کہ جب وے صرف چند آدمی کو مبتلا کرتی ہیں - اوپر کے بیان سے مرض کے
صرف مختلف حالات معلوم ہوتے ہیں اب ہم بیماری کی نسبت زیادہ تراہم باتیں
بتاتے ہیں چنانچہ -

مقالہ اول

اسباب الامراض

سبب کو انگریزی میں کاز بولتے ہیں - سبب دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو
اصطلاح میں پری - ڈسپوزیشن اور دوسری کو اکسائیٹنگ کاز کہتے ہیں
پری - ڈسپوزیشن کاز میں وہ باتیں شامل ہیں جنکا اثر سارے جسم یا جسم
کے کسی حصہ یا کسی عضو پر ایسا پیدا ہو جاتا ہے جس سے مرض میں مبتلا
ہونے کے لئے وہ مائل یا مستعد ہو جاتا ہے - اور اکسائیٹنگ کاز
ان سببوں کو کہتے ہیں جو جسم پر اپنا اثر مسیہہ یا پیدا کر کے مختلف بیماریوں کو

ظاہر کر دیتے ہیں۔ مگر ایسا نہ سمجھنا چاہئے کہ ان دونوں قسم کے سببوں میں کوئی حد مقرر ہو یا یہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں کیونکہ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت کوئی سبب بیماری کی استعداد کو پیدا کر دیتا ہے اور وہی سبب بعضہ فہ اشتعالک ویکر سیفہ مرض کو ظاہر کر دیتا ہے۔ علاوہ ان میں بعضہ فہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیری ڈسپوزیو۔ زنگ کا ز کے سبب کوئی خاص عضو بہ نسبت کسی اور کے مرض میں مبتلا ہونے کے لئے زیادہ تر مائل ہو جاتا ہے مثلاً عمر جو ایک پیری ڈسپوزیو۔ زنگ کا ز ہے اسکا اثر یٹو۔ بر۔ کل یا سرطان کے مادہ کو جسم کے کسی خاص مقام پر پیدا کرنے کے لئے بہت بھاری ہوتا ہے۔ تاکہ بیماری کے اسباب آسانی سے سمجھ میں آ جاویں انکو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک اسباب اندرونی یعنی وہ اسباب جو کسی شخص کی طبیعت میں پیدا لیش سے موجود ہیں یا جنکو وہ شخص خود حاصل کرتا ہو۔ دوم بیرونی اسباب۔

اول اسباب اندرونی۔ طبیعت یا جسم کی حالت اور صحت کی کیفیت مثلاً جب جسم کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے خواہ وہ کمزوری پیدا لیش سے ہو خواہ بعد پیدا لیش کے کسی اور سبب سے پیدا ہوئی ہو تب طبیعت آدمی کی انواع و اقسام کی بیماریوں میں مبتلا ہونیکے لئے مائل رہتی ہو اور احتمال ہے کہ جب جسم حالت اسکو خلاف ہوتی ہو یعنی بدن جنہا بہت قوی ہوتا ہو تب یہ لگ اقسام کے مرض میں مبتلا ہونیکے لئے استعداد ہوتا ہو اور خون کی حالت کا بھی اثر بہت ہی ہوتا ہو مثلاً جسم میں زیادتی (پے۔ تھور را) یا کمی (انے۔ میا) خون کی ہوتی ہے تب اس میں بھی بہتری بیماریاں آن گہری ہیں۔ اگلی بیماریاں خاص کر جب وہ شدید (ایکویٹ) قسم کی ہوتی ہیں تب ان سے بھی طبیعت دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے کے لئے مائل ہو جاتی ہے۔ یاد رہے یہ بیماریاں طبیعت کو اشتعالک ویکر اور امراض پیدا کر دیتی ہیں

مثلاً جب کوئی شخص پہلے مختلف قسم کے بخاروں میں مبتلا ہو جاتا ہو یا جب کسی کو پہلے ہو - پنگ - کاف (کو کر کہا لنسی) یا پیپٹرے کی بیماریاں یا وجع مفاصل یا آتشک ہو جاتی ہے تب ہی بیماریاں اور مضمون کو پیدا کر دیتی ہیں * بعض علمائین بھی ایسی ہیں مثلاً کہا لنسی جسکا علاج اگر بروقت نہ کیا جاوے تو انکے سبب سو نہایت اندیشناک بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں * حوایج ضروری کے (مثلاً بول و براز) رفع کرنے میں اگر غفلت کیجاوے تب ہی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں عموماً وہ برین جب کسی خاص اعضا میں یا کسی خاص بافت میں غیر طبیعی تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں تب انہیں اعضا یا بافت میں یا جسم کے دیگر حصص میں بیماری پیدا ہو سکتی ہے - مثلاً جب شرائین کی ساخت چربے میں یا ارضی مادہ میں بدل جاتی ہے تب انہیں آسانی سے پھٹ جانے کے استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور قلب کی بیماریوں سے اکثر پیپٹرے کی بیماریاں اور پیپٹرے کی بیماریوں کے سبب سو اکثر قلب کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں یا جب پیپٹرے یا قلب میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تب انہی اعضا میں وہی بیماری اور بیماریوں کو پیدا کر دیتی ہے * اسی فقرہ کی ضمن میں اور بھی اسباب ایسے ہیں جنسے بیماری پیدا ہو سکتی ہے مثلاً خونکا زیادہ بہ جانا کسی رطوبت کا بکثرت خارج ہونا یا عرصہ دراز تک جاری ہونا - اور پُرانی جلد کی بیماریوں میں جو عرصہ تک رطوبت بہتی رہتی ہے جب وہ دفعتاً بند ہو جاتی ہے تب ہی بیماری پیدا ہو سکتی ہے اور جب کوئی بیماری طبیعت میں ہوتی ہے تو اس سبب سو جسم کے خاص خاص مقامات میں خرابیاں پیدا ہو جا سکتی ہیں *۔

طبیعت کی خاص کیفیت - مثلاً بعض طبیعتیں ایسی ہیں کہ انہیں خاص شیا

کا اثر نہایت منہر ہوتا ہے کہ جنسے آؤرون کو بالکل گزند نہیں پہنچتا مثلاً خاص
میتھون کو اکھل و شرب کی بعض اشیا کے استعمال سے نہایت نقصان پہنچتا
ہے چنانچہ بعض قسم کی میچیلی یا ترکاری علی بنہ اقیاس بعض دوا کا اثر بھی خاص طبیعتوں
پر نہایت بُرا ہوتا ہے جیسے ایفون اور کونین اور آیو۔ ڈائیڈ آف پو۔ ٹا۔ سیم
وغیرہ۔ اور طبیعت کے اسی خاص کیفیت کے سبب سے وہ طبیعت بیماریوں
میں بھی مبتلا ہونے کے لئے مائل ہوتی ہو لیکن یہ کیفیت پری۔ ڈسپو۔ زنگ
کا زنجاری سے۔

میلان طبع موروثی۔ کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا اثر والدین سے
اولاد کو پہنچ جاتا ہے۔ امراض موروثی یہ ہیں چنانچہ بعض خلقی یا خون کی بیماریاں
مثلاً گارٹ (نقرس) * رو۔ ما۔ ٹے۔ نرم (رجع مفاصل) * اسکا۔ فیو۔ لا
(خمازیر) * ٹیو۔ بر۔ کیو۔ لو۔ سس * کنسر (سرطان) * سفی ریش
(ارتشک) اور وہ طبیعت بھی موروثی ہوتی ہے جس میں ادنیٰ سی بات میں کسی
زکسنی جگہ سے خون ایسا جاری ہونے لگتا ہے کہ جو مشکوکوں سے بند ہوتا ہو *
بعض عصبی بیماریاں جیسے اپنے۔ لپ۔ سی (مرگی) * کو۔ ریا (عرشہ) *
ان۔ سا۔ نے۔ ٹے (دیوانگی) * ٹا۔ پو۔ کن۔ ڈرامی۔ سس
(میراق) * ٹیو۔ رلیجا (رجع العصب) * ا۔ پو۔ پلکسی (سکتہ) *
پے۔ را۔ لی۔ سس (استرخا) *

نقص تولیدی اور اس قسم میں سے کسی کا نقص پیدا ہونا جیسے اندامین
اور ہر اپن۔

جسم کے کسی حصہ میں ابتدا سے کسی قسم کا بگاڑ پڑ جانا خواہ وہ بگاڑ
خاص ہو یا عام۔ مثلاً عروق کی ساخت کا بگاڑ جانا * اعضا سے کاچری میں

بدل جانا۔ جلد کی طاعت و در ہو جانی۔ با لونکا معمولی وقت سے پہلے سفید چلنا
یا سر کا گنجا ہو جانا۔ دانتوں کا گر جانا اور زوال کے دیگر نشانات کا ظاہر ہونا۔
بعض جلد کے امراض۔ خامکے سو۔ رائی سیس (چنبل) اور پیرا
دکوٹر (ام۔ خامی۔ سی۔ ما اور اسما (ومہ)۔ ریگ گردہ اور پتھری
ڈا۔ یا۔ بے۔ طیز (دیا بیٹس)۔ بو اسیر۔

دافع ہو کہ یہ کچھ ضرور نہیں ہو کہ جو بیماریاں پشت پشت چلی آتی ہیں وہ ایک
جیسی ہوں مگر ان قسم انگلی ایک ہی ہوتی ہے۔ ایسا خامکے عصبی بیماریوں میں
پایا جاتا ہے مثلاً ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پشت میں مرگی کی بیماری پائی جاوے
تو دوسری میں دیوانگی کا سلسلہ بندہ جاوے۔ مثلاً والدین کی بعض طبی
عادات کے سبب اولاد میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے مثلاً والدین میں جب
شراب خواری کی عادت ہوتی ہے تب اولاد میں بلاشبہ کوئی نہ کوئی عصبی بیماری
ضرور پیدا ہو جاتی ہے مگر بعض مرتبہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ والدین کی کسی ذاتی
بیماری کے سبب سے (جیسے آتشک) اولاد صرف کمزور و مرنی پیدا ہوتے
ہے۔ جو بیماری نسل بعد نسل پیدا ہوتی ہے وہ شکیم مادر میں جنین کو بھی چاہکتی
ہے یا ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ بعد پیدائش کے جب چاہے تب ظاہر ہو سکتی ہے
یادہ بیماری طبعیت کے اندر بیکار پڑی رہ سکتی ہے تا وقت کہ کوئی کساٹنک
کا زائسکو اشتعال دیکر ظاہر نہیں کر دیتا یا ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ مرض مذکور
ایک پٹری میں ظاہر ہو کر دوسری میں پیدا ہو جا سکتا ہے۔ اور اس میں تو
کچھ ہی شک نہیں ہے کہ جنکی طبعیت میں کسی موروثی بیماری کا مادہ ہوتا ہے
تو آپس میں انکے بیاہ شادی ہونے سے مادہ زور پکڑ جاتا ہے جیسے سل کی
بیماری میں ہوا کرتا ہے اور وہ مادہ اس وقت بھی شدت پکڑ جاتا ہے کہ جب

آپسین ایسوکنا بیاہ ہوتا ہے کہ جبکا رشتہ نہایت قریب ہوتا ہو خاصکر جب وہ شادی نہایت چھوٹی عسریں ہوتی ہے یا جب زن دشوہر کی عسریں بہت فرق ہوتا ہے۔

دوم اسباب بیرونی۔ اول وہ سبب جو باہر کی کیفیتوں کے متعلق ہیں۔ مثلاً ہوا جو ہوا سالش کے کام میں آتی ہے اسکا اثر بھی صحت پر بہت سا کچھ ہوتا ہے چنانچہ رہنے کے مکان میں جب تازی ہو کی آمد و رفت کافی طور پر نہیں ہوتی ہے تب اسی میں دکنفستین لمباتی میں جو سانس کے چوڑنے سے اور آتش کے جھلنے سے پیدا ہوتی ہیں یا اسی میں وہ کثافتیں لمبا سکتی ہیں جو شکل گہاس بدرو و جیولانی یا نباتی مادوں کے سطر جانے سے پیدا ہوتی ہیں یا کارخانہ جات سے جو کثیف ہوا میں پیدا ہوتی ہیں وہ اس ہوا میں شامل ہو جا سکتی ہیں یا خاک بول شپم اور زندہ جاندار مادہ ہی اس ہوا میں لمبا سکتے ہیں۔ اور ہوا ہی کے اندر خاص خاص قسم کے نباتی اور حیوانی سمیت بھی نکلے اس ہوا کو کثیف کر دے سکتے ہیں۔ عسلا وہ ازین ہوا کے اندر جب طوبت کی کمی بیشی ہوتی ہے تب بھی وہ ہوا مضر صحت ہوتی ہے۔

گرمی یا سردی کی کیفیت۔ زیادہ گرمی یا زیادہ سردی یا عرصہ تک کی گرمی یا عرصہ تک کی سردی کا اثر بھی سارے جسم یا جسم کے کسی خاص حصہ پر بہت ہی مضر ہوتا ہے۔ گرمی سے سردی یا سردی سے گرمی اگر دفعتاً لگ جائے تو وہ بھی بُرا ہے۔ گرمی کے موسم میں بھی اگر بدن میں لہو ہو جائے تو اس سے بھی بیماری پیدا ہو سکتی ہے مثلاً گرمی کے موسم میں بدن پر بیگے کپڑوں کا ہونا یا اگر بدن گرم ہو یا پسینہ آتا ہو اور اس حالت میں سرد ہو اگر جاوے تو وہ بھی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔

مقدار روشنی اور دھوپ کی۔ جو ایسے مکانات میں عرصہ دراز تک بود و باش کرتے ہیں جہاں روشنی اور دھوپ کاگز کم یا بالکل نہیں پرتا، انکی صحت میں بھی سرق پڑ جاتا ہے :

زمین کی خاصیت کا بھی اثر صحت پر بہت سا کچھ ہوتا ہے مثلاً جب زمین میں اس قسم کا نباتی مادہ ہوتا ہے جو سڑ جانے کے قابل ہو یا جب زمین مرطوب یا اس قسم کی ہونی ہے کہ اس میں رطوبت نفوذ کر سکے یا جب زمین میں ایسے اجزاء ہوں جن سے تریب جو ار کا پانی اور ہوا بگڑ جا سکے تو ایسی جگہ میں بود و باش کرنے سے بھی صحت بگڑ جا سکتی ہے ۔ جس سرزمین میں بہت سا نباتی مادہ جمع ہو اور وہاں کافی مقدار رطوبت اور حرارت کی بھی ہوتی ہو تو ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جسے تپِ فوبی اور آنے - میا وغینہ سہے ۔ جس زمین میں چکنی مٹی بہت ہوتی ہے وہ بہت مرطوب اور سرد ہوتی ہے اسلئے مضر صحت ہی ہے ۔ یہ تیلی اور کنکریلی زمین بشرطیکہ اس میں نباتی مادہ نہ ہو اکثر صحت بخش ہوتی ہے ۔ جس زمین میں چونہ اور گت - نے - شیا اکثر ہوتا ہے ایسا قیاس کرتے ہیں کہ وہاں کے باشندوں کو گھگھیا اور پیچھری کی بیماری ہو جاتی ہے ۔

موری کی آلائش سے بھی اکثر بیماری پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اس آلائش سے متعفن ہوا میں خایج ہوتی ہیں اور اس کے اندر گلے ہو کے جاندار مائے ہوا کرتے ہیں ۔ بعض حالتوں میں موری کی آلائش کے اندر خاص خاص مشیا خاصہ ہو کر تپتی ہیں جن سے بیماری پیدا ہو جاتی ہے ۔ اور جب وہ آلائش کی سطح سے پینے کے پانی میں مل جاتی ہے تب تو وہ مائیکروبز سے متعفن ہوتی ہے ۔

دوم وہ اسباب جو آدمی کے طریقہ گزران اور عادات اور بعض بعض اتفاقی اشرون کے متعلق ہیں۔ مثلاً غذا آدمی جب خراب یا کم غذا برابر یا کچھ عرصہ کے لئے استعمال کرتا رہتا ہے تب اس سے بھی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ برعکس اسکے جب غذا مرغین یا زیادہ کھائی جاتی ہے تب ہی مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ کھانا کھانے کا وقت جب بے قاعدہ ہوتا ہے یا جب غذا جلد جلد نگلی جاتی ہے یا اچھی طرح چبائی نہیں جاتی ہے تب اس سے ہی نقصان پیدا ہوتا ہے۔

پینے کی چیزیں۔ شراب خوری صحت کی بربادی کا ایک بڑا بیماری باعث ہے۔ اس بلا سے غذا دشمن کو بھی بچا دے + پانی کی کمی کے سبب بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ نہانے دھونے یا کسی اور کام کے واسطے پانی جب کافی نہیں ملتا ہے تب بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ زیادہ پانی پینا خصوصاً کھانا کھاتے وقت بہت بُرا ہے کیونکہ کٹرک جو سرد یعنی معدہ کی رطوبت کا ضم جس سے غذا ہضم ہوتی ہے وہ رتی ہو جاتی ہے اور تب غذا اچھی طرح ہضم نہیں ہونے پاتی + باور ہو کہ پانی ہی کے ذریعہ مختلف قسم کے فاسد مادے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں جیسے مضر ہوائیں بعض قسم کے نمک + کرمون کے انڈے + جاندار حیوانی مادے خاص کر وہ جو بول و برا زمین ہوا کرتے ہیں + باقی مادے حالت عفونت میں + خاص خاص قسم کے سیبات + زیادہ چار کا پینا ہی چھپا نہیں + دودھ جب بگڑ جاتا ہے یا خراب ہوتا ہے تب وہ بھی نقصان پیدا کرتا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ دودھ کے ذریعہ ہی ہتیری قسم کی سمیت انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں + بعض عادات ہی مضر صحت ہیں جیسے زیادہ تنہا کو چنیا یا تنہا

لینا۔ انہیوں کہانا اور غذا میں زیادہ مصالحہ کا استعمال کرنا ہی صحت کو نیک کرتا

ہے +

پوشاک۔ جب کپڑے کافی نہیں پہنے جاتے یا جسم کا کوئی حصہ کپڑوں سے
اچھی طرح ڈھکا ہوا نہیں ہوتا تب ہی صحت میں خلل پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ بچوں کا
جسم افضل اکثر نگہ چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے انکو سرور، ٹھک کر بیمار ہو جاتا ہے
ہو جاتی ہے اور اکثر آدمی اپنے سینہ کو اچھی طرح نہیں ڈھکتے یہی سبب ہے
برعکس اسکے کپڑے سب ضرورت سے زیادہ پہنے جاتے ہیں تب ہی اعتدال
پزیر پوشاک اور نگہ کپڑوں کا پہنا ہوا ہے۔ بچہ کپڑے سب نہیں اتار کر
جاتے تب اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔

نیلے بھیلے رہنا ہی بیماری کا مول لیسنہاز۔ میلہ ہنسنے سے یہی سبب تسم کی جلد
کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

صحت اور ریاضت۔ صحت برباد کرنے والا ایک ہی فصد زیادہ
کیجاتی ہے تب اس سے ہی صحت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ برعکس اسکے بربادیت
کم یا بالکل نہیں کیجاتی ہے اور آدمی کا بلی کرنا ہے تب ہی بیماری پیدا ہو جاتی
ہے +

دماغی کمزوری۔ دماغ کا زیادہ زور لگانا یا اکثریت سے مسلسل کرنا ناممکن
جب ساتھ ان باتوں کے نیند بھی کم آتی ہو اور دل کے اندر تکرار دہرنا ہو
ہو اور زیادہ خوشی و غورمی یا رنج و خشم فکر و تردد اور خوف، کہا جاتا ہے جو عیش
بیماری کے ہیں +

ضرب و خشم اور مصدمات بیرونی۔ جیسے چوٹ کا لگنا جسم
کے کسی حصہ کا عرصہ تک باہر ہنا۔ کسی کام میں زیادہ زور لگانا۔ ایک بل پر عرصہ

مٹک رہنا۔ کسی حصہ جسم پر کسی غیر جنس کا غلبہ نہ کرنا جیسے مثلاً ذیمن پتھری کا ہونا۔ رودوان میں سُدون کا جمع رہنا۔ جائیداد سیٹھوٹی یا نباتی اشیاء کا تراثر کرنا۔ نفس کے ذریعہ خاک کے ذرات کا کشش میں دھنسل ہونا۔ غرض ان ساری باتوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے *

مرض کے وہ اسباب جو خاصے ناسل کے متعلق ہیں

کثرت جماعت۔ جلق * ادویات * ہین یا کثرت پشہ ہونا۔ کانٹہ ہونا۔ ان ساری باتوں سے بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں *

بیماری کے خاص اسباب

وہ ت کے قسم کی ذہنی اشیاء جیسے لڈینی سپید اور سیاہی اور خاص فو۔ رس نہ پہنچا۔ تہا بنا اور سونا وغیرہ اشیاء جب جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تب اپنا اپنا اثر جسم کے کسی خاص حصہ یا سارے بدن پر پیدا کرتے ہیں *

مرض کے وہ اسباب جو نباتی مادہ سے پیدا ہوتے ہیں

جیسے فینون۔ کائی کی قسم کے نباتی مادہ۔ جو جسم کی مختلف ساخت میں پیدا ہو جاتے ہیں اکثر بیماری پیدا کرتے ہیں خاصاً چنڈ کی بیماریوں کو * ایک اور قسم کا نباتی مادہ جو معدہ میں پیدا ہوتا ہے اور جسکو اصطلاح میں اسٹون کہتے ہیں اس سے تھے اکثر بیماری ہو پڑتی ہے * نباتی مادہ جب متعفن ہونے پر ہوتا ہے تب اس سے فوٹی بخار پیدا ہوتے ہیں *

مرض کے وہ سبب جو سیتو امادہ سپریدیوہین

جیسے کن - تپے - ری - ڈش یعنی تیلنی بھی - شکم کے کچھوے - جلد کے کرم *

مرض کے وہ سبب جو آدمی کے جوہم کے اندر پیدا ہو جائیں

جب ماضیہ بگڑ جاتا ہے غذا کا استحراج ہونے نہیں پاتا ہو اور اس سبب جسم کی پرورش میں خلل واقع ہو جاتا ہے تب خون کی حالت بگڑ جاتی ہے اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے - جیسے گاؤٹ کی بیماری - جب یہ مرض ایک دفعہ پیدا ہو گیا تب نسلا بے نسلا جاری رہتا ہے *

مزاج - دموی مزاج کے آدمیوں کی طبیعت دموی بیماریوں کی طرف مائل رہتی ہو مثلاً انفلا میشن سیلان خون اور اجتماع خون کی بیماریاں * یعنی مزاج کے لوگوں کو نزلہ اور زکام اور استسقا کی بیماریاں ہو جایا کرتے ہیں * جنکا مزاج صفر آدمی ہوتا ہے * مکی طبیعت جگر معدہ اور امعاء کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے لئے مائل رہتی ہے * اور عصبی مزاج والے باؤگولاشنج اور عصبی دردوں میں مبتلا ہوتے ہیں *

عسر - نہایت نپے بچے جلدی بیماریوں اور عا اور سدرہ کی بیماریوں میں اور امراض دماغی میں مبتلا ہونے کے لئے مائل ہتی ہیں اور عا طغلی سے لیکر بلوغت تک معدہ اور امعاء اور کرم اور بخار اور کردپ کی بیماریوں کا طبیعت میں میلان رہتا ہے اور جوانی میں امراض دموی در خاصہ عورتوں کو جسم کی بیماریوں کا میلان رہتا ہے اور نشو و نما جب اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تب ایسی بیماریوں کی طرف طبیعت مائل رہتی ہے جیسے سیلان خون

اور انگلیکیشن اور جو اس سر میں آدمی کمزور ہو تو قتل کی بیماری ہی ہو جاتی ہے اور جب آدمی عین شباب میں ہوتا ہے اس وقت طبیعت اعتدال پر رہتی ہے عادات اسکے اس سر میں اچھے ہوتے تو بیماری سے محفوظ رہتا ہے ورنہ نقصانگہ گروہ وجع منھاصل اور قصور دماغ میں وہ شخص مبتلا ہونے کے لئے مائل رہتا ہے۔ جو جو اس سر زیادہ ہوتی جاتی ہے انسان مختل جسمانی اور روحانی نظر زیادہ مائل ہوتا ہے اور تفکرات دنیاوی میں مبتلا۔ اس واسطے صدمہ قسم کی بیماری میں گرفتار ہونے کے لئے طبیعت اسکی تعدد رہتی ہے۔

جنسیت۔ یہ بات ظاہر ہے کہ عورت اور مرد کے توالد اور تناسل کی بیماریاں خاص خاص ہوتی ہیں مگر قطع نظر اسکے جب ہم کسی مرد کو دیکھتے ہیں تو اس کے ماتھے پاؤں مضبوط عضلات سخت اور طاقت جسمانی اور قوت روحانی زیادہ پاتے ہیں اس واسطے مردوں کو منھاصل کی بیماری اور امراض دماغی زیادہ ترستے ہیں۔ اور عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ نازک اندام ہوتی ہیں اور ان کے دماغ اور اعصاب کو اونے سبابت سے تحریک ہو جاتی ہے اس واسطے دماغی اور عصبی بیماریوں میں عورات اکثر مبتلا ہو جاتی ہیں۔

علامات

زندگی کیمالات میں جب کوئی بات ایسی پیدا ہو جس سے کوئی بیماری ثابت ہو اسکو انگریزی میں سیمپٹم۔ ٹم اور عربی میں علامات کہتے ہیں۔ علامتیں کسی قسم کی ہوتی ہیں چنانچہ ایک جنے زل یا کانیں ٹلے۔ ٹیو شو۔ بیل۔ سیمپٹم یعنی علامات عامہ۔ دوسرے لوکل سیمپٹم یعنی علامات خاصہ۔ پہلی قسم کی علامتیں وہ ہوتی ہیں جنکا تعلق سارے

جسم سے ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم یعنی مسلمانانہ خاصہ وہ ہیں جو جسم کے کسی خاص حصہ پر محدود ہوں۔ دوسری قسم کی مسلمانین ہیں جنکو آب - چاک - ٹیو - سٹمپ - ٹنٹس بولتے ہیں۔ یعنی مسلمانین وہ ہیں جو طیبہ کو معلوم نہ کر سکتی ہیں جیسے شری یا درم - چارم سب - چاک - ٹیو - سٹمپ - ٹنٹس مسلمانین پر ہیں جنکو صرف مریض ہی معلوم کر سکتا ہے جیسے درم اور کسی حصہ جسم کا سن ہو جانا۔ پانچویں قسم مسلمانوں کی وہ ہے جسکو ڈاے - برکٹ یا ای - ڈیو - پینٹ بولتے ہیں یعنی وہ مسلمانین جو خاص بیماری کی جگہ پر پائی جاتی ہیں - چھٹی قسم ان - ڈاے - برکٹ پائسم - پے - تے - ٹکٹ مسلمانین وہ ہیں جو جسم کے کسی ایسے حصہ میں پائی جاتی ہیں جو بیماری کے مقام سے دور ہو جیسے درم و گردہ میں تھے کا ہونا - جگر کی بیماری میں دہنے کندہ سے پروردہ کا ہونا وغیرہ - ساتویں پری - ما - نے - ٹے - ری یا پری - کر - سری - سٹمپ - ٹنٹس - یہ وہ مسلمانین ہیں جن سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب کوئی نہ کوئی بیماری ظاہر ہو - نہ دالی - نہ جیسے مرگی کی نوبت سے پہلے شکوں کا نظارہ وغیرہ - اسی قسم کی مسلمانوں کو عربی میں مسلمات مندرہ کہتے ہیں - آٹھویں پے - تہاگ - نو - ما - پینٹ - سٹمپ - ٹنٹس مسلمانین وہ ہیں جو کسی خاص بیماری میں پائی جا دیں اور کسی دوسری بیماری میں نہیں - مسلمانوں کی نسبت ایک اور اصطلاح بولی جاتی ہے جسکو سائین کہتے ہیں - بعض کے نزدیک سٹمپ - ٹم اور سائین مترادف الفاظ تصور کئے جاتے ہیں مگر یہ غلط ہے کیونکہ سائین اس سلامت کو کہتے ہیں جس سے کوئی بیماری پہچانی جاوے یعنی سائین کے معنی درحقیقت پے - تہاگ - نو - ما - پینٹ - سٹمپ - ٹنٹس کے ہیں یعنی مسلمات تشخیصی - انہی مسلمانوں کی نسبت ایک اور اصطلاح یہ بھی بولی جاتی ہے کہ نے - نہی - کل - سائین - درحقیقت اس اصطلاح میں وہ کچھ مسلمان

آجاتی ہیں جسکو طبیب دریافت کر سکتا ہے یعنی کل آپ - بجائے ٹیو
 ڈنٹس لیکن بعض طبیب اس اصطلاح سے اشیاء متون کو لیتے ہیں
 جو اس - کل - ٹے - ٹرن یا پور - ٹشن وغیرہ وغیرہ ترکیبوں سے دریافت ہو سکتی
 ہیں۔ مرض کی تشخیص میں اکثر ایسا کیا جاتا ہے کہ کئی قسم کی علامتوں کو جمع
 کر کے مقررہ کرتے ہیں اور تب اس بیماری کی تشخیص کرتے ہیں مگر بعض دفعہ
 ایسا ہو جاتا ہے کہ ان علامتوں میں سے ایک علامت ایسی بیماری
 نکل اُتی ہے کہ جو عوام کے نزدیک خود مستعمل درجہ تصور کیا جاتا ہے اور
 اسیکے وسیعہ کی واسطے علاج بھی کیا جاتا ہے جیسے ڈراپ - سنی یعنی استسقا اور جان ٹیر
 یا بی پر تان اور ہے - مومہج یعنی خون کا آنا - جب اس قسم کی کوئی بیماری نکل
 نکل آوے تو یہ ضرور دریافت کرنا چاہئے کہ کس بیماری کے سبب وہ عمت
 پیدا ہوئی ہے *

واقع ہو کہ علامتوں سے واقفیت پیدا کر فی ہر طبیب کے واسطے ضروریات
 سے ہے کیونکہ اکثر انہیں علامتوں کے ذریعہ بیماری پہچانی جاتی ہے اور
 اسکا انجام نیک یا بد بھی کہا جاتا ہے تم نے دیکھا ہو گا کہ جو طبیب حاوق اور
 تجربہ کار ہوتے ہیں مریض کو دیکھتے ہی اکثر اسکی بیماری پہچان لیتے ہیں۔
 باریت فقط اسطور سے حاصل ہوتی ہے کہ انہوں نے امراض کی علامتوں کو
 اچھے طور پر سوچا اور نہایت کوشش سے ملاحظہ کیا تھا *

تشخیص بیماری کی

اصطلاح انگریزی میں اسکو ڈا - یاگ - نوٹس کہتے ہیں * ہم نے اوپر
 نسبت کا ذکر کیا ہے کہ بیماری کے پہچاننے کے واسطے علامتوں کو چاہی

طو پر پہچاننا نہایت ضروریات سے ہے +

بعض طبیبوں کو علامتوں سے اس قدر واقف نہ ہوتے ہیں کہ ہر فیکیو دیکھتے ہی
 انکی بیماری پہچان لیتے ہیں اور یہ بھی دریافت کر لیتے ہیں کہ آیا بیماری مذکورہ
 یا شدید ہے مثلاً سل کی بیماری نیو۔ مونیا لیسے ذات الریه ورام۔ نمایسی +
 لیٹھے افخ (الیه اوید مرائش) ڈیبر (لیه) ایک بیماری گروہ کی ہوتی ہے (ان بیماریوں
 کے آثار مریض کے چہرہ پر ایسے نمایاں ہوتے ہیں کہ یکدم تجربہ کار انکو فوراً
 پہچان لیتے ہیں لیکن جب کوئی بیماری چھے طور پر ظاہر نہیں ہوتی جیسے عین ابتدا
 ورجہ سل یا جیچاک کا یا جب صرف ایک ہی علامت ظاہر ہوتی ہے جیسے تھو
 کی بیماری جو کئی سببوں سے پیدا ہو سکتی ہے اسوقت طبیب کو مرض کی تشخیص
 میں دقت پڑتی ہے اور اسوقت بھی پہچاننا بیماری کا مشکل ہوتا ہے کہ جب مریض
 ہی کے بیان سے بیماری کی تشخیص نہ پڑتی ہے۔ غرض حالات مذکورہ الصدا
 ایسے ہیں کہ جن سے طبیب کی لیاقت معلوم ہو جاتی ہے + بعض وقت مرض
 کی تشخیص میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند علامتوں کے ظاہر ہونے کا ~~تکلف~~
 کرنا پڑتا ہے اور بذریعہ سینہ بین کے سینہ کو امتحان اور آلات سے قارورہ
 کا امتحان کرنا پڑتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاف کہہ دینا پڑتا ہے کہ
 بیماری ہماری سمجھ میں نہیں آتی +

مرض کی تشخیص میں ان باتوں کو دریافت کرنا چاہئے کہ وہ بیماری کس
 حصہ میں ہے اور اس حصہ جسم کا کتنا حصہ اس بیماری میں مبتلا ہے اور وہ ضرر
 کیونکر پیدا ہوا اگرچہ یہ ساری باتیں کامل طور پر اکثر دریافت نہیں ہو سکتیں
 پہر بھی ان کے دریافت کرنے میں حتی الوسع کوشش ضرور کرنی چاہئے بعض
 طبیب مرض کی تشخیص میں صرف اسیکو کٹنی سمجھتے ہیں کہ اس مرض کی لڑا

بہاری بیماری میں ہین صرف اُنہی کا ملاحظہ کر کے مرض کا نام نہ کہہ دیتے
ہیں جیسے ڈوس - پپ - شیا یا صرف ایک ہی بیماری سلامت کو مرض قرار
دیتے ہیں جیسے اسامی - ٹش اسبات کے دریافت کرنے میں بالکل کوتاہی
نہیں کرتے کہ علامات مذکورہ کا ممکن کس کس عضو کے بگاڑ سے ہے اور
بعض طبیب ایسا بھی کرتے ہیں کہ جب انکو معلوم ہو کہ مثلاً ماضوف ہے
تو اس کو غنیمت سمجھتے ہیں یہ نہیں دریافت کرتے کہ عضو مذکور کا کس قدر حصہ
مرض میں مبتلا ہے اور وہ بیمار - می اس عضو کے خاص کس جگہ پر واقع ہے اور
نزید دریافت کرتے ہیں کہ اس بیماری کے سبب سے کوئی اور عضو بھی ماضوف
ہو گیا ہے یا نہیں - پس اسکو کامل تشخیص نہیں کہہ سکتے ۔ جب مرض کی تشخیص کریں
تو اس بیماری کی کل علامات اور اسکی نسبت اور اور جو باتیں دریافت ہوتی
ہیں انکو بھی اپنے دل میں جمع کر کے غور کرنا چاہئے اور اچھی طرح فکر کر کے اسے
نتیجہ نکالنا چاہئے مثلاً بعض آدمیوں کا یہ تاہدہ ہے کہ دراصل انکو کوئی ہی بیماری
نہیں ہوتی ہے پھر بھی کسی نہ کسی قسم کی شکایت ضرور کرتے ہیں غرض ان کی
فریب کرنے کی ہوتی ہے ۔

بیماری واقعی میں اگر ثابت ہو جائے تو اسکی نسبت یہ دریافت کرنا چاہئے
کہ مرض اکیوٹ (حاد) ہے یا کرا - نک (مزمن) اور یہ کہ وہ بیماری امراض
عامہ میں سے ہے اور جو ہے تو کس قسم کی ہے - صرف ایک ہی یا کئی
اعضا میں مبتلا ہیں یا وہ بیماری ان اعضا کی کسی بناخت میں محدود ہے
اگر ہے تو یہ دریافت کریں کہ بیماری کے سبب سے اس عضو کا صرف فعل بگڑ گیا
ہو یا مرض نے اسکی ساخت کو بھی خراب کر دیا ہے ۔ بعد ازاں جہاں تک ممکن
ہو یہ بھی دریافت کرنا چاہئے کہ بیماری کس جگہ ہو کس عذاب ہو اور کس قسم

کی ہے۔ اس بات کو بھی نہ بھولیں کہ امراض عامہ کے ساتھ خاص خاص اعضا میں بھی بیماری ہو سکتی ہے جیسے اکثر بخار و عنین ہو اگر تاہم یہ مختلف بیماریوں کی ٹیپیکل تشخیص مختلف طور پر کیجاتی ہے مثلاً بعض بیماریوں کی تشخیص نہایت آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں بعض علاماتیں ایسی ظاہر ہوتی ہیں کہ جن سے ہم اس بیماری کو فوراً پہچان سکتے ہیں مگر بعض اوقات ہم کو اس خاص مرض کی تشخیص کے لئے ان بیماریوں سے اسکا مقابلہ کرنا پڑتا ہے جنکو ہم نے پہلے کبھی پہچانا تھا۔ پس جب کسی بیماری کی تشخیص کریں تو پہلے بعض سے پوچھیں کہ مرض کیونکر شروع ہوا اگر یہ بیماری کسی کے خاندان میں ہے یا نہیں اور اس مرض سے پہلے بیمار کی صحت کس طرح کی تھی۔ مرض موجود کس قدر عرصہ رہا اسکا سبب کیا ہے اور کیونکر یہ مرض شروع ہو کر بڑھا ہے۔ بی۔ اذان اسکی علامات موجودہ کو ملاحظہ کریں۔ باوجود ان ساری باتوں کے دریافت کرنے کے بھی اکثر اوقات تشخیص میں شک رہ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اپنی رائے کے دینے میں توقف کرنا چاہئے۔ دیکھیں کہ مرض کے دور میں کوئی اذہم علامتیں ہی پیدا ہوتی ہیں یا نہیں کہ جن سے تشخیص میں بیماری کی ہو سکے۔ اسے دیکھتے ہیں تو قلم حاکم اسوقت ضرور کرنا پڑتا ہے کہ جب کسی شدید بخار کی بیماری میں تشخیص کرنے پر قلم حاکم اذان باتوں کے جنکا ذکر اوپر کیا گیا جلیب کو ان مختلف امراض کی علامتوں سے ہی واقفیت پیدا کرنے چاہئے جو خاصہ انہی بیماریوں میں پائی جاتی ہیں کسی اور میں نہیں اور جنکو اصطلاح میں پے۔ تھاک۔ نو۔ ما۔ بکٹسم۔ ٹرم کہتے ہیں۔ بیماری کی تشخیص کے لئے جلیب کو ہر ایک مرض کے دور اور انجام سے بھی واقفیت ہونی چاہئے۔

مرض کا انجسام نیک یا بد کا کہنا

شم

خدا را از طبیب من پرسید کہ آخر کے شو وین باتوان بہ

اسکو اصطلاح انگریزی میں پراگ۔ نو۔ سس بولتے ہیں یہ واضح ہو کہ بیمار کے خویش اقارب کا ہمیشہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ حکیم سے اپنے رشتہ دار کی بیماری کا نتیجہ نیک یا بد پوچھ بیٹھتے ہیں سو فٹ طبیب کو جواب دینے میں بڑی احتیاط چاہئے کیونکہ مریفہ کو بد و نیک چھ طور پر امتحان کئے اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ نتیجہ نیک نکلیگا اور خدا انخواستہ وہ نتیجہ بد نکلا تو حکیم کی اسیمن مائیت ثابت ہوگی اور روزگار میں خلل پڑ جائیگا۔ پس مائیتیکہ بیمار کو سر سے پاؤں تک اچھی طرح امتحان نہ کر لین اور اس کے مرض کی ہر ایک علامت کو بخوبی نہ پہچان لین تب تک ہرگز اس مرض کا انجسام نہ کہنا چاہئے کیلئے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی مرض کی ظاہری علامات نہایت شدید ہوتی ہیں مگر عضو مائوت کو زیادہ صدمہ نہیں پہونچتا اس صورت میں انجسام کی قدر نیک نکل سکتا ہے۔ اور کہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ظاہری علامات تو خفیف ہوتی ہیں پر عضو مائوت کی ساخت نہایت بگڑ جاتی ہے اس حالت میں مرض کا نتیجہ ہمیشہ بُرا نکلتا ہے اور یہ کیجب کوئی بیماری بچوں یا جوانوں کو ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ بہ نسبت بڑھون کے اکثر جیسا نکلتا ہے اور اپنا قاعدہ اسباب میں یہ ہے کہ بیمار کے منہ بہ ہم صاف طور پر یہ نہیں کہہ دیتے کہ تیری بیماری مُہلک ہی بلکہ ہم اسکو اُمید نفا کے دیتے ہیں اگرچہ مرض اسکا مُہلک ہی ہوتا کہ ہم اسکا صدمہ نہ مار دے کیونکہ دنیا

بامید قائم ہے اور بیمار کے رشتہ دار کو بھی صاف یہ نہیں کہتے کہ مریض اس
بیماری سے جانبر ہو جائیگا یا ہلاک ہو جائیگا بلکہ ایک بات ایسی کہہ دیتے ہیں کہ جس
زندگی اور موت صاف طور پر مفہوم نہ ہو سکے کیونکہ اپنے تجربہ میں بارہا ایسا ہوا ہے
کہ بعض مریضوں میں ہم نے نہایت ردی علامتیں پائی ہیں اور انکو دیکھ کر
اپنے دل میں نچت ٹھہان لیا ہے کہ شام تک یہ بیمار بچنے کا نہیں تپس بھی جب دوسرے
دن صبح کو جا کر دیکھا ہے تو بیمار کو رو بصحت پایا ہے اور اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ
شدید بیماری میں علامتوں کو دیکھ کر ہم کو اُمید قوی ہوئی ہے کہ اب ہمارا بیمار
مرنے کا نہیں تپس بھی رہا ہلاک ہو گیا ہے غرض جبکہ طبیعت کا یہ حال ہے کہ آن کے
آن میں کچھ کی کچھ ہو جا سکتی ہے تو اسکی نسبت کوئی بات یقیناً کیونکر کہی جا سکتی ہے


علاج

اصطلاح انگریزی میں اسپیکٹریٹ۔ منٹ کہتے ہیں۔ جو وقت بیماری کی پہچان
لیا اور اسکی علامتوں کو خوب طرح ملاحظہ کر لیا اسوقت اس بیماری کے علاج
کی طرف متوجہ ہونا چاہئے علاج کئی قسم کا ہوتا ہے یعنی بعض دفعہ جب مرض
بخوبی سمجھ میں آجاتا ہے اور جب ہم اپنی دوا کے اثر سے اچھے طور پر واقف
ہو جاتے ہیں اسوقت اس بیماری کا علاج حکمت کے قاعدہ سے کرتے ہیں اور
جب ان دونوں میں سے کوئی بھی بات ہمارے مفہم میں نہیں آتی اسوقت
اندھے گے طور پر دھم کو ٹٹولنا پڑتا ہے یعنی کہی تو ہم کسی قسم کا علاج کرتے ہیں
اور کہی کیسی طور کا۔ کہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیماری کے استیصال کامل کے لئے
علاج کرتے ہیں اور کہی سے صرف استہامی ہو سکتا ہو کہ مرض کو کس قدر تخفیف ہو جائے
شکست کی بیماری کا علاج کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب یہ بیماری بڑھ جاتی ہو

تب علاج پذیر نہیں ہوتی ہے اور بعض دفعہ کسی مرض کے ظاہر ہونے سے پیشتر ہم کو ایسا علاج کرنا پڑتا ہے کہ جس سے وہ بیمار ہی ٹوک جاوے اُس کو انگریزی میں پرو-فاتی-کاکٹ-یاکٹ ٹریٹ-منٹ اور عربی میں علاج مین حفظ ما تقدم بولتے ہیں۔

علاج کے وقت بیمار کے حالات موجودہ کا بھی لحاظ رکھنا چاہئے مثلاً اگر بیمار کا چہرہ ہریکا اور بے ہوش ہو تو اس صورت میں کوئی دوا مولد خون تجویز کرنی چاہئے جیسے مرکبات فولاد-اور جب بیمار کے جسم میں زیادتی خون کی ثابت ہو تو اس صورت میں تنقید سے علاج کرنا چاہئے مثلاً معہل وغیرہ +

غرض حاصل اس مقالہ کا یہ ہے کہ بیماری کا علاج معالجہ ایک امر نہایت دشوار ہے جب تک حکیم اپنے فن میں حاذق نہ ہوگا تب تک اُس سے بیماری کا علاج اچھے طور پر ہرگز نہیں کیا جائیگا۔ بیماری کی تشخیص اور تہہ گوئی اور علاج کے وقت حکیم کو جائز کہ اپنا سارا زور لگا دے اور علم شریع اور علم الاء و دواء اور ان سارے علوم کو جو طب سے تعلق رکھتا ہے بن بیمار کے بستر کے پاس کام میں لاوے آپس بھی کثرت افادت غلطی کا احتمال ہوتا ہے۔ پس یاد رہے کہ ہر حالت میں مرض کا علاج خدا کی توکل پر کرنا چاہئے اپنی لیاقت اور تجربہ پر ہرگز بہرہ دہانگی نہ کرنا چاہئے ایسے مفرد طبیب ہنرمند اور طبعون حسدائق ہوتے ہیں +



باب سوم

علامات اور نشانات جنکا جاننا تشخیص بیماری واسطو اشد ضروریات سے ہے


مقالہ اول

شکم اور اعضا بطن

فقہہ ۱۔ امتحان شکم واسطے تاکہ بیماری محدود ہو اور اسکا بیان آسان سینہ اور شکم کو چند خیالی خطوط سے کئی اقسام میں تقسیم کیا ہے چنانچہ پہلے پہل چار خط سینہ اور صدر کی چاروں طرف کھینچا ہے اول خط الف الف الف (دیکھو تصویرین آ۔ اور ب)

تصویر دوم

تصویر اول



ہنسی کی ہڈی کے برابر کھینچا ہے اور دوسرا خط ب ب کوڑھی کی گری کچھ نیچے کی ٹوک

کے برابر۔ تیسرا خط ت دسویں پسلی کی کتری کے برابر اور چوتھا خط ث
ای۔ یلم ٹھی کے اوپر کے کنارہ کے برابر اور دوسیدہ خط ج ج کے
ذریعہ جو ہنے اور بائیں چٹون کے مقام کے درمیانہ حصہ سے شروع ہو کر خط
ب ب دین جاتے ہیں۔ شکم کو پھر تہ اقلیم میں تقسیم کیا ہے تہ درمیانہ اور
تہ جانبی چنانچہ تہ درمیانہ اقلیموں کا شمار جب اوپر سے نیچے کی طرف کریں تو
۱۔ لائیکم بالا سے ناف یعنی اپے۔ گس۔ ٹرک۔ ری۔ جن آٹیکا۔ اور دوسرا
درمیانہ اقلیم ناف جسکو انگریزی میں اُم۔ بے۔ لائی مکمل۔ ری۔ جن کہتے
ہیں اسکے پنج میں ناف ہوتا ہے اور تیسرا ٹھی۔ پو۔ گس۔ ٹرک۔ ری۔ جن
۲۔ یعنی اقلیم ٹھی۔ پو۔ گس۔ ٹرک۔ ری۔ جن کا اقلیم اگر جانبی اقلیموں کو بھی اوپر سے نیچے
کی طرف شمار کریں تو پہلے دہنا اور بائیں ٹھی۔ پو۔ کان۔ ڈر۔ یک۔ ری۔ جن
آٹیکا اور تہ دہنا اور بائیں اسی۔ لائیک۔ ری۔ جن یعنی مقام کو کھ۔
ان اقلیموں میں اعضا سے منسلک ذیل ہوتے ہیں چنانچہ اپے۔ گس۔ ٹرک
ری۔ جن یعنی اقلیم بالا سے ناف میں درمیانہ حصہ معہ کا اور اس کا خم اسفل اور
بایان لو تہزاجسکر کا اور جگر کا لا۔ یو۔ لس۔ اس۔ پے۔ جی۔ لے۔ آئی۔ ریہ
بھی جگر کا ایک چوٹا سا لو تہزاج ہے اور جگر کی رگیں اور پتھر یا س گلی یعنی لب لب
کا سر ہونا ہے۔ اور ان اعضا سے نیچے سی۔ لیاک۔ اک۔ یس اور
سی۔ لے۔ لو۔ تر گنگ۔ لے۔ اُن اور ایک حصہ دی۔ نا۔ کے۔ داکا اور
۱۔ یار۔ ٹھا اور دی۔ نا۔ ۱۔ زمی۔ گاس اور تہو۔ را۔ سب۔ ڈوگٹ ہوتا ہے۔
اُم۔ بے۔ لائی۔ مکمل۔ ری۔ جن یعنی مقام ناف میں اور من۔ ٹم اور
سے۔ سن۔ ٹری اور دوسے ڈیو۔ ڈی۔ نم یعنی معاشنا عشرہ اور
کو۔ لن یعنی معاتوں کا اثر حصہ اور چند چھ۔ جی۔ نم۔ معاشنا نم

رودے کے ہوتے ہیں ۔

اور ہائی - پو - گس - ترک ری جن میں مقام زیر ناف میں مثلاً اور کبھی
چھوٹے رودے ہوتے ہیں اور مثلاً کے پیچھے عورت میں جسم ہوتا ہے اور مرد
میں ریکٹم اپنے معاستیقم اور دہنی ہائی - پو - کان - ڈرک ری جن میں دہنا
لوہڑا جگر کا اور پتہ اور ایک حصہ ڈیو - ڈی - ثم رودہ کا اور پتہ ہوتا ہے اور حصہ
کو - لن کا اور دونوں سو - پرا - ری - نل کپ بشیول اور ایک حصہ دہنے گڑھ
کا ہوتا ہے اور بائیں جانب کی اسی تسلیم میں حصہ کا نسملی کم چڑا سلا
کپ بشیول اور بائیں گڑھ کا اور پتہ کا حصہ ہوتا ہے اور دہنی ای -

ری جن میں سی - کم اور اخیر حصہ ای - لیم کا اور ابست دہنی حصہ کو لن کا ہوتا ہے
اور بائیں جانب کی اسی ری جن میں سنگ - مائیڈ فلکشر اور تھوڑا سا اترتا
ہو حصہ کو - لن کا ہوتا ہے الف الف اور ب ب اورت کو اگر شیت کی طرح
لیجائے اور شیت کی ہڈی کے برابر ایک خط سے اگر ان کو تراشے تو نیچے
کی جانب چار حصہ میں تقسیم ہو جائیگی چنانچہ دہنا اور بایان ڈارسل ری جن
اور دہنا اور بایان لبر ری جن دہنے اور بائیں ڈارسل ری جن میں گڑھ
کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اور دہنا لبر ری جن میں سی - کم رودہ اور دہنے گڑھ
کا نیچے کا حصہ ہوتا ہے اور بائیں طرف کی اسی تسلیم میں کو لن کا ساگ - مائیڈ
فلکشر اور بائیں گڑھ کا نیچے کا حصہ ہوتا ہے پر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ
ان اعضا میں سے جب کوئی عضو پھول جاتا یا بڑھ جاتا ہے تو قرب کی اقلیموں
تک پھیل جاتا ہے مثلاً پھولا ہو حصہ یا مثلاً ام - بی - لاسے - کل ری جن
تک پہنچ جاتا ہے اور پھولی ہوئی کو لن اپنے - گٹرک ری جن تک پہنچ

جاسکتی ہے اور بڑھا ہوا جگر یا طحال دہنے یا بائیں ای۔ لائیک ری جن تک اتر
 آسکتی ہے۔ عورت اور مرد میں دو مختلف سر میں شکم کی مقدار اور شکل میں
 اختلاف پڑ جاتا ہے چنانچہ بچوں کا شکم بڑا ہوتا ہے اور نوجوان کا چھوٹا
 اور عورتوں کے شکم کا حصہ زیر ناف بڑھا ہوا ہوتا ہے اور ایک ہی شخص کے
 شکم کی مقدار میں بھی مشرق پڑ جاتا ہے مثلاً عمدہ اگر خالی یا پُر ہوا معا اگر ریح سے
 خالی یا پُر ہونے سے ہذا القیاس مثلاً اگر خالی یا پُر ہو تو ان بواعث سے شکم میں ضرور
 فرق پڑ جائیگا علاوہ ان میں ان بواعث سے بھی شکم کی مقدار بڑھ جاسکتی ہے اور
 شکل اسکی بدل جاسکتی ہے جیسے حمل اور استسقا اور استسقا سے خفیۃ الرحم نفع شکم
 بڑھ جاتا ہے سگریٹ مال وغیرہ کا شکم کے امتحان سے تین ترکیبیں کام میں آتی
 ہیں۔ اول۔ انس۔ پکشن یعنی دیکھنا بہانہ ۴ دوم ہاتھوں سے ٹٹولنا ۵ سوم
 پرکشن یعنی انگلیوں سے ٹٹولنا ۶

اول۔ انس۔ پکشن۔ اس ترکیب سے شکم کی مقدار اور شکل
 اور حرکات دریافت ہوتی ہیں۔ مثلاً مقدار شکم کی ان سببوں سے بڑھ جاسکتی
 ہے جسکا ذکر ابھی کیا ہے اور بموجب وسیع یا محدود ہونے سبب کے ہی سارے
 یا کسی حصہ شکم کی شکل بدل جاسکتی ہے۔ تیسرا شکم کی شکل کے ابتدائی حالات سے
 بھی واقفیت پیدا کرنی پڑ ضرور ہے مثلاً ان باتوں کا جاننا واسطے تشخیص کے بہت
 ضرور ہے کہ جب حمل کے سبب سے شکم بڑھتا ہے تب رفتہ رفتہ یکساں اور
 درمیان سے بڑھتا ہے اور پیٹ جب استسقا سے خفیۃ الرحم سبب سے بڑھتا
 ہے تب دہنی یا بائیں جانب سے بڑھتا ہے اور جب شکم میں پانی بھر جاتا ہے تو پیٹ
 رفتہ رفتہ اور چاروں طرف سے برابر بڑھتا آتا ہے اور شکم کی حرکات کے دریافت
 کرنے سے خاصکر دے جو سبب حرکات نفخ کے پیدا ہوئے ہیں تشخیص مرض

میں بہت مدد ملتی ہے شکر مرض ہے۔ رمی۔ ٹوہنا۔ ٹیٹس اور شکم سے۔ حرکت کے درودن میں منجس صرف سینہ کی حرکات سے لیا جاتا ہے۔ شکم کو حرکت نہیں ہوتی بلکہ اس کے جب سینہ کے عضلات یا عضلہ ڈا۔ یا ٹیٹس میں درد ہوتا ہے اور ذات الجنب کی ہمیا۔ یا ہا بھی شکم کے عضلوں کی حرکت سے۔ لیا جاتا ہے۔ سینہ کو حرکت نہیں ہوتی۔ ہا اور جب شکم بہت پھول جاتا ہے۔ تو اس کے سینہ کے عضلہ سے حرکت ہر جا لے لیں اور تیر۔ دم بند رہے۔ سینہ اور ڈا۔ یا فرام مسل کے لیا جاتا ہے اور جب ہر جا د شکم کا درجہ نہایت کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے اندر کے ہشہ۔ ڈا۔ یا۔ فرام مسل کو دبا دیتے ہیں اس وقت شکم کو بالکل حرکت نہیں ہوتی اور دم صرف سینہ کے ذریعہ سے لیا جاتا ہے۔

دوم۔ ہاتھوں سے ٹٹو لیا۔ عملادہ ان باتوں کے جنکا بیان اوپر ہو چکا ہے اس ترکیب سے شکم کی مقدار اور ڈول اور شکل اور نسبت بہت سا کچھ دیانت ہو سکتا ہے۔ عملادہ ازین شکم پر ڈا۔ یا ہر رکھنے سے اسکی حرکتیں جو تنفس سے ہوتی ہیں وہ بھی محسوس ہو سکتی ہیں اور اسی ترکیب سے ایارٹا کی حرکت جب اسی میں اینو۔ ریزم کہ ہمیا۔ سی ہو یا جب اس پر کوئی رسولی ہو یا جب اس میں سردی جمع ہو تو محسوس ہو سکتی ہے اور یہ بات بھی کہ شکم کس قدر گرم ہے اور چھونے یا دبانے کی برداشت اسکو ہے یا نہیں۔ جب شکم کی حرارت کا ملاحظہ کریں تو جسم کے کسی اور حصہ کی حرارت سے اسکا مقابلہ کریں۔ شدید پے۔ رمی۔ ٹوہنا۔ ٹیٹس اور جب اس کے امراض میں کہ جب شکم کے اندر انفلیمیشن بھی ہو پیٹ نہایت گرم ہوتا ہے اور اس گرمی میں ایک طرح کی تیزی محسوس ہوتی ہے جسکے دریافت کرنے کی عمدہ ترکیب نوید ریہ آلہ تیر۔ ما۔ مے۔ ٹر کے ہے اور اس طرح بھی دریافت کر سکتے ہیں کہ

پہلے کھلے ہاتھوں سے شکم کو آہستہ دبا دیں اگر اس سے بیمار کو درد معلوم ہو
 اور تین چار بھی موجود ہو تو یہ معلوم کرنا چاہئے کہ بیمار مرض پے۔ رمی۔ ٹو۔ ٹائٹس
 مین سب سے ہے لیکن مچا رہا ہو تو اس سے شکم کے عضلوں کا درد سمجھنا چاہئے اور
 اگر آہستہ دبائے سے درد محسوس ہو تو قدر۔ سنگ زور سے دبا دیں اور اگر خوب
 گہرا اور زور سے دبائے سے بعض درد شدید کے صرف ایک خفیف درد معلوم
 ہو تو اس سے یہ سمجھنا چاہئے کہ انخامیشن یا تو حیدہ یا امعا کے میو۔ کس پر وہ
 مین ہے اور پے۔ رمی۔ ٹو۔ نیم کے درد کے اچھے طور پر پیدا کرنے کے لئے
 شکم کو ایک جانب سے دباننا چاہئے تاکہ پر وہ نہ ٹوٹا۔ امعا کے اوپر سے کہنے لگے
 خاص تو لچ اور تو لچ سر بے (یعنی لڈ۔ کا۔ کاف) کے درد کو دبائے سے افادہ
 ہوتا ہے اور پہلے آہستہ اور بعد ازاں رفتہ رفتہ زور سے دبائے سے شکم
 کے عضلاتی درد کو بھی فادہ ہو جاتا ہے لیکن ہاتھوں کو اگر شکم سے دفعتاً اٹھا
 لیا جاوے تو عضلے حرکت میں آکر شدت سے درد کرنے لگتے ہیں اور شل جلد
 کے عصبی درد کے یہ عضلاتی درد بھی سلام مغز کی تحریک کے سبب پیدا ہوتا
 ہے اور برآمدگی دم کے وقت چونکہ عضلے کچ جاتے ہیں تو اس سے ہی درد
 پیدا ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ جب شکم کو دبا دیں تو اس وقت بیمار کے
 چہرہ کو جھٹیلاڑتے رہیں کیونکہ بنسبت بیمار کے جوابات کے چہرہ کے آثار سے
 زیادہ تر علم حاصل ہو سکتا ہے خاص کر جب علامات ردیہ موجود ہوں یا جب
 دماغ میں کوئی بیماری ہو۔ جب شکم میں زیادہ درد ہوتا ہے تو دباتے وقت
 مریض عضلوں کو خوب مکیچنے رکھتا ہے تاکہ شکم کے اندر کے اعضا دباؤ کے
 صدمہ سے محفوظ رہیں اس حالت میں ایسا کرنا چاہئے کہ باتوں میں لگا کر بیمار کی توجہ
 شکم کی طرف سے ہٹالیں۔ جب درد دہنے ماتی۔ پو۔ کان۔ ڈر۔ یک۔ می جہز

میں سبب بیاہی جگر کے ہوتا ہے تو اس صورت میں دہنا ریکٹس سل
 کچا ہوا ہوتا ہے۔ اگر امتحان کی وقت کو مٹی رسولی پائی جاوے یا شکم کے کسی
 خاص عضو کا حال پہچے طور پر دریافت کرنا منظور ہو تو یہ ترکیب کریں کہ بیاہ کو چت
 لٹا دیں اور سر کو اُسکی اس ترکیب سے بالمش پر رکھیں کہ کسی قدر اونچا اور سانسے کو ٹھیک
 رہی اور اُسکے ہاتھوں کو دو نو پہلو کے ساتھ دراز کر دیں دراز نوؤں کو شکم کی طرف
 ٹیک کر دو نو گھٹنوں کو راد ہر اوہر حُب را کر دیں۔ دو نو پاؤں بستر پر آسپین چڑھے
 ہوئے رہیں اور بیاہ کو اس بات کی تاکید کریں کہ شکم کے عضلوں کو خوب ڈھبیا چھوڑے
 باتوں میں اُسکو لگاے رہیں تاکہ توجہ اُسکی شکم کے امتحان کی طرف نہ رہے جب
 اس ترکیب سے شکم ڈھبیا ہو جاتا ہے تب رسولی کا موقع اور مقدار بخوبی دریافت ہو سکتی
 ہے اور شکم کے کُل اعضاء کی مقدار وغیرہ بھی آسانی سے معلوم ہو سکتی
 ہے ۴۰

سوم۔ پرکشن۔ یعنی شکم کو ٹھونکنا۔ اس ترکیب دو آوازیں پیدا
 ہوتی ہیں ایک ٹھوس اور دوسری صاف مثلاً جب معدہ یا امحایں پر بھجبری
 ہوتی ہے تب ٹھونکنے سے آواز صاف نکلتی ہے۔ ترکیب ٹھونکنے کی یہ ہے
 کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو شکم پر چاکرو ہٹے ہاتھ کی ایک یا دو انگلیوں سے
 ضرب لگا دیں منہ معدہ کے مقام پر کہ جب معدہ حالت معمولی پر ہو یا دوون
 کے کسی مقام پر کہ جب ہوا سے پُر ہوں ٹھونکنے سے ڈھپ ڈھپ کی آواز
 نکلتی ہے لیکن جب ہوا کے ساتھ کوئی رطوبت بھی ہوتی ہے تب آواز مذکور
 میں کسی قدر فرق پڑ جاتا ہے اور جب شکم کے ٹھوس اعضاء سے پر یا ایسے مقام
 پر کہ جہاں پانی بھرا ہو یا مجوف اعضاء پر کہ جب ان میں مطلق ہوا نہ ہو یا اعضاء
 کے مقام پر کہ جب وہ براز سے پُر ہوں یا بڑھے ہوئے جگر یا طحال پر یا رسولی پر

ہو نہ ممکن تو آواز ہوس پیدا ہوگی *

جب شکم کے اندر پانی ہوتا ہے تو اسطور سے دریافت ہو سکتا ہے کہ بیمار کو سیدھا بٹھا کر اسکے شکم کی ہر ایک جانب پر اپنے بائیں ہاتھ کی آہستہ کی آہستہ طور پر چسپان کریں اور دہنے ہاتھ کی انگلیوں سے شکم کی دوسری جانب کو ہونٹیں اس ترکیب سے پانی کی لہریں بائیں ہاتھ کی آہستہ کی آہستہ ہوئیں گی *

فقہہ - ۲ - قارورہ - پیشاب کو اصطلاح میں یو - رن کہتے ہیں - بیماری کی تشخیص کامل نہیں ہو سکتی ہے جب تک قارورہ کا امتحان اچھے طور پر نہیں کیا جاتا - اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قارورہ کے امتحان سے صرف گروے ہی کی بیماریاں نہیں پہچانی جاسکتیں بلکہ دیگر اعضا کی بیماریوں کا حال بھی دریافت ہو سکتا ہے - پس ہر حالت میں تارورہ کا ملاحظہ ضرور کرنا چاہئے - لیکن اسطور پر نہیں کہ جسطور پر دیسی طبیب یہ کہتے ہیں کہ مریض کو کہہ دیتے ہیں کہ لب فرش پر دو رکھڑ سے ہو کر تارورہ کی شیشی کو ہلاتے اور جیکم صاحبت لیکہ لگا سے دور سے سر ہلایا کر شکر دو ان کو کہتے جاتین کہ اوہو دیکھنا کہ وہ اس قارورہ میں کیسی حرمت کیسی صفرت اور کسقدر تشو اور سوجا بین - بلکہ تارورہ کو کسٹری کے قاعدہ اور باریک بین کے ذریعہ خوب توجہ سے امتحان کریں - یہ ساری ترکیبیں ذیل میں بیان کیجاتی ہیں *

خواصط ہری - صبح قارورہ توڑی عرصہ کا نفل ہوا ہلکے غلبے کے رنگ کا ہوتا ہے حرارت اسکی جسم کی حرارت غریبہ کی سطح پر ہوتی ہے اور بالکل شفاف اور بوماسکی خاص نگر بد نہیں ہوتی اور جب قارورہ مٹھو جاتا ہے تب وہ بوم بھی منع ہو جاتی ہے - ذائقہ کسقدر نہ ممکن اور تلخ ہوتا ہے اور وزن متناسب

۱۰۰۵ سے ۱۰۳۳ تک ہوتا ہے *

خواص کیمیائی - کیمیائی شناخت سے صحیح فارورہ مین جھوٹات کی
کی قدر زیادتی پائی جاتی ہے اور اگر اسکو اسقدر گرم کیجئے کہ جبین کہولنے
لگے تو کیسٹلج کاغیر نہیں پیدا ہوتا مرکبات بے - راجی - ٹا اور چاندی اور
سیسہ کے ملانے سے منجھرتہ نشین ہوتا ہے مگر معدنی تیزابوں کے ملانے سے
یہ بات نہیں ہوتی *

صحیح فارورہ مین - اگ - ٹا - لک - اسٹ کا عرق ملانے سے ایک ہلکا غبار
اگزا - لٹ - اف - لایم کا پیدا ہوتا ہے اور خالص لکلی دواؤں کا عرق ملانے سے
فاس - فٹ - اف - لایم کا منجھرتہ نشین ہوتا ہے اور ٹا - راکٹ - اسٹ کے
ملانے سے بھی ایک ہلکا غبار نیچے بیٹھ جاتا ہے *

متعفن ہو جانا فارورہ کا جب فارورہ تھوڑے عرصہ تک
ٹھہرا رہتا ہے تو میو - کس رطوبت ہلکے ابر کے طور پر بیکر فٹ کے پنیے مین
بیٹھ جاتی ہے اور اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے اور شناخت کیمیائی سے
اُس فارورہ مین کہا را پین ثابت ہوتا ہے اور اگر اسی مین کو می تیزاب چھوڑا
جاوے تو فوراً بوش کہانے لگتا ہے * یو - ریا کے اجزا علیحدہ ہوتے ہیں
اور تب فارورہ مین کار - بو - نٹ - اف - ایو - نیل پیدا ہو جاتا ہے اور ایک منجھ
ایو - نامی - کو - راکٹ - نے - شین فاس - فٹ اور فاس - فٹ - اف - لایم کا
تہ نشین ہو جاتا ہے میو - کس رطوبت مین این کمون کا تھوڑا سا حصہ پھنس جاتا
ہے جس سے اُس پشیاب پر ایک چھٹا سا بجاتا ہے - اس چھٹے کو اگر باریک مین
سے دیکھیں تو اسی مین ایو - نامی - کو - راکٹ - نے - شین فاس - فٹ کی فلمیں اور
فاس - فٹ - اف - لایم سفوف کے طور پر رطوبت میو - کس کے اجزا نظر آئینگے *

اگر قارورہ آذر بھی گندہ ہو جاوے تو زیادہ تر بدبو کرنے لگتا ہے اور پھر ایک نیلی یا سرخ رنگ کی سپوندی پیدا ہو جاتی ہے اور برتن کے پتیدے مین ٹری پبل ٹاس۔ فٹ کی تسلیں شل پروں کے اور ٹاس۔ فٹ ان لایم کا سنوٹ جم جاتا ہے اور اس کے کناروں پر بھی چمٹ جاتا ہے *

قارورہ کے اجزاء۔ یہ اجزاء دو قسم کے ہوتے ہیں ایک آ۔ گائیٹ اور دوسری ان۔ آر۔ ڈائیٹ * آر۔ گائیٹ اجزاء یہ ہیں یو۔ ریا اور لے تھکٹ اور ڈائی۔ پیو۔ رک اور لکٹ۔ ڈائیٹ اسٹڈ اور ایمو۔ نیا کے نمک اور فضلہ اور تھوڑی سی کریا۔ ٹین اور کریا۔ لے۔ مین *

ان۔ آر۔ گائیٹ اجزاء یہ ہیں کار۔ بائیٹ اور مائے۔ ڈرو۔ کلو۔ رک اور سیلفو۔ رک اور ٹاس۔ ٹارک اسٹڈ ہمراہ سوڈا اور پوٹاش اور یا ایم اور ان کے ہمارے ہیات تھوڑا سا سی۔ لیکا بھی ہوتا ہے *

تعمیر وقت اور اگل و شرب اور دوزش کے اختلافات سے قارورہ کے پانی کی مقدار اور خشک اجزاء میں ارتقار فرق پڑ جاتا ہے کہ ان اجزاء کی مقدار معلوم نہیں ہو سکتی اور عورت اور مرد کے قارورہ میں بھی ان اجزاء کی مقدار مختلف ہوتی ہے لیکن کئی شخصوں کے قارورہ کے اجزاء کو علیحدہ کر کے ان جزوں کی اوسط مقدار ذیل میں درج کرتے ہیں چنانچہ

اگر ایک ہزار حصہ قارورہ کا لیا جاوے تو اس میں سے ۵۰ حصہ پانی کا ہوگا اور ۲ حصہ یو۔ ریا کا * ایک حصہ یو۔ رک اسٹڈ کا ۱۴ حصہ نکون کا اور ۱۰ حصہ آر۔ گائیٹ اجزاء کا۔ اور جب پیشاب کے پانی کو اڑا کر خشک کر دیا جاوے تو اس کے خشک اجزاء کی مقدار میں یہ ہونگی *

نام جس کو	سید اکبر علی	سید احمد علی	سید اوسط
یو۔ ریا	۵۰۰	۳۰۰	۴۲۰
یو۔ رک اسٹہ	۱۶	۱۴	۱۵
فضلہ اور کہانے کا نمک اور ایمو۔ بیا کے نمک ...	۵۰۶	۲۵۸	۳۸۱
اجڑا از قسم نمکین سلفٹ کے	۱۶۰	۸۱	۱۰۴
اجڑا از قسم نمکین فاس۔ فٹ کے	۶۸	۴۵	۵۹
فاس۔ فٹ اف لائیٹ مائور۔ شیپ۔ شیپا	۱۹	۱۴	۱۶

متحدہ پیشاب کی۔ شب و روز کے پیشاب کی مقدار ہر آدمی میں یکساں نہیں ہوتی ہے اور اسی آدمی میں مختلف وقت کے اندر پیشاب کی مقدار میں اختلاف پڑ جاتا ہے پر کئی منتحانون کا جب اوسط لیتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ۴۴ گنتیہ کے اندر دوپہار۔ شب۔ پیشاب پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ زپانی پیا جاتا ہے اس بموجب پیشاب کی مقدار کا شمار کرتے ہیں مگر اس شمار میں کمی باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے چنانچہ پسینہ کا زیادہ یا کم آنا اور برآمدگی دم کے ساتھ رطوبت کا زیادہ یا کم نکل جانا علاوہ ازیں سر میں بہ نسبت گرمی کے پیشاب زیادہ پیدا ہوتا ہے علیٰ ہذا القیاس سردی میں بہ نسبت گرمی و نون کے اور مرطوب ہوا میں بہ نسبت خشک ہوا کے اور صبح کے وقت بہ نسبت شام کے۔ اور زیادہ رہے کہ طبیعت میں جب غصہ یا رنج و غم ہوتا ہو تب پیشاب بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے اور بیماری کا حال یہ ہے کہ جب برآمدگی دم کے ساتھ رطوبت کم خارج ہوتی ہے اور جب پسینہ ہی کم آتا ہے

تب پیشاب زیادہ پیدا ہوتا ہے بجز ان حالات کے کہ جب بُنجر کی شدت کے سبب رطوبات جسم کی کم ہو جاتی ہیں کیونکہ اس وقت پیشاب کی مقدار بھی ضرور کم ہو جاتی ہے اور تب لہرہ کی سردی کے درجہ میں اور شدتِ جوشِ مغصہ کے وقت اور مرضِ ہنس۔ ٹلے۔ ریا کی نوبتوں کے درمیان مقدارِ پیشاب کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں اگرچہ پیشاب کی مقدار روزانہ ۳۰ یا ۴۰ پائینٹ تک ہو سکتی ہے پر اس کے خشک اجزاء میں کی طرح کا تغیر نہیں واقع ہوتا لیکن ماسوائے ان حالات کے جنکا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور صورتوں میں جب پیشاب زیادہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اجزاء میں بھی زیادتی ہوتی ہے یا اُس میں کوئی شے غیر جنسِ مثلاً شکر اور کائیئل پیدا ہو جاتی ہے +

جب بڑا مدگی دم کے ساتھ رطوبت کم خارج ہوتی ہے اور جب پسینہ زیادہ آتا ہے اور اسہال اور ہیضہ کی بیماری میں اور جریان میں استسقا کی بیماری میں اور بہتری میں شکر کے شدید انفلامیشن میں اور بنجر کے درجہ شدید میں جب مقدارِ پیشاب کی کم ہو جاتی ہے اور جب گردوں میں انفلامیشن ہوتا ہے یا جب کوئی شخص تیز زہر کھالیتا ہے تب باتو پیشاب بالکل بند ہو جاتا ہے یا مقدار اسکی نہایت کم ہو جاتی ہے اور حالتِ صحت میں پیشاب کے خشک اجزاء میں بہت اختلاف پڑ جاتا ہے چنانچہ دو نہایت خشک بیماری اجسرا پیشاب کے یو۔ ریا اور یو۔ رکن اسٹیمین یہ دونو اجزاء انی میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں صورتوں میں کم اور بوڑھے اور بچوں میں سب سے کم اور جو وزرش کرتے ہیں ان میں یہ دونو جزو زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور جو کالہلی کرتے ہیں ان میں کم اور جنکی خوراک گوشت کی ہے ان میں بھی یہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں نسبت

انکے جنکلی خوراک بقولات کی ہے ۔

توام فارورہ سردہ پیشاب بنیت عورت کے زیادہ تر گڑھا ہوتا ہے اور یہ خلط پیشاب کی عہد غلی سے یکجہوا ٹی تک پہنچ جاتی ہے ۔ یہ بھون بڑھاتا جاتا ہے پیشاب بنیت سے ہوتا جاتا ہے اور گرم ہوتا ہے زیادہ تر ششوں میں پسینہ خشک اور حیوانی غذا کے سبب اور تھیند کیونکہ پیشاب بنیت زیادہ تر گڑھا ہوتا ہے مگر سردی کا بل انرجی تھیند غذا اور بقولات اور جمو خضات کے استعمال سے پیشاب بنیت ہو جاتا ہے اور خمر کے استعمال سے بھی تو ام پیشاب کا پتلا ہوتا ہے ۔ صبح کی بیماری کے وقت تو ام اور وسط درجہ پر رہتا ہے بعد صبح کی غذا کے بہت کم ہو جاتا ہے اور بعد دوپہر کے پھر تدریج بڑھنے لگتا ہے اور رات کی خفتہ کے بعد فوراً کم ہو جاتا ہے لیکن بعد چند گھنٹہ کے پیشاب اور دقون کی نسبت زیادہ تر غلیظ ہو جاتا ہے اور ساری رات کے اندر پھر تدریج اپنی اوسط پڑ جاتا ہے ۔

انہتمام طعام کے بعد جو پیشاب پیدا ہوتا ہے اُس میں اور اُس پیشاب میں بڑا فرق ہے جو پانی پینے کے بعد پیدا ہوتا ہے کیونکہ اگلے پیشاب میں جس کو اصطلاح میں یو۔ری۔نا۔کائے۔ لائی بولتے ہیں بنیت و دوسرے پیشاب کے جس کو یو۔ری۔نا۔پو۔ٹس بولتے ہیں یو۔ریا ۳ حصہ زیادہ اور یو۔ریک ۱ حصہ زیادہ اور اجزاء کے نمکین ۴ حصہ زیادہ ہوتے ہیں اور یہ پیشاب کہا را ہی ہوتا ہے ۔

پیشاب کے منجھ اجزاء ۴ گھنٹہ کے اندر اوسط ڈیڑھ آنوس سے کیفیت رکھتے ہیں اور بیماری میں کہی تو ۳ آنوس تک بھی بڑھ جاتے ہیں اور کہی ۱۱ گرین تک بھی گھٹ جاتی ہیں ۔

لون یعنی رنگ فارورہ ۔ صبح فارورہ کا رنگ اسکی مقدار پر منحصر ہے

یعنی اگر قارورہ کم پیدا ہو تو رنگ گہرا ہوتا ہے اور جو زیادہ ہو تو رنگ پھیکا ہوتا ہے صبح کیوقت رنگ اکثر گہرا ہوتا ہے بہ نسبت دن کے وقت کے اور اگر چہ بیماری کے پیشاب کا رنگ بھی سکی مقدار پر منحصر ہے پر حالت بیماری میں بل جانا یا کمر کا قارورہ کی غیبتی جزا سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ سما پیشاب کا رنگ سفید یا میل یا سیلکرن یا گندلا ہو گا اگر اس میں کال یا ورہ یا میو۔ کس یا پیپ یا زیادہ مقدار میں آئے۔ تپے۔ ناس۔ نفٹ ملا ہو اور اگر قارورہ میں صفرا یا رسٹ۔ ٹکٹ۔ اکسائیڈ ملا ہو یا کوکالورنگ۔ اسکا زرد ہونا یا بل یا سبزی ہونا ہے اور امراض الفلہ مشن میں یا تو گہرا صبح یا پیشاب اور دس سے زائد کا ہونا ہے اور زرد یا بل یا سبزی پکٹ۔ ٹکٹ۔ فیور اور تپ لڑنے کے حرق کے وقت اور سے۔ یا۔ ٹک۔ اسٹ کے ہونے سے سیاہ اور سا۔ یا۔ نیو۔ رکن۔ اسٹ کے ہونے سے پیشاب کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے اور عصارہ۔ پوٹہ اور چھتر اور لاگ۔ اوڈ کے کہانے سے رنگ پیشاب کا شرخ ہو جاتا ہے۔

نو پیشاب کی۔ قارورہ کی صبح یو اسوے ساچی دریافت ہوتی ہے کہ جب مقدار اسکی تھوڑی اور رنگ اسکا گہرا ہو کیونکہ قارورہ جب پیتا آتا ہے تو بالکل بے بو ہوتا ہے۔

بہت سی عصبی بیماریوں میں قارورہ کی بہت خوش بو تھی ہے اور جب علم مغزین صدمہ پہنچتا ہے تب اس سے ایو۔ نیا کی بو آتی ہے اور جب آلات بول کی بیماریوں میں پیشاب میں پیپ یا میو۔ کس ملا ہو جاتا ہے تب قارورہ سو گندی بو آتی ہے اور میٹھی بو مرض زیا بطوس شکر میں آتی ہے۔ ذوالقہ پیشاب کا نہ با بطوس کی بیماری میں بالکل شیرین ہوتا ہے۔

قارورہ بیماری کا۔ بیماری کے قارورہ میں دو باتیں غیر طبیعی ہونے لگتی

ہین۔ اول یا تو اُسکے معمولی اجزا زیادہ ہو جاویں یا کم اور دوٹوم یا اُس میں اجسزا غیر معمولی پیدا ہو جاویں اور یہ دوسری جماعت پھر کئی حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے مثلاً اول پیشاب میں ایمو۔ نیا یا چونے کے مرکب پائے جا سکتے ہین۔ دوٹوم جب غذا اچھے طور پر تحلیل نہیں ہوتی یا جب گردوں سے اشیاء سے فاسدہ اچھے طور پر اخراج نہیں پاتی تب پیشاب میں جیسرین غیر معمولی پیدا ہوتی ہین چنانچہ کائیل چربی دودھ شکر اور صغرا اور ایک شے بنام کس۔ ٹین جو حاملہ عورتوں کے پیشاب میں پائی جاتی ہے +

تیسرا خون یا اُسکے اجزا مثلاً ریڈ۔ کار۔ پس۔ کل یا نائی۔ برین یا البیو۔ مین + چہارم اعضا بول کے پردہ سے جو رطوبت وغیرہ نکلتی ہے چنانچہ رطوبت میو۔ کس۔ ایلے۔ تھے۔ لیم کے چپکے اور پیپ اور پیشاب پیدا کرنے والی مالیون کے ساکچے +

پنجم دیگر رطوبات جو پیشاب میں اعضا سے متصلہ سے شامل ہو جاتی ہین مثلاً رطوبت منی رطوبت سوزاک اور رطوبت لیو۔ کو۔ ری یا کی بیماری کے اور کرم + ششم زہر اور دوائیں بھی بعض دفعہ پیشاب میں پائی جاتی ہین + امتحان قارورہ۔ قارورہ کی شناخت کیلئے دو ترکیبیں کام میں آتی ہین ایک تو شناخت کیمیائی اور دوسری باریک بین + قارورہ کو یا تو بوقت نکلنے کے امتحان کرتے ہین یا جب تھوڑے عرصہ تک ٹھیرا رہتا ہے تب اُسکو دیکھتے ہیں اور اوپر کے نہرے ہونے حصہ کو اور نیچے جو درد نہ نشین ہوتا ہے اُسکو بھی ملاحظہ کرتے ہین چنانچہ باریک بین کا استعمال ایسی ضرور کے امتحان کے لئے کیا جاتا ہے +

شناخت قارورہ۔ قارورہ کی شناخت میں اکثر چار چیزیں نکال

کرتے ہیں ایک ٹر-مرک پے۔ پیرہ دوسرے لٹ-مس پے۔ پیرہ
 تیسرے حرارت چوتھے ٹائٹرک اسٹیفینے تیزاب شورہ قارورہ کی شناخت
 باریک بین سے کرنے کے لئے چند وائین-گلاس اور ایک شیشہ کی بنی جس کو
 اصطلاح میں پے-پٹ بولتے ہیں درکار ہوتی ہے جس قارورہ کو اس ترکیب سے
 امتحان کرنا منظور ہوتا ہے اسکو وائین گلاس میں چند گہٹھ مک ٹھہرنے دیتے
 ہیں تاکہ اسکو دردہ نشین ہو جاوے۔ بذریعہ پے-پٹ مذکور کے ایک قطرہ
 اس دردہ کا لیکر ایک ٹکڑے شیشہ پر رکھ دیتے ہیں اور تب اسکو ایک اور پٹے
 ٹکڑے شیشہ سے ڈھانپ کر باریک بین کے نیچے رکھ کر دیکھتے ہیں ۔

شناخت کے لئے جو قارورہ ہوتا ہے اسکو یا تو سارے دن کا اوسط پشیاپ
 ہونا چاہئے یا وہ جو صبح کے وقت کیا ہوا ہو۔ غرض اس پشیاپ کو لیکر حفاظت تمام
 ایک شیشہ میں بہر کر جو طبع ڈھانپ رکھیں تاکہ اس میں کوئی میردنی شے داخل
 ہونے پاوے ۔

اب ہم شناخت کی مختلف چیزوں کا اثر جو قارورہ پر ہوتا ہے بیان کرتے ہیں
 چنانچہ ٹر-مرک پے۔ پر دینے زرہ کاغذ کو اگر قارورہ میں ڈالیں اور رنگ اسکا
 بہو را ہو جاوے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قارورہ کہا رہے اور اگر
 لٹ-مس (یعنی نیلا کاغذ) ڈالیں اور وہ کاغذ سرخ ہو جاوے تو یہ سمجھنا چاہئے کہ
 پشیاپ میں ترقشی یعنی حموضات زیادہ ہیں ۔ اگر پشیاپ کو ایک شیشہ میں بہر کر
 آئینہ دین اور اس ترکیب سے ایک سفید بنجدہ نشین ہو جاوے تو یہ جاننا چاہئے
 کہ اس پشیاپ میں البیو-من موجود ہے اور اس میں اجزاء از قسم فاس-فٹ کے
 زیادہ ہونگے تو آئینہ کے دینے سے وہ بھی نیچے جم جائیگے لیکن پشیاپ مذکور میں
 اگر یو-رٹ-آف سوڈا اور ایمو-نیا ہوگا تو وہ آئینہ کے گھنے سے حل ہو جائیگے ۔

اگر پشیا ب میں البیو من ہو اور اسمین نامے - ٹرک - اسٹڈ والا جاوے تو وہ
 شے سخت ہو کر جم جائیگی اور پشیا ب میں اگر یو - رک - اسٹڈ ہو تو نامے - ٹرک - اسٹڈ
 کے ملانے سے بعد چند گینٹھ کے وہ بھی چیم جاتا ہے اور تب اس قارورہ میں ایک
 جوش پیدا کر کر یو - رک - اسٹڈ کو حل کر دیتا ہے۔ علاوہ ازیں قارورہ میں اگر
 اگ - زرا - لٹ اف - لائیم اور کھاد سی فاس - فٹ ہوں تو نامے - ٹرک - اسٹڈ کے
 ملانے سے وہ بھی حل ہو جاتے ہیں پشیا ب میں صفرا ہو تو نامے - ٹرک - اسٹڈ کے
 لانے سے رنگت اس صفرا کی بنر ہو جاتی ہے لیکن اگر تیزاب مذکورہ کی مقدار زیادہ
 ڈالا جاوے تو وہ بنری فوراً بدلا کر پہلے تو سرخی مائل ہو جاتی ہے اور تب رنگ
 اس کا بھورا ہو جاتا ہے اور اگر پشیا ب میں یو - ریا کا جز زیادہ ہو تو تیزاب مذکورہ
 کو پشیا ب کے ہوزن ملانے سے وہ بھی گرفت میں آسکتا ہے * اور جب
 پشیا ب میں چند قسم کے لطیف روغن ہوتے ہیں تب نامے - ٹرک - اسٹڈ کے
 ملانے سے وہ پشیا ب گدلا ہو جاتا ہے *

ٹائیڈرو - کلو - رک - اسٹڈ کے ملانے سے یو - رک اور ڈے - پیو - رک اسٹڈ
 جم جاتا ہے اور صفرا کی رنگت بھی اس تیزاب کے ملانے سے بنر ہو کر نیچے بیٹھ
 جاتی ہے علاوہ ازیں اس تیزاب کے ملانے سے اگ - زرا - لٹ اف - لائیم
 اور فاس - فٹ حل ہو جاتے ہیں * اور جب پشیا ب میں پیو - کس - رطوبت
 (یعنی بلغم) ہوتی ہے تب اسمین سے - ٹکٹ - اسٹڈ (یعنی تیزاب سرکہ) ملانے
 سے وہ پشیا ب گدلا ہو جاتا ہے * جب پشیا ب میں شکریا البیو من ہو اگر
 اسکو گرم کر کے سلفیو - رک - اسٹڈ (یعنی تیزاب گوگرد) ملا دیں تو سیاہ رنگ
 کا کوئلہ نیچے بیٹھ جائیگا *

پشیا ب میں اگر ار - تے فاس - فٹ ہوں اور اسمین امیو - نیا ملایا جائے

تو وہ اشیاء سفید منجھرنے کے نیچے بیٹھ جائیں گی اور یو۔ آرک اسٹڈ کے قلمون میں اگر ایمو۔ نیا کی ہو اور چوڑی جاوے تو ان قلمون کا رنگ نہایت خوبصورت اور اسی ہو جائیگا کہ اگر پیشاب میں یو۔ رہا ہو اور اس میں آگ۔ زرا۔ لک اسٹڈ کا عرق ملا یا جاوے تو آگ۔ زرا۔ لٹ آف یو۔ ریا کی قلمیں پیدا ہونگی اور لائیکو اور پٹا کے کئے ملانے سے یو۔ برکن اسٹڈ اور یو۔ آرٹ آف سو۔ ڈا اور ایمو۔ نیا حاصل ہو جائے ہیں اور اگر انکو آخ دیوین تو ان سے ایمو۔ نیا کی بوبیدہ ہوگی *

علامہ ابن سینا پیشاب میں اگر شکر ہو تو لاسے۔ کو بار۔ پو۔ ٹاسی کے ملانے سے رنگ اس پیشاب کا گہرا ہو اور اسی ہو جائیگا اور پتے قسم کے اجزا ہی اس چیز کے ملانے سے کاڑھے ہو جاتے ہیں اور سلفٹ۔ اف۔ کا۔ پر کے عرق کا اثر پیشاب پر یہ ہونا ہے کہ جس پیشاب میں شکر ہوتی ہے اگر اس میں خوب زیادہ لائیکو اور پٹا سی ملا کر اور اس میں سلفٹ۔ اف۔ کا۔ پر کا عرق چھوڑ کر آنچ دیا جاوے تو شیشہ کے نیچے ایک سبز منجھرتہ نشین ہو جائیگا کہ جس سے موجدگی شکر کی ثابت ہوتی ہے۔ صحت اور بیماری کے قاردرہ میں جو اجزا پائے جاتے ہیں ان میں سے چند اہم خردن کی کیمیائی خاصیت اور باریک بینی شکلین ذیل میں درج کی جاتی ہیں چنانچہ اول یو۔ ریا جس پیشاب میں یہ خرد صحت سے زیادہ ہوتا ہے اس کا وزن متناسبہ بڑھ جاتا ہے چنانچہ ۱۰۳۰ سے ۱۰۳۵ تک ہوتا ہے اور کسی گھڑی کے شیشہ پر تھوڑا سا پیشاب کا لیکر اگر اس میں مہوزن خالص ملے۔ ٹرک اسٹڈ ملا دیں اور اس مرکب کو ایک سرد جگہ میں رکھ دیں تو ناٹریٹ اف یو۔ ریا کی قلمیں پیدا ہو جائیں گی لیکن پیشاب میں اگر یو۔ ریا کی مقدار کم ہو تو اسٹڈ مذکور کے ملانے سے بیشتر اس پیشاب کو آخ کے ذریعہ اڑا کر کاڑھا کر لینا چاہئے لیکن نہایت عمدہ ترکیب یو۔ ریا کے گرفت اور نما سے۔ ٹریٹ آف یو۔ ریا کی عمدہ قلمیں


حاصل کرنے کی یہ ہیں کہ تھوڑا سا پیشاب مشکوک کا لیکر آبِ گرم کی آنچ پر اڑا کر مش
شیرہ کے گاڑ دیا کریں تب اُس میں خالص الکحل ملا کر چہان ڈالیں اور کچھ پر خوب گاڑ دے
کر کے چند قطرے پانی اور ناسے۔ ٹرک اسٹڈ کے ملا دین اس ترکیب سے
ناسے۔ ٹریٹ اف یو۔ ریو کی قلمیں فوراً بن جائیں گی کہ جنکی باریک بینی شکل تصویر ایک
مین دکھائی دیتی ہے *

تصویر ۱



تصویر ۲

لیکن آسان ترکیب اس شے کے گرفت کی
جو روزمرہ شفاخانہ میں برتی جاتی ہے یہ
ہے کہ ایک شیشے پر پیشاب کے چند
قطرے لیکر اڑا دین اور تب اُس میں اتنا
ہی ناسے۔ ٹرک اسٹڈ چھڑوین
مگر ناسے۔ ٹرک اسٹڈ کے عوض اگر
اگ۔ زرا۔ ایک اسٹڈ ملا دین تو اس
شکل کی قلمیں پیدا ہونگی جو تصویر (۲)
میں دکھائی دیتی ہیں *



تصویر ۳

اور اگر اوپر کے الکحل ملائے ہوئے
عرق کو رکھ چھڑوین تو وہ از خود اڑ جائیگا
بعد اسکے اُس شکل کی قلمیں پیدا ہونگی جو
تصویر (۳) میں دکھائی دیتی ہیں *



دوم۔ پو۔ رک اسٹڈ۔ اسکو لے۔ تھک اسٹڈ بھی بولتے ہیں بعض
اوقات یہ شے پیشاب میں اس کثرت سے پیدا ہوتی ہے کہ جس طرف میں میرا
پیشاب کرتا ہے اُسکے گرد مٹخ رنگ کے ذرّوں کے طور پر جم جاتی ہے گویا کسی

سُرخ مچ کا سُفوف چھڑک دیا ہے۔ اور بعض دفعہ سُرخ یا زرد رنگ کی ریت یا کنکر کے طور پر بیمار کے پیشاب سے خارج ہوتی ہے +

جس پیشاب میں تیزاب جمع جاتا ہے رنگ اُسکا اکثر سُرخ ہوتا ہے اسمین ترشی زیادہ پائی جاتی ہے اور اُسکا وزن متناسبہ ۱۰۲۰ یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے + اس شے کو پیشاب سے اسطوریہ لے کر سکتے ہیں کہ چھ یا آٹھ آونس قارورہ میں دو یا تین ڈرام ہائیڈرو۔ کلو۔ رک اسٹ ملا دیں اور اس مرکب کو ۲۴ یا ۴۸ گھنٹہ تک ایک بند برتن کے اندر رہنے دیں اس ترکیب سے سُرخ یا سُرخ مائل یو۔ رک اسٹ کا بچہ نیچے جم جائیگا + اور یہ بھی شناخت یو۔ رک اسٹ کے گرفت کی اچھی ہے کہ چینی کے برتن میں تھوڑا سا پیشاب مشکوک کار کہہ کر اسمین قدر کے ہائیڈروک اسٹ چھوڑ دیں۔ بعد ازاں اسپرٹ لمپ پر رک کہہ کر اسکو اڑا دیں جب تک ایک ہشہ سُرخ مائل زردی باقی رہ جاوے۔ جب یہ شے سرد ہو جاوے تب ایسا کریں ایک شیشہ کی ڈنڈھی کو ایمو۔ نیا کے تیز عرق میں ڈبو کر اس سرد چیز پر گادیں اسکے کرنے سے چمکیلا اور رنگ فوراً پیدا ہو جائیگا +

یو۔ رک اسٹ تو گرم اور زرد سرور پانی میں جل ہوتا ہے مگر لائیکوار۔ پوٹاس سے بین فوراً اُحل ہو جاتا ہے اور جب اس عرق میں کوئی تیزاب ذرہ زیادہ ملایا جاتا ہے تو اُسکے دانے بنکر بنجھ ہو جاتا ہے + مانے رٹرک اسٹ کے ملانے سے یہ شے حل ہو جاتی ہے اُسوقت ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے + جب یہ شے باریک بین کے


تصویر ۴



بچے دیکھی جاتی ہے
تب سبکی طرح کی
شکلین نظر آتی ہیں
چنانچہ دیکھو (تصویر ۴)

اس تصویر میں حرف ت کی جو شکل ہے وہ ایک بال ہر چہرہ پر۔ رک اسٹڈ کی جیسے گئی میز
سوم۔ مائے۔ پیو۔ رک اسٹڈ۔ یہ شے اگرچہ مویشی میں کثرت سے
پائی جاتی ہے پر انسان کے پیشاب میں بھی ہوتی ہے۔ اسکے حاصل کرنے کی
ترکیب یہ ہے کہ چنڈ آؤنس پیشاب کا لے کر آنچ کے ذریعہ اڑا کر مثل بیڑہ کے
اکاڑا کرین اور تب اس میں سیتھہ زیادہ مائٹڈ رو۔ کلو۔ رک اسٹڈ ملا دیں۔ اس
ترکیب سے یو۔ رک اور مائے۔ پیو۔ رک اسٹڈ نیچے بیٹھ جائیگا۔ اس منجد کو آب

تصویر ۵



سرو سے دھو ڈالیں اور تب بالکل ملا کر
جوش میں اسکے کرنے سے مائے۔ پیو۔ رک اسٹڈ
حل ہو جائیگا۔ پھر اس عرق کو آنچ پر
اڑھانے سے اسٹڈ مذکور مثل تصویر (۵)
کے جم جائیگا۔

چہارم۔ یو۔ ریٹ اف ایمونیا

یہ نمک بعض دفعہ گل پیشاب میں پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے وہ پیشاب ایسا
سدا رہو جاتا ہو کہ جیسے میو۔ کس اور پیپ کے ملنے سے ہوتا ہے اور بعض دفعہ سفیدی
یا سرخی مائل منجد بن کر نیچے بیٹھ جاتا ہے
اگر اس میں لائے۔ کوار۔ پوٹاسی مل کر جوش
دین تو ایمو۔ نیا کی بو پیدا ہوگی۔

تصویر ۶



اسکی بار ایک بینی شکل میں تصویر (۶) میں
دیکھائی دی گئی ہیں۔

اس یو۔ ریٹ اف ایمو۔ نیا کے دانہ دار منجد میں اکثر اوقات یو۔ ریٹ اف سوڈا
اور یو۔ ریٹ اف ایمو۔ نیا اور یو۔ ریٹ اف سوڈا اور یو۔ ریٹ اف لائیم

اور پورٹ آف گئے۔ شیاملا ہوا ہوتا ہے *

پنجم۔ پورٹ آف سوڈا۔ یہ شے تہا بطور منجمد کے اکثر کم ملتی ہے

مگر گاؤٹ لینے نقرس اور بخاروں کے بیماروں کا علاج جب کار۔ پورٹ آف سوڈا

تصویر ۴

الف



سے کیا جاتا ہے تب پیشاب میں بطور

منجمد کے ملتی ہے باریک بینی شکل اس

کی تصویر (۴) کے حرف الف

میں نظر آتی ہے اور حرف ب کی

جو ۴ تصویر میں ہیں وہ بھی اسی پسند

کی ہیں مگر یہ شاذ و نادر دیکھنے میں آتی ہیں *

ششم۔ اگ۔ ز۔ ا۔ لٹ آف لائیم۔ یہ شے دانوں کے طور پر نرم

پائی جاتی ہے مگر اکثر اسکی باریک باریک نہایت چوٹی چوٹی بہت پہلو قلعین

سارے پیشاب میں پہیلی ہوئی ہوتی ہیں اور شہتوت کے قسم کے سنگ مثانہ

کا جزو اعظم بھی اگ۔ ز۔ ا۔ لٹ آف لائیم ہے *

پانی اور لائیکوار۔ پوٹاسی اور اسے بکٹ اسٹدین یہ شے حل نہیں ہوتی

مگر نائے۔ ٹرک اسٹدین حل ہو جاتی ہے۔ کیمیائی یا باریک بینی امتحان کیو اسٹے

اس ترکیب سے یہ شے حاصل ہو سکتی ہے کہ کسی گاؤم شکل کے شیشہ میں ایک یا دو

اؤنس پیشاب مشکوک کا بھر کر چند گنٹھ تک ٹھہرنے دیں اور تب نیچے کے طبقہ کا

تھوڑا سا بذریعہ پے۔ پٹ کے لیکر کسی گہڑی کے شیشہ پر بہ کر دیں اور اس کو

قدر سے گرم کریں اس ترکیب سے اگ۔ ز۔ ا۔ لٹ آف لائیم کی قلعین نیچے بیٹھ

جائینگی تب شیشہ کو ادھر ادھر ہلا کر انکو جمع کر لیں جو عرق باقی ہو اسکو اسی


گہڑی کے شیشہ میں چند منٹ تک ٹھہرنے دیں تب اوپر کے عرق کو

پے۔ پٹ سے علیحدہ کر کے اُسکے عوض شیشہ مذکور میں تھوڑا سا آب سرد چھڑو دین
اور جو سفید چمکدار سفوف شیشہ میں ہو اُسکو بند کر دین پے۔ پٹ کے علیحدہ کر کے
باریک بین کے نیچے رکھ دین جب انکو باریک بین سے دیکھتے ہیں تو انکی شکلیں
چوڑی بہت پہلو نظر آتی ہیں (دیکھو تصویر ۸) مگر ان کی شکلیں ایسی بھی ہوتی
ہیں جیسے (تصویر ۹) میں نظر آتی ہیں لیکن ایسا قیاس کرتے ہیں کہ اس شکل کی
قلین اکثر پر ہمیشہ نہیں گردون ہی میں پیدا ہوتی ہیں *

تصویر ۹



تصویر ۸



ہنقسم اجزائے اقسام فاس۔ فٹ۔ پیشاب میں فاس۔ فارک اسٹ
کئی چیزوں کے ہمراہ ملا ہوا ہوتا ہے چنانچہ اول ایمو۔ نیو فاس۔ فٹ اف مگنیشیا
کہ جسکو ٹری۔ پیل فاس۔ فٹ بھی کہتے ہیں * وڈوم ایمو۔ نیو فاس۔ فٹ اف لائم
کہ جسکو بے۔ سٹ یا بابائی۔ بے۔ سٹ فاس۔ فٹ بھی کہتے ہیں * اور
سٹوم فاس۔ فٹ اف لایم *

ان ساری اشیاء کی خاصیتیں ایک سی ہیں چنانچہ جس پیشاب میں یہ پائی
جاتی ہیں اکثر یا تو وہ نیو۔ ٹرل یا کیتھد رکھا رہتا ہے رنیو۔ ٹرل اس پیشاب
کو کہتے ہیں جو ترش اور نہ کھارا ہو (یہ چیز بن اکثر سفید ہوتی ہیں تا جب انکے

ساتھ خون لمبا وے اور جس پشیاب میں یہ ہوتے ہیں اسکو گرم کیا جاوے تو حل
ہنہن ہوتی ہیں بلکہ جم کر نیچے بیٹھ جاتی ہیں *

پانی ملے ہوئے تیزابوں میں حل ہو جاتے ہیں لیکن پانی اور ایمو نیا اور نیکو ر پڑا
میں حل نہیں ہوتی مگر فاس - فٹ اف - لایم تیزابوں میں کم حل ہوتا ہے * اب
ان اجزاء کا عیدہ علیحدہ بیان ذیل میں کیا جاتا ہے *

اول ٹری - پل - فاس - فٹ حالت صحت کے پشیاب میں اگر چند قطرے ایمو - نیا
کے ملائے جاویں تو گدلا ہو جاوے گا اور اس کے نیچے ٹری پل - فاس - فٹ ہمراہ
فاس - فٹ اف - لایم کے بیٹھ جائیگا اور یہی بات اُس وقت بھی پیدا ہوتی ہے کہ جب
مرض پلے - رالے - جیا یعنی جسم اسفل کے فالج میں پشیاب مشانہ کے اندر عرقہ یک
ہٹیرا رہتا ہے اور اُس وقت بھی کہ جب مشانہ کا پردہ میو - کسٹاؤف ہو جاتا ہے -
یہ چیز کئی شکلوں میں پائی جاتی ہے چنانچہ بعض دفعہ سفید کنکر کے طور پر اور کبھی پشیاب پر
اسکا باریک پردہ سا بجاتا ہے اور بعض اوقات یہ شے مثل رطوبت میو - کسٹاؤف
منجھ کے طور پر بنکر پشیاب کے نیچے جم جاتی ہے اور بعض دفعہ مثل پیپ کے ایک لسلہ
رطوبت کے طور پر * اکثر اوقات اسکی شکلیں مثلث یا چو گوشہ ہوتی ہیں اور ان کی

نوکیں گاؤم (دیکھو تصویر ۱)

باسی - بے - سیٹ فاس - فٹ
کی شکلیں (تصویر ۱۱) میں دکھائی


دیتی ہیں *

توم فاس - فٹ اف - لایم ایک


سفید سفوف کے طور پر بنکر نیچے بیٹھ

جاتا ہے *

تصویر ۱۰



تصویر ۱۱



ہشتم۔ بعض دفعہ پیشاب کو اڑانے سے کہانے کے نمک کی قلیمن دکھائی دیتی ہیں۔ اصلی شکل تو ایک لمبی مکعب ہوتی ہے لیکن پیشاب کے اڑانے میں تعجیل کی وجہ سے تو صلیب کے طور پر بنتا ہے اور بعض دفعہ ہشت پہلو

تصویر ۱۲

بھی ہوتی ہیں (دیکھو تصویر ۱۲)

نہم کا ٹیل یعنی کیلوس۔ جس پیشاب میں کیلوس ہوتا ہے وہ سرد ہونے کے بعد بطور فالو وہ کے جم جاتا ہے۔ اس میں چربی اور البیو۔ من کی مقدار زیادہ ہوتی ہے



اور اسکی اسپے۔ سی۔ ٹکٹ گرا۔ وی۔ ٹی صحت سے کم ہوتی ہے +

دہم۔ شیر جس پیشاب میں دودھ ملا ہوا ہوتا ہے وہ گدلا ہوتا ہے اور آنچ دینے سے جم نہیں جاتا، اگر اسپین ٹکٹ اسٹڈیا البیو من کی مقدار زیادہ ہو۔ اس پیشاب کا تھوڑا سا لیکر قدرے گرم کیا جاوے اور اسپین چند قطرے اسے ٹکٹ اسٹڈیا ڈائے۔ لیوٹ سلیفورک یا ٹائیڈرو۔ کلو۔ رکن اسٹڈ کے ملائے جا دیں تو پھر اس دودھ کا جم جائیگا +

یازدہم۔ شکر۔ پیشاب میں انگریزی شکر ہوتی ہے۔ اور پیشاب کے اندر یہ شکر زیادہ بٹوس کی بیماری میں پائی جاتی ہے۔ وزن متناسب سے زیادہ ہوتا ہے چنانچہ ۱۰۲۰ سے ۱۰۵۰ ٹکٹ + شکر کی پہچان کے واسطے کئی شناخت مقرر ہیں لیکن شکر کی شناخت کرنے سے پہلے یہ ضرور دریافت کر لینا چاہئے کہ اس پیشاب میں البیو۔ من تو نہیں ہے۔ ہے تو اسکو علیحدہ کر لینا چاہئے۔ بعض یہ صلاح دیتے ہیں کہ ایسے پیشاب کو شکر کے دریافت کرنے سے پہلے جوانی کو بھلا سے فلٹر کر لینا چاہئے + شناخت مقصد ذیل شکر کی گرفت کے لئے مقرر ہیں +

اول۔ ٹرا۔ مر۔ ٹریٹ۔ پیشاب میں ہلکا عرق سلفٹ اف کا۔ پرکاتیک
 ملا دین جب تک رنگت اسکی ہلکی نیلی ہو جائے تب اس میں زیادہ لائیکوار۔ پوٹا سے
 ملا کر سارے کو جوش دین اسکے کرنے سے پیشاب میں اگر شکر ہوگی تو ایک نابنجی
 رنگ کا منجھرتہ نشین ہو جائیگا *

دوم۔ فے۔ اینگس۔ ٹریٹ۔ ڈاکٹر نے۔ لنگٹے شکر کی گرفت کے لئے
 پنخ مرتب کیا ہے۔

لشخ۔ سلفٹ اف کا۔ پر ۱/۲ ۹۰ گرین * ٹرا۔ ٹریٹ اف پو۔ ٹامش ۳۶۴
 گرین * سو۔ لیوشن اف کاسٹک سو۔ ڈابہ آونس * پانی استقدر کہ جتنے
 کل عرق ٹھیک چھ ملوئیڈ آونس ہو جاوے * اس عرق کو کسی ایسی جگہ شیشہ کی
 ڈنٹ لگا کر رکھنا چاہئے جہاں روشنی نہو اور وہ جگہ سرد بھی ہو *

اشارہ۔ مین نے دیکھا ہے کہ دکانون مین ہی اکثر سو۔ لیوشن اف کاسک
 سو۔ ڈاتیارہین ملتا۔ مین اسکو اس ترکیب سے گرہین تیار کر لیتا ہوں کہ کاسک
 سو۔ ڈاکے بتے ڈیڑھ ڈرام لیکر ۴ آونس ٹریٹڈ واٹر میں حل کر لیتا ہوں اور
 تب اس میں سلفٹ آف کا۔ پرکاسفوف اور ٹرا۔ ٹریٹ اف پوٹامش حل کر کے
 استقدر ڈیسٹلڈ واٹر اور ملا دیتا ہوں کہ جس سے کل عرق ٹھیک ۶ آونس بن جاوے *
 اس عرق کے استعمال کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ ایک ٹریٹ۔ ٹیوب کو پون
 یا ایک پانچ تک عرق مذکورہ یا اسے پُر کرین اور جب کھولنے لگے تب دیکھیں کہ کوئی
 شے نیچے بیٹھی تو نہیں ہے کیونکہ جب عرق مذکور اچھا نہیں بنتا عرصہ تک رکھا رہتا
 ہے تب بگڑ جاتا ہے اور جوش دینے سے ایک دو منٹ کے اندر کاسائیڈ اف کا پر
 منجھ ہو کر نیچے بیٹھ جاتا ہے تب شکر کی گرفت کے قابل نہیں رہتا۔ پس اس صورت
 میں تازہ عرق تیار کر لیتا چاہئے۔ اب اس تازہ عرق کا ایک یا پون پانچ

ٹسٹ ٹیوب مین لیکر اسپرٹ لمپ پر جو شمع مین اور جب کہو لنے لگے تب آسمین
ایک یاد و قطرے پیشاب مشکوک کے چھوڑ دیں * اگر پیشاب مین شک ہوگی تو چند
لمحہ کے بعد رنگ اس عرق کا گہرا زرد ہو جائیگا اور بعد تھوڑے عرصہ کے بہت سا
زرد یا سرخ رنگ کا منجمد نشین ہو جائیگا *

شناخت کے وقت اس بات کی ضرورت سیماطرب مین کہ پیشاب مشکوک کہیں
زیادہ نہ پڑ جائے ورنہ زیادہ شکر کے سبب جو منجمد بن جاتا ہے وہ پھر حل ہو جاتا ہے
اور ٹسٹ ٹیوب مین شفاف زرد رنگ کا عرق رہ جاتا ہے * پیشاب مین اگر تھوڑی
شکر ہو تو ایسا کریں کہ جبنا عرق ٹسٹ ٹیوب مین چھوڑیں اتنا ہی اس مین پیشاب مشکوک
کا ڈالیں اس سے زیادہ ہرگز نہ ڈالیں۔ اب سارے کو جو شمع مین پیشاب مین اگر شکر ہوگی تو ہنات
گدلا زردی مثل سبز رنگ پیدا ہو جائیگا۔ بعد ازاں اس عرق مین آہستہ آہستہ تیز زرد رنگ
کا منجمد نشین ہو جائیگا۔ اگر فوراً کوئی منجمد نہ بنے تو اس عرق کو قدرے گرم جگہ
مین رکھ دیں تاکہ بتدریج سرد ہو جاوے۔ اسکے کرنے سے اگر پیشاب مین بہت
ہی تھوڑی شکر ہوگی تو وہ عرق بتدریج گدلا ہو تا جائیگا اور رنگ اسکا ہلکا سبز یا
ہو جائیگا *

یاد رہے کہ عرق کو عرصہ تک جو شمع دینا چاہئے ورنہ یو۔ رک اسٹڈ اور اس
پیشاب کے دیگر اجزا اکسائیڈ۔ اف۔ کا۔ پرکے منجمد کو حل کر دینگے *
ڈاکٹر پے۔ ونی۔ نے اوپر کے نئے۔ لنگس۔ سو۔ یوشن مین یہ ترقی کی ہے کہ
جس سے وہ عرق عرصہ تک مگر نئے ہنیں پاتا۔ چنانچہ انکا نسخہ یہ ہے کہ
نسجہ۔ سلفٹ اف۔ کا۔ پر۔ ۳۲۰ گرین * مار۔ ٹریٹ اف۔ پو۔ ٹاش۔ ۴۲۰ گرین *
کاسٹک۔ پو۔ ٹاش۔ ۴۲۰ گرین * ڈیسٹیلڈ واٹر۔ ۲۰۔ آونس * سب کو ملا کر عرق
تیار کر لیں * اسکے استعمال کرنے کی ترکیب مثل اوپر کے ہے *

سوم - مورتس ٹسٹ - ایک ٹسٹ ٹوبہ میں ہوزن پشیا شکوک اور لائیکوار - پوٹاسی ہر کر جوشن دین - اسکے کرنے سے پشیا میں اگر شکر موجود ہے تو رنگ اس عرق کا تھوڑا بہت گہرا ہو جائیگا - اور جو بہت شکر ہوگی تو رنگ قریب سیاہ ہو جائیگا - مگر اس شناخت پر اعما و نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ تھوڑی مقدار شکر کی اس سے گرفت میں نہیں آسکتی ۔

چہارم - فر - من - ٹے - شن ٹسٹ - یہ شناخت اسطور سے کیجاتی ہو کہ ایک ٹسٹ ٹوبہ میں تھوڑا سا جرمین اینٹ چھوڑ کر باقی ٹوبہ کو پشیا سم پر کر دین اب ایک چینی کی نشتری پر جس میں قدر سے پشیا ہو ٹوبہ مذکور کو انداز دین اور کسی گرم جگہ میں چند گھنٹہ تک اسطرح رہنے دین اگر پشیا میں شکر ہے تو ٹیسٹ ٹیسا شروع ہو جائیگا اور اس ٹوبہ سے بتدریج پشیا نکھڑے نشتری میں آجائیگا - اوپر کی جگہ اس ٹوبہ کی جو خالی ہو جائیگی اس میں کار - بائٹ اسٹڈ کی ہوا ہوگی جبکی پہچان یہ ہو کہ اس میں جلتی ہوئی تہی لگانے سے گل ہو جائیگی ۔ یہ شناخت چندان بار کیا نہیں ہے ۔

پنجم - جان سنس ٹسٹ - یہ شناخت اسطور پر کرتے ہیں کہ پشیا شکوک میں بہت رکن اسٹڈ اور لائیکوار - پوٹاسی ڈاکر جوشن سے تھے ہیں اگر شکر موجود ہو تو اس عرق کا رنگ گہرا سرخ ہو جاتا ہے لیکن بہت رکن اسٹڈ کو دوبارہ قلم بن کر صاف کر لینا چاہئے ۔

ڈاکٹر جان - سن پکٹ - رکن اسٹڈ کے سفوف میں کاس - پکٹ پوٹاش کی ایک ایک گرین کے ٹکڑے ملا کر استعمال کرتے ہیں ۔

دوازدہم - بائیل لینے صفرا - پشیا میں صفرا کی گرفت کے لئے یہ روشناخت ہیں ۔

اول۔ مے۔ لٹس ٹسٹ۔ یہ شناخت ٹیٹرک اسٹڈ سے کی جاتی ہے

چنانچہ ترکیب یہ ہے کہ کسی سفید چینی کی تشتری کے ایک حصہ پر ایک یا دو قطرے پشیا ب مشکوک کے ڈالیں اور اُسکے قریب مگر الگ ایک یا دو قطرے ٹیٹرک اسٹڈ کے ڈالیں۔ اب تشتری کو قدر سے ہٹا کر دین تاکہ اسٹڈ کے قطرے پشیا ب کے قطروں سے ملجا دیں۔ اگر پشیا ب میں صفر ہے تو قطروں کے ملنے کی جگہ پر مختلف رنگ پیدا ہو جائینگے مثلاً بنری سے رنگ اودا ہو جائیگا اور تب نیلا اور اخیر میں رنگ سُرخ ہو جائیگا۔ ہنیں تو اوسا کریں کہ ایک ٹسٹ ٹیوب میں پہلے قدرے پشیا ب مشکوک کا لیکر اسمین تبدیل کرنا ہے۔ ٹرک اسٹڈ ڈالیں تاکہ اُسکے قطرے نیچے بیٹھنے لگیں۔ اس ترکیب سے بھی ہی رنگ پیدا ہونگے +

دوم۔ پے۔ ٹن۔ کا۔ فرنس ٹسٹ۔ یہ شناخت دو طور سے کی جاتی ہے

ایک تو یہ کہ ٹسٹ ٹیوب میں قدرے پشیا ب مشکوک کا لیکر اسمین تبدیل کرچ خالص سلیفو رک اسٹڈ چھوڑیں جب تک صفر کے محو ضات جو جم کر پہلے نیچے بیٹھ جاتے ہیں حل ہو جا دیں۔ اب اُس عرق میں قدرے شکار یا ایک قطرہ شیرہ کا ڈالیں۔ اسکے کرنے سے مختلف رنگ پیدا ہو جائینگے مثلاً پہلے اودا تب سُرخ اخیر میں گلنار +

دوم۔ کسی سفید چینی کی تشتری میں قدرے پشیا ب مشکوک کا رکھ کر اسمین یا تو ایک قطرہ گاڑے شیرہ کا چھوڑ دیں یا اُس میں ایک ٹکڑا قند کا حل کر دیں۔ بعد ازاں قنبا پشیا ب ہو اُتنا ہی اُس میں سلیفو۔ رکن اسٹڈ چھوڑ دیں۔ اب اُس تشتری کو قدرے گرم کریں۔ اسکے کرنے سے پہلے تو سُرخ رنگ پیدا ہو گا اور بعد ازاں گلنار +

سینروہم۔ خون پشیا ب میں جس پشیا ب میں خون ہوتا ہے رنگ اُسکا خوب سُرخ ہوتا ہے مگر صرف سُرخ رنگت سے خون کی شناخت ہنیں ہو سکتی کیونکہ اودہ بہتری خیرین میں جن سے پشیا ب سُرخ رنگ کا ہو جاتا ہے۔ پس خون اسطور سے

گدلا ہو تو ٹسٹ ٹیوب کو لپ پر دو چار دفعہ پھیرنے سے وہ حل ہو جائیگا تب
ٹیوب کے اوپر کے حصہ کو آؤر گرم کریں تاکہ البیو-مین گرنٹ میں آجادے *
سوم-ٹسٹ ٹیوب کو آنچ پر اتنی دیر رکھنا چاہئے جس سے پیشاب کہونے لگے *
چہارم بعد جوش دینے کے ایک دو قطرے نائے-ٹرک اسڈ کے بھیالنے چاہئے
کیونکہ پیشاب اگر نہایت خفیف ٹرش ہوگا تو فاس-ٹک کی قسم کے اجزا بچھ ہو کر
بچے بیٹھ جائیں گے جس سے وہ پیشاب گدلا ہو جائیگا جیسے البیو-مین کے ہونے
سے ہو کرتا ہے اور اس شناخت کے درست ہونے پر شک ڈال دیکھا اسٹ
جوش دینے کے بعد آسمین ایک دو قطرے نائے-ٹرک اسڈ کے ضرور چھڑ دینے
چاہئیں جس سے فاس-ٹک کی قسم کے اجزا فوراً حل ہو جاتے ہیں مگر البیو-مین
ہنیں حل ہوتا * پس یاد رہے کہ پیشاب کو جوش دیکر آسمین نائے-ٹرک اسڈ
ضرور چھڑ دین *

دوم-پکٹ-رک اسڈ ٹسٹ-پکٹ-رک اسڈ کا یا تو کاڑھا عرق

استعمال کریں یا اسکا سفوف یا تھین کامین لادین *

پانزویہم-رطوبت میوگسٹینی بلغم-تھوڑا سا بلغم تندرست پیشاب
میں بھی ہوتا ہے اسکی شفافیت میں کسی طرح کا فرق نہیں پڑتا مگر بیماری میں
مقدار اس طوبت کی مختلف ہوتی ہے یعنی کبھی تو صرف اسقدر کہ پیشاب
تھوڑا سا گدلا ہو جاتا ہے پر بعض اوقات اسقدر زیادہ کہ اس پیشاب کو اگر ایک
برتن سے دوسرے برتن میں ڈھالئے تو ایسا گرتا ہے جیسے سفیدی بقیہ * جس
پیشاب میں بلغم ہوتا ہے وہ اکثر کہنا رہتا ہے اور آنچ یا نائے-ٹرک اسڈ کے کانے
سے جم نہیں جاتا الا اگر آسمین البیو-مین بھی موجود ہو * لیکن بلغم آلودہ پیشاب میں
اسے پکٹ اسڈ لادین تو وہ جم جاتا ہے *

نشانہ دہم۔ پس لے سنے پیپ جس پشیاب میں پیپ ملی ہوئی ہوتی ہے وہ اکثر یا تو ترش ہوتا ہے یا نیو۔ ٹرل یعنی نتو ترش اور نہ کہار اور جب پشیاب تھوڑے عرصہ تک ٹھہرا رہتا ہے تب پیپ بچے بیٹھ جاتی ہے اور اوپر ایک طبقہ علیحدہ بن جاتا ہے لیکن اگر پشیاب کو خوب ہلا دیجئے تو پیپ فوراً سارے میں مل جاتی ہے۔ طبقہ نہ کو رہیں اگر اسے۔ ٹکٹ اسڈ کے تو حل نہیں ہوتا لیکن لائیکوار۔ پوٹاس سے ملانے سے پیپ زیادہ لسدا اور گاڑھی ہو جاتی ہے اور پھر

ملاکر ہلا دین تو لوس سے کب قدر چربی پیدا ہو جاتی ہے پیپ کو اگر باریک بین کے پتے دیکھیں تو بہت سارے گول گول کیسے نظر آویں گے (دیکھو تصویر ۱۲)

تصویر ۱۲



کہ جبکہ گرد ایک پردہ ہوتا ہے اور


انکے اندر ایک چھوٹا سا آؤر کیسہ ہوتا ہے جس کو اصطلاح میں نیو۔ کلیس بولتے ہیں اور عسلاوہ اس نیو۔ کلیس کے روعن کی چوٹی چوٹی بوندیں اور نہایت چھوٹے چھوٹے دانے ہی ہوتے ہیں۔ اسے۔ ٹکٹ اسڈ کے ڈالنے سے گرد کا پردہ شفاف ہو جاتا ہے اور چھوٹا درمیانہ کیسہ نمایاں چنانچہ تصویر ۱۲ میں کر جہیں الف کے کیسے معمولی بیچے کیسے ہیں اور ب وہ جو بعد ملا اسٹیک اسڈ کے دکھائی دیتی ہے۔ لیکن باور ہے کہ باریک بین کے پتے میو۔ کس کی شکل بھی پرچے کیوں کی ہی ہو جاتی ہے آما فرق ہو کہ ان کیوں کے اندر جو دانے ہوتے ہیں وہ پیپ کے ذانون کی طرح نمایاں نہیں ہوتے۔

تشخیص درمیان پیپ اور میو۔ کس کے۔ سابق میں ان دونوں طوبوز کی تشخیص کو نہایت دشوار سمجھتے تھے اور اس بات کے لئے بہتری ترکیبیں

نکالی تھیں لیکن اب اس امر کو خوب جانتے ہیں کہ پیپا درتندرست بلغم میں فرق ہے
مگر پیپا در اس پردہ کے بلغم میں کہ حسین انعام میں موجود ہو بہت ہی تھوڑا فرق
ہوتا ہے لیکن اسے بڑا کن اسٹڈ اور کینج کے ذریعہ ان دونوں کو بخوبی علیحدہ کر سکتے
ہیں کیونکہ جس پشیاب میں پیپا ہوتی ہے اگر اس میں مائیکرک اسٹڈ ملا کر پینج دین
تو پیپا جم جائیگی لیکن جس پشیاب میں میو-کس ہوتا ہے اس میں یہ بات نہیں
ہوتی الا اگر اس میں کسی اور جگہ سے ایسویہ میں جھل ہو جا دے +

ہفتہ ہم سے - من یعنی منی - کہہ لیا ہی ہوتا ہے کہ جب پشیاب بعد
انزال کے آتا ہے تو نائیزہ میں جو منی لگی ہوتی ہے وہ اس پشیاب کے ساتھ دھکے
ملجاتی ہے ایسے پشیاب کو اگر خارج ہونے

کے بعد ہی باریک بین سے دیکھیں تو اس
میں چھوٹے چھوٹے کرم دکھائی دینگے
جیسے (تصویر ۱۵) میں نظر آتے ہیں اور
جنکو اصطلاح میں اسپرے - ٹو - زد - آکتے



ہیں + جو جو شناخت اور تشخیص ہم نے پشیاب کے اجزاء کی اور بتلای ہیں انکو اچھے طور
پر کام میں لانے کے لئے آلات کی ضرورت پڑتی ہے مگر اب ہم یہ بتلانا چاہتے
ہیں کہ پشیاب کو صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ایک آدھ سہل شناخت کو کام میں
لا کر اس کے اجزاء کی خاصیت اور ترکیب کیونکر کہی جاسکتی ہے + علی العموم جو اشیاء
پشیاب میں جم جاتے ہیں وہ یہ ہیں +

اول - اگر پشیاب کا در دھنچ اور فلموں کی شکل کا ہو تو وہ پشیاب ٹریش ہوگا اور اس
میں یو - برکن اسٹڈ ہمراہ دھمکت کے موجود ہوگا +

دوم - اگر پشیاب کا اور وسیع اور سلموں کی شکل کا ہو تو وہ پشیاب یا تو کہا را یا

نیو-ٹرل ہوگا اور اسمین ٹریپل-فاس-فٹ موجود ہوگا *

سوم- اگر پشیا ب کا ڈر د سفید مگر سفوف کے طور پر ہو اور قلمون کے طور پر نہیں
تو اسمین ٹریپل-فاس-فٹ اور فاس-فٹ آف لائم موجود ہوگا *

چہارم- اگر ڈر د کی رنگت ادوی ہو تو پشیا ب ٹرش ہوگا اور اسمین یورٹ اور
فاس-فٹ آف ایمونیا موجود ہوگا *

پنجم- اگر ڈر د کی لائل یا چہاے کے طور پر بہرے رنگ کا ہو تو اس میں
یورٹ آف ایمو-نیا اور سوڈا اور فاس-فٹ اور پشیا ب کی رنگت موجود ہوگی *

ششم- اگر ڈر د کی رنگت بہری اور مٹھی مائل ہو تو اسمین خاصکر یورٹ آف سوڈا
موجود ہوگا اور گاہے فاس-فٹ بھی *

ہفتم- اگ-زا-لٹ آف لائم پشیا ب میں بہت شاذ و نادر پائی جاتی ہے *

ہشتم- کار-بونٹ آف لائم بہت شاذ *

نہم- سُرخ ذرات خون کے اور پیپا اور بلغم وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں *

واضح ہو کہ جو اجزاء دوم سوم چہارم پنجم اور ششم و فعات میں مذکور ہوئے ہیں

انکے اندر مختلف مقدار میں یورٹ اور فاس-فٹ ہمراہ پشیا ب کی رنگت کے

ہونے میں غرض انکو ایک دوسرے سے اور دیگر رطوبات کے اجزاء سے

بھی بآسانی مشرق کر سکتے ہیں- چنانچہ ترکیب اسکی یہ ہے کہ قارورہ کو ہلکا کر

آبج دیں اگر اس سے دُر و حل ہو جاوے تو جانتا چاہئے کہ اسمین اجزاء ششم

کھماری یورٹ کے ہیں اور خاصکر یورٹ آف ایمو-نیا موجود ہے لیکن گرم

کرنے سے بھی قارورہ گدلا ہو تو اس میں یا تو فاس-فٹ یا پیپ یا بلغم ہوگا *

پس انہیں فرق کرنے کی یہ ترکیب ہو کہ قارورہ میں ہائیڈرو-کلورک اسڈ

علاوین اگر فاس-فٹ ہوگا تو حل ہو جائیگا پیپ یا بلغم نہیں اور جس پشیا ب میں

صرف پورٹ یا ساتھ اُسکے البیو-من بھی ہوتا ہے آنچ دینے سے اول صاف آلا
پھر گدلا ہو جاتا ہے *

سانچے پیشاب کی نالیوں کے جو گردن میں پیدا ہوتے ہیں اور جنکو

اصطلاح میں کاسٹس آف دی یو-ری-ٹری یوٹیش بولتے ہیں *

گردن کی بیماریوں کی تشخیص کامل کے واسطے باریک بین کو ضرور کام میں لایین
اور دیکھین کہ پیشاب کے دُرو میں سانچے میں یا نہیں اور جو ہیں تو کس قسم کے
ہیں کیونکہ مختلف مرض میں مختلف طور کے سانچے پیدا ہوتے ہیں *

دافع ہو کہ گردن کی بیماریوں میں دو سببے پیشاب کے دُرو میں سانچے پائے

جاسکتے ہیں یعنی ایک توجہ وہ بیماریاں کمر پر ضرب کے پہونچنے سے یا مشائین

پتھری کے ہونے سے یا نائزہ میں اسٹریچ کے ہونے سے یا پیشاب کے بند ہونے سے

پیدا ہوتے ہیں * دوم جب مرض اس-کار-لے-ٹے-نایا-مے-ٹریس یا

اری-سی-پے-کس یا گاؤٹ یا رو-ما-ٹے-زم یا اسکرا-فیو لایا سٹراب

غذا کے باعث جسم کی پروڈیکشن چھے طور پر نہیں ہونے پاتی یا جب جگر کا فضا چھو

طور پر انجام نہیں ہونے پاتا یا جب تیز چیزوں کے استعمال سے مثلاً روغن

تار-پین یا کن-تھے-ری-ٹوش گردن کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں *

عرض ان صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ گردن میں جو پیشاب کی نالیان ہوتی ہیں

انہیں مواد فاسد جمع ہو جاتا ہے اور جب پیشاب ان نالیوں میں جمع ہوتا ہے

اسوقت وہ موذی مادہ جو نالیوں میں جمع تھا اور جس نے نالیوں کی شکل بگڑ چکی

ہی سوت کے ٹکڑوں کے طور پیشاب کے ہمراہ بحری بول سے گزر کر شامیر

آ جاتا ہے اور جبوقت مریض پیشاب کرتا ہے اسوقت پیشاب میں ملا ہوا خارج


ہوتا ہے۔ پس چونکہ گردن کی ایک بیماری میں خاص قسم کے سانچے یا ٹریس

توان ساپچون کو اچھے طور پر باریک بین سے دیکھنا چاہئے تاکہ تشخیص مرض میں

(تصویر ۱۶)



تصویر ۱۷



نالیون کے اپنے - تھے - لیم پردہ کے ٹکڑے ہوتے ہیں اس قسم کا کاسٹ مرض
کراٹک برائٹس ڈیزیز میں پایا جاتا ہے اور یہ کاسٹ ان آدمیوں کے پیشاب

(تصویر ۱۸)



غلطی ہونے پاوے چنانچہ (تصویر ۱۶)
میں اپنے - تھے - لیم کاسٹ دکھائی دیتا
ہے - اس میں خون کا فاشی - برین ہوتا ہے
اور اس فاشی - برین کے ہمراہ پیشاب کی
نالیون کا پردہ اپنے - تھے - لیم اور خون
کے کار - پس - کھل ہوتے ہیں ۔

اس قسم کا کاسٹ مرض اکیوٹ ڈس کو آ
مے - ٹیو لف - راجی - لٹس میں پیدا ہوتا
ہے اور یہ مرض نتیجہ مرض سکا - لے - ٹینا
کا ہے ۔

(تصویر ۱۹) میں گراہ نیو - لمر کاسٹ نظر
آتا ہے ۔ یہ کاسٹ خون کے فاشی - برین
کا بنتا ہے اور اس پیشاب میں گردوں کی
نالیون کے اپنے - تھے - لیم پردہ کے ٹکڑے ہوتے ہیں اس قسم کا کاسٹ مرض
کراٹک برائٹس ڈیزیز میں پایا جاتا ہے اور یہ کاسٹ ان آدمیوں کے پیشاب
میں پایا جاتا ہے جنکو بارہ گاؤٹ یعنی فرفس
کی بیماری ہوتی رہتی ہے ۔

(تصویر ۲۰) میں دک - سی کاسٹ
دینے عمومی سانچے (نظر آتے ہیں) اس
قسم کا کاسٹ بھی کراٹک برائٹس ڈیزیز


تصویر ۱۹



تصویر ۲۰



تصویر ۲۱



میں پایا جاتا ہے اور کبھی اکیوٹ
نفرامی - ٹس میں بھی کہ جب یہ بیماری
کسی اور مرض کے سبب پیدا ہو۔

(تصویر ۱۹) مین آئیلی کاسٹ
(یعنی روغنی سانچے) دکھائی دیتے ہیں
خون کے فائی - برین سے بنتے ہیں کہ جس
میں روغن کے قطرات اوپر پر ۵

ا پے - تہے - لیم کے کیسے روغن سے
پڑھتے ہیں انکے پائے جانے سے
یہ سمجھنا چاہئے کہ گردہ کی ساخت بالکل
گھل گئی ہے - یہ بیماری برائیس ڈیزیز
کی ایک بڑی جہلک قسم ہے۔

(تصویر ۲۰) مین پیو - رو - لٹ کاسٹ
کی شکل سے (یعنی پیپ کے سانچے)
یہ بھی خون کے فائی - برین سے بنتے

ہیں کہ جس فائی - برین میں پیپ کے کیسے ہو کرتے ہیں۔ یہ کاسٹ پیو - ری - ٹیو
لف - رائی - ٹس میں پائے جاتے ہیں کہ جو مرض نہایت جہلک ہوتا ہے۔
(تصویر ۲۱) بلڈ کاسٹ (یعنی خون کے سانچے) (قسم کے سانچے مرض اسٹراک
یو - ری - پیٹ حرقت الجمل اور ہے - مایو - ری - لیم بول الدم میں پائے جاتے ہیں
کہ جب یہ بیماریاں روغن تار - پین کے اس نمال یا کسی اور سبب سے پیدا ہوتی ہیں
یہ خون کے سانچے گردوں کی مایوں میں بنتے ہیں کہ جس سے حاف ثابت ہوتا ہے

کہ شیباب کا خون گردہ سے آیا ہے *

فقہہ - ۳۰ - برازہ - براز کئی طور کا ہوتا ہے چنانچہ بعض دفعہ اس میں تلخ رہنے میوہ کس (ملا ہوا ہوتا ہے اور کبھی امحا کے میوہ کس ممبرین کے انفلا میشن میں براز کے اندر لطف یا پیپ پائی جاتی ہے - اور کبھی براز میں خون ملا ہوا ہوتا ہے جب فضلہ میں صفر انہیں ہوتا تب رنگ اسکا سفید میٹل اور جب زیادہ صفر ہوتا ہے تب رنگ بہت ہی زرد ہوتا ہے اور بچوں کا پانچواں اکثر سبز رنگ کا بھی ہوتا ہے * جب فضلہ عرصہ دراز تک امحا کے اندر ہوتا ہے یا جب جگر کی بگڑی ہوئی مٹوٹیا اس کے ساتھ مل جاتی ہیں تب بدبودار ہوتا ہے اور اس وقت خشک اور سڈون کے طور کا ہو جاتا ہے کہ جب عرصہ تک فضلہ رووون میں پڑا رہتا ہے اور جب مرکبات سیما ب کا استعمال کیا جاتا ہے تب براز کا رنگ ہلکا زرد ہوتا ہے اور معدنے تیزابوں کے زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے رنگت اسکی سبز ہو جاتی ہے اور فولاو کے مرکبات کے استعمال سے اور زیادہ خون کے مل جانے سے رنگ فضلہ کا سیاہ ہو جاتا ہے *

اور یہ بھی یاد رہے کہ بقولات کی سبزی اور دوا کی رنگت بھی فضلہ کے ہمراہ مل جاتی کہرتی ہے چنانچہ ساگ کی سبزی اور دہ - رب یعنی ریونڈ کی نردی خیرہ *

فقہہ - ۳۱ - زبان - جب ہم دیکھتے ہیں کہ زبان ایک بڑا لحمی عضو ہے اور اس میں خون کی رنگین کثرت سے ہوتی ہیں اور اسپرچو پر وہ چسپان ہے اس سے شب و روز رطوبت جلدی رہتی ہے تو عجب نہیں کہ زبان کے ملاحظہ سے بیماری کی تشخیص میں بڑی مدد مل سکتی ہے - پس زبان کے دیکھنے سے عضلون اور اعصاب اور دوران خون کے حالات دریافت ہو سکتے ہیں اور اگرچہ عام رطوبتوں کا حال اپنی زبان کے ذریعہ معلوم ہو سکتا ہے پر امحا کی خاص رطوبت کی کیفیت تو اس عضو سے

ضروری منکشف ہو جاتی ہے کیونکہ زبان کے اوپر چودہ چسپان ہے وہ سارے
رودون درمعدہ پر بھی لگا ہوا ہے *

گل تندرست آدمی کی زبان یکساں نہیں ہوتی کیونکہ بعض کی ہمیشہ صفا اور بعض
کی سیقدریلی اور کبھی زبان سُرخ اور کبھی ہسکی ہوتی ہے اور بعض کی سخت اور
بعض کی ڈھیلی اور سپردانٹون کے نشان ہوتے ہیں اور بعض آدمی کی زبان کا یہ
حال ہے کہ جب انکو زبان نکالنی کہتے تو ڈھیلی اور چوڑی نکلتی ہے اور بعض کی باز
ایسی سُکڑی ہوئی ہوتی ہے کہ نکلتے وقت نوکیلی ہو جاتی ہے اور نہایت تندرست
آدمی کی زبان کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ صبح کے وقت غذا سے پیشتر ایک سفید رنگ
کھیل جسکو اصطلاح میں قر کہتے ہیں سپر چٹا ہوا ہوتا ہے اور جن لوگوں کو منہ بکھر
سونے کی عادت ہے صبح کو انکی زبان خشک ہوتی ہے *

بیماری میں زبان کی حالت مختلف ہوتی ہے چنانچہ جب خاص زبان میں انفلیمیشن
ہوتا ہے تب وہ پھول جاتی ہے اور یہی حال اسکا اعضاے متصلہ کی شدید امراض میں
مرکبات سیما کے استعمال سے منہ آ جانے میں ہو جاتا ہے برعکس اسکے جب
مریض لاغر ہو جاتا ہے تب زبان بھی ڈھیلی ہو جاتی ہے اور اگرچہ نکل زبان کی نکالنے
کے طور پر منحصر ہے پر عام قاعدہ یہ ہے کہ جب جسم میں طاقت ہوتی ہے تب زبان
کم چوڑی اور نوکیلی ہوتی ہے اور حالت ضعف میں چوڑی اور ڈھیلی اور زبان کی
حرارت کا یہ حال ہے کہ حالت بیہوشی اور دم بند ہونے میں اور دباے ہنصہ کے
مرض میں مثل تنفس کی ہوا کے زبان کی حرارت بھی نہایت کم درجہ پر ہوتی ہے *

رنگت زبان کی مثل جلد کی رنگت کے ہوتی ہے مثلاً دموی مزاج کی زبان
سرخ ہوتی ہے اور جب جسم سے کوئی رطوبت خارج ہو جاتی ہے اور حالت کمزوری
اور اکال ہیا ریون میں پھسکی پڑ جاتی ہے اور تکلیف تنفس اور امراض شش و قلب میں

جنین م نہایت تکلیف سے لیا جاتا ہے زبان کی رنگت اودھی ہو جاتی ہے اور اعضا کے انقباض کی حالت پر بھی زبان کی رنگت منحصر ہے مثلاً جب معدہ اور امعاء کے میوہ کس پردہ میں شدید انقباض میں ہوتا ہے اسوقت ساری زبان یا صرف اُسکی نوک یا اُسکے کنارے یا نوک اور کنارے دونوں کی رنگت سُرخ ہوتی ہے اور بعض قسم کے اسکار۔ لے۔ ٹے۔ نا اور تیرا می میں دینے کن۔ ٹے۔ نیوٹو فیور) بعد دور ہو جانے قر کے زبان نہایت سُرخ ہو جاتی ہے اور بخار میں جب ساتھ اُسکے معدہ اور امعاء بھی شامل ہوتے ہیں اور جب معدہ اور رودہ بلا بخار کے مآوف ہو جاتے ہیں اسوقت زبان چکنی اور سُرخ ہوتی ہے اور جب حلق میں شدید انقباض میں ہوتا ہے تب بھی زبان خوب سُرخ ہو جاتی ہے ۔

زبان کے خشک یا تر ہونے پر بھی بہت سی باتیں منحصر ہیں مثلاً حالتِ صحت میں یہ بات ہوتی ہے کہ لعابِ دہن اور تھوک کے ہونے سے زبان تر رہتی ہے مگر جب وہ لعاب اور تھوک اس قدر پیدا نہیں ہوتا کہ جو حلق کے اندر گزرنے کے بعد اور بخارات بن کر اُڑ جانے کے بعد دہن میں کافی موجود ہو تب زبان بیشک خشک ہو جائیگی ۔ پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ زبان کے ذریعہ دو بڑی باتیں یہ معلوم ہو سکتی ہیں کہ آیا رطوبت پیدا کر نیوالی گلیٹین اور دورانِ خونِ غلیظ طور پر انجام پاتا ہے یا نہیں۔ پس جب زبان خشک ہوتی ہے جیسے بخار اور انفلاشن کی بیماریوں میں ہوا کرتی ہے تو اس سے یہ معلوم کرنا چاہئے کہ خونِ اس قدر دریا نہیں کرتا کہ جس سے علاوہ زبان اور دہن کے دیگر اعضا میں بھی رطوبت پیدا ہو سکے مگر جب زبان تر ہوتی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گُل اعضا میں رطوبت اچھے طور پر پیدا ہوتی ہے اور یہ بھی انفلاشن اور

بخار کی شدت کم ہو گئی ہے۔ پس اوپر کی تقریر سے یہ ظاہر ہے کہ جب خشک زبان تر ہو جاوے تو یہ ایک سلامت نیک ہر چنانچہ بخار کی بیماری میں طبیب زبان کو اچھے طور پر ملاحظہ کرتے ہیں اور جب انگلی سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ خشک زبان کے کنارے تر ہوتے آئے ہیں اور وہ تراوت ساری زبان پر پھیلتی جاتی ہے تب خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ اب رطوبت جسم کی جاری ہو گئی اور شفا عنقریب ہے +

کُل شدید امراض میں ایک گاڑھی رطوبت زبان پر جسم جاتی ہے چنانچہ بخار کے ابتدا ورجہ اور کھارے فیروز کام میں اور سخت انفلامشن اور شدید رطوبت نے اپنے وجہ مفاصل کی بیماری میں جو فرج ہوتا ہے وہ ملائی کے طور پر سفید رنگ کا ہوتا ہے اور جب بخار کا درجہ بڑھ جاتا ہے تب فرنگہ کوڑکی رنگت بہوری یا سیاہ ہو جاتی ہے اور زبان خشک اور بھلسی ہوئی ہوتی ہے اور جو وقت زبان پر ایک موٹی خشک اور سیاہ رنگ کی فریم جاتی ہے اور دانتوں پر بھی ایک سیاہ رنگ کی رطوبت جسکو اصطلاح میں سارڈیز کہتے جمع ہوتی ہے اس وقت یہ معلوم کرنا چاہئے کہ بخار اب درجہ رومی کو پہنچ گیا اور جسم میں کمال ضعف ہو گیا اور خون نہایت میل ہو گیا اور رطوبت جسم کی بالکل بگڑ گئی۔ ان حالات میں نہایت بدبودار پاخانہ ہی آتا ہے +

جان ٹوس یعنی یرقان کی بیماری میں قر کی رنگت صفراوی ہو جاتی ہے اور مرض اس کے دی میں بسبب نکلنے خون کے رنگت قر کی سیاہ ہو جاتی ہے +
بہنچی یعنی ٹوس۔ پیپ۔ شیا کے بیمار کی زبان میں اختلاف ہے کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان کی جڑ پر تو ایک موٹی فرج جمع ہو جاتی ہے مگر نوک اور کنارے اس کے خوب شخ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ساری زبان پر قر عرج جاتی ہے

رسا تہ اُسکے زبان پر دانتوں کے نشان بھی پائے جاتے ہیں اور کبھی پردہ
اپنے - تھے - لی - ام کے چہل جانے سے زبان جاہجاسے چہلی ہوئی نظر آتی ہو
اور بعض دفعہ زبان پر گہرے گہرے شگاف پڑ جاتے ہیں چنانچہ یہ بات خمر شوز
کی زبان پر اکثر پائی جاتی ہے اور آنشک کی بیماری میں زبان کا یہ حال ہوتا ہے
کہ اُسکے کنارے سخت اور اسپر مرنی قسم کے زخم پڑ جاتے ہیں جو نبضیت
کی حالت میں بعض دفعہ زبان پر ایک بہورے رنگ کی فرو جم جاتی ہے +

اسکار - لے - لے - نا کے بیمار کی زبان میں ایک بات خاص یہ پائی جاتی ہے
کہ زبان کی چوٹی چوٹی گلیٹان بڑھ کر اور سخی ہو کر سفید قرم کی چہلی کے اندر سے
پھوٹ کر باہر نکل آتی ہیں جس حالت کو عوام زبان پر کانٹے پڑ جانے کہتے ہیں + جیسے
دہن اور حلق کے غشامین ہو کر تے ہیں ایسے ہی زبان پر بھی چوٹے چوٹے زخم
پڑ جاتے ہیں جنکو اصطلاح میں اف - تھے اور اردو میں چہالے کہتے ہیں چنانچہ جب
یہ چہالے بچوں کی زبان پر پیدا ہوتے ہیں تب ان کو تھرش بولسمین اور سل کی
بیماری کے اخیر وجہ میں اور اعضا سے اندرونی کے مزمن امراض کے مہلک ہونے
کے وقت بھی زبان پر چہالے پیدا ہو جاتے ہیں +

زبان کے باہر نکلنے کے طور سے بھی بہت سی باتیں چل ہو سکتی ہیں چنانچہ
حالت کمزوری میں اور کمزوری میں جب بخار آتا ہے اور خوف کے باعث اور
شرابیوں کے ہدیامین زبان نکلتے وقت کانپتی ہے + جبے بان خشک ہوتی
ہے بشکل باہر نکلتی ہے اور جن بیماریوں میں عقل مختل ہو جاتی ہے انہیں زبان
آہستہ اور رک رک کر نکلتی ہے اور جب جسم کی ایک جانب مفلوج ہو جاتی ہو
اُسوقت زبان باتو جانب مفلوج یا مندرست کی طرف گھوم جاتی ہے +

فقرہ - ۵ - مسوڑے - مسوڑوں سے دوران خون کا حال دیکھا

ہوتا ہے۔ چنانچہ جب جسم میں خون زیادہ ہوتا ہے تب وہ سُرخ ہوتے ہیں اور جب خون کم تب پہکیے اور جب دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے تب ادھر اور اسکر۔ وی کی بیماری میں سوڑے پیوے اور سیاہی پیل ہوتے ہیں اور ذرا ہی صدمہ پہنچے تو اُن سے خون نکلنے لگتا ہے * مرکبات سیما ب کے استعمال سے وہ پھول جلتے اور اُن کے کنارے سُرخ ہو جاتے ہیں اور سیسہ یعنی لڈ کے زہر میں ان پر ایک نیلی لکیر پڑ جاتی ہے *۔

فقہ ۵ - ۶ - بیدن - بیدن اور دہن کے ملاحظہ کرنے سے مثل سوڑوں کے دوران خون کی حالت دریافت ہوتی ہے چنانچہ جب جسم میں خون کم ہوتا ہے تب بیدن پہکی پڑ جاتی ہیں اور اُن حالتوں میں خشک اور بھلسی ہوئی ہوتی ہیں کہ جن میں زبان کا رنگ بھی پہکیا ہوتا ہے اور جن حالتوں میں زبان پر چھالے پیدا ہوتے ہیں انہیں لبو نیز ہی چھالے نکل آتے ہیں اور زکام کی بیماری اور بخار کے فرو ہونے کی حالت میں لبو نیز ایک قسم کے دانے پیدا ہوتے ہیں جنکو اصطلاح میں ہر - پیر لے - بے - ریش یعنی تبخا کہتے ہیں - لبون کے ملاحظہ کی وقت اس بات کا لحاظ رکھ کر عورتیں سچی ملکہ پاں کہا یا کرتی ہیں اور پاں کی لالی لبو نیز جایا کرتی ہیں اور اسکو خوبصورتی تصور کرتی ہیں - کسی شاعر نے اس بار سے مین کیا خوب کہا ہے *۔

شعر

سیالیدہ لب پر رنگ پاں ہے تماشا ہے تر آتش دہوان ہے

فقہ ۵ - ۷ - دندان - دانتوں کے امتحان سے بھی بہت سی باتیں حاصل ہو سکتی ہیں مثلاً جب دودھ کے دانت نکلنے والے ہوتے ہیں تب بچوں کو بعض دفعہ بڑی تکلیف ہوتی ہے یعنی شدت کا بخار آ جاتا ہے امعا کے انحال پڑ جاتے ہیں اور چیچک اور خسرہ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور کن - ول - شن یعنی ام بصیان

بھی ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی جوان ہوتا ہے اور اسکے دانت مضبوط اور سہول
 ہوتے ہیں تو اس بات سے جسم میں طاقت پائی جاتی ہے اور حالت کمزوری
 اور اسکر - فیو - کس مزاج کے آدمی کے دانت کمزور یا مردار پڑ جاتے ہیں مثلاً
 جب کسی شخص کا ماضیہ ہمیشہ بگڑا رہتا ہے یا جب کوئی شخص شیرینی یا ترشی یا
 مرکبات سیما ب کثرت سے استعمال کرتا ہے اور جو سیما ب کے کارخانہ میں کام
 کرتے ہیں بعض حصہ انکے دانتوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جھڑ جاتا ہے *
 مرض اسکے - دمی میں اور سیما ب کے استعمال سے جب منہ آ جاتا ہے تب دانت
 ہلنے لگتے ہیں * تب دائمی اور مرض کی حالت رومی میں اپنا ایک بہورے یا سیما
 رنگ کی کاٹھی رطوبت جم جاتی ہے * امعا میں جب کسی قسم کی خراش ہوتی ہے
 یا جب انہیں گرم ہوتے ہیں تب بچے دانت پیتے ہیں اور تب نوبتی کی سردی کے
 درجہ میں دانت سے دانت بچنے لگتے ہیں *

ہندوستان میں عورتیں سستی لگاتی ہیں جس سے دانتوں کا آبناب دور
 ہو جاتا ہے - اس بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے - کہ شعر -
 ملے سستی رتبہ دانتوں کا بہت کم کر دیا کیا غضب تم نے کیا ہیکر کو نیکم کر دیا
 فقرہ - ۸ - حلق اور لوزیتیں عین بی مان - سلسل - گلا نڈ - یہ دونوں مقام
 پہول جاتے اور انہیں انفلا میشن ہو جاسکتا ہے اور یو - ویو - لاسینی منہ کا کوڑا
 زکام اور کہانسی کی بیماری میں بڑھ کر بٹک پڑتا ہے اور حلق میں گدگدی پیدا
 کر کے کہانسی کو عرصہ تک جاری رکھتا ہے یہ بات کمزوری میں بھی ہوتی ہے *
 فقرہ - ۹ - تھوک - ان حالتوں میں یا وہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تھوک پیدا
 کرنیوالی کلیٹوں میں خراش ہوتی ہے چنانچہ جب سن در آ سکے متصل کے مقامات
 میں انفلا میشن ہوتا ہے اور بعض دفعہ بچوں کے دانت لگتے وقت اور جوانوں میں جب

وانت بگڑ جاتے ہیں اور بعض دفعہ ایسی ادویات کے اثر سے بھی تھوک زیادہ پیدا ہوتا ہے جیسے سیلاب * آیتو * مدین * ان - ٹے - مو - نی - پرو - سکاٹ اسٹ اور ڈی جی - ٹے یس میں بحالت حمل میں بھی تھوک اکثر زیادہ پیدا ہوتا ہے - اور مہنہ سے کف جاری ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ چیز تھوک کے زیادہ پیدا ہونے سے جاری ہوتی ہے اور کیتھ رہو کی مایون سے زیادہ بلغم کے پیدا ہونے سے ہی مہنہ سے کف نکلتی ہے * یہ ایک علامت مرگی اور مرض مائتھرو - فوبیا (بے دیوانہ جانور کے کاٹنے سے جو بیماری ہوتی ہے) کی ہے *

فقہہ - ۱۰ - ذالیقہ - جن بیماریوں میں زبان خشک اور اسپر فرجم جاتا ہے ان میں مہنہ کا ذالیقہ بھی بدل جاتا ہے چنانچہ ا - یو - پکسی اور برقان اور نجام کی بیماری میں صبح کو اٹھتے وقت اور نہایت بگڑے ہوئے ماضیہ میں اور رنج غم فکر یا دل درد حرامین بھی زبان کا ذالیقہ کڑوا ہو جاتا ہے * مسلول اکثر اپنے بلغم کے نمکین ذالیقہ کی شکایت کرتے ہیں اور جب مہنہ اور حلق کے اندر بدبودار زخم چڑ جاتے ہیں * زبان کا ذالیقہ بدبودار ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ماضیہ کے بگڑ جانے سے مہنہ کا ذالیقہ شل گندہ اندون کے بدبودار ہو جاتا ہے اور سیلاب کے استعمال سے جب مہنہ آ جاتا ہے تب زبان کا ذالیقہ تانبے کے طور کا ہو جاتا ہے *

فقہہ - ۱۱ - اشتہا - جب کوئی شدید بیماری ہو نیوالی ہوتی ہے تب پہلے پل بھوک مر جاتی ہے اور غذا کی طرف سے مریض کو نفرت ہو جاتی ہے پھر اس کے جب بیمار رو بصوت لانے لگتا ہے تب سب سے پہلے بھوک کہنے لگتی ہو * اور بڑے بچے اور نرسن امراض میں بھوک کا کم ہو جانا ایک علامت بد ہے کیونکہ بغیر بیماری کے ہی بھوک کم ہو جاسکتی ہے مثلاً جب ہوا خوری اور زرش بنین کجاتی ہے یا جب دل کے اندر خوف رنج و غم فکر اور یاس و درمان ہوتا ہے *

اور کہانے کا ہوگا جسکو انگریزی میں بیو-سے-میا اور عربی میں جمع البقرہ کہتے ہیں اکثر اسوقت زیادہ ہوتا ہے کہ جب معدہ کے اندر خراش اور امحایین کرم ہوتے ہیں اور بعض دفعہ یہ ایک بیماری نرالی ہی ہوتی ہے اور بچوں کے مے-سن-ٹیرک گلاڈ کی بیماری میں بھی کہانے کا بڑا ہوگا ہو جاتا ہے اور جب کوئی شخص کسی ضرر سے شفا پانے لگتا ہے تب بھی اسکو یہ بات ہو جاتی ہے جس سے صاف یہ پایا جاتا ہے کہ طبیعت اس لاغری کو جو مرض کے باعث پیدا ہوئی ہے رفع کرنا چاہتی ہے۔ گمانے کا نشہ جب اتر جاتا ہے تب بھی پہوک نہایت شدت سے لگتی ہے ۔ بعض دفعہ ایام حمل میں اور مرض کلو-رو-سٹس اور ہس-ٹے-ریا کی بیماری میں اور کسی قسم کی دیوانگی میں بھی اشتہا کا ذب پیدا ہو جاتی ہے ۔

فقہہ-۱۲-نشنگی۔ بیماری میں پیاس اکثر معلوم ہوتی ہے چنانچہ شدید انفلمیشن میں اور شدت کے بخار و نیمین اور چوٹ اور ضرب شدید میں اور انفلیرین میں کہ جنہیں بہت سا خون نکلتا ہے اور کسی ہم رطوبت کے زیادہ نکلیجانی سے یہی نشنگی زیادہ معلوم ہوتی ہے ڈا-یا-ریا (اسہال) اور ڈی-سن-ٹری (پیش) اور کالرا (بھیضہ) اور مرض ڈا-یا-بے-ٹیر (ذیابٹوس) اور ڈیپ-سی (استسقا) اور جب سٹل کی بیماری میں کثرت سے عرق آتا ہے اور تندرستی میں بعد ورزش کے زیادہ پیاس معلوم ہوتی ہے اور جب کسی غذا میں نمک اور مصالحہ زیادہ ہوتا ہے اس کے کہانے سے بھی پیاس زیادہ معلوم ہوتی ہے ۔

فقہہ-۱۳-بوتے منفس۔ جن عرقیات یا غذا میں تیز اور خاص قسم کی بو ہوتی ہے ان کے استعمال کرنے سے وہ بوفوراً معدہ میں جذب ہو کر خون کے ہمراہ بجاتی ہے اور جب وہ خون شش میں صاف ہونے کو آتا ہے تب وہ بوفوراً سانس کی ہوا کے ہمراہ باہر محسوس ہوتی ہے ۔ بعض دفعہ کے مرض میں اور جب

خون پتلا پڑ جاتا ہے اور سیما کے استعمال سے جب ہنہ آجاتا ہے اور بخار کے شدید درجوں میں اور اسکر۔ وی کی بیماری اور دہن کے انفلامیشن اور زخم میں تنفس سہجہ ہوتی ہے اور جب شش میں گنگرین کی بیماری ہو جاتی ہے تب بہی تنفس سے نہایت بدبو آنے لگتی ہے اور ذیابیطوس شکر میں تنفس کے ہوا کی بوشل شش کے میٹھی ہو جاتی ہے *۔

فقہہ - ۱۴ - قے۔ واضح ہو کہ معدہ ایک ایسا اہم عضو ہے کہ جس سے صرف فعل اخضام طعام ہی انجام نہیں پاتا بلکہ علاوہ اس عضو کا دماغ۔ قلب اور شش وغیرہ اعضا سے بھی تھے صرف معدہ ہی کے لگاڑ سے نہیں ہوتی ہے بلکہ بہت سے اعضا کے شدید امراض اور ضروب میں بھی تھے ہوا کرتی ہے یا جب نظام عصبی میں کوئی صدمہ شدید پہونچتا ہے مثلاً جب دماغ میں صدمہ پہونچتا ہے یا جب اس عضو میں انفلامیشن ہو جاتا ہے تب باعث معدہ کی شرکت کے تھے ہونے لگتی ہے۔ علاوہ ازیں جب صفر کی پتھری مجری مرارہ سے اور ریگ گردہ مجری بول سے گزرتی ہے اور قلب اور رحم میں جب شدت کا انفلامیشن ہوتا ہے تب بھی تھے ہوا کرتی ہے اور عوارق نازک مزاج اور حاملہ کو بھی اکثر تھے ہوا کرتی ہے اور جب چیچک یا کسی اور قسم کے بخار آگئے والے ہوتے ہیں تب اکثر تھے ہوا کرتی ہے *۔

فقہہ - ۱۵ - مادہ قے کا۔ قے کے ذریعہ جو شے خارج ہوتی ہو اس کے امتحان سے بھی بیماری کی تشخیص کو اکثر بہت مدد ملتی ہے چنانچہ جب معدہ میں انفلامیشن یا زخم پیدا ہوتا ہے اور اس باعث قے ہوتی ہے تب غذا غیر منہضم قے کے ذریعہ نکلتی ہے اور ایام حمل میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے بعض دفعہ ایک قسم کی بدہضمی میں جسکو گس۔ ٹرال۔ جیا کہتے ہیں دو یا چار گھنٹہ بعد غذا کے

ایک شغاف پانی کے طور پر ترش طوبت بذریعہ تھے کے خارج ہو جاتی ہے اور جب جگر کی ساخت میں بیماری ہوتی ہے تب اکثر صفراؤمی - ڈیو - نم (معاثنا عشرہ) رودہ سے معدہ میں آ جاتا ہے اور تھے کے ذریعہ نہ صرف اخراج پاتا ہے اور ہے - مائے - شش (تھے اللہم) کی بیماری میں تھے کے ساتھ خون کے ٹولے یا غذا کے ہمراہ خون ملا ہوا نکلتا ہے - اور جب معدہ کے اندر اینڈو - میزیم کی تھیلی پھٹ جاتی ہے تب تھے کے ہمراہ خالص خون نکلتا ہے اور جب متصل کے کسی عضو کا وٹیل معدہ میں پھوٹ جاتا ہے تب پیپ کی تھے ہوتی ہے اور جب امعاء میں اس قسم کی گرہ پڑ جاتی ہے جس سے پاخانہ بالکل بند ہو جاتا ہے تب براز کی تھے ہوتی ہے جسکو اصطلاح میں اس - ٹر - کو - ری - شش و - می - ٹینگ کہتے ہیں اور جب معدہ کے اندر حوصات کا غلبہ ہوتا ہے تو تھے کے ہمراہ چوٹے

چھوٹے ٹکڑے اخراج پاتے ہیں جنکی باریک بینی



شکل اس تصویر میں کھلائی دیتی ہے اور جن کو

اصطلاح میں سارسی - نی - ون - ٹری - کیولائی

بولتے ہیں ۔

مقالہ دوم

دوران خون

فقہہ - ۱ - نبض - رگوں میں خون کس طور سے دورہ کرتا ہے اس بات کے ملاحظہ سے ہی تشخیص مرض کو ٹری مدد ملتی ہے اور خاصہ نبض کے ملاحظہ سے بہت سی بیماریوں کا انکشاف ہو جاتا ہے - غالب کے مقام پر یا تھہر کہیں تو اس عضو کی حرکتوں کا شمار اور اسکی طاقت اور سرعت دریافت ہو سکتی ہے اور یہ بھی کہ حرکتیں بیک

باقاعدہ اور ساتھ تنظیم کے ہوتی ہیں یا نہیں لیکن مساوی باتوں کے ہر ایک کتون کے ساتھ قلب سے کثرتِ خون شریان میں جاتا ہے۔ دل کی حرکتوں کے ملاحظہ سے دورانِ خون کا اندازہ بخوبی دریافت ہو سکتا ہے لیکن مختلف وجوہ کی شریان کے انبساط اور انقباض میں اگر فرق نہ ہو تو یہ اندازہ البتہ درست تھا مگر اس فرق کے ہونے سے معالج کو بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اُسکی توجہ نبض کی طرف زیادہ رجوع ہوتی ہے۔

اختیاط میں نبض کے ملاحظہ کے لئے۔ پہلے احتیاط تو یہ ہے کہ مریض کے پاس جاتے ہی اُسکی نبض کا ملاحظہ نہ کریں بلکہ تھوڑے عرصہ توقف کر کے نبض کو دیکھنا چاہئے تاکہ وہ دھڑکے جو طبیع کے دیکھنے سے مریض کے دل میں پیدا ہوتا ہے رفع ہو جائے کیونکہ اس دھڑکے کا اثر دورانِ خون پر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے نبض بے قاعدہ ہو جاتی ہے۔ نبض کے ضربات کے شمار کے لئے صرف ایک ہی انگشت کافی ہے لیکن اسلئے تاکہ نبض کی باریکیاں بخوبی معلوم ہو جائیں اپنے ہاتھ کی چار انگلیوں کو۔ بیمار کی رمی۔ ڈیل۔ اور۔ ٹرمی (یعنی زندہ اعلیٰ) پر رکھ کر آہستہ اور یکساں دبا نا چاہئے اور اگر شریان مذکور کو چپکلیا سے دبا دیں تو پہلے انگلی سے اُسکی لچک بھی دریافت ہو سکتی ہے۔ چونکہ نبض کا مٹی پر چونکہ بدقت محسوس ہو سکتی ہے اسلئے اُنکے قلب کے ضربات کا ملاحظہ کرنا کافی ہے لیکن بہتر تو یہ ہے کہ کچھ جوت خواب میں ہو اُسوقت اُسکی نبض دیکھیں۔

واضح ہو کہ نبض کی جتنی خاصیتیں ہیں سب سے اُسکا تو اثر نہایت آسانی سے دریافت ہو سکتا ہے اور نبض کی یہ خاصیت اکثر قلب کی حرکات کی تعداد کے برابر ہوتی ہے کہہیں اس تعداد سے زیادہ نہیں ہوتی بلکہ اس سے کم ہو سکتی ہے۔ نبض قلب میں بطون (دون۔ ٹرمی۔ گلنس) کے اندر خون استعد رکھتا ہے

کہ جسم کی کُل رگون میں اُس خون کی حرکات کا اثر نہیں پہنچتا اسلئے ری ڈیل اسٹری پر بھی نبض محسوس نہیں ہوتی علاوہ اسکے نبض کئی اور بواعث سے بھی محسوس نہیں ہو سکتی چنانچہ جب قلب بغیر خون کے حرکت کرتا ہے یا جب شریان مذکور کسی بستے دب جاتی ہے اور حالت غشی میں (سن کو - پی) قلب کی ضربان ایسی ضعیف ہو جاتی ہیں کہ انگا اسٹری ڈیل - اسٹری تک پہنچ نہیں سکتا اسلئے وہاں پر نبض بھی سوسل نہیں ہوتی +

نبض میں کئی باتوں سے اختلاف پڑ جا سکتا ہے چنانچہ عمر سے مزاج سے اور عورت اور مرد کے ہونے سے اور خواب غذا ورزش اور مریض کے جسم کے موقع سے بھی ایسے وہ کھڑا یا بیٹھا یا لیٹا ہو اور دن کے مختلف وقتوں کی نبض میں بھی بڑا اختلاف ہے اور ان باتوں سے بھی نبض میں متغیر پڑ جاتا ہے مثلاً جسم میں کمی بیشی خون کی اور طاقت یا ضعف وغیرہ سے +

اول عمر - عہد طفلی - بچوں کی نبض کی تعداد میں بڑا فرق ہوتا ہے چنانچہ پیدائش کے روز جو وقت بچہ سوتا رہتا ہے اسکی نبض عرصہ ایک منٹ کے اندر ۱۳۰ سے ۱۴۰ مرتبہ تک چلتی ہے اور عہد طفلی سے لیکر جوانی تک نبض کی ضربات تعداد میں گہتی رہتی ہیں اور چون جو عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے ضربات نبض کی بھی کثرت بڑھتی جاتی ہیں +

دوم نبض عورت اور مرد کی - تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ سات پہر کی عمر تک مرد اور عورت کی نبض کی تعداد میں چند ان فرق نہیں پایا جاتا لیکن جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تب عورت کی نبض نسبت مرد کے چھ سے چودہ مرتبہ زیادہ حرکت کرتی ہے +

فہرست نبض کی مختلف عورت اور مرد میں

- ۱۔ بعد پیدا ہونے کے نبض عرصہ ایک منٹ کے اندر ۱۲۰ مرتبہ چلتی ہے *
- ۲۔ نہایت نیچے بچہ کی " " " ۱۲۰ " " "
- ۳۔ عہد طفلی میں " " " ۱۰۰ " " "
- ۴۔ بلوغت میں " " " ۹۱ " " "
- ۵۔ جوانی میں " " " ۷۵ " " "
- ۶۔ بڑھاپے میں " " " ۷۰ " " "
- ۷۔ نہایت ضعیفی میں " " " ۷۵-۸۰ " " "

دفعات ۴ اور ۵ اور ۶ میں اگر ۱۰ ضربات زیادہ کریں تو عورت کی نبض کے تعداد حاصل ہو سکتی ہے *

دوم۔ مزاج۔ مختلف مزاج کے آدمی کی نبض میں اختلاف ہو یا نہیں اس بات میں راسے دینی شکل ہے لیکن علی العموم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ دوسری اور عصبی مزاج کے آدمی کی نبض نسبت بلغمی اور صفراوی مزاج کے زیادہ تیز ہوتی ہے *

جسم کے موقعے۔ تندرست جوان مرد کے جسم کے مختلف موقعوں میں نبض کی اوسط سرعت یہ ہے کہ کل حالات غیر معمولی کا لحاظ رکھ کر اگر نبض کا ملاحظہ کریں تو کہڑے رہنے کے موقع میں نبض ۷۹ دفعہ چلتی ہے * بیٹھے رہنے کے موقع میں ۷۷ اور لیٹے رہنے کے موقع میں ۷۶ * اور جب حالات غیر معمولی کے شمار کے بغیر نبض کی ضربات کو گنتے ہیں تو کہڑے رہنے کے موقع میں ۸۱ * بیٹھے رہنے کے موقع میں ۷۸ * اور لیٹے رہنے کے موقع میں ۷۶ *

جوان عورت کی نبض کی اوسط سرعت کل حالات غیر معمولی کو شامل کرنے سے

گہڑے رہنے کے موقع میں ۸۹ * بیٹھے رہنے کے موقع میں ۸۶ * لیٹے رہنے کے موقع میں ۸۰ * اور جب حالات معمولی کے بغیر نبض کی ضربات کا شمار کرتے ہیں گہڑے رہنے کے موقع میں ۹۱ * بیٹھے رہنے کے موقع میں ۸۴ * اور لیٹے رہنے کے موقع میں ۸۰ * جب سر پر نسبت جسم کے نیچا رکھا جاتا ہے تب نبض گہٹ جاتی ہے *

دن کے مختلف وقتوں کے اندر نبض میں اختلاف پڑ جاتا ہے چنانچہ یہ قاعدہ، جو کہ تندرست جوان آدمی کی نبض صبح کے وقت زیادہ تر جلد چلتی ہے نسبت شام کے اور چون و چون چڑھتا جاتا ہے نبض گہٹی جاتی ہے اور یہ بھی ایک قاعدہ اکثر یہ ہو کہ اثر اسباب خارجی کا نبض پر صبح کے وقت زیادہ تر ہوتا ہے نسبت شام کے سوم خواب - نیند کے وقت نبض بہت گہٹ جاتی ہے اور بے خوابی میں چونکہ دوران خون تیز ہوتا ہے تو نبض بھی سہل ہو جاتی ہے *

چھارم ورزش - اس باعث سے نبض زیادہ تر تیز ہو جاتی ہے اور بعد ورزش کے جوتھکان ہوتا ہے اُس سے نبض گہٹ جاتی ہے *

پنجم - اکل و مشرب - بقولات کے کہانے سے نبض میں بہت ہی تھوڑا فرق پڑتا ہے مگر اغذیہ کی نوعیت کا اثر نبض پر بہت ہوتا ہے اور گرم چیزوں کے پینے سے نبض بہت ہی تیز ہو جاتی ہے لیکن عرقیات سرد کے پینے سے نبض بہت گہٹ جاتی ہے *

غصہ اور غضب یا س اور حرمان غصہ اور غضب کے وقت نبض تیز ہو جاتی ہے اور میانس حرمان کی وقت کمزور * اور خوف بھی بڑا بھاری سبب نبض کے کمزور کر دینے کا ہے *

اثر گرم و سرد ہو ا کا نبض پر - جب سرد ہو ا چلتی ہے اُس وقت نبض گہٹ جاتی ہے اور گرم ہو ا کے چلنے سے نبض بڑھتی ہے *

کمی بیشی خون کی مقدار میں۔ دوسری مزاج کی نبض سیرج ہوتی ہے لیکن جسم کے اندر جب خون اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ جس سے قلب بجاوے اور اپنا فعل انقباض اور انبساط کا اچھے طور پر نہ کر سکے تب نبض کی مقدار کمزور ہو جاتی ہے + خون کی مقدار میں جب صرف تھوڑی ہی کمی ہوتی ہے تب نبض بیل ہو جاتی ہے مگر جب خون جسم کے اندر بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے تب نبض سیرج ہو جاتی ہے + ضعف جب بیماری کے بغیر جسم میں ضعف آ جاتا ہے تب نبض گھٹ جاتی ہو لیکن نہایت ضعف کی حالت میں نبض سیرج ہو جاتی ہے +

یاد رہے کہ تندرست آدمیوں کی نبض ان باتوں سے سیرج ہو جاتی ہے کشتی - دھوپ - ہیل کود - اشیاء کی شرب خاصہ کہ گرم چمیرین خمر اور تنباکو - گرمی - نہایت ضعف - بخوالی - دوسری مزاج - غصہ اور غضب - اور نبض کے بیل کر دینے والے اسباب یہ ہیں خواب - ٹکان - عرصہ تک حرکت نہ کرنا - کمزوری بغیر بیماری کے بشرط کہ غایت درجہ کی نہ ہو - سردی خواہ بیرونی یا اندرونی - یاس اور حرمان +

بیان مذکورہ بالا سے نبض کا صرف بڑھنا اور گھٹنا ہی ثابت ہوتا ہے مگر نبض کی اور بھی خاصیتیں ہیں جن کا جاننا ہی ضروریات سے ہے مثلاً جو وقت نبض کے اوپر انگلی رکھتے ہیں اس وقت جو حرکت محسوس ہوتی ہے وہ کئی حالتوں سے مرکب ہوتی ہے چنانچہ الف - قلب کی حرکت ب - صدمہ اس حرکت قلب کا اوپر اور طلی (ایار - ٹا) اور بڑی بڑی شریان کے ت - حالت شریان کے پردوں کی شت قوام خون کا ج - دماغ اور طلی کے کیواڑوں کا (ایار - ٹا) وائٹس +

الف - خاصیت نبض کی جو قلب کی حرکت کر نیچے طور اور خون کی مقدار پر منحصر ہے + اول - قلب کی حرکتوں کے طور کے لحاظ سے نبض کو سیرج (فری - کوئٹ) یا بیل (ران - فری - کوئٹ) کہتے ہیں +

(دوم) جب قلب اپنے قاعدہ مقرر پر پہاڑ پر حرکت کرتا ہے تب نبض کو باقاعدہ (ری-کیو-لر) اور جب قلب کی حرکت کہیں زیادہ اوپر کی کم ہو جاتی ہے تب نبض کو بے قاعدہ (اری-کیو-لر) کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان دونوں صورتوں میں نبض کی دونوں حرکات کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ اوپر کی کم ہوتا ہے لیکن جب کچھ عرصہ تک برابر چلتے چلتے نبض ایک وقفہ رک جاتی ہے اور پھر چلنے لگتی ہے تب نبض کو فوٹی (ان-ٹر-ے-ٹنٹ) کہتے ہیں *

سوم جو خون دل سے شریان میں جاتا ہے اس خون کی مقدار کے بموجب نبض کو پرائفل (یا باریک) (اسمال) کہیں گے۔ جب دل کی ہر حرکت کے ساتھ مقدار خون کی برابر پہنچتی ہے تب نبض کو برابر (ای-کوئیل) اور جب مقدار مختلف ہوتی ہے تب نبض کم و بیش (ان-ای-کوئیل) کہتے ہیں *

چہارم۔ بلحاظ وقت کے جو قلب کی دونوں حرکتوں کے انجام پانے کو لگتا ہے نبض کو بلی (سلو) سیر (کوئیک) اور نہایت سیر (جر-کنگ یا باؤنڈنگ) کہیں گے *

ب۔ جب قلب کی حرکتوں کا صدمہ شریان کے پردوں پر پہنچتا ہے تب نبض میں یہ خاصیتیں پائی جاتی ہیں *

اول۔ جب شریان کی پچاک زیادہ ہو جاتی ہے تب نبض کو سخت (مارڈ) کہتے ہیں *

دوم۔ جب پچاک کم ہو جاتی ہے تب نبض کو عام (سائنٹ) بولتے ہیں *

سوم۔ جب پچاک بڑی بڑی شریان میں تقسیم ہو جاتی ہے اور ری-ڈیل-آر-ٹری تک نہیں پہنچتی تب نبض کو جر-کنگ یا تھرے-نگ بولتے ہیں *

ت۔ چونکہ گل شریانوں کے پردوں میں عضلاتی ریشے موجود ہیں اور چوٹی شریان میں بھی ہیں اور چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ عضلاتی ریشے بسبب عصبی طاقت کے ہمیشہ سکڑتے اور پیستے رہتے ہیں اس لیے ان شریانوں کے سکڑنے اور پیلنے سے شریانوں کے ضربات

یعنی نبض میں فرق پڑ جاتا ہے ریشہ مذکور حالت صحت میں تنہ ہوئے ہوتے ہیں اور حالت بیماری میں سبب ضعف اعصاب کے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں ۔

ث - خون کے پتیلے یا گھاڑھے ہو جانے سے بھی نبض کی طاقت میں فرق پڑ جاتا ہے مثلاً اس حالت میں جسکو اصطلاح میں آنے - میا کہتے ہیں خون میں ریڈ - کار - پسکل کم ہو جاتے ہیں اور سفید کیسوں کا غلبہ ہوتا ہے اس واسطے خون پتلا پڑ جاتا ہے اور نبض کمزور ۔

نبض کی چال دریافت کرنے کے لئے حال میں ایک آدا ایجاد ہوا ہے جسکو اصطلاح میں اس - فائی - مو - گراف کہتے ہیں - پُرزے اس آلہ کے ایسے پیچیدہ ہیں کہ جب تک آلہ کو اچھی طرح دیکھا نہ جائے تب تک سمجھ میں نہیں آتے اور تاکہ اس آلہ سے نبض کی چال دریافت ہو سکے اسکو اپنے ماتہ سے لگانا چاہئے غرض ایسا واسطے اس آلہ کے لگانے کی ترکیب اور اسکے الگ الگ پُرزوں کا بیان اس موقع پر نہیں کیا گیا ۔ طب کے طالب علم اس آلہ کو مطب میں ہر روز لگایا کرتے ہیں ۔

علاوہ نبض کے جلد کی رنگت سے بھی دوران خون کا حال معلوم ہو سکتا ہے چنانچہ جب جلد کی رگوں میں دوران تیز ہوتا ہے تب جلد سرخ نظر آتی ہے جیسے اشتہا صحر موی نریج میں ہوا کرتا ہے اور جب رگوں میں خون کم ہوتا ہے تو جلد پہلکی پڑ جاتی ہے جیسے آنے - میا کی حالت میں جلد ہوا کرتی ہے اور جب جگر خون کے کل منفرا کو علیحدہ نہیں کر سکتا ہے کی قدر منفر باقی رہ جاتا ہے تب جلد کی رنگت زرد ہو جاتی ہے اور نہایت ضعف کی حالت میں جیسے اسکر - وی اور سی - مے - ٹنٹ اور ڈٹائی نفس فیور کی حالت رومی میں ایسا ہوتا ہے کہ جلد کی باریک رگیں پھٹ جاتی ہیں اور ان سے خون نکالکر جلد کے نیچے جمع ہو جاتا ہے ۔ جب اجتماع خون کا زیادہ ہوتا ہے تب اسکو اصطلاح میں اسکر - وی - سی - ٹنٹ

کہتے ہیں اور جب استعد رکم کہ جس سے خون کے چھوٹے چھوٹے اور گول گول دھڑوں
یا چتیاں جلد پر پیدا ہو جاتے ہیں تب انکو پے - ٹے - کی کہتے ہیں *

فقہ ۲-۵ - وینس لعینہ وریدین - وریدون کی پہیلی اور پہولی ہوئی حالت

کے ملاحظہ کرنے سے ہی امراض کی تشخیص کو بہت مدد ملتی ہے مثلاً اگر قلب کے
مقام پر کان لگا کر سننے سے اُسکے کیواڑوں کی بسیار ثبات ہو جاوے لیکن
یہ اگر ثابت نہ ہو کہ خاص کر کونسے کیواڑ میں بیماری ہے تو دل کی ہر ایک حرکت
کے ساتھ جو گلو - لر - دینوں کے ٹرنے سے یہ ثابت ہوگا کہ ٹرائی - کنس - پڈ

کیواڑ میں بیماری ہے یعنی وہ کیواڑ چونکہ اچھے طور پر بند نہیں ہو سکتے اسلئے
کسی قدر خون دھنسنے دن - ٹری - کل سے دھنسنے آمدی - کل میں لوٹ جاتا ہے اور

جب اُن وینوں کی ٹرپ بہت زیادہ ہوتی ہے تب اس سے یہ ثابت ہوتا
ہے کہ دنیا دن - ٹری - کل موٹا ہو گیا ہے * بعض دفعہ لیکن شاذ و نادر ایسا بھی
ہوتا ہے کہ قلب کی حرکت کا دھکا کے - پے - لے - ریز یعنی عروق شعیریہ سے گزر کر

وریدون کو پہونچتا ہے جس سے انہیں شریان مثل نبض کے پیدا ہوتے ہیں اور


کو اصطلاح میں دسی - لنس پلس بولتے ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ قلب بے تحاشہ ٹرپ رہا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے

کہ جب کوئی ورید کسی شریان کے اوپر ہوتی ہے تو اس شریان کی حرکت

اُس ورید میں بھی حرکت پیدا کر دیتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا خود وہ

ورید حرکت کر رہی ہے - پس اس قسم کی ورید کی ٹرپ کو اصل دی - لنس پلس

سے جھکا ذکر اور پر کیا گیا ہے ذوق کرنا ضرور چاہئے *



مقالہ سوم

آلاتِ تنفس

فقہہ ۱۔ حرکاتِ تنفس۔ تنفس یعنی ہوا کے لئے تنفس کی حرکتوں کا شمار کرنا بھی ضروریات سے ہے یہ ترکیب اسکی یہ ہے کہ بیمار کو چت لٹا کر اپنے ماتھ کو اُسکے شکم پر رکھ دیں اور اُس سے گفتگو کریں تاکہ اُسکی توجہ شکم پر نہ جا پڑے کہ جس سے دم کی حرکتوں میں فرق پڑ جاتا ہے لیکن تنفس کی حرکتوں کو کان سے سنکر شمار کرتا بہتر ہے۔

تعداد حرکاتِ تنفس

جیسے تنفس کی حرکتوں میں کئی باتوں سے فرق پڑ جاتا ہے اسی طور پر تنفس کے حرکات میں بھی چند بواعث سے فرق آ جاتا ہے لیکن اے الموم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منٹ کے عرصہ میں آدمی ۱۵ دفعہ دم لیتا ہو یعنی تنفس کی چار ضربان کے عرصہ میں قریب ایک دفعہ لیا جاتا ہے لیکن جسے تنفس میں ویسے تنفس کی حرکتوں میں بھی ان باتوں سے فرق پڑ جاتا ہے جیسے عمر سے عورت اور مرد کے ہونے سے۔ جسم کس موقع پر ہے اس بات سے۔ شب و روز کے مختلف وقتوں سے۔ ورزش سے۔ ورزش کرنے سے۔ نیند کی حالت سے۔ چنانچہ

عمر اور عورت اور مرد کا ہونا۔ اس امر کا تجربہ جو مختلف عمر کی عورت اور مرد میں کیا گیا تو یہ نتیجہ حاصل ہوا +

عمر	مرد	عورت
پیدائش کے وقت	۱۷ سے ۲۳	۶۸ سے ۳۷
۵ سال	۳۳	۱۱
۲۰ سال ۱۵	۲۴ سے ۱۶	۱۶
۳۵ ۲۰ ..	۲۴ سے ۱۳	۱۷
۴۰ ۲۵ ..	۲۱ سے ۱۵	۱۱
۵۰ ۳۰ ..	۲۳ سے ۱۱	۱۶

جسم کے مختلف موقعے۔ تخریباتِ وضع سے یہ بات پائی گئی ہے کہ
جب نبض ۶۴ دفعہ چلتی ہے اس وقت کھڑے ہونے کے موقع میں ۴۴ دفعہ لیٹا
جاتا ہے اور بیٹھے رہنے کے موقع میں ۱۹ دفعہ اور لیٹے رہنے کے موقع میں ۱۱ دفعہ
پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ جسم کے مختلف موقعوں میں نبض کی چال کا جو فرق
بیان کیا گیا ہے وہ نبض کے باب میں راست نہیں آتا وہ قاعدہ یہ تھا کہ کھڑے او
بیٹھے رہنے کے موقع کی نبض میں زیادہ تفریق ہے نسبت کھڑے اور لیٹے رہنے کے
موقع کے (دیکھو مضمون نبض کو) *

دن کے مختلف اوقات میں۔ اس میں بھی نبض کی ضربان کا قاعدہ حرکت بہ نفس کے قاعدہ کے جیسا کہ پہلے کیونکہ جو نبض جو دن زیادہ چڑھتا جاتا ہے وہ بڑھتی جاتی ہے مگر نفس جلد جلد لیا جاتا ہے۔ نبض کی تعداد چار ہے کتنی ہو، ہر دم شام کی وقت ۱۸ دفعہ لیا جاتا ہے اور صبح کو ۱۰ بار۔

خواب۔ جاگنے کی حالت میں تنفس جلد جلد لیا جاتا ہے نسبت سوسٹھ کے
چنانچہ کسی عورت کا ذکر ہے کہ اُس کے تنفس کی حرکت جاگنے کی حالت میں ۲۴ ہوتی

اور سونے کی حالت میں ۲۱۔ علامہ ان سبب کے جنکا ذکر اوپر کیا گیا ہو حرکات تنفس پر ایسے سببوں کا ہی اثر پیدا ہو جاتا ہے جو حالت صحت میں نبض کی سرعت پر موثر ہوتے ہیں مثلاً دسے اسباب جن سے نبض بے حرک اور دوران خون تیز ہو جاتا ہے تنفس کی حرکتوں کو بھی زیادہ کر دیتی ہیں اور جسے جن سے نبض بے حرک اور دوران خون کمزور ہو جاتا ہے حرکات تنفس کو بھی گھٹا دیتے ہیں چنانچہ ورزش کرنے سے تنفس کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور سکوت سے گھٹتی ہے اور نبض اور تنفس دونوں کا یہ حال ہے کہ گرمی سے بڑھتے اور سردی سے گھٹتے ہیں مگر حالت کمزوری میں اس قاعدہ کا خلاف وقوع میں آتا ہے کیونکہ جب بلا بیماری کے آدمی کمزور ہو جاتا ہے بشرطیکہ وہ کمزوری غایت درجہ کی نہ ہو تب نبض تو بے حرکات تنفس پر درجہ کمزوری میں زیادہ ہو جاتے ہیں *۔

فقہہ ۲۔ دم لینے کی تیز آواز تندرستی میں آدمی ایسی آسانی سے دم لیتا ہے کہ کوئی ہی آواز نہ نہیں پیدا ہوتی مگر بعض بیماری میں دم کشی کے ساتھ خاص آواز پیدا ہوتی ہے مثلاً ہو۔ پٹنگ۔ کافی یعنی کوکر کہانسی میں نوبت کی قوت بچہ کہانستے کہانستے بے دم ہو جاتا ہے اور جب دم زور سے کہینچتا ہے تو ایک ایسی تیز آواز پیدا ہوتی ہے کہ جو مشہور ہے اور مرض کمزور میں دم لینے کی آواز مرغ کے بانگ کے طور پر ہوتی ہے اور دم کی بیماری میں مرغی جب دم کہینچتا ہے تو اس سے ایک سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے اور چونکہ خواب میں تا لوکا طاعن حصہ (سائٹ - پالٹ) بے حرکت رہتا ہے اور مرض - پو - پگسی (سکتہ) میں مفلج ہو جاتا ہے تو سانس کے ساتھ خواٹے کی آواز نکلتی ہے جسکو اصطلاح میں اسٹرنٹو - رس - بری - زنگ بولتے ہیں اور آہ کرنے اور جمائی لینے کے وقت بھی دم زور سے لیا جاتا ہے - یہ دونوں حرکتیں اکثر اسطور پر پیدا ہوتی ہیں

ہو جادوے یا یہ ایک علامت زکام اور مے۔ زلس کی ہے ۔

دوم کہانسی۔ چھینکوں کے ذریعہ جطو پر ناک صاف ہوتی ہے اسبطو کہانسی کے وسیلہ سے ہوا کی نالیان صاف ہوتی ہیں جو شے کہانسی کے ذریعہ باہر نکلتی ہے اسکو اصطلاح میں اس۔ پیو۔ مانعے بلغم بولتے ہیں ۔

کہانسی کئی قسم کی ہوتی ہے چنانچہ خشک کہانسی ہو جو جسمین بلغم نہیں آتا اور تر کہانسی ہو جو جسمین بلغم آتا ہے شگما جب نیو۔ مو۔ گٹرک نرو کے پھپھرون کی شاخوں میں کسی قسم کی خراش ہوتی ہے یا جب ہوا کی نالی کا کوئی حصہ کسی سولی یا کسی ذرے کے غیر طبعی ابھار سے دب جاتا ہو تب کہانسی خشک آنے لگتی ہے اور بعض دفعہ ا۔ یار۔ ٹا کے اینو۔ ریزم میں عرصہ تک خشک کہانسی آتی رہتی ہے اور ہوا کی نالیوں کے ابتدائی درجہ انفلامیشن میں کہ جب خون کی رگیں پڑ رہتی ہیں شگما کٹا زکام اور ارن۔ فلو۔ ارن۔ زار قسم زکام اور کروپ کی بیماری میں کہانسی خشک ہوتی ہے علاوہ ان میں بدھنمی کی بیماری میں اور جب شہت سے قبض ہو جاتا ہے اور امعا میں جب کرم ہوتے ہیں تب بھی خشک کہانسی آتی ہے اور پس۔ ٹے۔ ریا کی بیماری میں بھی بلند خشک اور کٹے کٹے ہوئے نختے کے طور کی کہانسی آتی ہے سئل کی بیماری کے شروع میں صعلو بستر خواب سے اُٹھتے ہی یا عرصہ بعد خشک یا کسیدہ تر کہانسی آتی رہتی ہے ۔ اور زمار۔ سسٹینے حلق میں جب انفلامیشن ہوتا ہے اور اس باعث لوزتین جب بڑھ جاتی ہیں اور کوتا لنگ پڑتا ہے تب بھی خشک کہانسی آیا کرتی ہے اور لا۔ رنگس (جھڑہ) اور ٹرے۔ کیا (جھڑہ کے نیچے کا حصہ) میں جب انفلامیشن یا زخم پڑ جاتا ہے تب نہایت تکلیف دہندہ خشک یا کسیدہ تر کہانسی آتی ہے اور جب جھڑہ کے اوپر کے حصہ میں کوئی بیماری ہوتی ہے تب علاوہ خشک کہانسی کے آواز بھی بیٹھ جاتی ہے ۔ اگر کہانسی خشک اور تھوڑی ہو اور ساتھ اُس کے پسلی بیٹھتا

دور تب یہ ایک علامت مریضات الجنب کی ہوتی ہے۔ جب خشک کہانسی
نوبت بنوبت آتی ہے تب اسکو اصطلاح میں اسپاز۔ موڈوک کافی کہتے
ہیں۔ یہ بات اکثر جگر یا ڈا۔ یا۔ فرام کے کسی عضو متصل کے انفلامیشن میں یا صفرا
کے ٹرک جانے میں پائی جاتی ہے لیکن خشک کی بنسبت تر کہانسی زیادہ تر ہوتی ہے
چنانچہ سینے کے اکثر امراض میں کہانسی کے ساتھ بلغم آیا کرتا ہے۔

فقہہ - ۴ - بلغم یعنی اس۔ پیو۔ ٹا۔ اگرچہ یہ بات درست ہو کہ کہانسی
کے ذریعہ جو شے شش سے باہر آتی ہے اس کے اچھے طور پر ملاحظہ کرنے سے
بہت سی امراض سینہ کی تشخیص کامل ہو جاتی ہے لیکن یاد رہے کہ کہانسی کے
ذریعہ جو شے خارج ہوتی ہے وہ صرف بلغم ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ لعاب
دھن اور گلو اور رطوبات بنی اور بعضہ نفعہ معدہ کی رطوبتیں اور جو چیز اس عضو میں
موجود ہوتی ہے وہ بھی ملی ہوئی ہوتی ہے پس صرف بیمار کے بیان سے ہم یہ
نہیں معلوم کر سکتے کہ جس طوبت کا ذکر کرتا ہے وہ کسی خاص مقام کی ہو مثلاً جب
وہ رطوبت خون آمیز یا نرا خون ہی ہو تو صرف بیمار کے بیان سے یہ نہیں کہا جاسکتا
کہ وہ خون شش ہی کا ہے یا بذریعہ قے کے معدہ ہی سے آیا ہے اور جب
مقدار خون کی بہت کم ہوتی ہے تب بھی یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ
خون شش یا حلق کا ہے اور بچے تو اکثر اپنے بلغم کو نگل ہی جایا کرتے ہیں
جب ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ بلغم شش ہی کا ہے تب اسکی مقدار کا ملاحظہ
کرنا چاہیئے اور یہ کہ اسقدر بلغم کتنے عرصہ میں خارج ہوا ہوگا اور وہ کس قسم کا
ہے مگر اکثر یہی قاعدہ ہے کہ جب تھوڑی سی کہانسی کے ہمراہ بلغم آسانی سے
زیادہ مقدار میں آتا ہے تو اسکو ایک نیک علامت کہتے ہیں یعنی اس معنی پر
یہ علامت نیک ہو کہ اسوقت تک بیمار کی حالت اچھی ہوتی ہے اور اس قسم کا

بلغم زکام کے درجہ اخیر میں سل کے درجہ دوم اور سوم میں اور ہو۔ پنگ۔ کاف لینے
 کو کہ کہانسی میں آتا ہے۔ جو برعکس کی سیکے شش کے کل امراض شدید کے ابتدا میں بلغم طیل آتا
 ہے۔ جب قلت سے بلغم کی کثرت ہو جاوے تو اسکو ایک علامت نیک سمجھنا چاہئے
 اور جو صحت میں بلغم کثرت سے آتا ہو اور پر کم آنے لگے تو اس سے یہ معلوم کرنا چاہئے کہ
 بیماری نے پھر شدت پکڑا ہے اور جب تھوڑا تھوڑا بلغم تکلیف سے آتا ہو اور اسپین
 خون کی دھاریاں بھی ہوں تب اس سے یہ سمجھنا چاہئے کہ شش میں یا تو بہت سا خون
 جمع ہے یا انفامیشن کا زور و شور ہے اور جب ایک ہی مرتبہ کی کہانسی سے بہت سا
 بلغم خارج ہو جاوے تب یہ معلوم کرنا چاہئے کہ یا تو وہ بلغم شش کے کسی غار میں یا اسکے
 قُرب کے کسی اندر عضو جس میں تھا اور پیپڑ سے کے وسیع حصہ میں۔ کس جہز میں سے وہ بلغم
 آتا ہے۔ بلغم کی خاصیتوں کے دریافت کرنے سے ہی بیماری کی تشخیص کو بہت مدد
 ملتی ہے چنانچہ کٹار (زکام) برا نکٹائی۔ ٹیس اور نیو مو۔ نیا (ذات الریہ) کی بیماری ہیز
 بلغم کہی گاڑا اور کبھی پتلا آتا ہے اور بعض دفعہ سل کے ابتدا میں بلغم پتلا مثل پانی کے
 آتا ہے اور شش کی بیماری کے خشک درجہ کے بعد جب طوبت آنے لگتی ہے تو
 بلغم لیسڈر کی مقدار میں آتا ہے اور اسپین ہو رہے یا سیاہ رنگ کے دغ اور ہوا
 کے بلبے ہوتے ہیں اور جو بلغم مرض نیو۔ مو۔ نیا کے پہلے درجہ میں آتا ہے وہ لیسڈر تار
 کے طور پر زردی یا نل یا رنگ کے رنگ کا ہوتا ہے اس بلغم کو مصطلح میں رس۔ ٹے
 اس۔ پیو۔ ٹم بولتے ہیں اور شدت کی کہانسی میں اور بعض وقت سل کی بیماری میں بلغم
 میں خون کے نقطو یا دھاریاں ہوتی ہیں اور زکام یا برا نکٹائی۔ ٹیس کی بیماری کے بڑے
 جانے سے اور سل کی بیماری میں ہی بلغم سپ۔ امینز آتا ہے اور جب سل کی بیماری
 میں شش کے اندر کا کوئی غار پھٹ جاتا ہے اور پلور کی تھیلی کی سپ یا جگر کا دوسر
 شش کے اندر پھوٹ جاتا ہے تب بلغم میں نری سپ بھی ہوتی ہے لیکن جگر کے

نبیل کی سپ پین بہت صفر اعلیٰ ہوتا ہے +

بعض دفعہ بلغم میں تہایت بدبو ہوتی ہے چنانچہ یہ بات اسوقت ہوتی ہے کہ جب بلغم ایک ہی جگہ میں جمع ہو کر متعفن ہو جاتا ہے یا جب وہ بلغم گنگرین آفندی - لنگس کی بیماری میں آتا ہے +

فقہہ ۵۔ خون تہو کما۔ ایسا اکثر کم ہوتا ہے کہ سل کی بیماری میں مریض خون ہین تہو کما اس واسطے خون تہو کمنے سے سل کی بیماری کا گمان اکثر ہوتا ہے لیکن علامہ اس مرض کے بعض دفعہ مرض نیو - مو - نیا اور برانکائی - ٹس اور دمہ کی بیماری میں بھی تہوک کے ہمراہ کیفہ رخون آسکتا ہے اور جب برانکیئل - ٹیوب کے اندر پالی - پس کی رسولی ہوتی ہے اور جب اینو - ریزم کی تہی کسی ہوا کی مالی میں پھوٹ جاتی ہے اور بعض دفعہ سل کی بیماری میں بھی ایک سخت بہت زیادہ خون آسکتا ہے + خون کی رنگت اور اس کے ہمراہ جو کوئی شے ملی ہو اور اس خون کے آنے کا طور ضرور دریافت کرنا چاہئے تاکہ یہ معلوم ہو جاوے کہ وہ خون معدہ یا شش سے آیا ہے - اسکا ذکر آئندہ آئیگا +

فقہہ ۶۔ دریافت کرنا مرد کے اعضائے تناسل کا حال یہی تشخیص مرض کو بہت مدد دیتا ہے مثلاً جب تفسیک سر یا خفہ کے چٹرے میں درد ہوتا ہے اور تفسیب کو بار بار خیرش ہوتی ہے تو ان علامتوں سے مشانہ کے اندر تہری ثابت ہوتی ہے اور جب گردن میں اجتماع خون کا ہوتا ہے یا مشانہ میں خراش یا نائزہ میں انفلامیشن تب بھی تفسیب کو خیرش ہوتی ہے مگر خفہ یا سپاری میں کسی طرح کا درد ہین ہوتا اور سوزاک کی بیماری میں خیرش درد کے ساتھ ہوتی ہے اور تفسیب خم کہا جاتا ہے جس سلامت کو اصطلاح میں کار - ڈی کہتے ہیں اور کن - تہے - سی - ڈس اور روغن تارین جب زہر کی مقدار میں کہا یا جاتا ہے اور ہر قسم کے تیز زہر میں بھی تفسیب کو

خیزش ہوتی ہے اور پہانسی کیسی آؤر قسم کے مرگ ناگہانی مین آؤر پرو۔ سیکٹ آر
کے زہر اور مرج کی نوبت کے وقت بھی مضیب کو خیزش ہوتی ہے *

فقہہ - ۷۔ عورت کے اعضاءے تناسل مین بہت قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں
جنہن سے چند کا ذکر بیان کیا جاتا ہے کیونکہ وہ جسم کی آؤر بیماریوں کی علامتیں ہوتی
ہیں مثلاً جب جسم مین خون کم ہوتا ہے تب عورت کو حیض نہیں آتا اور بعض دفعہ جسم
مین خون کے زیادہ ہونے سے بھی یہ بات ہوتی ہے۔ اور بعض قسم کی دیوانگی مین
بھی یا تو حیض بند یا تکلیف سے آتا ہے اس امر مین زیادہ علم حاصل کرنا ہو تو دیکھو میری
کتاب امراض النساء *

منالہ چہارم

نظام عصبی

نظام عصبی مین تین طور سے خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اول جس مین تغیر واقع ہو سکتا
ہے + دوم عضلات کی حرکت مین فرق پڑ سکتا ہے + سوم عقل و ہوش و احساس مین
خلل واقع ہو سکتا ہے +

فقہہ - ۱۔ درد۔ جب درد کی علامت سے کسی بیماری کو پہچاننا منظور ہو
تو اس کی شدت خاصیت جگہ و آؤر مدت کا لحاظ کرنا چاہئے مثلاً زمین ان باتوں کو بھی دیکھنا چاہئے کہ وہ درد
قائم رہتا یا کبھی رفع بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ اس درد کے کوئی اور بھی علامت موجود
ہے یا نہیں + جب درد کی شدت دریافت کرنا چاہیں تو یہ بات ضرور یاد رکھیں
کہ ہر ایک بیمار اپنے درد کو مختلف طور پر بیان کرتا ہے دوا سکی یہ ہے کہ کیسے جسم میں
حس زیادہ اور کسی مین کم ہوتا ہے اور کوئی بڑے حوصلہ کے ہوتے ہیں اور کوئی
بزدلے اور کوئی راست گو اور کوئی غریبی +

دروجب کم ہوتا ہے تو بیمار اسکو خفیف یا مدہم یا قابل برداشت کہتے ہیں اور جب
 زیادہ تو اسکو دروشدید یا نہایت سخت در د کہتے ہیں ۔ در د کی شدت کے باب
 میں یہ بات قابل یاد رکھنے کے ہے کہ نہایت شدت کا در د بھی کسی ایسی ادنی بیماری
 سے پیدا ہو سکتا ہے کہ جو بالکل خطرہ جان نہیں ہوتی برعکس اس کے خفیف در د اکثر
 کسی مہلک بیماری میں پیدا ہو سکتا ہے علاوہ ازیں یہ بھی بات قابل یاد ہے
 کہ ہنس - ٹے - ریا کی بیماری میں مریض اپنے در د کو مبالغہ سے بیان کرتی ہے اور تب
 رومی میں چپاتی ہے ۔ خاصیت در د کی مثل شدت کے ہر تیسری قسم کی ہو سکتی ہے ۔
 اور سخی خاصیت سے در د کی جگہ اور اصل سبب معلوم ہو سکتا ہے چنانچہ سبب - امی - کیوٹ
 انفلامیشن اور ملایم اور پھلنے والے حصوں کے اکیوٹ انفلامیشن میں بھی بعض دفعہ میٹھا
 در د ہوتا رہتا ہے مثلاً جب جگر میں اجتماع خون کا ہوتا ہے تب ہنی پسلی کے نیچے میٹھا
 در د ہوتا رہتا ہے اور گردن کے اجتماع خون میں کمزور اور جب بخار شدت سے
 آتا ہے تب سر اور پشت اور ہاتھ اور بیرون میں در د ہوتا ہے اور جب یہ میٹھا
 در د کسی قدر شدت کا ہوتا ہے تب اسکو انگور نری میں نا - اینک - پین بولتے
 ہیں یعنی اس قسم کا در د مثل چبانے کے محسوس ہوتا ہے اور مرض پے - رین ٹائیڈ
 اور رو - ما - ٹینم (جمع مفاصل) اور گاؤٹ (نقرس) کی بیماری میں پیدا ہوتا ہے
 اور شدید انفلامیشن میں سبب گرمی اور کچا وٹ کے در د ساتھ جلن کے معلوم ہوتا
 ہے جبکو انگور نری میں بر - ننگ - پین بولتے ہیں اور جب کوئی وٹیل ایسی جگہ میں
 ہوتا ہے جو بہت پہلے نہیں سکتی تب اس در د کے ساتھ ٹپک ہوتی ہے ۔ اس در د
 کو انگور نری میں تہرا - پنگ - پین بولتے ہیں ۔ اور امحاکے در د کو انگور نری میں
 اکثر گراے - پنگ بولتے ہیں یعنی چپش اور کن - سرینے سرطان کی بیماری - اور
 نیو - رلجیا یعنی پٹھوں کے در د میں ٹیسین پڑتی ہیں جس در د کو انگور نری میں

شو۔ ٹیگ۔ پین بولتے ہیں *

درد کی جگہ۔ یہ بھی دریافت کرنا پڑ ضرور ہے کہ درد کون سے مقام پر ہوتا ہے
مثلاً درد یا تو خاص عضو ماؤف پر ہو سکتا ہے یا کسی ایسے مقام پر ہو سکتا ہے کہ
جس جگہ کا درد (عصب) بہما عضو سے تعلق رکھتا ہے مثلاً جب بیماری کو ہلے کے
جوڑ میں ہوتی ہے تب گھنٹوں میں شرکت کا درد ہونے لگتا ہے اور سنگ مثلاً نہ
میں قصب کے سرور اور عورت کے نائزہ کے سورخ پر درد ہوتا ہے اور گردن کے
انفلیمیشن میں اور مجری بول میں جب پتھری یا ریت پھس جاتی ہے تب چٹون انوز
اور خضیون میں درد ہونے لگتا ہے اور رحم کی بیماری میں کمر پر اور قصبیت میں انوز
کے پیچھے اور جگر کے انفلیمیشن میں دہنے کندھے پر اور قلب کی بیماری میں بائیں
شانہ یا ساعد تک درد پہنچاتا ہے *

مرض لیو۔ کو۔ بریا یا کسی اور باعث سے جب عورت کمزور ہو جاتی ہے تو بائیں
پسلی میں درد ہونے لگتا ہے اور جب اسپائی۔ مل۔ کا رڈ یعنی نخاع میں خفیف درد
ہوتا ہے تب سینا اور شکم کے عضلون میں درد پیدا ہوتا ہے اور جب کبھی کسی نزدیکی
جڑ میں کسی قسم کی خراش ہوتی ہے تب جہاں جہاں اُس نزدیکی شاخیں پہنچتی ہوتی
ہیں اُن سب میں درد پیدا ہوتا ہے۔ ان دردوں کو اصطلاح میں سم۔ پے۔ تھوٹیک۔ پیز
یعنی درد شرکی بولتے ہیں *

درد کی حد۔ اکثر یہ قاعدہ ہو کہ جب درد کسی خاص ہی جگہ پر محدود ہوتا ہے
تو اس سے شدید بیماری کا احتمال ہوتا ہے نسبت اُس درد کے جو زیادہ دور تک پہنچا
ہوا ہو تا ہے چنانچہ جیب درد۔ مار۔ ٹیرم کا درد صرف عضلون ہی میں ہوتا ہے یا جب درد
پس۔ ٹے۔ ریا کم بیمار کو ہوتا ہے تب دور تک پہنچتا ہے لیکن ساتھ اُسکے
یہ بھی یاد رہے کہ صرف ٹھونکا درد بھی اکثر اوقات ایک ہی جگہ پر محدود رہ سکتا ہے

شکلاً ابرو یا کسی ایک عضو پر یا حصے یا پستان پر *

مدت درد کی۔ درد کی مدت کو جب خاص مکہ صحت کی حالت سے متبادل کرتے ہیں تو اس سے بہت سی فائدہ مند باتیں حاصل ہوتی ہیں مثلاً جب درد عرصہ دراز تک ہوتا رہتا ہے اور اس کے ہونے سے بیمار کی صحت میں جملہ نہیں پڑتا تو اس درد کو عصبی قیاس کرنا چاہئے اور اگر اس قسم کا درد عورت کو ہو تو ساتھ اس کے اکثر اذیتمات مرض ہیں۔ ٹے۔ ریا کی بھی پائی جاتی ہیں اور یہ تہی عہدہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب کوئی سخت بیماری کسی خاص مقام پر محدود رہتی ہے تب اس جگہ درد اکثر برابر ہوتا رہتا ہے مگر کبھی زیادہ اور کبھی کم بھی ہو جاتا ہے اور دوا سے اس کو تخفیف بھی ہو جاسکتی ہے اور یہ کہ تخفیف امراض کا درد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے اور درد شقیقہ یعنی ہے۔ مے۔ کرے۔ نیامین درد نوبت نوبت ہوتا رہتا ہے اور درد کے ساتھ یہ باتیں بھی پائی جاتی ہیں کہ انفلمیشن کے درد کو دبانے سے شدت ہوتی ہے اور گوشت کے درد کو حرکت یا انگلیوں سے ٹھونکنے سے زیادتی ہوتی ہے برعکس اسکے عصبی اور تہنجی دردوں کو مثلاً درد تھوچ کو دبانے سے تخفیف ہوتی ہے عصبی اور رد۔ ما۔ ٹیزم اور گاؤٹ کے درد میں صحت کے اندر چندان فرق نہیں پڑتا مگر ماسوائے ان کے اور تہنجی قسم کے درد ہیں کثرون میں بیمار کی صحت میں مشرق آجاتا ہے *

فقہہ ۲۔ دوم کم ہو جانا حس کا۔ اعضا سے جو اس قسم کا حس کم ہو جاسکتا ہے مثلاً لمس کی نسبت یہ بات ہو سکتی ہے کہ کوئی حصہ جسم کا حس ہو جاسکتا ہے جیسے سروی کے لگنے اور کسی مقام کے پٹھوں کے دب جانے سے جب کوئی مقام عرصہ دراز تک سن رہتا ہے تو یہ بات اس جگہ کے پٹے کے دب جانے یا اسکے کسی مرض کے سبب ہوتی ہے اور جب کسی مقام کا حس بالکل جاتا رہتا ہے تو اس صورت میں

مقام مذکور کا عصب یا تو بالکل دب جاتا یا اس میں یا دماغ یا حوام مغزین کو سخت
بیماری ہوتی ہے۔ جب ہاتھوں ٹانگوں یا سارے جسم کا حس جاتا رہتا ہے تو یہ بات
اُن مقاموں کے عضلات کے مفلوج ہو جانے سے پیدا ہوتی ہے۔

فقہہ ۳۰۔ بصارت میں کمی یا بون سے فز پڑ سکتا ہے مثلاً بد ہضمی اور بخار
کی حالت میں تھوڑے عرصہ کے لئے بینائی میں کمی تغذیرق پڑ جا سکتا ہے مثلاً آنکھوں
کے سامنے کالے یا روشن نقوط نظر آتے ہیں یا چنگاریاں یا نہایت شوخ رنگ جیسے
ڈوبے یا پھانسی کے وقت) دیکھائی دیتے ہیں + اور بصارت صرف دھندلی یا
کاجی رہتی ہے یا مریض ایک چیز کو دو دیکھتا ہے (جیسے حالت نشہ میں) اور بعض
ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کا صرف نصف ہی دیکھائی دیتا ہے اور جب آنکھوں یا
دماغ میں انفلامیشن ہوتا ہے تب بیمار کو روشنی کی برداشت نہیں ہوتی۔ یہ بات
سبب زیادہ خون کے نگہانے اور کمزور بیاریوں میں بھی پائی جاتی ہے اور جب
خاص آپٹک نرو یا دماغ کے اس حصہ میں بیماری ہوتی ہے کہ جہان سے رو
مذکور نکلتا ہے تب بصارت بالکل جانی رہتی ہے جب خون بہت نگہاتا ہے یا
عورت عرصہ دراز تک بچہ کو دودھ پلاتی ہے یا جب جسم کی کوئی رطوبت زیادہ خارج
ہونی رہتی ہے اور جب حالت غشی طاری ہوئی ہو تو یہ ہے تب اکثر یا تو بصارت
تھوڑے عرصہ کے لئے دھندلی یا بالکل جاتی رہتی ہے + جب مریض تھوڑے عرصہ
کے لئے احوال ہو جاتا ہے تو اکثر اس سے دماغ کی بیماری ثابت ہوتی ہے یہ ایک
علامت غیر محدود ہے چنانچہ جب بچوں کے دماغ میں کوئی بیماری ہوتی ہے
اور شج ہونے لگتا ہے تب یہ علامت اکثر پیدا ہو جاتی ہے اور جس کیلئے بچپن
میں کوئی بیماری دماغ کی ہو جاتی ہے وہ شخص ساری عمر احوال رہتا ہے +
آنکھوں کے حد کے ملاحظہ سے ہی بیماری کی تشخیص کو بڑی مدد ملتی ہے

چنانچہ یہ قاعدہ اکثر یہ ہے کہ جب دماغ میں کسی قسم کی خراش ہونی ہے خواہ وہ نفاذ کے باعث یا کسی اور سبب سے ہو تب پتلیاں سُکڑی رہتی ہیں اور انسیون اور کے - لے - بار بین کے زہر میں بھی پتلیاں آنکھوں کی بہت سُکڑی رہتی ہیں اور جب دماغ میں باخراش کے اجتماع خون کا ہوتا ہے اسوقت پتلیاں پہیلیاں ہوتی ہیں اور یہی حالت پتلیوں کی ٹائیڈرو - کنفلش (دماغ میں پانی بہہ جانا) اور گلی اور بعض دفعہ - پو - پکسی کی بیماری میں اور قبضیت اور شکم کے کرم کی بیماری میں بھی ہو جایا کرتی ہے علاوہ ان میں بلا - ڈو - نا اور ٹائیڈو - سسٹس اور دہتور سے کے زہر وغیرہ بھی آنکھوں کا حد تو پہیلیاں ہوتا ہے اور حد قح کے انقباض اور انقباض سے آنکھ کے پردہ رے - ٹے - نا کا حال دریافت ہو سکتا ہے مثلاً روشنی کے بگنے سے اگر پتلی سُکڑ جاوے تو یہ سمجھنا چاہئے کہ پردہ مذکور میں حس موجود ہی اور جو روشنی کا اثر پتلیوں پر کچھ بھی نہ ہو تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پردہ رے - ٹے - نا مفلج ہو گیا ہے اور آنکھوں میں جب کوئی بیماری نہ ہو اور ایک پتلی سُکڑی اور دوسری پہیلی ہو تو اس سے دماغ کی بیماری کا احتمال ہوتا ہے اور آنکھ کے ڈھیلے کو انگلیوں سے چھونے سے اگر بیمار کو کچھ معلوم نہ ہو تو اس سے یہ سمجھنا چاہئے کہ سارے جسم کے اعضا کا حس زائل ہو گیا ہے مثلاً کلو - رافارم کے سونگھنے سے اور صرع کی آنکھوں کا یہی حال ہوتا ہے لیکن جب کوئی شخص مرگی کی بیماری کا فریب کرنا ہے تب آنکھوں کو چھوتے ہی وہ بند ہو جاتی ہیں اور یاد رہے کہ جس شخص کو حلق کی عادت ہوتی ہے اسکی آنکھوں کی پتلیاں اکثر پہیلی ہوتی ہوتی ہیں +

فقہ - ۴ - شنوائی - شنوائی میں اسطور پر فرق آجاتا ہے کہ بعض دفعہ کانون میں شن شن کی آواز سنائی دیتی ہے یا باجا بجا سا معلوم ہوتا ہے یا گاڑی

چلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے + بعض دفعہ تو یہ باتیں ایسے خفیف سبب سے پیدا ہوتی ہیں کہ ان سے کچھ اندیشہ پیدا نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ دماغ کی حادثات یا مریض بیمار یوں میں یہ آواز سنائی دیتی ہے اور جب دماغ میں شدید انقلابات ہوتا ہے اس وقت بیمار کو آواز نہایت بُری معلوم ہوتی ہے اور جب دماغ میں خون کم ہوتا ہے اور ہنس - ٹپے - ریاکی بیماری میں بھی بعض اوقات مریض کو آواز سے تکلیف ہوتی ہے اور بخار کی بیماریوں میں اکثر کان بند ہو جاتے ہیں اس وقت اس کو ایک نیک علت سمجھنا چاہئے +

فقہہ - ۵ - قوتِ شامہ - مثل قوتِ سامعہ اور باصرہ کے اس قوت میں بھی فرق پڑتا ہے مگر یہ فرق چند ان بیماریوں میں ہے + قوتِ ذالہ کا ذکر باب سوم کے اول مقالہ کے دسویں فقرہ میں کیا گیا ہے +

فقہہ - ۶ - فرق عضلات کی حرکت میں - جسم کے کُل عضلات میں تین طرح کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے یا تو وہ مفلوج ہو جاسکتے ہیں یا انہیں تشنج پیدا ہو سکتا ہے یا عضلات مذکور کچکرائیںٹے رہتے ہیں +

فقہہ - ۷ - فالج کی قسم کا ہوتا ہے چنانچہ بعض وقت صرف ایک ہی جانب کا جسم مفلوج ہوتا ہے اور کبھی جسمِ اُفعل میں فالج ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک جانب چہرہ کی مفلوج ہو جاتی ہے اور کبھی کسی خاص مقام کی جس حرکت میں فرق پڑ جاتا ہے اس کا ذکر عصبی بیماریوں کے باب میں مفصل آئیگا +

فقہہ - ۸ - عضلات کا تشنج - بعض دفعہ بخار کی بیماری میں مریض کے ماتھوںز کی انگلیاں خود بخود کانپتی ہیں یا مریض اپنے بسترہ کو انگلیوں سے فوجتا رہتا ہے اور کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مریض جب زبان نکالتا ہے تو وہ کانپنے لگتی ہے - یہ علامتیں نہایت ضعف کی حالت میں پیدا ہوتی ہیں اور ان سے نظامِ عصبی کا ضعف

تجربہ اور مشاہدہ سے حاصل ہو سکتا ہو کتابوں کے پڑھنے سے نہیں، * طبیب اگر اس علم کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہو جس طبیب کو بشرہ شناسی نہیں آتی وہ اپنے فرہین کا مل نہیں کہلا سکتا جو طبیب اپنے فن میں کامل ہوتے ہیں آلات کے ذریعہ امتحان کرنے سے پہلے اپنے بیمار کا چہرہ خوب غور سے دیکھتے بیاتے ہیں۔ اور اکثر اوقات چہرہ کے دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ فانی بیماری میں مریض مبتلا ہے اور نئے بچوں کی بیماری تو اکثر چہرہ ہی کے ملاحظہ سے پہچانی پڑتی ہے کیونکہ وہ اپنا مرض خود آپ بتا نہیں سکتے۔ پس میں ملاحظہ اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ جب کوئی بیمار تمہارے سامنے آوے پہلے اُسکے چہرہ کو خوب غور سے ملاحظہ کرو دماغ کی بیماری دل کی شش کی اور شکم کی اکثر بیماریاں صرف چہرہ کے ملاحظہ سے پہچانی جاسکتی ہیں۔ اور بیمار پہچاننے کے لئے ہزار کوشش کرے آشک کا مرض تو چھپ ہی نہیں سکتا تجربہ کار طبیب مریض کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں اگر تم بچہ کو حضرت وہ کوئی آٹا رہیں جو مختلف بیماریوں میں چہرہ پر پیدا ہوتے ہیں تو اس کے جواب میں میں یہی کہہ لگا کہ مصرع

دل من داند و من داند و دل من *

فہم کو اس قدر طاقت نہیں کہ اُن آثار کے تصویر کاغذ پر کھینچ کر تم کو دکھلا سکے۔ اور زبان ہے ان کے بیان سے عاجز ہے۔ عرصہ دراز کے مشاہدہ سے لوح دل پر وہ تصویر کچ جاتی ہے اور مریض کا چہرہ دیکھتے ہی آنکھوں کے سامنے آکھڑی ہوتی ہے ستم بھی جب اس مریض کو شش کر کے تب عرصہ دراز کے بعد یہ بات حاصل ہوگی۔ ذیل میں چند بیماریوں کے آثار بیان کرتا ہوں ان کی تصویر مشاہدہ تمہارے دل پر کچ جاوے۔ مثلاً دیوانگی کامل میں چہرہ پر

نہایت جوش ظاہر ہوتا ہے اور مایو لیا کے چہرہ پر مایوسی پائی جاتی ہے اور سادہ لوح کا چہرہ ایک عجیب قسم کا بالابو لا ہوتا ہے اور ڈے - لے - ریم ٹرنس کے مریض کے چہرہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کسی بات کا اندیشہ رہتا ہے اور مصرع کا چہرہ ایک نرمالی ہیتم کا ہوتا ہے اور مسل اور مرض ام - فائیسی - ما (نفخ المریم) اور قلب کی ساخت کی بیماری اور مرض ذیابٹوس اور گردن کی بیماریوں کا اثر چہرہ پر ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جبکا بیان نہیں کیا جاسکتا ہے مگر مشاہدہ اور تجربہ سے حاصل ہوتا ہے اور ہنس - لٹے - ریا کے مریض کی صورت کبھی رونی اور کبھی ہستی ہوتی ہے اور باوجودیکہ صد با تون کی ہلکونکایت ہوتی ہے تیسرہ ہی مریض تندرست نظر آتی ہے ۔

مقالہ ششم

بیمار کے جسم کے موٹے

جب بیمار کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور وہ چت پڑا رہتا ہے تب اس سے کمال ضعف ثابت ہوتا ہے اور جب دہنی یا یائین کرڈٹ پریستار ہوتا ہے تب یہ علامت طاقت کی جو پہنچائیت ضعف کجیالت سے جب بیمار کو طاقت آنے لگتی ہے تب بعوض چت کے دہنی یا یائین کرڈٹ پریستار ہوتا ہے ۔ مریض اگر مبیٹھا رہے یا نصف جسم کو ایک لنگا کر سیدھا رکھے تو اس سے تکلیف نفس ثابت ہوتی ہے مثلاً شدید امراض شش اور قلب کی بیماریوں میں یہ بات پائی جاتی ہے ۔ جب بیمار پاؤں کو سمیٹ کر جیت پڑا رہتا ہے تب اس سے شکم کی بیماری ثابت ہوتی ہے ۔

مقالہ سہم

نشوونما میں شریٹ چانا

واضح ہو کہ بدن کی بافت یا اعضا کے نشوونما میں دو قسم کا فرق واقع ہو سکتا ہے یا تو وہ بافت یا اعضا معمولی مقدار سے بڑھ جا سکتے ہیں تب اُس حالت کو اصطلاح میں ڈے - پیر - ٹرو - فی کہتے ہیں اور جب مقدار گھٹ جاتی ہے یعنی وہ لاغر ہو جاتا ہے تب اُس حالت کو اصطلاح میں اٹ - رو - فی بولتے ہیں ۔

اول ڈے - پیر - ٹرو - فی

جب جسم کی کسی بافت یا عضو کی ساخت کے معمولی اجزاء زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں تب اُس کو ڈے - پیر - ٹرو - فی کہتے ہیں ۔ لیکن بافت مذکورہ دو طور سے بڑھ کر موٹی ہو جا سکتی ہے ۔ ایک تو اُس کے اصلی اجزاء کے زیادہ ہو جانے سے ۔ دوسرے اُس میں نئے اجزاء کے پیدا ہو جانے سے ۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جسم کے ہر ایک عضو میں کئی قسم کی یافت ہوتی ہے اور ان میں سے کوئی موٹی ہو جا سکتی ہے جس سے اُس عضو کا فعل یا تو بہتر یا بدتر ہو جا سکتا ہے مثلاً دل میں مسکیو - لر ٹے - ریشیو اور فائی - برس لٹے - ریشیو اور چربی ہو ا کرتی ہے ۔ پس ان میں سے کوئی بھی جب بڑھ جاتی ہے تب بھی یہی کہیں گے کہ ڈے - پیر - ٹرو - فی ا ف و سی ٹارٹ ہو گیا ہے ۔ مگر اکثر ایسا ہو ا کرتا ہے کہ کسی عضو کی وہی ساخت بڑھ جاتی ہے جب اُس عضو کے فعل کی تیزی و تندہی منحصر ہوتی ہے اور اُس سبب سے اُس عضو کا فعل تیز ہو جاتا ہو ۔ مسلسل یہی خاصکہ بڑھ کر موٹے ہو جاتے ہیں ۔

اسباب - ڈے - پیر - ٹرو - فی کا اکثر سبب یہ ہو ا کہ جب کسی عضو کو معمولی سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ برائیاں ہونے پاوین جو اُسکے بغیر واقع ہو سکتی ہیز

تب وہ عضو بڑھ کر موٹا ہو جاتا ہے مثلاً جب کہی جوف لکھی اعضا کے جیسے سودہ یا ول یا مشانہ کے دھانہ مین یا کسی اور مقام مین اس قسم کا سڈک پڑ جاوے جس سے انکے اندر کے اجزا داخل یا خارج ہونے پادین تب اعضا کے مذکور کی ساخت مگر خاص کر مسکیو۔ لرٹے۔ ریشیو بڑھ کر موٹی ہو جاتی ہے لیکن وہ مسکیو۔ لرٹے شیو جبکو اصطلاح مین رن۔ وائرلن۔ ٹے۔ ری۔ مسکیو۔ لرٹے شیو کہتے ہیں اکثر موٹی ہو جاتی ہے جیسے رحم تاکر حمل کا بیج اس سے اُٹھ سکے۔ اور تب خون کا کوئی فضلہ جسکا پیدا ہو کر جیم سے خارج ہو جانا نہایت ضروری امر ہے خون ہی مین رکراہ جاتا ہے تب وہ اعضا جسکا کام اُس فضلہ کو خون سے علیحدہ کر کے خارج کر دینے کا ہے بڑھ جاتے ہیں مثلاً جب گردن مین سے کوئی گڑہ اپنا کام اچھی طرح نہیں کر سکتا ہے تب اسکا کام دوسرے کو کرنا پڑتا ہے جس سے یہ دوسرا گڑہ بڑھ جاتا ہے علیٰ ہذا تعیاس پیٹر ونگا بھی یہی حال ہے کہ جب ایک بیکار ہو جاتا ہے تب اُسکا کام دوسرے کو کرنا پڑتا ہے جس سے وہ دوسرا پیٹر بڑھ جاتا ہے جب کسی عضو کو عرصہ دراز تک معمول سے زیادہ حرکت دیا جاتا ہے تب بھی بڑھ جاتا ہے جیسے زیادہ ورزش کے سبب سے کشتی گیرون کا گوشت بڑھ جاتا ہے عسلادہ ازین جن کسی عضو مین معمول سے زیادہ خون آتا ہے تب بسبب زیادہ غذا پینچنے کے وہ عضو بڑھ جاتا ہے ۔


دوم۔ اٹرو۔ فی

یہ حالت خلاف ہے حالت اول سے۔ پر اٹرو۔ فی کے اٹرو۔ فی مین ایسا ہوتا ہے کہ کسی عضو کے معمولی ساخت کے اجزا یا تو متھار مین گھٹ جاتے ہیں یا تو وہ مین کم ہو جاتے ہیں ۔

اسباب خون کے پردرشی اجزا مین جب فرق پڑ جاتا ہے تب جسم کم و بیش

لاغر ہونے لگتا ہے یا جب خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے جیسے زیادہ خون کے نکل جانے سے یا خون کی مقدار یا خاصیت میں فرق پڑ جانے سے۔ اور ان بیماریوں کے سبب سے بھی لاغری پیدا ہو سکتی ہے جنہیں ماضیہ بگڑ جاتا اور غندہ کا احتمال اچھی طرح ہینے پاتا اور ان مرضوں کے سبب سے ہی بدن لاغر ہو جاتا ہے جنہیں خون کے پریشی اجزاء اہل ہو جاتے ہیں۔ جیسے گردوں کے برا بیٹنس ٹوٹنے اور ٹوا۔ یا۔ بے طیر اور سل میں ہو کر رہے +

جب جسم کے کسی حصہ میں شریانی خون کم پہنچتا ہے تب وہ حصہ ڈبلا ہو جاتا ہے جب کسی عضو یا بافت پر دباؤ پہنچتا ہے تب وہ جانے کے سبب وہ عضو ڈبلا ہو جاتا ہے مثلاً رسولیوں کے ڈبانے سے ہڈیاں و جسم کے دیگر اعضا لاغر ہو جاتے ہیں + بعض دوائیں بھی ایسی ہیں جنکے استعمال سے خاص اعضا یا بدن کی خاص بافت ڈبلی ہو جاتی ہے جیسے سیما یا آئیو۔ ڈائیڈ یا برو۔ مائیڈ اف پوٹاشیم اور کہو دو ایٹر یعنی جب اس قسم کی دوائیں عرصہ دراز تک استعمال میں آتی ہیں تب اٹرو۔ فی پیدا ہو جاتی ہے + اٹرو۔ فی میں یا تو سارا بدن مبتلا ہو جاسکتا ہے یا کوئی خاص عضو میں یہ حالت پیدا ہو جاسکتی ہے۔ پہلے بدن کی چربی جذب ہو جاتی ہے تب گوشت اور بعد ازاں دیگر ساخت میں اٹرو۔ فی ہونے لگتا ہے اخیر میں خون کے اجزاء کم ہونے لگتے ہیں اور اندرونی اعضا میں بھی بات پیدا ہو جاتی ہے + جب کوئی خاص عضو لاغر ہو جاتا ہے تب وزن اُسکا گھٹ جاتا ہے۔ رنگ اُسکا بہ نسبت صحت کے پیکا پڑ جاتا ہے اور اس میں خون کی مقدار بھی کم آتی ہے +



مقالہ ہشتم ڈوی۔ جی۔ نے۔ ریشن

جب کوئی بافت معمولی حالت سے اتر حالت میں بدل جاتی ہے جس سے اپنا معمولی کام نہیں کر سکتی ہے تب اسکو ڈوی۔ جی۔ نے۔ ریشن کہتے ہیں اور ڈوی۔ جی۔ نے۔ ریشن کا افظ اس صورت میں بھی بولا جاتا ہے کہ جب خون سے کوئی نئی شے نکال کر کسی بافت کی معمولی اجزاء میں جمع ہو جاتی ہے جس سے اجزاء کو راکٹر جذب ہو جاتے ہیں اور اجزاء میں اکثر نیست و نابود بھی ہو جاسکتی ہیں + ڈوی۔ جی۔ نے۔ ریشن یعنی اتری کئی قسم کی ہوتے ہیں چنانچہ

اول نے۔ ٹے ڈوی۔ جی۔ نے۔ ریشن
یعنی

چربی میں بدل جانا کسی عضو یا ساخت کا

اس قسم کی اتری دو طور کی ہوتی ہے۔ ایک تو جب کوئی عضو یا بافت بالکل چربی میں بدل جاوے یا دو قسم اس عضو کی ساخت میں چربی کا مادہ پیدا ہو جاوے۔ دوسرے میں جسم کی مختلف بافت کا بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ چربی میں بدل جاتی ہیں چنانچہ مسکیو۔ لمرے۔ شیو۔ اگرچہ ان عضلات کے ریشہ ہی چربی میں بدل جاسکتے ہیں جنکو ہم اپنے ارادہ سے حرکت میں لاسکتے ہیں تاہم اس قسم کی اتری دل کے عضلاتی ریشوں ہی میں اکثر پیدا ہوتی ہے +

خون کی رگیں۔ چون جو ٹکٹکس زیادہ ہوتی جاتی ہے خون کی رگیں چربی میں بدل جانے کے لئے زیادہ تر قابل ہو جاتی ہیں +

عصبی بافت۔ عصبی کیسے اور بافت بھی چربی میں بدل جاسکتے ہیں چنانچہ دماغ

اور نکل جیاری کے سبب سے جب طاعن ہو جاتے ہیں تب ایسا ہی ہوتا ہے کہ عصبی مادہ چربی میں بدل جاتا ہے ۔

اسباب - اس قسم کی ابتری کے ظاہر اسباب یہ معلوم ہوتے ہیں کہ جب اسے جسم یا جسم کے خاص حصہ کی پرورش میں خلل واقع ہوتا ہے تب بافت چربی میں بدل جاتی ہیں اور بڑے پائے میں اکثر بافت صحت کی حالت سے ابتری میں بدل جاتے ہیں جب جسم کے کسی حصہ میں رگوں کے دی جانے یا انکے منفذ کے بند ہو جانے سے خون شیرینی نہیں پہنچ سکتا ہے تب وہ حصہ چربی میں بدل جاسکتا ہے اور ایسی بیماریز میں بھی اس قسم کی ابتری پیدا ہو سکتی ہے جنہیں مریض بہت کمزور ہو جاتا ہے جیسے سکل یا سرطان کی بیماریاں اور فاس - فو - رس یا سیکھیا یا انٹے - منی کا زہر ہو جاتا ہے تب بھی یہ بات ہو سکتی ہے ۔

جب کوئی بافت چربی میں بدل جاتی ہے تب نگہ سکا پھیکا ہو جاتا ہے اور اخیر میں نرم و مائل یا خفیف ہو رہا ہو جاتا ہے اور دبائے سے باسانی چر جاتا ہے اور نرم ہو کر پٹیلی ہو جاتی ہے - نتیجہ جکا یہ ہوتا ہے کہ ساخت عضو کی شق ہو جاتی ہے جیسے دل یا رگوں میں اکثر ہوا کرتا ہے ۔

دوم - دفعہ اول کی ابتری میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اعضا کی بافت بالکل چربی میں بدل جاتی ہیں اس سبب سے انکا یہ حال ہو جاتا ہے کہ ادنیٰ صدمہ سے بافت مذکور چر جاسکتی ہیں یا ٹوٹ جاسکتی ہیں - لیکن اس دفعہ دوم کی ابتری میں ایسا ہوتا ہے کہ خود بافت میں کسی قسم کا تغیر نہیں واقع ہوتا - چربی کا مادہ خون سے نکل کر ان بافتوں کے بیچ بیچ کی جگہ میں ایسا جمع ہو جاتا ہے کہ بافت مذکور اس میں دب جاتی ہیں مگر زائل نہیں ہوتی لیکن کچھ عرصہ بعد اس چربی کے دباؤ کے سبب سے بافت مذکور کی حالت بھی ابتر ہونے لگتی ہے یہاں تک کہ جذب ہو کر نیست و نابود ہو جاتی ہیں - چنانچہ شحم

آدمی میں اور دل میں اور جگر کے کیسوں میں ایسا ہی ہوتا ہے جسکا ذکر اوپر کیا گیا *
 اسباب - جب خون میں بکثرت چربی ہوتی ہے تب آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے
 اور اندرونی اعضا کی بابت کے درمیان بھی بڑی جمع ہو جاتی ہے اور خون میں زیادہ
 اسوقت ہوتی ہے کہ جب آدمی زیادہ روغن یا سرمہ کی غذا کھاتا ہے جس سے چربی
 میں سکے اور عیش عشرت میں رہنا یا خدمت کا نہ کرنا بھی باعث چربی کے زیادہ جمع
 ہو جاتا ہے عسلاہ ازین عادات مذکور بالا سے جسم میں چربی بنتی ہے وہ جسم
 کے کام میں خچ ہنیں ہونے پاتی خون ہی کے اندر جمع ہوتی رہتی ہے *

بعض ایسی بیماریوں میں جیسے آدمی کا بدن لاغر ہو جاتا ہے اعضا میں چربی جمع
 ہو جاتی ہے خاصکر جگر میں مثلاً اس کی بیماری میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ سارا بدن لاغر
 ہو جاتا ہے اور اسکی چربی جذب ہو کر جگر میں جمع ہو جاتی ہے جس سے جگر چربی
 میں بدل جاتا ہے *

جب دم لینے کا کام ابھی سر انجام نہیں پاتا ہے لینے آدمی دم ابھی سر نہیں
 لے سکتا ہے تب جسم کی چربی بھی معمولی طور پر خچ ہونے نہیں پاتی مثلاً بعض شش
 اور دل کی بیماریوں میں ایسا ہی ہوتا ہے *

جب اعضا کی ساخت کے درمیان چربی جمع ہو جاتی ہے تب وہ بڑھ جاتے
 ہیں اور انکی شکل میں بھی سرق پڑ جاتا ہے اور انکے کنارے گول ہو جاتے ہیں
 اور رنگ انکا چربی کے رنگ کا سا سفید ہو جاتا ہے اور ساخت نہایت ملائم
 انگلی سے دبائے یا انکو کاغذ پر رکھ دیجئے تو چربی کا دہتا لگ جاتا ہے *

کیال - کے - ری - آس

ٹومی - جی - نے - ریش

اعضا کی ساخت میں ایک اور قسم کی اتیری ہو جاتی ہے جس میں مٹون کے

درمیان چونہ یا مٹی کے قسم کا مادہ جمع ہو جاتا ہے۔ یہ مادہ ابتدا میں نر و خرو ذرات کی شکل کا ہوتا ہے اور خاکہ کرباقتون کے درمیان مگر بعض دفعہ خود انکے اندر ہی جمع ہو جاتا ہے۔ مادہ مذکور بغیر چربی کی شکل کا ہوتا ہے معدنی تیزابوں کے مانے سے حل ہو جاتا ہے اسوقت جوش کہا کر اس سے کار۔ با۔ نکٹ اسٹڈ کی ہوا کے بلبے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ وہ مادہ از قسم کار۔ بو۔ نٹ کے ہوتا ہے۔ پہلے پہل تو یہ مادہ خون کی چوٹی چوٹی رنگون کے چاروں طرف جمع ہوتا ہے مگر کچھ عرصہ بعد اسقدر بڑھ جاتا ہے کہ اُسکے بڑے بڑے ڈلے بنجاتے ہیں۔ اُس مادہ میں چونا اور گنیشیا کے مرکبات از قسم کار۔ بو۔ نٹ اور فاس۔ فٹ کے ہوتے ہیں۔ یہ مٹی کا مادہ صکر ایسے باقتون میں جمع ہوتا ہے جہیں جان ہنیں ہوتی اور جنہیں پہلے کسی اؤر قسم کے مگر خاکہ چربی کے قسم کی اتری پیدا ہو گئی ہو۔ اس مٹی کے قسم کی اتری میں ٹرائیز اور دل کے کیواڑ اور دل کے دمانے اکثر مبتلا ہوتے ہیں اور انکا نقصان اُنہی کی ساخت میں زیادہ تر نمایاں ہوتا ہے۔ مگر یہ مادہ جسم کی اؤر اور ساخت میں بھی پیدا ہو سکتا ہے *

اسباب۔ جیسا کہ اوپر بتلایا گیا ہے اس قسم کی اتری کی حالت اسوقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ساخت ہیجان ہو جاتی ہے یا اُس میں خون سے پرورش اجزا کے لینے کی طاقت نہیں ہوتی جیسا کہ بڑا پلے میں ہوتا ہے اور جب کسی خاص مقام پر یہ بات ہوتی ہے تب اسلئے ہوتی ہے کہ دمان خون شریانی کافی مقدار میں نہیں پہنچتا یا آہستہ آہستہ دورہ کرتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب باقتون میں اس قسم کی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ جس سے دے اُس خون کو اپنی پرورش کے لئے لے سکیں جہیں کار۔ بو۔ نٹ اور فاس۔ فٹ کے قسم کے نمک حل شدہ ہوتے ہیں تب نمک مذکور کسی عضو میں جمع ہو جاتے ہیں یا ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ

خود وہ نمک خون سے نکل کر جمع ہو جاوے گا مگر جب خون کا دورہ صحت ہو جاتا ہے تب وہ کار۔ با۔ نکٹ اسٹڈ کی ہوا جس میں نمک نہ ہو کر سل کئے ہوئے ہیں خون سے علیحدہ ہونے لگتے ہیں اور اس وقت بھی وہ نمک جمع ہو جاسکتے ہیں کہ جب خون میں بکثرت ہوتے ہیں جیسے کہ۔ ریز اور نکٹ۔ رو۔ سس کی بیماری میں ہو کر ماکہ ہے۔ جس مقام پر وہ اجڑا مٹی یا پتھر کی تسم کے جمع ہوتے ہیں وہ جگہ گہر ورمی و سخت مثل سیٹنگ کے ہو جاتی ہے اور ایسی کر دبانے سے جڈ ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ جب ساخت کی یہ حالت ہو جاتی ہے تب نتیجہ اسکا بہت بُرا ہوتا ہے مثلاً جب شرائین میں اس تسم کی تبری واقع ہوتی ہے تب منفذ انکائیٹنگ ہو جاتا ہے اور نرمی اور لچک انکی جاتی رہتی ہے جس سے باسانی ٹوٹ پھوٹ جاسکتی ہیں تب اس حصہ میں خون کم پہنچتا ہے اور وہ حصہ جسم کا لاغر (اٹرو۔ فی) ہونے لگتا ہے یا حالت کسر کی تہر ہو جاتی ہے یا وہ مردار پڑ جاتا ہے یا اس میں خون جم کر ڈلے بجاتے ہیں جس سے منفذ ان رگوں کا ٹوک جاتا ہے یا رگہما سے مذکور کے ٹوٹ جانے سے خون جاری ہو پڑتا ہے اور جب اس تسم کی تبری ل کے کیو اڑون اور درون میں لاحق ہوتی ہے تب دل کے اندر خون کے آنے جانے میں اور دل کے صحیح افعال کے اچھی طرح انجام پانے میں نہایت مزاحمت ہوتی ہے علاوہ ان تہروں کے جنکا ذکر اوپر کیا گیا ہے جسم کی ساخت کی اور حالتوں میں بدل جاسکتی ہے مثلاً دباؤ یا رگڑ کے سبب سے انکی حالت فانی۔ برس۔ ٹے۔ رشیو میں بدل جاسکتی ہے تب اس کو فانی۔ برائیڈ ڈی۔ جی۔ نے۔ ریش کہتے ہیں اور جب بافت اصلی حالت سے نرم ہو جاتی ہیں یا پگھل جاتی ہیں تب اس حالت کو میو۔ کائیڈ۔ ڈی۔ جی۔ نے۔ ریش بولتے ہیں اور کو۔ لائیڈ۔ ڈی۔ جی۔ نے۔ ریش اس تہر حالت کو کہتے ہیں جس میں ساخت کل کر پیلپل شل فالو وہ کے ہو جاتی ہے۔

مقالہ نہم

چھوت

چھوت کیا چیز ہے۔ اکثر لوگ اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں جس سے اس کا مفصل حال اس موقع پر بیان کیا جاتا ہے *
اصطلاح میں چھوت کو کن - ٹے - جی - ان کہتے ہیں۔ واضح ہو کہ چھوت کی بیماری لینے کن - ٹے - جی - اس ڈیزیز وہ بیماری ہے جو ایک تنفس سے دوسرے کو لگ جاتی ہے چاہے وہ دونو تنفس ایک ہی نوع کے ہوں یا الگ الگ دو نوع کے۔ اور جس شے کی چھوت لگ جاتی ہے اس کو اصطلاح میں کن - ٹے - جی - ان لینے چھوت کہتے ہیں *
چھوت کی اصل کیا ہو کن جالتو غین موتی ہو اور کیونکر پہنچتی ہے

اُن جھگڑوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوت کا زہر ابتداً کیونکر پیدا ہوتا ہے اور یہ کہ وہ از خود پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ شاید متعدد بیماریاں ایسی ہوں کہ جن میں چھوت از خود پیدا ہو جاتی ہے بلکہ اکثر امراض متعدی کا یہ قاعدہ ہے کہ اُنکی چھوت ایک انسان سے دوسرے کو لگ جاتی ہے اور چھ۔ ایسی ہی ہیں کہ جنکی چھوت حیوان سے آدمی کو لگ جاتی ہے جیسے وکٹ - سائے - نا اور ٹائیڈرو - فو - بیا اور گلکان - ڈرس اور ان امراض میں سے بعض بیماریاں ایسی ہی ہیں کہ جنکی چھوت زوہا اسی یا کسی اور حیوان میں پہنچائی جاسکتی ہے مگر اس صورت میں اس چھوت میں تخصیص ات پیدا ہو جاتی ہے * بعض محققین کا ایسا بھی خیال ہے کہ گاہے گاہے چھوت کا زہر نباتات سے بھی حاصل ہو سکتا ہے *
چھوت

چہوت مختلف شکلوں میں ہوتی ہے اور مختلف طریقوں سے لگ جاتی ہے ایک خاص جماعت کی بیماریاں ایسی ہیں جو جسم چسبائی یا نباتی مادہ کے پیدا ہونے سے ظاہر ہوتی ہیں جیسے اس کے - نیر اور مختلف قسم کے ٹے - نیا (دیکھو باب امراض جلد ۱) اور بعض ایسا قیاس کرتے ہیں کہ جاندار کیسوں سے چہوت پیدا ہوتی ہے جیسے سرطان کی بیماری میں ہوا کرتا ہے - اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انفلمیشن کے مقام بازخم کی جگہ کی پیپ یا کوئی اور موزمی مادہ سے چہوت کا زہر پیدا ہوتا ہے جیسے سوزاک اور آتشک اور چیچک اور نگان - ڈراس اور پرسیوت کی بیماری در پیوز - پے - رل - پے - رمی - ٹو - نامی - ٹس) میں ہوا کرتا ہے عسلا وہ ازین چہوت کا زہر ہینپون کے مادہ میں یا ان کے گہرند میں ہی ہوا کرتا ہے جیسے چیچک کی بیماری میں ہوتا ہے - بہتیرے چہوت کے زہر ایسے ہی ہیں کہ ان کی صورت شبہا بہت کچھ ہی ہینپون ہوتی اس قسم کے زہر جسم کی مختلف طبقات کے بنجیر اور فضلات سے لڑنے لگتے ہیں خاص کر ان طبقات سے جو شش اور جلد سے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض زہر ایسے ہیں جو سانس کی ہوا میں ہوا کرتے ہیں جیسے ہو پنگ - کاف میں اور بعض مختلف فضلات کے بنجیر میں ہوتے ہیں جیسے چیچک میں امراض اسکار - لے - ٹے - نا کا زہر جلد کے اس اپے - تے - لیم میں بختہ ہوا کرتا ہے جو اس بیماری میں بھڑ جاتا ہے اور اس زہر کی چہوت عرصہ دراز تک مریض کے کمر و نین چڑھی رہ سکتی ہے - ہیضہ اور ٹامی - فائیڈ فیور کی چہوت صرف دراز کے ذریعہ پھیل سکتی ہے - یہ چہوت رو و دن سے حاصل ہوتی ہے اور ہر قسم فضلات میں لگ جاسکتی ہے بشرطہ کہ ان فضلات میں چہوت مذکور مخلوط ہو جاوے اور مرض فائیڈ رو - نو - سیا کی چہوت لباب دہن کے ذریعہ لگ جاسکتی ہے - یہ بھی یاد رہے کہ جب کوئی شخص کسی متعدی بیماری سے مر جاتا ہے تو اس کی کنش کے بنجیر سے

اُس مرض کی چھوت اُڈرون کو لگ جاسکتی ہے بخیر مذکور کا یہ اثر موت کے بعد عرصہ تک رہ سکتا ہے +

اِس چھوت کی نسبت دوسری بات یہ دریافت کرنی چاہئے کہ یہ چھوت ایک حیوان سے دوسرے کو یا ایک انسان سے دوسرے کو کیونکر لگ جاتی ہے اور جسم کے اندر کیونکر داخل ہوتی ہے بعض دفعہ تو سب بات کا کرنا ضرور پڑتا ہے کہ جس چیز میں اُس چھوت کا زہر ہوتا ہے اُسکو جسم کی بافت کی باریک رنگوں میں داخل کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ جذب ہو جاوے جیسے ٹیکا لگانے میں کیا کرتے ہیں عداوہ ازین زہر مذکور جب جلد یا میوہ کس پر وہ کے کسی زخم یا چھلی ہوئی جگہ میں لگ جاتا ہے تب وہ خون میں جذب ہو جاتا ہے مثلاً ٹائڈ رو - فو - بیا اور آتشک اور دک - سائی نا ایسی بیماریاں ہیں جنکا زہر ترکیب مذکورہ بالا سے خون میں جذب ہو کر وہ بیماریاں پیدا کرتا ہے - ایک اُوندہ ترکیب چھوت لگ جانے کی یہ بھی سبب کہ زخم نہ ہو زہر اگر کسی خاص مقام پر صرف لگ ہی جائے تب بھی اپنا اثر پیدا کر کے اُس خاص موضع کو ظاہر کرتا ہے جکا وہ زہر ہوتا ہے - لیکن وہ طریقہ چھوت کے لگ جانے کا صرف اِسطح ہوتا ہے کہ جب زہر مذکور جسم کے میوہ کس پر دون میں لگ جاتا ہے جیسے سوزاک میں اور پیو - ریو - لنٹ - اف - تھال - میا میں ہو اگر تا ہے +

پے - ری - سائیٹ قسم کی بیماریوں کی چھوت ایک جسم سے دوسرے جسم میں لگ جانے سے بیماری پیدا کرتی ہے + جیسے اس - کے - بنز کی بیماری میں ہو کرنا ہے - بہت ہی چھوت کی بیماریاں ایسی ہی ہیں جو ہا کسی قسم سے لگنے کے ایک انسان سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں - چنانچہ اس صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوت کا وہ ارد گرد کی ہوا میں پہنچتا ہے اور تب اچھوتا آدمی یا تو اُسکو سونگہ لیتا یا کہا جاتا ہے یا اُس شخص کی بند اُس کو وہ جذب کر کے خون میں پہنچا دیتی ہے - چھوت جب

اس ترکیب سے لگ جاتی ہے تب اسکو اصطلاح میں ان فلک - شن کہتے ہیں علاوہ
 ازین مادہ چھوت کا کہانے پینے کی خیزون میں بھی ملجاسکتا ہے جیسو دودھ میں جبکہ پینے
 سے انسان کے جسم میں وہ مادہ داخل ہو سکتا ہے اور وہی چھوت کا مادہ کپڑوں میں
 بھی لگ جاسکتا ہے خاصکر پشیمندہ یا ریشمی یا سوتلی کپڑوں میں اور بستر میں بھی لگ جاسکتا
 ہے جیسے تو شک رزاسی اور لحاف وغیرہ میں اور مادہ مذکور بالو میں بھی چھٹا رہ سکتا ہے۔
 غرض اشیا کے مذکورہ بالا سے لوگوں میں پھیل جاسکتا ہے۔ یاد رہے کہ چھوت کا مادہ
 ان خیزون میں عرصہ تک زندہ رہ سکتا ہے اور عرصہ دراز بعد ہیکلہ بیماریاں پیدا کر سکتا
 ہے ان اس صورت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تب تیزی سکی
 کم ہو جاسکتی ہے ۔ ایسا بھی ہو گیا ہے کہ جو لوگ مریض کے پاس سے ہو کر تندرست
 آدمیوں میں جا ملے ہیں انکے ذریعہ چھوت کا مادہ ان تندرست آدمیوں میں پھیل گیا
 ہے جس سے وہ لوگ مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ دھوبی کے
 گہرے جوڑے ہوئے کپڑے آئے ہیں یا جب مدرسہ میں کوئی بائی بیماری موجود ہو وہاں سے
 بچوں کے کپڑے جب گہرے پیچ گئے ہیں تو ان کپڑوں کے ذریعہ ہی مرض پھیل گیا ہے علاوہ
 ازین خون کے ذریعہ گاڑیوں کے ذریعہ اور ہتھیری اور چنبروں کے ذریعہ بھی چھوت کا مادہ
 پھیل جاسکتا ہے ۔ اور گہروں کے اسباب درجن اور کمر دن کی دیواروں میں مادہ مذکور
 لگا رہ سکتا ہے ۔ یس یاد رہے کہ جب کسی گہر میں کوئی مریض ہوتا ہے تو اسیں اس
 وبائی مرض کا مادہ عرصہ تک لگا رہتا ہے پس جب تک اس گہر کو ترکیب وافع عفونت
 سے اچھی طرح پاک نہ کیا جاوے تب تک لوگوں کو اسیں بسنا نہ چاہئے ۔ وبائی مرضوں
 کا مادہ مور و گس کے ذریعہ بھی پھیل سکتا ہے چنانچہ بیمار پر ہیکلہ جب وہ کہیائے تندرست
 آدمیوں پر جا بیٹھتی ہیں تب وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور ایسا بھی ہو
 ہے کہ کہمیان مریض کے بول و براز سے مرض کی چھوت کو اور جبکہ پھیل سکتی ہیں

لیکن سب سے بہاری ذریعہ دباہی مضمون کے پھیلا دینے کا پینے کا پانی ہے۔ مثلاً اگر ترکیب سے ہیضہ اور ٹامی - فائینڈ فیور کی دباہی سطح پھیل سکتی ہے کہ ان امراض کے بیماروں بول و برائے اس پانی میں ملایا جاتا ہے جو پینے کے کام میں آتا ہے (دیکھو باب حفظ صحت)* جب چھوت کا مادہ ہوا میں ملکر کسی آدمی کو جا لگتا ہے تب اسکی جلد پر با اس کے منہ یا ناک حلق ہوا کی مالیون عمدہ اور رودہ اور جسم کے دیگر حصوں کے میو - کس پردہ پر چھوٹ جاسکتا ہے اور وہاں سے زیادہ تر بار یک پر دون میں نفوذ کر کے میو - کس پردہ کی موٹی سخت مین جمع ہو کر جلد کے اپنے - تپے - لی - ال کیسوں کے نہایت بار یک بار یک مشیت کے اندر سے بار یک بار یک عروق شعیریہ اور عروق جاذبہ میں منجذب ہو جاتا ہے اور تب سارے جسم کے خون میں مل جاتا ہے جلد جب پہلی ہوئی ملائم اور مرطوب ہوتی ہے یا عروق شعیریہ جب کمزور اور پھیلی ہوتی ہیں اور جب ان مقامات مذکورہ بالا کے کسی جگہ کوئی زخم یا کوئی جگہ چھلی ہوئی ہوتی ہے تب اس مادہ کو خون میں جذب ہو جانے کا نہایت عمدہ اور آسان موقع مل جاتا ہے اور ایک اور موقع اس کے جذب ہو جانے کا وہ بھی ہے کہ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد جب رحم پھیلا ہوا اور ڈھیلیا ہوتا ہے ۔

مختلف بیماریوں کی چھوت کے لگ جانے کے طور میں یہی تسلسل ہے مثلاً چھپا اور مے - زائس اور اسکار - لٹ فیور کا زہر ایک آدمی سے دوسرے میں نہایت آسانی سے سرایت کر جاتا ہے مگر ٹامی - فائینڈ فیور کا کم - ان - فلو - ان - زائس بیماری کی چھوت نہایت پھیلا جانے کے قابل ہے۔ ٹامی - فلو - ان - فلو کی چھوت کا یہ حال ہے کہ مریض کے ارد گرد گہرا دھندلاہٹا ہے اور باہر کی ہوا میں ملکر زایل ہو جاتا ہے ۔ اگرچہ یہ بات ہے کہ چھوت کا مادہ جبکہ زیادہ اور قہتا تیز ہوتا ہے اتنا ہی جلد ایک سے دوسرے آدمی کو لگ جاتا ہے لیکن گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مادہ کی مقدار بہت ہی تھوڑی ہو پھر بھی اس سے بیماری پھیل سکتی ہے ۔ مختلف اوقات کے اندر چھوت کے مادہ کی تیزی

میں بھی فرق ہوتا ہے چنانچہ اس میں اسطے کوئی وبا شدید اور کوئی خفیف ہوتی ہے اور چھوٹے مادہ کی تیزی یا گندے جسم کے اندر اسکے داخل ہونے کی ترکیب پر بھی منحصر ہے مگر مادہ مذکور اس وقت زود اثر ہو جاتا ہے کہ جب اس سے کسی اڈور کو ٹیکا لگایا جاتا ہے اور ایسا قیاس کرتے ہیں کہ جب کوئی چھوٹ کا مادہ کئی آدمیوں کے جسم کے اندر سے گزرتا ہے تب طاقت اسکی گہٹ جاتی ہے *

چھوٹ کے مادہ کے لگ جانے سے اس بیماری کا ظاہر ہونا یا نہ ہونا اس شخص کے مزاج اور طبیعت اور صحت کی حالت اور اسکے عادات پر بہت سا کچھ حصر رکھتا ہو اگرچہ یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی متعدی بیماری ایک دفعہ ہو جاتی ہے تب وہ شخص اس بیماری میں دوسری دفعہ اکثر مبتلا نہیں ہوتا لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ لگا ہے گا ہے اسکو وہ مرض کئی مرتبہ ہو جاتا ہے مگر جب وہ بیماری دوسری دفعہ ہو جاتی ہے تب بہ نسبت دفعہ اول کے خفیف ہوتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت کے اندر دو متعدی بیماریوں میں مبتلا ہو جاوے لیکن جب ایسا ہوتا ہے تب وہ دونوں بیماریاں آپس میں مل جیکر ایک دوسرے کے اثر میں فرق ڈال دیتی ہیں۔ بعض حالات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک متعدی بیماری دوسری متعدی بیماری کو پیدا ہونے میں دیتی ہے خواہ کچھ عرصہ کے لئے خواہ ہمیشہ کیو اسطے نہیں تو انکے اثر کو بہت ہی کم کر دیتی ہے جیسا کہ گائے کی سینٹا کے ٹیکا سے چھپک کا حال ہو جاتا ہے۔ بعض شخص ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب کو متعدی بیماریوں کی چھوٹ لگتی ہی نہیں اس صورت میں ایسا قیاس کرتے ہیں کہ اس شخص کو شکم اور مین وہ بیماری نکل چکی تھی + چھوٹ کے مادہ کا کم یا زیادہ پہلنا خارجی حالات پر بھی بہت حصر رکھتا ہے چنانچہ حفظ صحت کے قاعدوں کی پابندی جب اچھی طرح نہیں ہوتی ہے تب بہت تیزی سے متعدی زہر لگتا اثر تیز ہو جاتا ہو خاصکر

نائی۔ من۔ فیور اور ری۔ لپ۔ رنگ۔ فیور کے زہر و لکنا یہ حال اکثر ہوتا ہے ایسا
 قیاس کرتے ہیں کہ ہیضہ اور نائی۔ فائیڈ فیور کی چھوت میں جب پانی مل جاتا ہو تب
 زیادہ تر تیز اور تند ہو جاتا ہے اور بعض محققین یہ بھی منسرتے ہیں کہ چھوت کا مادہ جب
 پہلے پہل خارج ہوتا ہے تب وہ منفر صحت نہیں ہوتا بلکہ کچھ عرصہ بعد اس میں سمیت آ جاتی
 ہے چھوت کے مادہ کا کم یا زیادہ تند ہونا آب و ہوا اور موسم پر زیادہ منحصر رہتا ہے
 مثلاً بعض چھوت کی بیماری کے پیدا ہونے کے لئے حرارت زیادہ چاہئے برعکس
 بعض چھوت کی بیماری زیادہ گرمی سے ٹوک جاتی ہے * مگر جب چھوت کے مادہ میں
 نہایت شدت کی گرمی یا نہایت شدت کی سردی لگائی جاتی ہے اور جب اس پر
 کیمیائی اشیاء کا اثر پہنچایا جاتا ہے تب وہ زہریلا مادہ زایل ہو کر بیکار ہو جاتا ہے۔
 چنانچہ جو بیماریاں چھوت کے زہرون سے پہیلیتی ہیں انہیں ترکیبون سے انکو ہم روک
 سکتے ہیں مثلاً وہ کیمیائی اشیاء جو چھوت کے زہریلے مادہ کو زایل کر کے بیکار کر دیتے
 ہیں یہ ہیں جیسے کلو۔ رین اور آیمو۔ ڈین اور نائی۔ پو۔ کلو رائیڈ اف لایم اور کلو رائیڈ
 اف زنک اور سل۔ فیور۔ رس اسٹ اور کار۔ بو۔ لک اسٹ اور کر۔ سی۔ لک اسٹ
 اور کان۔ ڈیز۔ فلوئیڈ اور کلو۔ ری۔ لم *

کن۔ ٹے۔ جی۔ ان یعنی چھوت کی چھوٹے۔ واضح ہو کہ بعض متعدی
 امراض مریض بناتی ہیں مگر وہ مادہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ جنکا نشیمن انسان کے جسم پر ہوتا
 ہے۔ مگر ان بیماریوں میں سے ہر ایک بیماری الگ الگ قسم کی نباتی یا حیوانی ماؤ
 سے پیدا ہوتی ہے۔ پس وہ خاص مادہ جس سے وہ خاص قسم کے متعدی امراض پیدا ہوتے
 ہیں انکی نسبت ایسا قیاس کرتے ہیں کہ ان ہر ایک مرض کے پیدا کرنے کے لئے خاص
 خاص قسم کا موٹی مادہ یا زہر ہوتا ہے جس سے وہی خاص بیماری پیدا ہوتی ہے کوئی اور
 بیماری اس خاص مادہ سے نہیں پیدا ہو سکتی اور جب تک اس خاص زہر کا اثر جسم میں

ہنہن ہوتا تنک وہ خاص بیماری پیدا نہیں ہو سکتی غرض اسی قیاسی ہر کو اصطلاح
میں کن - ٹے - جی - ان یا دائی - رٹش کہتے ہیں ۔

بعض متعدی امراض مگر خاص کردہ جو انفلو میشن کے قسم کے ہوتے ہیں ان میں خاص
تکے موزمی دے پیدا ہوتے ہیں جیسے پیپ ۔

کن - ٹے بھی - ان پختی چوت کی اصلیت کی نسبت فی زمانہ دو اصول کو پہنچتے
غلبہ ہے - ایک کو کے - می کل تپوری اور دوسرے کو دائی - ٹل تپوری کہتے ہیں ۔
پہلے اصول کی نسبت ایسا قیاس کرتے ہیں کہ مختلف متعدی مرض کی چھوت کا مادہ الگ
الگ ہوتا ہے یا وہ چھوت کا مادہ بچھڑا سیال یا ہوائی ہوتا ہے اور یہ کہ اس میں کھینچائی
تغیرات جلد پیدا ہو جاتے ہیں جس سے اس کی شکل بدل جاتی ہے ۔

چھوت کی اصلیت کی نسبت دوسرا اصول جبکہ اصطلاح میں دائی - ٹل یا جرم تپوری
بھی کہتے ہیں یہ ہے کہ اس اصول کے بموجب ایسا قیاس کرتے ہیں کہ کل متعدی امراض جاندار
مادہ سے پیدا ہوتے ہیں جنکو جرم کہتے ہیں ۔ اور یہ کہ ہر ایک چھوت کی بیماری الگ
الگ جاندار مادہ سے پیدا ہوتی ہے لیکن اس بیماری پیدا کرنے والے جرم یعنی تخم کی
خاصیت کی نسبت اور اس بات کی نسبت کہ تخم مذکور ٹھیک کس ترکیب سے بیماری کہ پیدا
کرتا ہے اطباء کی رائے میں اتفاق نہیں ہے لیکن علی العموم ایسا قیاس کرتے ہیں کہ جرم
مذکور نہایت خرد و خرد جاندار ہوتا ہے اور یہ کہ نہاتات کے قسم کے ہوتے ہیں گو
بعض محققین انکو حیوانی مادہ بتلاتے ہیں اور کوئی تو انکو بک - طری - آ اور کوئی
بے - سی - لائی اور کوئی مائی کہہ دے گا کہ - سائی اور کوئی اسکو کسی ڈر نام سے نامزد
کرتے ہیں ۔ اور یہ جاندار مادہ کے قسم کا اثر پیدا کر کے بیماری کو ظاہر کرتے ہیں اس
باب میں ہی اطباء کی رائے میں اختلاف ہے لیکن ایسا اکثر قیاس کرتے ہیں کہ خود وہ
مادہ سے ہی چھوت میں اور یہ کہ ان کے جاندار ہونے کے سبب سے ان میں بیماری پیدا

کرنے کی استعداد موجود ہے ۔

چھوت کا مادہ جسم پر کس قسم کا اثر پیدا کرتا ہے اور اس مادہ میں کس کس قسم کے تغیرات واقع ہوتے ہیں ۔ واضح ہو کہ چھوت کے مادہ کا اثر یا تو کسی خاص مقام کی طرف محدود رہتا ہے جیسے اسکے ۔ نیز اور شاید سوزاک میں بھی ہو اگر تا ہے یا بعض چند موقع میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر تو اثر اس کا کسی خاص مقام پر پیدا ہوتا ہے لیکن آخر کار سارے جسم میں پھیل جاتا ہے جیسے آتشک کے مادے یا ٹیکاکے ذریعہ گائے کی سیتل یا چھپک کا مادہ لیکن ایسے مادہ کے اثر کی نسبت قاعدہ یہ ہے کہ اس مادہ کا پہلا اثر سارے جسم پر ہوتا ہے جس سبب سے جسم کے خاص خاص مقامات پر اس کا اثر بڑھتا ہے ۔

جب خاص خاص بیماریاں خاص خاص مقامات سے شروع ہوتی ہیں یا تو ٹیکاکا لگانے سے چھپک کی بیماری تب وہ لم ۔ فائٹک گلائڈس کے ذریعہ (یعنی عذو و جاذبہ) اس مقام کے عین اوپر ہوتے ہیں اس خاص زہر کا اثر پیدا ہو جاتا ہے ۔ خاص اسی وقت یا قریب اس وقت کے کہ جب اس قسم کے تغیرات کا زور و شور ہوتا ہے بخار کی علامتیں ظاہر ہو پڑتی ہیں اور تب تھوڑے عرصہ بعد خاص قسم کے بخارات نمودار ہو جاتے ہیں لیکن گائے کی سیتل میں اس قسم کے بخارات نہیں پیدا ہوتے اور جن بیماریوں میں پہلے پہل بظاہر کسی خاص قسم پر اس زہر کا اثر نمودار نہیں ہوتا تو اس صورت میں ایسا قیاس کرتے ہیں کہ ان مختلف چھوت کے مادوں کا اثر پہلے پہل خون پر یا جیسے بعض تصور فرماتے ہیں وہ اثر نظام عصبی پر ہوتا ہے ۔ لیکن بعض محققین ایسی بیماریوں کی نسبت بھی یہ قیاس کرتے ہیں کہ ان کے بھی ہر کا اثر پہلے پہل ایسے مقام یا مقامات پر ہوتا ہے کہ جہاں سے زہر مذکور جسم کے اندر سما گیا تھا اور تب اوپر کی لم ۔ فائٹک عذو و نہین تغیر پاکر سارے جسم کو مبتلا کر لیتا ہے ایسا قیاس خاص طور پر مرض ڈف ۔ تپ ۔ ریما

اور ہیفیڈ اور ٹامی - فائیڈ فیور کے پیدا ہونے کی نسبت کیا جاتا ہے لیکن چاہے قیاس
کیسا ہی کیا جاوے اُن مختلف بیماریوں کا اثر سارے جسم پر وہ غیر بھی نہایت جلد
ہو جاتا ہے ۔

غرض جب چھوت کا مادہ جسم میں سریت کر گیا تب جلد بڑھنے لگتا ہے اور
جُرم - تھیو - ری کے موجب (دیکھو اوپر) جُرم یعنی تخم بکثرت پیدا ہونے لگتے ہیں شاید
خون کے البیومین کو کہا کر یا رگون کی دیواروں یا جسم کی بافتوں کا ماس کر کے بتر
جاتے ہوں - غرض اس ترکیب سے نہایت ہی تھوڑا سا چھوت کا مادہ جب جسم کے اندر
داخل ہو جاتا ہے تب اس سے اُور پیدا ہو کر بہت سا بچتا ہے ۔

پس وہ چھوت کا مادہ خون کے وسیلہ سے سارے جسم میں پہنچتا ہے اور جسم
اُن آفتوں میں پہنچ جاتا ہے جہاں سکے بڑھنے کے لئے عمدہ موقع ملتا ہے ۔ پہلے
تو جسم میں اسکے اثر کی کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوتی مگر مادی مادہ مذکور کچھ عرصہ
تک بیکار رہتا رہتا ہے ۔ اگرچہ بیکاری کا زمانہ مختلف بیماریوں میں مختلف ہوتا ہو
پھر بھی ہر ایک مرض میں وہ زمانہ قریب ایک خاص حد تک کا ہوتا ہے ۔ چھوت
کی بیکاری کا وہ زمانہ ہوتا ہے جو چھوت کے مادہ کے جسم کے اندر داخل ہونے
سے لیکر مرض کی ابتدائی علامتوں کے پہلے پہل ظاہر ہونے تک رہتا ہے اور اس
عرصہ کے مابین یا تو بیماری کی کوئی بھی علامت نہیں پیدا ہوتی یا جو ہوتی ہے وہ
اُس خاص مرض سے چند ان تعلق نہیں رکھتی بعض دفعہ زہر کی بیکاری کا زمانہ دراز
ہونا ہے مثلاً کانے - ڈرو - تو - بیامین - ہینون - تک زہر بیکار رہتا رہتا ہے ۔

اس بیکاری کے زمانہ کو اصطلاح میں پے - ری - اُڈاف - ان - کیو - بے - شن کہتے
ہیں ۔ چھوت کے زہر کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اس قسم کا ہوتا ہے جس سے بُخار ہو جاوے
تب اُسکے اثر کی پہلی علامت بخار کی ہوتی ہے چنانچہ لرزہ ہو کر گلے کا بخار کی

پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ علامہ وہ بخار کے بیماری علامات خاصہ
 بھی ظاہر ہو جاتی ہیں بعضہ دفعہ جسم پر چھوٹ کا اثر اس شدت سے ہوتا ہے اور
 وہ اثر اس قدر جلد بڑھ جاتا ہے کہ اُس کے عین ابتدا ہی میں بیمار تلف ہو جاسکتا ہے۔
 اور جو بچہ رہا تو ایک خاص عرصہ کے بعد وہ اثر جس بیماری کے زہر کا ہوتا ہے یا تو خاص
 جگہ پر پیدا ہو جاتا ہے یا اُس بیماری کی خاص خاص بُرائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں مثلاً
 وہ بُرائیاں یا تو ایک ہی بانٹ یا صرف ایک ہی عضو میں محدود رہتی ہیں یا جسم
 کے کئی حصے اُس میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب چھوٹ کے زہر کے خاص اثر کے پیدا
 ہونے کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تب علامتوں کو تخفیف ہونے لگتی ہے زہر ٹہننے سے
 ٹوک جاتا ہے آخر کا جسم سے بالکل خارج ہو جاتا ہے ۛ

یہ بات یاد رہے کہ چھوٹ کی جو جو خاص بیماریاں ہیں ان کے ہر ایک سے اپنے اپنا دور
 باقاعدہ پورا کرتے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ اُن درجوں کا دور ایک حد تک ہوتا ہے
 علامہ وہ ازین امراض مذکور بعضہ دفعہ تو نہایت خفیف اور گاہے ایسے شدید ہو جاتے
 ہیں کہ ردی سلامت پیدا کر کے بیمار کو ہلاک کر ڈالتے ہیں ۛ

مقالہ دہم

اپنے۔ ڈی۔ مائینی وبا

بعض بیماریاں مخلوق میں خاص خاص طور پر پہلی ہی غرض موجب اسکے اُن کو لگتی
 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں مثلاً اُن کو اس۔ پو۔ را۔ ٹوک اُصورت میں کہتے ہیں کہ
 جب انہیں خال خال دھبی مبتلا ہوتے ہیں جیسے برا نکائی۔ ٹش یا وہ امراض
 اُن۔ ڈی۔ مائینی کہتے ہیں کہ جب خاص خاص امراض میں محدود ہوتے یا اُن امراض
 میں اکثر ظاہر ہوا کرتے ہیں جیسے نپ لہزہ یا گھینگ کی بیماری ۛ

اپنے۔ ڈی۔ رکٹ بیماری وہ ہوتی ہے جو بہت سے آدمیوں میں عالمگیر ہو جاتی ہے اور
 اُنہیں نہایت جلد پھیل کر لوگوں کو پامال کر دیتی ہے۔ لیکن اس قسم کے مرض کے
 ظاہر ہونے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے اور ظاہر ہو کر ایک محدود وقت تک
 رہ کر غائب ہو جاتے ہیں جیسے ہیضہ اور ان۔ ڈی۔ رکٹ۔ فیور یا چیچک۔ مگر اور ہے
 کہ اکثر اوقات اسپو۔ راڈوک اور ان۔ ڈی۔ رکٹ اور اپنے۔ ڈی۔ رکٹ بیماریاں
 ایک دوسری میں بدل جاتی ہیں مثلاً اپنے۔ ڈی۔ رکٹ قسم کی بیماریاں بعض دفعہ عالمگیر
 نہ ہو کر صرف متعدد آدمیوں میں خراب ہوتی ہیں تب اپنے۔ ڈی۔ رکٹ مرض اسپو۔ راڈوک
 ہو جاتا ہے جیسے ہیضہ کہ جب بہت سے لوگوں میں پھیل جاتا ہے اور پامال کر دیتا ہے تب
 اُس ہیضہ کو اپنے۔ ڈی۔ رکٹ کا کہتے ہیں۔ لیکن بعض موسم میں ایسا ہی ہوتا ہے
 کہ وہی ہیضہ کی بیماری خال خال آدمیوں میں خراب ہوتی ہے مگر چند ان مہلک ہنہیں ہوتی
 تب اسکو اسپو۔ راڈوک کا کہتے ہیں۔ مزید براین اپنے۔ ڈی۔ رکٹ اور اسپو۔ راڈوک
 بیماریاں کسی جگہ ان۔ ڈی۔ رکٹ ہی ہوتی ہیں جیسے ٹائیفس فیور اگرچہ اپنے۔ ڈی۔ رکٹ
 یا اسپو۔ راڈوک ہوتا ہے پھر بھی اکثر ایسے بڑے شہروں میں ان۔ ڈی۔ رکٹ ہی
 ہو جاتا ہے کہ جہاں حفظ صحت کا نظام اچھا نہیں ہوتا ہے *

دباؤن کا حال یہ ہے کہ دباؤن۔ ڈی۔ جی۔ ان کے سبب سے اکثر پہلے ہی ہے اور
 اسکے پہلے کو ان باتوں سے مدد ملتی ہے جو حفظ صحت کے مخالف ہیں کیسی اور ظاہری
 سبب سے جیسے قحط سالی اور بہتری دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ دباؤن کو مکر پیدا ہو جاتا ہے۔
 یہ بات ٹھیک طور پر نہیں کہی جاسکتی۔ مزید بریں بعض بیماریاں ایسی ہی ہیں جو دباؤ
 ہو جاتی ہیں مگر جب تک متعدی ہونے کے باب میں ہنوز بحث چلی آتی ہے جیسے
 ان۔ فلو۔ ان۔ زکی بیماری اگرچہ انکے اپنے۔ ڈی۔ رکٹ ہو جانے کی نسبت بہتر ہے
 اصول بتائے گئے ہیں مثلاً ایسا قیاس کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کی ہوائیں کوئی بابت

ایسی پیدا ہو جاتی ہے جس سے بیمار یاں دبا ئی ہو جا سکتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہوا میں یہ کیفیت سیاروں کے اثر سے یا ان گیسوں کے اثر سے پیدا ہو جاتی ہے جو آتشخیز پہاڑوں یا زلزلہ سے اُٹھتی ہیں یا جب ارد گرد کی ہوا میں برقی اثر آجاتا ہو یا جب اسپین نہایت خرد خرد بار یک بنی کرم پیدا ہو جاتے ہیں تب ہی ان کے سبب سے بیمار می اپنے ڈی۔ ٹی۔ ٹی۔ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سب خیالات ہیں انکی نسبت کوئی بات ٹھیک نہیں مستلزامی ہے + مگر ان یہ قرین قیاس ہے کہ بعض بعض دباؤ سوتل ضرور پیدا ہوتی ہے کہ جب ہوا میں بعض کیفیات ایسی آجاتی ہیں جن سے چھوٹ کے تخم یعنی جرم پیدا ہو کر زندہ رہ سکتے ہیں +

جب حفظ صحت کے قاعدوں کے خلاف کیا جاتا ہے یا کسی اور ظاہری سبب سے کوئی متعدی بیماری دبا ئی ہو جاتی ہے تب ایسا قیاس کرتے ہیں کہ اس متعدی بیماری کا خاص زہر ان سببوں سے یا تو بڑھ جاتا ہے یا زیادہ تر تیز اثر ہو جاتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ ان اسباب مذکورہ بالا سے لوگوں کی طبیعت میں ایسا تغیر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ طبیعت اس متعدی مرض میں مبتلا ہونے کے قابل ہو جاتی ہے اور اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دباؤن کی نسبت یہ باتیں دریافت کی گئی ہیں کہ متعدی بیماریاں اکثر دبا ئی ہو جاتی ہیں اور وہ ہی جو مے۔ لے۔ ریا کے سبب سے پیدا ہوتی ہیں + مگر قاعدہ یہ ہے کہ متعدی امراض اور مے۔ لے۔ ریا زہر کی بیماریوں میں سے ایک ہی وقت کے اندر صرف ایک ہی قسم کی بیماریاں دبا ئی ہو جاتی ہیں مگر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاص خاص زہروں کی شدید بیماریاں ایک ہی دفعہ پہلیکے دبا ئی ہو جاتی ہیں اور کما ہے گا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ عکساوہ ان کے کوئی اور بیماریاں دبا ئی ہو جاتی ہے + جب کوئی دبا پہلی ہوئی ہوتی ہے تب اس سے اور بیماریوں کی خاصیت میں فرق پڑ جاتا ہے چنانچہ ہیضہ کی دبا کے ایام میں لوگوں کو دست لگجاتے ہیں اور

اِنْ - فلو - اِنْ - زاکمی ویا کے وقت لوگ زکام کے قسم کے امراض میں اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں ۴۰

ویا کے پھیلنے کی حدود میں بڑا نسرق ہوتا ہے مثلاً جب کوئی ویا بہت ہی پہیل جاتی ہے تب ایک جگہ کو چوڑا کر دوسری میں اور دوسری کو چوڑا کر تیسری میں غلہ ہذا القیاس اسطرح پہیلی جاتی ہے لیکن جب ایک جگہ کو چوڑا کر دوسری میں وصل ہوتی ہے تب پہلی جگہ میں اُسکا اثر کم ہو جاتا ہے ۴۱ اور ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ میں کسی خاص خاص سبب سے وہ ویا محدود رہتی ہے ۴۲

امراض مفصلہ ذیل وہ ہیں جنکی ویا میں اکثر بہت دور دراز تک پہیل جاتی ہیں جنہیں اِنْ - فلو - اِنْ - زاکمی اور سے - ٹرنس اور اسکار - لے - ٹے - نا اور چچک ۴۳

ٹامی - فس فیور اور ری - لپ - سنگ فیور کی ویا اکثر ایسے مقامات میں محدود رہتی ہے کہ جہاں حفظ صحت کے قاعدوں کے خلاف کیا جاتا ہے اور بیضہ اور ٹامی - فایڈ فیو اور ڈوف - تھے - ریا کی ویا کسی کسی جگہ بقاعدہ ظاہر ہو پڑتی ہے ویا کی چال اور رفتار میں بھی نسرق ہے مثلاً ویا اکثر ایک خاص سمت کو باقاعدہ آگے بڑھتی جاتی ہے غرض اس ترکیب سے ساری دنیا کی سیر کر سکتی ہے لیکن یا تو بہت زود رفتار ہوتی ہے یا نہایت آہستہ اور تدریج ایک جگہ سے دوسری جگہ آگے بڑھتی ہے - بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی جگہ کو چوڑا کر پھر اس میں موجود ہوتی ہے یا خاص خاص جگہ کو بالکل چوڑا دیتی ہے اور دوسروں میں ظاہر ہو پڑتی ہے اور ویا کا یہ بھی دستور ہے کہ اپنی سمت کو چوڑا کر دہننے بائیں مڑ جاتی ہے اور اُن مقامات میں ظاہر ہو جاتی ہے جو اُسکے رخ پر نہیں ہوتے ۴۴ ویا میں ہوا کے رخ کی تابع نہیں ہوتی کیونکہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہوا کے رخ کے خلاف ہی باپہیلی ہے ویا یا تو دفعتاً تھوڑی بہت رفتہ رفتہ ظاہر ہو سکتی ہے لیکن اکثر تدریج ہی ۴۵

ظاہر ہوتی ہے۔ دبائی بیماری کا اکثر یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب کسی جگہ ظاہر ہونے والی ہوتی ہے تب اُسکے آثار خفیف طور پر پہلے ہی سے پیدا ہونے لگتے ہیں مثلاً ہیضہ کی دبا کے ظاہر ہونے سے پہلے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دست آنے لگتے ہیں یا کسی کسی کو خفیف ہیضہ بھی ہو جاتا ہے ان علامتوں کو پری۔ مائے۔ ٹری سم۔ ٹم کہتے ہیں * دبا کی شدت میں بھی بہت اختلاف ہے مثلاً بعضہ فقہ تو دبا بہت ہی خفیف ہوتی ہے اور بعض اوقات نہایت ہی مہلک۔ لیکن یہ قاعدہ ہے کہ شروع میں دبا بہت ہی شدید ہو ا کرتی ہے اس بات کا سبب شاید یہ ہے کہ اُس مابین پہلے ہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں جنکی طبیعت اُسکے اثر کو اخذ کرنے کے لئے نہایت مستعد ہوتی ہو * دبا جب کسی جگہ سے سدھارنے لگتی ہے تو بتدریج سدھارتی ہے اُس وقت جو جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں اُن میں مرض خفیف ظاہر ہوتا ہے مگر کسی سبب سے یا ملا کسی ظاہر سبب کے بھی دبا فوراً دور ہو جاسکتی ہے *

کس جگہ میں باکس عرصہ تک ہتی ہے یہ بات بھی ٹھیک نہیں کہی جاسکتی چنانچہ وقفہ دیکر کسی جگہ ہیضہ برسوں رہ سکتا ہے بعضہ فقہ کئی دبائی بیماریوں کا پے درپے دؤر بھی ہو جاتا ہے مثلاً کسی جگہ کوئی دبائی بیماری ظاہر ہے تو اُسکے دور ہو جانے کے تھوڑے بہت عرصہ بعد اُسی جگہ کوئی اور دبائی بیماری ظاہر ہو جاسکتی ہے اور اُسکے رفع و دفع ہو جانے کے بعد اُس جگہ کوئی اور دبائی بیماری آن موجود ہو سکتی ہے علیٰ ہذا القیاس اُسکے بعد کسی اور تھاغلیہ ہو جاسکتا ہے *

یہ بات ضرور یاد رہے کہ دبا کا پہلینا یا پھیلنا آدمی کے بہت اختیار میں ہے کیونکہ حفظ صحت کے قاعدوں کے خوب طرح پابند رہنے سے آدمی یا تو دبا کو روک سکتا ہے یا اُسکی شدت کو کم کر دے سکتا ہے *

واضح ہو کہ بعضہ فقہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی باکا اثر آدمیوں پر ہوتا ہے

شبِ اسمین حیوانات بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسمین کچھ عجیب نہیں کہ اس ایام میں نباتات پر بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے *

مقالہ یارِ دہم

تدبیر حفظِ اقدم امراض متعدی و وبائی کی

اول جب ہیضہ یا کسی اور بیماری کی وبا پھیلنے والی ہو تو حاکمون کو فوراً اطباء کی صلاح لینی چاہئے اور اس کو روکنے کے لئے جو تدبیریں وہ بتا دیں ان پر عمل کرنا چاہئے *
دوم - اگرچہ وبا کے روکنے کے لئے ہر قسم کے لوگوں کو کوشش کرنی چاہئے لیکن غرباء کو اس امر میں زیادہ ترجیح چاہئے پس جس شہر میں وبا پہلی ہو وہاں کے حاکمون کو ہر گلی کوچہ کی خبر گیری کرنی چاہئے اور طبیب کی ہدایت کے بموجب دیباہی بیماریوں کے روکنے کی جو تدبیریں ذیل میں درج کیجاتی ہیں ان کو محکمہ لوگوں پر جاری کرنا چاہئے *

سوم - جس جس مقام میں گندگی جمع ہو اور جہاں جہاں اجسہ کے نباتاتی یا حیوانی سڑکائی ہوں اور ان سے عفونت پیدا ہوتی ہو ان مقاموں کو فوراً صاف کرادین اور دیکھیں کہ پہرہ پنر اس قسم کی گندگی جمع نہ ہونے پاوے اور شہر کے بدر و میلہ اور متعفن ہوں یا شہر کے کسی مقام پر گندہ پانی جمع ہو تو فوراً اسکی صفائی کی طرف متوجہ ہوں قصاص خانے اور گورجون کے مکانات کہ جہاں کثرت سے مویشی رہتے ہیں اکثر میلے ہوا کرتے ہیں انکو بھی فوراً صاف کرادین *

چہارم - جب کسی مقام پر گندگی کے ایسے بڑے بڑے ڈھیر ہوں کہ سردی سے اڑھہ نہیں سکتے تو حکیم کی صلاح لیکر ان پر ایسی دوا چھڑک دیں جس سے عفونت زایل ہو جائے

جس کسی مکان کا صحن تمام اور ایسا ہو کہ اسیں گندگی یا عفونت غرق ہو جاتی ہے تو اُس پر ہی اس دوا کو چھڑک دیں اور جب کسی گہر یا شفا خانہ یا پلٹن کے بار کون میں ہیفیہ کی دیا پہیلی ہو تو دمان گسے جا سے ضرور دین ہی اُس دوا کو ضرور چھڑک دیا کریں *

پنجم - پینے کا پانی جن چامات یا تالاب سے آتا ہو اُنکو اچھے طور پر ملاحظہ کریں اور انہیں سے کسی کے اندر رٹرے چوانی یا نیاتی اجرا کا گزر ہو یا کسی بدر رو یا تالاب کا گندہ پانی رس رس کے پڑتا ہو تو ہرگز اُس چاہ یا تالاب کا پانی نہ پینا چاہئے *

ششم - مکانات خاص کر ایسوں کو کہ جہاں لوگوں کا بہت مجمع ہو فوراً دھوا لیں اور سفیدی کر دیں *

ہفتم - ایک ہی جگہ میں بہت سے آدمیوں کا اثر و حام نہونا چاہئے خاص کر جس گہر میں بیمار ہو دمان پر فالتو آدمیوں کی کچھ ضرورت ہینن *

ہشتم - مکان کے اندر ہو اکی آمد و رفت کا پکا بندوبست کریں اور مکان کے دروازے اور کھڑکیوں کو کھولیں *

نہم - ہر قسم کے خانگی کاروبار میں صفائی کو زور دیں اور مکان کے اندر یا اُس کے احاطہ میں کہیں گندگی ہو تو اُسکو اُس وقت اُٹھوا دیں اور مکان کے اسباب اور بار چھانہ کے طرف فوراً صاف کریں اور تدابیر دفع عفونت سے اُنکو پاک کریں (دیکھو آگے اُن تدبیروں کو) *

دہم - یاد رکھنا چاہئے کہ چیچک کی بیماری کی دبا دوانوں کی پیچھے و زیرہ پہیلی ہے اور ہیفیہ کی دیا اور ٹائی و فائبرڈ فیور کی دبا دوا وہ دست و تنے کے ذریعہ اور مرض ٹیف - تپہ - ریا اور اسکار - لے - ٹے - نا کی دبا بیمار کے کھڑوں میں جو رطوبت پنی اور گلو اور سپینہ جذب ہو جاتا ہے اُس سے پہیلی ہے اس واسطے اس بات کی احتیاط چاہئے کہ جن چیزوں میں وہ رطوبات جذب ہو گئی ہوں اُن سے

پرہیز کرادین شکار مریض کے اوڑھنے یا بچھانے کے کپڑوں اور ان اشیاء سے جو مریض کے استعمال میں آئی ہوں پرہیز کریں۔ درباب ہیفیڈ اور ٹائی نائیڈ فیو کے یہ بات یاد رکھیں کہ بیمار کے دست و قے کے اندر چونکہ مادہ دبا کا موجود ہوتا ہے اسلئے اُنکو جا سے ضرور یا بدرو میں پہنکنا نہ چاہئے بلکہ تدابیر دافع عفونت سے اُنکے اثر کو زایل کر دین تاکہ اُنکے ذریعہ دبا پھیلنے نہ پاوے اور خاص کر اگر بات کی ضرورت تھی مابین کہ وہ دست و قے کسی تالاب یا چاہ کے کنارے یا کسی اور پینے کے پانی کی جگہ کے قریب نہ پہنکیے جا دیں کیونکہ اس سے یہ خطرہ ہے کہ دبا کا مادہ جو اُنکے اندر موجود ہے پانی میں لمجائیگا اور سارے کو بگاڑ دیگا اُس پانی کے پینے سے دبا عالمگیر ہو جائیگی ۔

یا تو وہم جو کوئی شخص دبا ہی مرض میں مبتلا ہوا سکے ساتھ تندرست آدمیوں کو بلا ضرورت ملنا نہ چاہئے ۔

دو تہ وہم جس مکان میں دبا موجود ہو اگر اُس کا دفعہ نہ کیا جاسکے تو مناسب ہے کہ ساکنین کسی اور مکان میں جاسیں ۔

سینہ وہم یا ام دبا میں اغذیہ کا پرہیز ضرور چاہئے شکار اُس موسم میں بقولات سے پرہیز چاہئے خاص کر کہیر کے لکڑی خرلوزہ و ترلوزہ وغیرہ اور اگر داضمہ بگڑ جاوے یا دت آنے لگیں تو ادویات مناسب سے فوراً روک دیں ۔ مکان میں سرکہ چھڑکنا یا سرکہ پینا اُس موسم میں فائدہ مند ہے ۔

تدابیر دافع عفونت

اگرچہ عفونت کے دفع کرنے کی بہتری ترکیبیں ہیں مگر انہیں بھ کوئی بھی ایسی تدبیر نہیں ہے جو صفائی کا مقابلہ کر سکے مکان کو صاف تہہ رر کنا۔ ہوا سے

خوش کی آمد و رفت کی طرف توجہ کرنی اور متعفن اور گندہ پانی وغیرہ کی طرف متوجہ ہونا سب سے بہتر ہے کیونکہ اور تدبیریں بکل مصنوعی ہیں اسلئے ممکنہ خاص حالات کے اندر کام میں لانا چاہئے ۔

اول۔ مصنوعی ترکیب سے عفونت دفع کرنے کے لئے ایسی چیزیں اچھی ہیں جیسے کلو۔ رائیڈ اف لایم ۔ تازہ چونہ ۔ کار ۔ بالک اسڈ ۔ کان ۔ ڈیز ۔ فلوئیڈ اور بعض حالات میں پر۔ کلو رائیڈ اف ایرن ۔ سلفٹ اف ایرن اور کلو۔ رائیڈ اف زنک بھی مفید ہے اور بعض صورتوں میں کلو۔ رین ہوا اور گندہ ہاک کی ہوا کا آمادہ ہو سکتی ہے اور کوٹا اور تازی ٹی بھی عفونت کو دفع کرتی ہے ۔

دوم۔ پر۔ کلو رائیڈ اف ایرن یا کلو رائیڈ اف زنک کام میں لانا منظور ہو تو انکا کاڑھا عرق جو قرابا دین میں مذکور ہو اسمین آٹھ یا دس گونہ پانی ملا کر استعمال کر سکتے ہیں اور جب سلفٹ اف ایرن یا کلو رائیڈ اف لایم استعمال کرنا چاہیں تو ان کے نصف سیر میں چار سیر پانی ملا کر خوب حل کر لیں ۔ کان ۔ ڈیز ۔ فلوئیڈ کے ایک حصہ میں ۔ حصہ پانی ملا نا چاہئے ۔ جب کسی چیز سے بدبو کو دفع کرنا ہو تو اسمین ادویات دفع عفونت تنیک ملا دین جب تک اسکی ساری بدبو نہ ایل نہ ہو جاوے ۔

سوم۔ دیانسی بجا رکے براز کی بدبو دور کرنی ہو تو پاخانہ کی جگہ میں یا تو

کلو۔ رائیڈ اف لایم یا کان ۔ ڈیز ۔ فلوئیڈ چھڑک دین ۔

چھارم۔ جہاں پیر گندگی کے بڑے بڑے ڈبیر ہوں کہ وہ سردست نہ اٹھو اسے جاسکین تو پیر و فایتین پنخ ویزر ٹکڑی کا کوٹا کوٹ کر جا دین ۔ تازہ جلا ہو چونہ بھی اس بات کو فائدہ کرتا ہے مگر کوسے کے برابر نہیں اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی اسوقت پاس نہ ہو تو ان ڈبیر میں پرکٹی پنخ موٹی خشک چکنی مٹی بچا دین ۔

پنجم۔ مکانات کے مٹی کے صحن میں اگر حیوانی یا نباتاتی متعفن مادہ عرق

ہو گیا ہوا اس باعٹ اس جگہ سے بدبو آتی ہو تو اس صحن کی عفوئت کو یہی
اسی ترکیب سے زایل کریں جسکا ذکر دفعہ چار میں کیا گیا ہے ۔

ششم - موری اور بد رو کی عفوئت کے دفع کر نیکی لئے سکولائیڈ اف لایم
یا کان - ڈینر - فلوئیڈ یا پر - کلورائیڈ اف - ایرن فائدہ مند ہے ۔

ہفتم - پینے کے کپڑے یا نہانے دھونے کی گنگیان وغیرہ پاک کرنی ہوں
تو پانچ سیر پانی میں ایک آونس کان - ڈینر - فلوئیڈ ماکر اس عرق میں کن کپڑوں کو فوراً
ڈبو دیں یا ایسا کریں کہ انکو نئے الفور کہوتے ہوئے گرم پانی میں ڈبو دیں اور تب دھونے
کے وقت دھوبی کو کہہ دیں کہ انکو اچھے طور پر پانی میں چوش دیدے ۔

ہشتم - کنسل یا اوڑھنے بچانے کے کپڑے ڈھل ہنیں سکتے انکی نسبت ایسا کریں
کہ کسی مکان کو ۲۰ یا ۲۵ درجہ تک گرم کر کے اس کے اندر ان کپڑوں کو کئی گنہٹہ برابر
رہنے دیں ۔

نہم - مکانات کی دیوار اور چیتوں پر چونہ پھیر دین اور لکڑی کے کیوڑ اور شہتیر
وغیرہ چوبی اسباب کو پہلے صابون اور پانی سے صاف کر کے کلورائیڈ اف لایم کے
عرق سے دھو ڈالیں جسکے ۵ سیر پانی میں دو آونس سکولائیڈ اف لایم چڑا ہو ۔

دھم - جس مکان میں کوئی نہ رہتا ہو اسکے پاک کرنے کی ترکیب یہ ہو کہ اس
مکان میں نصف یا ایک پاؤ گندہک جلا دیں یا نصف سیر بلاک - اکسائیڈ اف منگے - زینر
لیکڑا سینمکس کا تیزاب باؤہر اور نیم سیر پانی چھڑ دیں ۔ اس سے کلور - رین ہوا پیدا
ہوگی کہ نہایت دافع تعفن ہے ۔ مگر ان ترکیبوں کے کرنے کیوقت مکان کے دروازہ
اور کھڑکیوں کو کئی گنہٹے برابر بالکل بند رکھنا چاہئے ۔

یا زوہم - ہاتھوں کو متعدد بار دھو سے پاک کرنا - اسٹر - ڈام کے پروفیسر فارسٹر
فرماتے ہیں کہ میں نے بار بار اس بات کو آزمایا ہے کہ جب ہاتھوں میں کوئی متدی

مادہ لگ جاتا ہے جیسے لعش کے امتحان میں یا کسی دبائی بیماری کے دست ثقی وغیرہ کے امتحان میں تب چاہے کار۔ بالک اسٹڈ یا بو۔ را۔ سک اسٹڈ یا کلورائیڈ اف زینک یا ٹینکیم آف۔ اسٹیل وغیرہ کے عرق سے کٹنا ہی صاف کیجئے وہ متعدی مادہ ہرگز دور نہیں ہوتا چھٹا ہی رہتا ہے اور یہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ اکثر طبیب جو فیصدی ڈباہی حصہ کار۔ بالک اسٹڈ کے عرق سے یا ڈاکٹر بے۔ لارنچ کی ترکیب کے بموجب ڈائیڈ رو۔ کلورک اسٹڈ اور فیصدی حصہ گلائی۔ سی۔ ربین میں جس حصہ کار۔ بالک اسٹڈ ملا کر اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو ان عرقوں سے بھی متعدی مادہ دور نہیں ہوتا بلکہ عرق مذکورہ ذیل اسباب کے لئے بہت ہی مفید ہے کہ ہاتھوں کو پہلے صابون اور پانی سے خوب طرح دھو کر سارے چودہ گرین یا پندرہ گرین کرو۔ سیو۔ سب۔ لی۔ میٹ لیکر ۵۴ آونس ٹمٹلڈ واٹر میں حل کرین اور اُس عرق سے ہاتھوں کو دھو ڈالین۔ یہ سب موصوف فرماتے ہیں کہ جب ہاتھوں کو متعدی مادہ سے خوب طرح پاک کرنا ہو تو صابون اور پانی سے خوب طرح دھو کر کرو۔ سیو۔ سب۔ لی۔ میٹ کے عرق سے انکو اچھی طرح دھو ڈالنا چاہئے +

مقالہ دوازدہم

تدابیر حفظ صحت

سچ ہے ایک تندرستی بزرگوں کی نعمت۔ آدمی بیمار ہو کر یا تو کام ہی نہیں کر سکتا یا کام کرنا اُسکے واسطے نہایت دشوار ہو جاتا ہے اور جن باتوں سے پہلے اُسکا جسم خوش ہوتا تھا وہی باتیں بیماری میں اُسکو بُری معلوم ہوتی ہیں +

بیماری آدمی کی زندگی کو صرف تلخ ہی نہیں کر دیتی بلکہ بار بار بے سرو سامان اور مخلص بھی بنا دیتی ہے کیونکہ جب بیماری کے سبب اپنے معمولی کاروبار سے

معدور ہو جاتا ہے تو خود اسکو اور اسکے بال بچوں کو وہ آسائشیں نصیب نہیں ہو سکتیں۔
جو تندرستی کی حالت میں ہوتی تھیں اور اکثر صحت کے بعد بھی وہ اور اسکے بال بچے
عرصہ دراز تک اس تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں اور کبھی بیماری مہلک ہوتی ہے۔ یہ اڑن
شخص جبکی کمائی سے سارا کنبہ پلتا تھا عین سبب میں مرجاتا ہے۔ بہ مثال ہشمر
اور دیہات کے کل لوگوں پر صادق آسکتی ہے۔ باوجودیکہ تندرستی منعقد ہو سکتی
بڑی نعمت ہو اور عام خلق اللہ کے واسطے بڑی دولت پر بھی اکثر لوگ اسکی طرف بہت
کم توجہ کرتے ہیں اور ایسے تو بہت ہی کم آدمی ہونگے جو بیماری سے پہلے اس نعمت
کی قدر کرتے ہوں۔

جب کوئی شخص بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر یا حکیم کی صلاح لیتا ہے اور تندرست ہونے تک
بہت سا وقت اور روپیہ بھی خرچ کر دیتا ہے۔

خیال کرو اگر وہ بیماری سے پہلے ہی مرض کے سبب کو روکنے میں کوشش کرتا تو
بیماری سے بالکل محفوظ رہتا تکلیف نہ پاتا، نہ کڑکی فیس سبب چھ جاتا اور روپیہ کا نقصان
بھی نہ اٹھاتا جو ایام مرض میں کام نہ کر سکنے سے اٹھانا پڑتا ہے البتہ مرض کے سبب
رفع کرنے میں بھی روپیہ صرف ہونا ہے لیکن یہ صرف ان نقصانوں کا پاسبان ہی
ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے خصوصاً جبکہ بیماری کا سبب خفیف ہو۔ پس یہ سکتا
ہے کہ آدمی کی ادنیٰ کوشش سے اکثر بیماریاں رک جائیں کیونکہ یہ بیماریاں جن سے
لوگ دکھ بہرتے ہیں اور مرتے ہیں انہیں کی غفلت اور بے توجہی سے پیدا ہوتی
ہیں۔

حفظ صحت جبکو اصطلاح میں آئے۔ جین کہتے ہیں اس علم کا نام ہے جو آدمی کو مرض
کے روکنے کی تدبیریں بتلاتا ہے۔

چند سال پہلے مرض کے روکنے میں بہت کم کوشش ہوتی تھی بلکہ جو تہا بیماری

کے پیدا ہی کر سکتے ہیں سرگرمی سے مدد دیتا تھا۔ ایسے بہت تھوڑے تھے کہ اُس کے روکنے میں کوشش کرتے ہوں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اُس کے روکنے میں ہر شخص کچھ نہ کچھ مدد کر سکتا ہے لیکن اس بات کے سمجھنے کے واسطے کہ مرض کے روکنے کے لئے آدمی کو کیا کرنا چاہئے اُن باتوں سے آگاہ ہونا لازم ہے جن سے صحت قائم رہتی ہے *

یہ ممکن نہیں کہ اس کتاب میں وہ ساری باتیں سما جائیں جو صحت کے متعلق ہیں بلکہ ان میں سے ایک کا پورا پورا بیان کرنا بھی ممکن نہیں تاہم ان میں سے چند ایسی باتوں کا ذکر آسان عبارت میں ہو سکتا ہے جو نہایت قابل توجہ ہیں۔ اوہا نہیں بچے ہی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً اُن باتوں کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں کہ صحت کے بڑے بڑے قانون کیا ہیں اور یہ بھی کہ ہندوستان کے ہر شہر اور گائوں میں لوگ اُن قوانین کی طرف کس طرح توجہ نہیں کرتے یا کس طرح اُنکے خلاف کرتے ہیں اور اس لیے توجہی اور مخالفت کا تدارک کیونکر ہو سکتا ہے جس سے شہروں اور گاؤں میں حالت موجودہ کی نسبت زیادہ تر صحت قائم رہے *

یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ اکثر طبیب مرض کے دفیہہ کے لئے دوا ہی کو مقدم سمجھتے ہیں اور اُن باتوں پر جن سے بیماری رُک جاتی ہے یا صحت قائم رہتی ہے مطلق توجہ نہیں کرتے اب ہم اس موقع پر اُن تدبیروں کا ذکر کرتے ہیں جنکے بغیر دوا کا رگر نہیں ہو سکتی اور نہ آدب بیماری کی رُک سکتی ہے وہ یہ ہیں۔

اول ہوا۔ دوم پانی۔ سوم غذا۔ چہارم پوشاک۔ پنجم ریاضت۔ ششم فضا۔ ہفتم خواب *

ہوا کے اجزا

گُرہ ہوا کے جزو عظم یہ ہیں اکسے۔ جن اور ناے۔ ٹرو۔ جن اور کیتھر

کار۔ بانک اسٹڈ اور پانی کے بخارات اور ذرہ سانا سے۔ ٹرک اسٹڈ اور ایمونیا اور جیلون کی ہوا۔ ہوا کو اس وقت کثیف کہتے ہیں کہ جب اسکے معمولی اجزاء معمول سے زیادہ ہوتے ہیں یا علاوہ انکے جب ہوا میں کوئی شے غیر ملی ہوئی ہوتی ہے۔ ہوا کے ۲۰ حصہ میں اکسے۔ جن کی معمولی مقدار ۲۰.۹۶ ہوتی ہے مگر پہاڑوں کے اوپر کی صاف ہوا میں وہ مقدار بڑھ کر ۲۰.۹۸ ہو جاتی ہے۔ شہروں کی ہویز ۲۰.۹۰ تک بلکہ اس سے بھی کم ہو جاتی ہے *۔

اؤ۔ ژوئن اکسے۔ جن جب متغیر ہو کر تیز ہو جاتا ہے تب اسکو اؤ۔ ژوئن کہتے ہیں۔ ہوا میں اؤ۔ ژوئن اکثر ہوتا ہے مگر رات کے وقت بہ نسبت دن کے زیادہ ہوتا ہے اور یہ فائدہ مند ہے الا جب مقدار اسکی زیادہ ہوتی ہے اُس وقت شش کی نالیوں میں غرہش پیدا ہوتی ہے۔ بیمار کے کمرے میں جب ہوا کی آمد و رفت کا نظام ناقص ہوتا ہے تب اس میں اؤ۔ ژوئن نہیں ہوتا اور اور ہیفیہ کی وجہ سے پہلی ہوئی ہوتی ہے تب بھی ہوا میں مقدار اؤ۔ ژوئن کی بہت کم ہوتی ہے۔ جب ہوا میں برقی اثر کا گزر ہوتا ہے تب اور دیگر ترکیبوں سے بھی اؤ۔ ژوئن پیدا ہوتا ہے۔ جب اس میں حرارت آجاتی ہے تب بد لکر اکسے جز بن جاتا ہے چنانچہ جب سرنی۔ ٹے۔ گریڈ۔ تھرما۔ میٹر کا پارسو درجہ پر ہوتا ہے تب یہ تغیر آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے مگر ۳۰ درجہ میں اؤ۔ ژوئن فوراً بدل کر اکسے۔ جن بن جاتا ہے *۔

نایٹروجن۔ یہ ہوا میں سب سے زیادہ نہیں ہے بلکہ معمولی مقدار سے جب تھوڑا ہی زیادہ ہو جاتی ہے جیسا کہ گاہے گاہے قلیل عرصہ کے لئے ہو جاسکتا ہے تب بھی منضرحت نہیں ہے۔ نایٹروجن کی معمولی مقدار ہو اکسے ۱۰۰ حصہ میں ۷.۹ ہوتی ہے *۔

کار۔ با۔ نک۔ اسٹ۔ صاف ہوا مین کار۔ با۔ نک۔ اسٹ کی معمولی مقدار میں اختلاف ہو چیا پچھ ہوا کے ایک ہزار حصہ میں ۲۰ سے لیکر ۵۰ حصہ ہوتی ہے، مگر اوسط مقدار اسکی ۴۰ ہے اور اگر ۵۰ سے زیادہ ہو جاوے تب اس مقدار کو زیادہ تصور کرنا چاہئے۔ سمندر میں کار۔ با۔ نک۔ اسٹ کی مقدار نسبت زمین کے کم ہوتی ہے اور سمندر کی پوایں نسبت رات کے دن کو زیادہ ہوتی ہے۔ بشر کی کثرت سے کار۔ با۔ نک۔ اسٹ بھل جاتی ہے تب ہوا میں اسکی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ ہوا میں کار۔ با۔ نک۔ اسٹ کی مقدار ان سببوں سے عموماً زیادہ ہو جاتی ہے جیسے حیوانات کے سانس سے۔ انکے بدن کے بخارات سے۔ آگ کے جلنے سے اور اشیاء کے ٹھکانے سے۔ پس ان اضلاع میں کار۔ با۔ نک۔ اسٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جہاں آبادی گنجان ہوتی ہے *۔

دم چھڑنے کی ہوا کے ایک ہزار حصہ میں کار۔ با۔ نک۔ اسٹ ۴۰ حصہ ہوتا ہے۔ جو ان آدمی کے دم چھڑنے کی ہوا میں کہ جب وہ اپنے معمولی کار و بایں مصروف ہوتا ہے جو میں گنہ کے اندر ۱۲ سے ۱۶ مکعب فٹ کار۔ با۔ نک۔ اسٹ ہوتا ہے اور اسکی جلد سے بھی بخیر نیکر کی مقدار خارج ہو جاتا ہے * نصف سیریل کے جلنے سے قریب ۱۰ مکعب فٹ یہ ہوا پیدا ہوتی ہے * نصف سیر خشک لکڑی کے جلنے کے لئے ۱۲۰ مکعب فٹ ہوا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بالکل جل کر کھتر ہو جائے اور اسکے جلنے سے جو ہوا پیدا ہوتی ہے بہت ساحلہ کا کار۔ با۔ نک۔ اسٹ ہوتا ہے۔ مگر نصف سیر کوئلہ کے کامل طور پر جل جانے کے لئے ۴۰ مکعب فٹ ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس نتیجہ اسکے جلنے کا نرا کار۔ با۔ نک۔ اسٹ ہوتا ہے *۔

مٹرانہ کے معنی میں جاندار مادہ مین اکسے۔ جن کا بتدریج جذب ہو جانا جس سے اس مادہ کا کار۔ با۔ نک۔ اسٹ کوئلہ اکسے۔ جن کے جلنے سے کار۔ با۔ نک۔ اسٹ بن جاتا ہو *۔

بد رو کی غلاطت سے جو عفونت خارج ہوتی ہے اسکے سو حصہ میں سولہ حصے کار۔ با۔ نمک اسٹڈ ہوتا ہے اور بد رو کی ہوا میں فیصد ہی ۳ یا ۴ حصہ ہوتا ہے قبرستان کی ہوا میں ۱۸ حصہ میں ۹ و ۱۰ حصہ کار۔ با۔ نمک اسٹڈ ہوتا ہے اور جیلوں کی ہوا میں ۱۰ سے ۱۸ حصہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے ۰

اثر کار۔ با۔ نمک اسٹڈ کی ہوا کا۔ سانس کے ذریعہ زیادہ کار۔ با۔ نمک اسٹڈ سونگھا جاتا ہے تب بموجب سونگھنے والوں کے مزاج کے اسکا اثر مختلف طور پر نمایاں ہوتا ہے چنانچہ بعض اشخاص میں جب کار۔ با۔ نمک اسٹڈ باہر کی ہوا کے فی ہزار ۱۵ سے ۱۶ حصہ کی مقدار میں سونگھا جاتا ہے تب شدت کا درد سر ہوتا ہے بخیر اسکے اس سے بھی زیادہ کار۔ با۔ نمک اسٹڈ ملی ہوئی ہوا میں دم لیتے ہیں پھر بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب ہوا کے فی ہزار حصہ میں کار۔ با۔ نمک اسٹڈ پچاس سے سو حصہ ہوتا ہے تب اس ہوا میں سانس لینے سے آدمی مر جاتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب ہوا کے ہزار حصہ میں پندرہ حصہ سے کم کار۔ با۔ نمک اسٹڈ ہوتا ہے تب اس میں دم لینے سے خمار چڑھ جاتا ہے۔ ایسا قیاس کرتے ہیں کہ جب ہوا میں کار۔ با۔ نمک اسٹڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تب سل کی بیماری پیدا ہوتی ہے لیکن اس صورت میں علاوہ کار۔ با۔ نمک اسٹڈ کے اُن اشیاء فاسدہ کا بھی لحاظ رکھنا چاہئے جو دم چھوڑنے کی ہوا میں ہوتی ہیں صرف کار۔ با۔ نمک اسٹڈ کے یونے سے تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ خمار چڑھ جاتا ہے کیونکہ جب یہ ہوا زیادہ مقدار میں ہوتی تب خون میں اکسے۔ جن کا فی مقدار میں ملنے نہیں پاتا جس سے خون کا کاربن یعنی کوئلہ خون ہی میں رہ جاتا ہے اور شش سے کار۔ با۔ نمک اسٹڈ بنکر اچھی طرح خارج نہیں ہونے پاتا جب کسی مکان کی ہوا میں کار۔ با۔ نمک اسٹڈ زیادہ ہوتا ہے اور آسمان رہنے والے اس ہوا میں دم لیتے ہیں تو تھوڑے ہی عرصہ بعد ان کے

سورن میں دروہوں نے لگتا ہے اور دم گھیرتا ہے *

پانی کا بخار - ہوا جب پانی کے مقابلہ میں ہوتی ہے تب اس سے رطوبت جذب کرتی ہے۔ برآمدگی دم کی ہوا پانی کی بہانپ سے تر بتر رہتی ہے اور ایک جوان آدمی کے شش اور جلد سے ۲۴ گھنٹہ کے اندر ۲۵ سے ۴۰ آؤں تک پانی شکل بخار خارج ہوتا ہے اور جب لکڑی جلتی ہے تب اس سے بھی پانی بہانپ بنکر خارج ہوتا ہے۔

نایٹرک اسٹ - ہوا میں کسی قدر نائے - ٹرک اسٹ ہمیشہ موجود ہوتا ہے اور زیادہ بارش کے بعد اور ہوا میں جب برقی اثر زیادہ ہوتا ہے تب نایٹرک اسٹ کا ہونا صاف پایا جاتا ہے مگر اس کا اثر انسان کے صحت پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔

ایمو - نیا - صاف ہوا میں ایمو - نیا کے آثار بھی پائے جاتے ہیں اور شدت سے مینہ برسنے کے بعد ہوا میں یہ شے زیادہ ہو جاتی ہے اور کوئلہ کے جلتے وقت بھی یہ شے پیدا ہوتی ہے مگر ہوا میں اسکی مقدار کبھی اتنی نہیں ہوتی کہ جس سے صحت کو نقصان پہنچے ان شاید اتنا ہو کہ آنکھ میں جلنے لگیں * بد روکی ہوا اور ان کے پانی میں ایمو - نیا کا جزو ہوتا ہے۔ قبرستان کی ہوا میں یہ شے بکثرت ہوتی ہے اور گاہے گاہے جہیلوں کی ہوا میں بھی ہو کرتی ہے *

مفصل بیان ہوا کی کثافتوں کا - ہوا میں دو قسم کی کثافتیں ہوتی ہیں - سمجھ یا ہوائی - سمجھ تو اس میں تیرے پھر ہوا میں اس کے ساتھ مل کر جزو بنجاتے ہیں * سمجھ کثافتیں دو قسم کی ہوتی ہیں - ایک ان - آر - گے - نکٹ یعنی غیر جاندار - دوسری آر - گے - نکٹ کثافتیں جن میں جان پڑ جائیگی قابلیت ہوتی ہو * ان - آر - گے - نکٹ سمجھ کثافتیں یا تو زمین سے یا سمندر سے ہوا میں اٹھتی ہیں اور علامات سے اور بعض مٹیوں کے سامان سے بھی پیدا ہو کر ہوا میں طہ جاتی ہیں مثلاً باریک سنگ ریزہ - کھڑیا مٹی اور صرف مٹی کے باریک ریزے القطرہ کے انفر اور گندہک

دیگر۔ کہانے کا نمک جو سمندر سے یا زمین سے پیدا ہوتا ہے علی العموم ہوا میں ملا ہوا ہوتا ہے۔ اور لوہے اور پتھر کاٹنے کے کارخانوں سے بھی ان دھاتوں کے ذرات اڑ کر ہوا میں مل جاتے ہیں *

آر۔ گے۔ ناک بمخدر اجزا ہوا میں بکثرت ہوتے ہیں اور یہ مختلف قسم کے اور زیادہ تر مضر ہوتے ہیں۔ آندھی جب زمین سے خاک و گرد اڑا لیتی ہے تب اسکے سو حصہ میں ۳۶ سے ۴۶ حصہ آر۔ گے۔ ناک قسم کے بمخدر شیا ہوتے ہیں کہ خنجر جان پڑ جانے کی قابلیت ہوتی ہے اور پانی جب بخیر بن کر اڑتا ہے خاص کر جبیلون کا پانی تب اس سے بکثرت جاندار مادے اڑ کر ہوا میں مل جاتے ہیں جیسے حیوانی اور نباتاتی مردہ مادے۔ نہایت خرد خرد کرم جنکو اصطلاح میں پکٹ۔ پڑا کہتے ہیں کرمیوں کے انڈے نباتات کے بیج وغیرہ وغیرہ *۔ ب۔ ر۔ رو کی ہوا میں گوشت اور دودھ بہت جلد بگڑ جاتا ہے کیونکہ اس میں حیوانی اور نباتاتی جاندار مادی بکثرت ہوتے ہیں۔ ہوا میں بال پشم رومی کے ریشہ وغیرہ کارخانجات سے اور لوگوں کے رہنے کے مکانات سے اڑ کر جاتے ہیں * اور پیپ کے کیسے بول براز کے اجزا خشک اور نہایت باریک اور بدن کی وہ کثافتیں ہی جو جلد و ریشہ کے ذریعہ خارج ہوتے ہیں ہوا میں جاتے ہیں اور اسکو کثیف کر دیتے ہیں اور یہ اجزا ایسے مکانات سے پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہوا کی آمد و رفت کا اچھا بندوبست نہیں ہوتا اور شفا خانہ جات سے پیدا ہو کر ہوا میں مل جاتے ہیں * یہ مضر مادے جو ہوا میں ہوتے ہیں کئی طور سے صحت میں خلل ڈالتے ہیں۔ مثلاً آنکھ آتی ہوئی کی پیپ کے کیسے اڑ کر کسی تندرست آدمی کی آنکھ میں پڑ جائیں تو اسکی آنکھ آجائیگی۔ بعض پے۔ را۔ سائٹ قسم کی جلد کی بیماریاں اور ایسی سو پے لٹر بھی انہیں بیماریوں کے مادہ سے ہوا کے ذریعہ پیدا ہو سکتے ہیں * اور ٹائی فائیڈ

فیور کا زہر بھی ہوا ہے آدمی کے رودون میں آہل ہو کر اس مرض کو پیدا کر سکتا ہے
ناک اور شش کے میوہ کس پردہ میں دماقی ذرات رومی کے اور شش کے ریشہ داخل
ہو کر خراش کر سکتے ہیں جس سے برا نکائی۔ ٹنٹن اور دیگر امراض شش پیدا ہو سکتے ہیں
جس ہوا میں ہیفہ اور ٹائی۔ فس اور ٹائی۔ فائیڈ فیور اور ڈی۔ سنٹری اور چھپ
اور اسکار۔ لے۔ لے۔ نایا۔ زلس کا زہر ہوا سکے سو گھنٹے سے وہ زہر غزل
کو لگا کر ان امراض کو پیدا کر سکتا ہے۔ اور شاید سل کی بیماری بھی مگر حیوانات
کے پلو۔ رو۔ نیو۔ مو۔ نیا کا مرض تو ضرور ہے بلغم کے ذریعہ حیوانی زہرون سے
پیدا ہون مضر مادہ شش کے وسیلہ سے خون میں داخل ہو جاتا ہے۔ چونکہ فیتل
ہوا میں صرف تیرے پرتے ہیں اور اسکا جرد نہیں بنتے ہیں وہ غالباً شش
میں نہیں پہنچ سکتیں الا جب بہت ہی باریک ہوتی ہیں بلکہ ناک کے نہنوں
میں حلق یا دہن کے اندر چھٹ کر رہ جاتے ہیں پھر انکو آدمی نگل جاتا ہے اور اس
ترکیب سے وہ کثافتیں معدہ اور رودون میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہاں تک
آ جاتے ہیں تب خراش کر کے ڈس۔ پیپ۔ شیا وغیرہ مرض پیدا کر دیتے ہیں
اور اگر ان کثافتوں میں خاص بیماریوں کا زہر موجود ہے تو رودون کے میوہ
پر وہ کے وسیلہ سے وہ خاص بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب ایسی بیماریاں
جوشش کی نہیں ہوتی ہیں ہوا میں تیرے ہوئے غیر اجزا کے سبب سے پیدا
ہوتی ہیں تب وہ خراشش کے وسیلہ سے خون میں نہیں پہنچتے بلکہ غالب ہو
کر آدمی انکو نگل ہی جاتا ہے اور تب معدہ کے وسیلہ خون میں داخل ہو کر ان
امراض کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ قاعدہ صرف ان بیماریوں کے پیدا ہون کی نسبت
نہیں راست آتا جو غدار زہریلے مادوں سے پیدا ہوتی ہیں وہ امراض بھی
اسی قاعدہ سے پیدا ہوتے ہیں جو بار اور تابا اور سیسہ اور سنگیہ کے زہر

میں سے جاسکتا ہے جاہل و کرموں کے انہوں یا مردوں

کے سبب سے ہوا کرتے ہیں۔ عسکاج اس قسم کے موذی مادوں کے اثر سے محفوظ رہنے کا یہی ہے کہ اس جگہ جہاں یہ مادے موجود ہوں حرارت پیدا کریں ایسے ڈس۔ این۔ فکٹ۔ ٹنٹ چیزوں کو کام میں لادیں جن سے وہ مادے زائیل ہو جائیں اور ان ترکیبوں سے بھی وہ مادے انسان کے جسم میں داخل نہیں ہونے پاتے جیسے روتی کے اس۔ پانی۔ رے۔ ٹرے سانس لینا۔ کیونکہ روتی کے ریشوں میں ہوا کے بمخدرات پہنچ جاتے ہیں اور مصنوعی ترکیب سے کارخانہ جات میں ہوا کے تیز دھار چوڑنے سے۔ اور قدرتی ترکیبوں سے بھی ہوا کی کثافت کے بمخدرات کی مقدار کم ہو جاتی ہے مثلاً جو انہیں سے زیادہ تر زنی ہوتے ہیں وہ تو خود بخود زمین پر گر پڑتے ہیں۔ دوسروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ بارش سے دھلک کر زمین پر آ جاتے ہیں یا حل ہو کر پانی کے ساتھ بہ جاتے ہیں اور انہیں سے جو مادہ جاندار ہوتا ہے اُس میں تبدیل رج اسے جن مل جاتا ہے اور تب وہ کار۔ بانک۔ اسٹ اور پانی کی شکل بن کر یا کسی اور ہوائی شکل میں ہو کر تبدیل ہو جاتا ہے *

ہوا کی لطیف کثافتیں۔ یہ ہیں فاسد بخارات۔ جیلون کی ہوا۔ سلفو۔ رے۔ ٹڈ۔ ٹائیڈ۔ رو۔ جن۔ * سلفورٹ۔ اف۔ ایو۔ نیا۔ * سلفورٹ۔ سل۔ فیو۔ رک۔ اسٹ۔ * ٹائیڈ۔ رو۔ رکلو۔ رک اور ناسے۔ ٹرس۔ اسٹ وغیرہ * ان سب میں فاسد بخارات ہی زیادہ مضر صحت ہیں * یہ فاسد بخارات انسان یا حیوانات کے جسم کے سڑ جانے سے پیدا ہوتے ہیں * مگر سب سے بڑا بھاری مہلک پیدا ہونے کا وہ بخیر ہے جو انسان یا دیگر حیوانات کے پسینہ اور سانس سے پیدا ہوتی ہے اور اگرچہ یہ فاسد بخارات بد رو اور قبرستان کے ہوا میں بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ فاسد مادے نہایت مضر اور بکثرت ہوتے ہیں جو ایسے مکانات میں جمع ہو جاتے ہیں جنہیں ہوا کی آمد و رفت کا اچھا بندوبست نہیں ہوتا اور جنہیں آدمی بکثرت

رہتے ہیں کیونکہ آدمی کے پیٹ پر سے اور جلد کے وسیلہ سے بہت زیادہ فاسد مادہ پیدا ہوتا ہے اور شفا خانون اور ایسے کروں مین تو بہت ہی کثرت سے ہوتا ہے کہ جہاں بیا اور زخمی ہوا کرتے ہیں کیونکہ وہاں عسل اوہ سانس کے معمولی کثافتوں کے جلد کے بخارات اور بول و براز اور پیسا اور خون کی عفونت بھی ہوا مین ملجاتی ہے۔ یاد رہے کہ جو ہوا سانس چھوڑنے سے باہر نکلتی ہے اس مین کئی قسم کے زہریلے جملے ہوتے ہیں۔ جو فاسد بخارات پیٹ پر سے اور جلد سے پیدا ہوتے ہیں ان مین ایک خاص قسم کی سبائیز بدبو ایسی ہوتی ہے کہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی ناکوں کو محسوس ہو جاتی ہے چنانچہ سپاہیوں کی بارگ جلیخا نون اور مدرسوں کے کمرے اور وہ مکانات جن مین کو کچھ سے ٹنگ منقذ ہوتی ہے اور لوگوں کا وہاں زور و کام ہوتا ہے جب ان مین ہوا کی آمد و رفت کا اچھا بندوبست نہیں ہوتا ہے تب لوگوں کے شش اور جلد سے ایسے بدبو بخارات خارج ہوتے ہیں کہ ناکوں کو فوراً محسوس ہو جاتی ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ جو لوگ وہاں ہوتے ہیں ان کو وہ بدبو محسوس نہیں ہوتی لیکن جب کوئی شخص باہر سے اُن مکانات کے اندر داخل ہوتا ہے تب وہ فوراً تاڑ جاتا ہے ۔

جھیون کی ہوا۔ جھیون مین یہ ہوا اکثر ہوتی ہے اور وہاں بناتی مادوں کے گل جانے سے پیدا ہوتی ہے اور پتھر کے کوئلہ کے ہوا کا یہ خرد عظیم ہے اگر یہ ہوا برابر سوگھنے مین آوے تو صحت کو ضرر مضر پڑتی ہے ۔

سل۔ فیو۔ رے۔ ٹڈ۔ ٹائیڈ رو۔ جن۔ یہ ہوا ایسی جاندار اشیا کے مٹر جانے سے پیدا ہوتی ہے جن مین گندہک ہوتی ہے اور گاہے گاہے کوئلہ اور کٹری کے جلنے سے بھی پیدا ہوتی ہے اور گندگی مین بھی بکثرت ہوتی ہے۔ اس ہوا کے سوگھنے سے جسم مین کس قسم کا اثر پیدا ہوتا ہے اس بات پر اسے مین اختلاف ہے۔ لیکن اس بات مین تو شک نہیں ہے کہ خالص سوگھی جائے تو ہلاک کر دیتی ہے۔

نکسب سے بڑھ کر فاسد بخارات زیادہ مضر ہوتے ہیں

لیکن جب تھوڑی تھوڑی مقدار میں عرصہ تک سونگھی جاتی ہے تب کمزوری پیدا ہوجاتی ہے بہوک جاتی رہتی ہے اور انے - میا ہوجاتا ہے ۔

اثر کشیف ہوا میں دم لینے کا - واضح ہو کہ کشیف ہوا میں سانس لینے سے نہ صرف خاص بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بلکہ صحت کو بھی نقصان پہنچتا ہے چنانچہ وہ لوگ جو اس قسم کی ہوا میں دم لیتے ہیں طبیعت انکی بیماری میں مبتلا ہونے کے لئے مایل رہتی ہے اور وہ بیماری نہایت شدت سے ظاہر ہوتی ہے اور جب وہ مرض رو بصحت لاتا ہے شفا رکھتی عرصہ بعد ہوتی ہے - ایسے لوگوں کی عمر کم ہوجاتی ہے اور مرتے ہی زیادہ ہیں ۔ ہوا کی جن کثافتوں کا ذکر اوپر ہوا ہے چونکہ انہیں سے کوئی ایک تنہا نہیں ہوتی بلکہ مختلف حالات میں مختلف طور پر ملے جلتے ہوتے ہیں اور اثر بھی انکا مختلف ہوتا ہے تو ان کے اثر دن کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنا ضرور معلوم ہوتا ہے پس -

ہوا ان کمزورین یا مکانات کی جنکی تھوڑی سی جگہ میں آدمی ہنترتے ہیں - اس ہوا کے بہت سے حصے میں پانی کا پہاںپ اور کار - با - ٹکٹ اسٹ ہوتا ہے اور بدبودار اور نہایت زہریلے جاندار بخارات بھی ہوتے ہیں جو باشندگان کے شش اور جلد سے پیدا ہوتے ہیں - پس اس ہوا میں دم لینے کا اثر عمدہ طور پر معلوم ہوجاتا ہے چنانچہ اس میں دم لینے کے چند گہنہ لکچہ بخار کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں - جسم گرم ہوجاتا ہے - نبض سیرج ہوجاتی ہے - زبان میلی ہوجاتی ہے - بہوک جاتی رہتی اور تشنگی کا غلبہ ہوتا ہے وغیرہ - اس ہوا سے باہر نکل آنے کے بعد بھی یہ علامتیں کئی دن تک جاری ہتی ہیں ۔ جب بہ نسبت آدمیوں کے قدر و کی رہنے کی جگہ بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے تب سبب کم ہوجانے اکسے - جن کی مقدار کے دم گہنٹنے لگتا ہے اور فاسد بخارات کے زہر کے سبب سے جو باشندگان کے پسینہ اور شش

سے پیدا ہوتے ہیں انہیں سے ایسے تو جلد ہلاک ہو جاتے ہیں چکی طبیعت اس نہر کو جلد متبول کر لیتی ہے اور اوروں کا جو زندہ رہتے ہیں وہی حال ہوتا ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور جن لوگوں کی عادت ایسی ہو امین رہنے کی ہے جو برآمدگی دم کی ہوا سے تھوڑی سی کیف ہو گئی ہو انکی صحت کو بہت ہی نقصان پہنچتا ہے اور یہ نقصان ایسی حالتوں میں زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب کہلی ہو امین ریاضت نہیں کھاتی ہے جیسے خیاط اور مدرسوں کے لڑکے ہوا کرتے ہیں۔ چہرہ انکا پیلا پڑ جاتا ہے۔ ہواک مر جاتی ہے۔ حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ طاقت گھٹ جاتی ہے۔ اور انکی صحت اس قدر بگڑ جاتی ہے کہ دبا سی اور متعدد ہی بیماریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور ایسے لوگ سب اور دیگر امراض شش میں مبتلا ہونے کے لئے مایل ہوتے ہیں اور گائے گھوڑے اور دیگر حیوانات بھی اس قسم کی ہوا میں عرصہ تک رہتے ہیں تو مثل انسان کے بیمار ہو جاتے ہیں *

جن کمزور یا کمکانات میں بیمار رہتے ہیں انکی ہوا میں تو زیادہ کثافتیں مل جاتی ہیں کیونکہ جاندار مادوں کی انہیں کثرت ہو جاتی ہے۔ اگر ان مادوں کے دگر کرنے میں کوشش نہ کی جائے تو طبیعت اس قدر کمزور ہو جاتی ہے کہ ان مریضوں کی بیماریاں شدت پکڑ جاتی ہیں اور انہیں سے جو رو بصحت لاتے ہیں وہ عرصہ تک لٹکے رہتے ہیں عسلا وہ ازین وہ خاص بیماریاں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں جنکے پیدا ہونے کے اسباب اگر دور نہ کئے جائیں تو جمع ہوتے رہتے ہیں *

آگ کے چلنے کی کثافتیں اکثر جمع نہیں ہوتے پائین۔ ہندوکانوں میں جو تیار جلتی ہیں انکی کثافت آمیز ہو امین دم لینے سے بعض دفعہ دوسر ہو جاتا ہے اور دم گھٹنے لگتا ہے۔ جب کوئی شخص ایسے بند اور گرم مکان سے نکلے یا ہرچلا جاتا ہے تب وہ بیمار ہو جاتا ہے *

بدر رو کی ہوا۔ اسمین بعض اخرا تو ایسے ہوتے ہیں جنکے سو نگینے سے دم گٹھنے لگتا ہے اور بعض بالکل زہر کا کام کرتے ہیں چنانچہ اسی واسطے سور یون اور بدر روؤن کے صاف کر نیوالے گاہے گاہے ہلاک ہو جاتے ہیں اور اسی واسطے اُن لوگوں کو اکثر بڑبھنی ہتی ہر اور دست آتے ہیں اور انکی انگلیں ہمیشہ آئی ہوتی ہوتی ہیں۔ اور جس ہوا کا تعلق بدر رو کی ہوا سے ہوتا ہے اسمین برابر دم لینے سے درد سر ہو جاتا ہے۔ جی متلائے لگتا ہے دست آتے ہیں اور تمام بدن سست رہتا ہے اور جب عرصہ تک اسمین دم لیا جاتا ہے تو صحت میں بہت ہی خرابی پڑ جاتی ہے اور انے۔ میا ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ایسا ہی دیکھا گیا ہے کہ گاہے گاہے تھوڑے عرصہ کے لئے بخار ہو جاتا ہے اور دروسر اور ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ اور بدر روؤن میں چونکہ براز کے بخیر بھی ہوا کرتی ہے تو اسکے سو نگینے سے اسہال ہو جاسکتا ہے خاص کر جب وہ زہریلی بخیر زیادہ حرارت اور خشکی کے سبب سے تیز ہو جاتی ہے۔ اور اسی بدر روؤن کی ہوا میں دم لینے سے ٹائی۔ فائینڈ فیور بھی ہو جاتا ہے +

بول و براز۔ جہان کہیں پیشاب اور پاخانہ کا ڈھیر ہوتا ہے اور اُس جگہ کی ہوا ان سے گندمی ہو جاتی ہے تو وہ ضرور صحت کو نقصان دیتی ہے لیکن بول و براز کو زمین پر پھیلا دیا جاتا ہے تب وہ چند ان ضرر نہیں پہنچاتے گو وہ مکروہ ہوتے ہیں کیونکہ ان سے جو بخیر پیدا ہوتی ہے وہ باہر کی ہوا کے ساتھ فوراً مل جاتی ہے۔ لیکن جب بول و براز کو ٹی میں ملا دیتے ہیں تب انکی خاصیتیں دور ہو جاتی ہیں گو بجاری کا خاص زہر اس ترکیب سے زایل نہیں ہو سکتا جیسے انٹے۔ رکن فیور کا زہر اور جب بہتے ہوئے دریا میں اس قسم کی گندگی چھوڑی جاتی ہے تب ہی پانی میں مل جانے کے سبب سے اسکا مضر اثر دور ہو جاتا ہے +

قبرستان۔ قبرستانوں میں یا انکے قوب و جوار میں بود و باش کرنا بھی ضرر مند

مضر صحت ہے اور اگرچہ اس مقام کی کثیف ہوا سے کوئی خاص قسم کی بیماری نہیں پیدا ہوتی تاہم دھان کے باشندوں کی صحت استفادہ بگڑ جاتی ہے کہ طبیعت انکی مہلک بیماریوں کے حملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایسے مقام کے پانی کے پینے سے بھی صحت کو ضرر پہنچتا ہے۔ بعض دفعہ خنازہ کے ساتھ جانا ہی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔

جھیلوں کی ہوا۔ جھیلوں کی ہوا اور دیگر مقامات کی ہوا ایسی کہ جہاں نباتاتی مادہ لگنے لگتا ہے باری کے تپوں کو پیدا کرتی ہے۔ طحال میں اجتماع خون کا ہو جاتا ہے۔ خون تیز ہو جاتا ہے اور عمر کم ہوتی ہے اور بعض اوقات ڈی۔ شری کی بیماری بھی ہو جاسکتی ہے اور علاوہ اس ہوا کے ایسے مقامات کے پانی سے بھی وہی نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔

مچھل بیان ہوا کی کثافتوں کا۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے بڑے بڑے قدرتی کام ہوتے رہتے ہیں جن سے ہوا کثیف ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پہلے حرکات تنفس لینے دم لینا ہے۔ حیوانات کے ہر سانس کی حرکت سے کچھ نہ کچھ ہوا کثیف ہو جاتی ہے مثلاً ہوا کا بخروا عظیم اکسے۔ جن سے جیسپر زندگی منحصر ہے۔ اس بخرو کا کچھ حصہ پیڑ و درخت جاتا ہے اور اسکی جگہ وہ فاسد مرکب پیدا ہو جاتا ہے جسکو کار۔ بانٹ اسٹگاس کہتے ہیں اور یہی ہی بہت سا پانی کا بخار اور مختلف قسم کے مرکبات فاسد بھی جو جسم میں پیدا ہوتے ہیں ہوا میں ملتے ہیں۔

جس سے کہ ذکر آگے کیا جائیگا اسکے بند مرتبان کے اندر مرجانے کا ایک تو یہ سبب تھا کہ ہوا میں سے اکسے۔ جن گاس صرف ہو گئی۔ اور زندگی قائم رکھنے کے واسطے اس گاس کے سوانہ کار۔ بانٹ اسٹگاس کہتے ہیں نہ پانی کا بخار اور دوسرا سبب وہ فاسد مرکبات تھے جو جلنے کے فعل کو اصطلاح میں کم۔ بٹس۔ جن کہتے ہیں اس سے بھی ہوا کثیف ہو جاتی ہے کیونکہ ہر ایک چیز کے جلنے کے لئے آگ۔ سے۔ جن کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ جل نہیں سکتی۔ اور اس کے جلنے سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا

بہت ساحصہ نہی فاسد کار۔ بانک اسٹڈ گھاس کمی ہو لکا جڑو ہوتا ہے جو سانس کے ساتھ نکلتی ہے۔ اگر چہ ہے کی جگہ تم ایک بند مرتبان میں کسی جلتی ہوئی چیز کو رکھ دو تو وہ بھی جلد بچھیر جائیگی کیونکہ اکسے۔ جن جلد خچ ہو جاتی ہے اور بغیر اکسے۔ جن کے کوئی شے جل نہیں سکتی ہے +

اشیا کے سڑ جانے سے بھی ہو اکشیف ہو جاتی ہے اور یہ مادہ ہے کہ کل اجزاء حیوانی یا نباتی مرنے کے تھوڑی دیر بعد سڑنے لگتی ہیں۔ اور گرم ملکوں میں تو اور ہر وہ مرے اور سڑنا شروع ہو گئی تب ان سے مختلف قسم کی ہوائیں پیدا ہوتی ہیں جن میں سے بعض نہایت زہریلی بھی ہوتی ہیں۔ آدمی اور جانوروں کے مردے اور کل مردہ نباتات یا انکے کچھ کچھ حصے سڑتے اور لگتے ہیں پھر ان سے فاسد ہوائیں پیدا ہوتے ہیں + انہی میں زندہ حیوانوں کے فضلے بھی شامل ہیں مثلاً پسینہ جو جلد سے نکلتا ہو بول دہرا ز اور بیکار اجزاء جو گل زندہ حیوانات کے جسم سے نکلتے ہیں اور انہیں سے بعض ایسے ہیں کہ کہیں کہیں جسم سے جدا ہونے سے پہلے ہی بوسیدہ ہونے لگتے ہیں علاوہ اسباب مذکورہ بالا کے زمین کے بخارات سے بھی ہو اکشیف ہو جاتی ہے کیونکہ زمین جیسی کہ ہم کو معلوم ہوتی ہے اس طرح ٹھوس مٹی یا ریت کا ڈلا نہیں ہے جسکے اندر کوئی شے محفوظ نہ کر سکے بلکہ سطح زمین اور اس بانی کی سطح کے مابین جو اسکے نیچے ہوتا ہے ہوا کی آمد و رفت کم و بیش جاری رہتی ہے اور یہ ہوا زمین سے نکلکے باہر کی ہوائیں ملتی ہے۔ پس اگر زمین میں کوئی شے ایسی ہو جس سے اسکی ہو اکشیف ہو سکتی ہے تو وہ کثرت زمین کے مسامات کے رستے ہوا کے ذریعہ سے اوپر نکل آئیگی اور باہر کی ہوا کو اکشیف کر دیگی جو ہمارے سانس کے کام میں آتی ہے۔ کل جاندار مادے جو انسان یا اور حیوانات کے جسم سے نکلتے ہیں لوگ انہیں بالکل مضر صحت نہیں سمجھے اور یہ نہیں جانتے کہ انہیں اثر پہ ہوتا ہے اور اس خیال سے کہ زمین ہی یہ پڑا رہنے دیتے ہیں گھاس بھوس پتے

اور آؤر نباتی اجزاء جو گلنے لگتے ہیں انہیں بھی اُثر پیدا ہوتا ہے۔ اس اثر کی بدی اسوقت زیادہ تر بڑھ جاتی ہے جب زمین سیلی ہوتی ہے کیونکہ زمین کے اسطرح سیلنے سے وہ خیریز جلد مٹنے لگتی ہیں اور اُس سیل پہنے پانی کے بخار کو ہوا اُڑا لی جاتی ہے جس سے ایک مضر صحت مروجی پیدا ہوتی ہے۔ زمین علی العموم مرطوب یعنی سیلی ہوتی ہوتی ہے اور اسی سیل اور مٹری ہوتی نباتات کے باعث اُن مقاموں کی ہوا جہاں دلدل ہوتی ہے مضر صحت ہو جاتی ہے اور اگرچہ دلدل کی مقدار دور دورا رہی ہو تو وہی ہوا کے جھوکے اُسکی کثافت کو شہر دن اور گاؤں میں اُڑا لی جاتے ہیں۔ گہر کے روزمرہ کے ایسے کاموں سے جیسے نہانا۔ دھونا۔ کھانا پکانا ہے جو جو کثافتیں پیدا ہوتی ہیں اگر انہیں ماحیہ تمام منع دفع نہ کیا جائے تو اُن سے ہی ہوا کثیف ہو جاتی ہے۔

بعض پیشے اور حرفے بھی ایسے ہیں کہ جیسے ہوا کثیف ہو جاتی ہے۔ مثلاً چٹار نگنے والے قسائی رنگ ساز وغیرہ جنکا پیشہ حیوانات و نباتات کے اجزاء سے مردہ سے تعلق رکھتا ہے ہوا کو کم و بیش کثیف کر دیتے ہیں اور بعض اہل حرفہ ایسے بھی ہیں جنکی مشینا سے چھوٹے چھوٹے کر کے یا آؤر قسم کے اجزاء ہوا میں اُڑا کر لجاتے ہیں۔ مثلاً سوسن گر۔ سان گر یا کارخانوں میں کام کرنے والے غرض یہ چھوٹے چھوٹے کر کے یا آؤر قسم کے اجزاء بھی جب ہوا میں سے سانس کے ذریعہ ہپٹرسے میں پہنچتے ہیں تو ان سے بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔

پاک اور صاف ہوا کی ضرورت۔ پانی یا غذا کے بغیر تو آدمی کچھ دن جی بھی سکتا ہے لیکن ہوا بغیر چند منٹ کے اندر ہی مر جاتا ہے۔ پس زندگی کے کل ضروریات میں سے ہوا نہایت ضروری چیز ہے اگرچہ ہوا کو تو تم دیکھ سکتے ہو نہ معلوم کر سکتے ہو جب تک کہ تم سے آکر نہ کہائے اور اسوقت اُسکو چھو یا جھکڑ لیتے ہیں تم ہمیشہ ایک بڑے ہوا کے کمرہ میں رہتے رہتے ہو اور اُسکی تہ میں اسطرح چلتے پرتے ہو جس طرح

مچھلیاں پانی کی تہ میں چلتی پہرتی ہیں۔ پس چونکہ زندگی کے واسطے ہوا ایک نہایت ضروری چیز ہے تو تندرستی کی واسطے بھی پاک اور صاف ہوا کا ہونا ایک امر ضروری ہے اگر کسی جانور کو گھٹتی ہوئی ہوا میں بند کر دو مثلاً ایک چوہے کو کسی شیشے کے مربان میں تو پہلے وہ مانپنے لگیگا اور پھر مرجائیگا۔ ایسا کم اتفاق ہوتا ہے کہ ہوا ایسی کثیف ہو جائے کہ آسمین حیوانات زندہ نہ رہ سکیں مگر اسقدر کثیف تو بار بار ہو جاتی ہے کہ جو آسمین رہتے ہیں انکا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ تندرستی میں مشرق آ جاتا ہے اور انواع و اقسام کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

ہوا کے پاک کرنے کے قدرتی عمل۔ تم نے دیکھ لیا کہ ہوا کو کثیف کر دینے کے بہت سے سبب ہیں جو ہمیشہ جاری رہتے ہیں پس اگر قدرتی ترکیبوں سے انکا دفعہ نہوتا رہتا تو زندگی محال ہو جاتی مگر بعض ایسے قدرتی قانون ہیں جو بہت کچھ اسبابی کو رفع کر دیتے ہیں۔ اول مختلف قسم کے گاسون کا منتشر ہوتے رہنا جس سے خود بخود فاسد ہوا میں پرگندہ ہو کر عام ہوا میں مل جاتی ہیں۔ دوسرے ہوا کا تیز چلنا جس سے مختلف ہواؤں کا آپس میں مبادلہ ہو جاتا ہے۔ تیسرے جو کار۔ بانک۔ اسڈر زندہ حیوانات و نباتات سے بکثرت پیدا ہوتی ہے اس کے اجزا کو ہرے پودوں کا عید کر دینا اور اسطرح اکسے۔ جن کو خالص کر کے ہوا میں ملا دینا۔ پس یہ تین ترکیبیں ہوا کی صفائی کی ہیں جو کہ ہمیشہ ان کثافتوں کے بہت سے حصہ کو صاف کرتی رہتی ہیں جو اوپر کی صورتوں سے پیدا ہو کر تھی ہیں۔

مگر افسوس یہ ہے کہ لوگ اکثر ان صفائی کی ترکیبوں کو کارگر نہ ہونے نہیں دیتے۔ وہ ہوا میں کثافتیں پیدا کرنے کے علاوہ اپنی جان کو ایسے گھٹے ہوئے گہروں میں بند کر دیتے ہیں جہاں کثافتوں کے صاف کرنے میں ان قدرتی ترکیبوں کی بہت تھوڑی بلکہ کچھ ہی پیش ہنیں جاتی اور شہروں میں مکانات ایسے گنجان بناتے ہیں

ہین کہ اکثر لوگ نہایت تنگ جگہ میں رہتے ہیں اور اسلئے کثیف ہوا میں دم لینے سے جو ضرر ہوتا ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے ۛ

ہوا کے پاک کرنے کی مصنوعی ترکیبیں - بذریعہ دوس - ان - فکٹ - ٹرنٹ چنیز اور ہوا کی آمد و رفت کے عمدہ بندوبست سے ہوا پاک ہو جاتی ہے -

دس - ان - فکٹ - ٹرنٹ اشیاء - مصنوعی ترکیبوں سے ہوا کی عفونت دفع کرنے کے لئے جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے - انکو اصطلاح میں ڈس - ان - فکٹ - ٹرنٹس کہتے ہیں - یہ وہ اشیاء ہیں جو ہوا کی ایسی کثافتوں کو یا تو زایل کر دیتی ہیں یا پیدا نہیں ہونے دیتی ہیں جو مضر صحت ہیں ۛ ڈس - ان - فکٹ - ٹرنٹ اشیاء اپنا اثر اسطور پر پیدا کرتی ہیں کہ مضر گیس ہواؤں یا بخارات کے اجزاء کو الگ الگ کر کے ایسے جزو یا مرکبات پیدا کر دیتے ہیں جو مضر صحت نہیں ہیں یا گندہ ہونے اور خیر ٹھہرنے کی ترکیبوں کو رد کر دیتے ہیں یا ان جاندار جرم یعنی تخم کو ہلاک کر ڈالتے ہیں جن سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یا جاندار سمیتات کو زایل کر دیتی ہیں یا گندہ ہونیوالی اشیاء کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ ان میں اکسے جن گیس جلد لمجائے اور وہ گندہ ہونا نہ پاویں ۛ ڈس - ان - فکٹ - ٹرنٹ اشیاء میں قسم کی ہوتی ہیں اول منجھ - دوم ستیال - سوم ہوائی ۛ

اول منجھ ڈس - ان - فکٹ - ٹرنٹ اشیاء - ان سب میں سے کوئلہ بہتر ہے - یہ چنیر سلیف - رمی - ٹیڈ - ٹائیڈ رو - جن گیس اور دیگر ہوائی اشیاء کے اجزاء کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیتی ہے جو نباتاتی اور حیوانی مادہ کے مٹ جانے سے پیدا ہوتے ہیں - علامہ ازین کوئلہ مضر کے لطیف جاندار عفونتوں کو بھی اپنے اندر جذب کر کے اُس اکسے - جن گیس کے ساتھ مخلوط کر دیتا ہے جو اسلئے مسامات کے اندر موجود ہوتی ہے اور اس ترکیب سے عفونت مٹے مذکورہ کو ضرر رسان ہونے نہیں دیتا - لیکن کوئلہ کا سیدھا اثر ان کثافتوں پر نہیں ہوتا جو ہوا میں بہتے بہرتے ہیں لیکن ان ہوا کے

بعض ایسی حالتوں کو دور کر دے سکتا ہے جن سے مرض پیدا کہہ نیوالے جاندار مادے کے نشوونما ہوتی ہے۔ کوئیک چونکہ سستا اور کارگر ڈریس۔ ارن۔ فیکٹ پٹرنٹ ہے اسکو شفاخانوں کے ڈاکٹرس میں اور جاسے ضرور دین میں اور بدرون میں اور دیگر ان کل مقامات میں ہونا چاہئے کہ جہاں بدبو اور مضرت عفونیتیں ہوا کرتی ہیں۔ مگر کوئیک کو خوب طسرج کوٹ کر پچھا دینا چاہئے مگر یاد رہے کہ کوئیک جب ایک مرتبہ استعمال میں آجاتا ہے تب ازہنیز کرنا مکرر دوبارہ جلا کر استعمال کیا جاوے نہ مثل سابق کے کارگر سے جاتا ہے۔

خشک مٹھی۔ خاصہ کہ جب اسمین کنکریلی اجزا اور اس قسم کے پورے رنگ کے بہرہری مٹی بھی ملی ہوئی ہوتی ہے جو نباتاتی اور حیوانی اجزا پر ہوا کے اثر سے بن جاتی ہے اور جسکو اصطلاح میں پٹوئیس کہتے ہیں۔ غرض اس قسم کی سوکھی مٹی عفونتوں کو خوب جذب کرتی ہے۔ لیکن اس بارے میں کوئیک کی نسبت کم اثر رکھتی ہے۔ اگرچہ سوکھی مٹی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جاندار مادہ کو یا ان سمیتات کو زایل کر دے سکے جن سے بیماریاں پیدا ہونی ہیں پہرہی جب بیمار کے دستوں میں خوب طسرج سوکھی مٹی ملا دی جاتی ہے تب بہت حصہ اس مست کے مضر مادہ کا جس سے وہ بیماری لوگوں میں پھیل جاسکتی ہے زایل ہو جاتا ہے۔ خشک مٹی سے بدبو زایل ہو جاتی ہے لیکن اس بدبو کے مضر اجزا پر اثر کم کرتی ہے۔

لائم لعینے چونا۔ چونا دو قسم کا ہوا کرتا ہے۔ ایک بھجایا ہوا چونا یعنی سڈرٹ ان لائم اور دوسرا بھجہ چونا یعنی کاسٹک لائم۔ یہ دونوں قسم کا چونا ہوا کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس ہوا کے کار۔ بانٹ اسڈ کو اور اسمین جو گندہک کے قسم کی بدبو دار اجزا ہوتے ہیں انکو بھی زایل کر دیتا ہے۔ کاسٹک لائم جب جاندار مادہ کے مقابلہ میں آتا ہے تو انکو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ پس اس قسم کا چونا جب گندہ مردوں میں اور بیمار کے دستوں میں ملا دیا جاتا ہے تب وہ مضر صحت کم ہوتے ہیں۔ کمکات کی دیواروں پر جب بچھائے ہوئے چنے کی سفیدی کرتے ہیں تب ایسے زندہ یا مردوں مادہ کے اثر کو زایل کر دیتا ہے جو ان دیواروں پر

لگے ہوئے ہوتے ہیں سگر دو بارہ سفیدی کرتے ہے پہلے دراز دن کو خوب طرح کچھ ڈالنا چاہئے اور کہ جن کو یا تو حسب الدنیا یا مٹی میں دبا دینا چاہئے *

مرکبات جنہیں کار۔ با۔ لکٹ اسٹہ ہوتا ہے جیسے بک۔ ڈو۔ گلن باؤڈر وغیرہ اچھے ڈس۔ ان۔ نکٹ۔ ٹینٹ چنیرین ہیں۔ انہیں جو کار۔ یا۔ لک۔ اسٹہ ہوتا ہے اُس سے ٹرانڈرک جاتی ہے اور جو مٹی کا جزو جیسے چونا وغیرہ ہوتا ہے وہ متعفن ہو کر کو جذب کر لیتا ہے *

کلو۔ رمی۔ لم۔ یہ مرکب کلو۔ رائیڈ اف الو۔ نم۔ ہے۔ ہوتا ہے یہ منجھلیکن ہوا لگنے سے گلجاتا ہے۔ اسپن یہ خاصہ ہے کہ اس قسم کی عفونت جیسو سفیدوے ٹنڈ ٹائیڈ روغن اور فاس۔ فیو۔ رسے۔ ٹنڈ ٹائیڈ روغن اور فاس۔ فیو۔ نی۔ ام۔ ہیں۔ انکی مضر خاصیت کو زایل کر دیتا ہے۔ یہ چنیر بہت عمدہ انٹے۔ سپ۔ نکٹ ہے اور یہ خود دیدوار نہیں ہوتی ہے * اور نہ ہر کا اثر رکھتی ہے * اسکا استعمال عرق اور خشک طور پر بھی کیا جاسکتا ہے *

دوم۔ سیٹال ڈیس۔ ان۔ نکٹ۔ ٹینٹ چنیرین۔ جب ڈس۔ ان۔ نکٹ ٹینٹ چنیرین عرق کے طور پر ہوتی ہیں تب بنسبت خشک چنیروں کے زیادہ تر آسانی سے استعمال کیا جاسکتی ہیں۔ مگر انکا اثر متعفن ہوا کے اسی حصہ پر ہوتا ہے جو اگلے ہمارے قریب ہوتی ہے پس مناسب یہ ہے کہ جب ان عرقیات کا استعمال کریں تب انکو جوڑی رکابیوں میں بہرہ کر جائیگا کہہ دیں یا کپڑوں پر چھڑک دیں۔ بہرہ رو اور مور یو لکی عفونت دور کرنے کے لئے یہ عرق بہت اچھا ہے چنانچہ نصف سیر مردار سنگ کو قدرے پانی میں ملا کر اسپر سات آؤنس یا ٹینٹرک اسٹہ آہستہ آہستہ جوڑ دیں۔ اب اسپن اسقدر اور پانی ملا دیں جس میں کل عرق دو گیا۔ لن ہو جاوے جس جگہ بدبو ہو وہاں اسکو ڈال دیں * کلو۔ رائیڈ اف زنک کا عرق۔ اسکی فی ڈرام میں ۵۰ گرین کلو رائیڈ اف زنک

ہونا چاہئے۔ اس عرق کا ایک پائینٹ ایک گیلن پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ اس سے
 عسلاوہ شمعین ہواؤں کے جاندار مادہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے *
 سلفٹ اف زنک اور سلفٹ اف ایرن کا عرفی ہی چھاؤس۔ ان - فیکٹ - ٹنٹ ہے *
 کان - ڈینر فلوئید کریمین پر - مینگے - نٹ اف پوٹاش ہوا کرتا ہے بہت اچھا
 ڈس - ان - فیکٹ - ٹنٹ ہے۔ اس سے جاندار مادہ ہلاک ہو جاتا ہے اور سٹرانڈر بھی ک
 جاتی ہے *
 کار - با - لکٹ اسٹڈ جب پانی میں ملا کر استعمال کیا جاتا ہے تب سٹرانڈر ک جاتی ہے

اور جاندار مادہ ہلاک ہو جاتا ہے ایک آؤس کار - با - لکٹ اسٹڈ اور آٹھ اونس سلفٹ اف
 ایرن تین گیلن - لن پانی میں ملا کر اسکار - لے - ٹے - نما اور چھپک کے بیمار کے کپڑوں
 وغیرہ پر لگانے سے ان بیماریوں کی چھوت کے مادہ کا اثر زایل ہو جاتا ہے اور دس حصہ
 میلے کار - با - لکٹ اسٹڈ میں سو - لیو - شن اف کھورائیڈ اف زنک ملا کر اور اسکو
 بہت سے پانی میں حل کر کے پانخانہ اور موریوں اور بدبودار کردہ عین چھڑکنے سے عفونت
 دور ہو جاتی ہے *

سوم ہوا کے قسم کے ڈس - ان - فیکٹ - ٹنٹ چنیرین - ان سب میں
 سے کلو - رین عمدہ ڈس - ان - فیکٹ - ٹنٹ ہے جتنے قسم کی مضر ہوائیں ہین جیسے
 سیفو - رے ڈنڈ ٹائیڈ رو - جن وغیرہ ان سب کے اثر بد کو یہ کلو - رین ہوا زایل کر دیتی
 ہے اور اس سے جاندار مادہ سے بھی ہلاک ہو جاتے ہین کجن سے دہائی بیماریاں
 جیسے ہفیمہ اسکار - لٹ فیور - چھپک وغیرہ پیدا ہوتی ہین - کسی مکان کو دبا کے اثر
 سے پاک کرنے کے لئے ایسا کریں کہ اسمین کلو - رین ہوا پیدا کر کے سارے دروازوں
 اور کھڑکیوں کو بند کر دیں اور ایک شبیہ نہ روز اسطرح رہنے دیں بعد ازاں سب
 دروازوں اور کھڑکیوں کو خوب طرح کھول دیں تاکہ مکان کے اندر باہر کی کھل پھر

داخل ہو سکے کیونکہ کلو-رین ہوا ایک نہایت تیز چیز ہے۔ ذرہ ہی مکان کے اندر جا بیگی
تو ناکون مین خراشس پیدا کریگی۔

کلو-رین ہوا کے پیدا کرنے کی کئی ترکیبیں مین چنانچہ کلو-ری-نے ٹڈ لایم یا
کلو-ری-نے ٹڈ سو-ڈا کو پانی سے مرطوب کر کے مٹی کی رکابیوں مین مکان کے
اندر جا بجا رکھ دیں یا چترک دیں تاکہ جو کلو-رین ہوا اس سے آہستہ آہستہ پیدا ہوتی جاو
وہ اُس مکان کے ہر ایک گوشہ مین خوب طرح بہر جاوے۔ اور اس ترکیب سے بھی یہ ہوا
پیدا کیجا سکتی ہے کہ چار حصے بازار کا ٹائیڈرو-کلو-رک اسٹڈ ایک حصہ ملاک
اکسائیڈ اف مینگے-نیز کے سفوف (انجنے) مین ملا دیں۔ نہین تو ایک کام کریں
کہ چار حصہ گھمانے کا نمک لیکر ایک حصہ انجنے اور دو حصہ میلا سلیفیو-رک اسٹڈ
اور دو حصہ پانی ملا کر دھیمی آنچ پر رکھ دیں۔ اس سے کلو-رین ہوا پیدا ہو جا بیگی۔
اور یوں تو اگر صرف کہاٹیکا نمک آگ کے انگاروں پر چترک دیا جاوے تب بھی
کسی قدر کلو-رین ہوا پیدا ہو جا بیگی اور مرض کے مضر مادہ کو زایل کر دیگی۔

آئیو-ڈین کا بخار بھی چاٹوس-رائٹ-ٹکٹ-ٹنٹ ہے ایک ڈرام آئیو-ڈین لیکر
چھت سے لگا دیں۔ آہستہ آہستہ سب اُڑ جا بیگا اور مضر مادہ کو زایل کر دیگا۔ چنانچہ
شفا خانہ جات مین یہی ترکیب عمدہ کار آمد ہے۔ اور جو یہ چاہو کہ آئیو-ڈین کا بخار
جلد پیدا ہو کر اپنا اثر ظاہر کر دے تو ایسا کر دو کہ گرم تو سے پر یا انگاروں پر قدرے
آئیو-ڈین چھڑ دو یا آئیو-ڈین کو پانی مین حل کر کے سارے مکان مین اُس عرق
کو بچکا رہی سے چترک دو۔

سلیفیو-رس اسٹڈ بھی بدبودار ہووے گا اثر بد کو زایل کر دیتا ہے اور سڑا
اور خیر اُٹھنے کو روک دیتا ہے۔ اس ہوا سے ایسے مکانات نہایت عمدہ طور پر پاک کئے
جا سکتے مین جنہیں متعدی بیمار یوں کا علاج کیا گیا ہو۔ چونکہ یہ ہوا بہت تیز ہوتی ہے مکان کو

بالکل خالی کر کے اس ہوا کو پیدا کرنا چاہئے۔ بہت آسان ترکیب اس ہوا کے پیدا کرنے کی یہ ہے کہ گندہاک کا سفوف آگ کے انگاروں پر چڑھ کر دین یا ایسا کرین گندہاک پر اسپرٹ اف وائین ڈال کر یا اسپرٹ قطرہ چھڑک کر آسین آگ لگا دین اگرچہ اوپر کئی ترکیبیں بیان کی گئی ہیں جن سے بیکار کا مضر مادہ یا متعفن ہوائیں زائل ہو سکتی ہیں مگر ان پر بہرہ رسد کبھی نہ کرنا چاہئے بلکہ یاد رہے کہ جب تک کسی مکان میں ہوا کی آمد و رفت کا کامل طور پر بندوبست نہ ہوگا ادویات دفع عفونت سے بہت تھوڑا فائدہ ہوگا۔ پس

بیان ون - ٹے۔ لی۔ شن کا۔ اس لفظ کے معنی ہیں ہوا کی آمد و رفت کا بندوبست یعنی حیوان یا انسان کے رہنے کے مکانوں میں پاک اور صاف ہوا کا بکثرت ہونا۔ اگرچہ اس موقع پر صرف رہنے کے مکانات کی باعث ہوا کی آمد و رفت کا ذکر کیا جائیگا لیکن یاد رہے کہ مٹرکون۔ بازاردون۔ دیہاتوں۔ شہروں۔ مکانات کے احاطوں اور پلٹنوں کی چھادنیوں میں ہوا کی آمد و رفت کا انتظام ایسا ہی ہونا چاہئے جیسے ہنر کے کمروں اور مکانات میں ہونا چاہئے۔

ون - ٹے۔ لے۔ شن کے باب میں ان امور کا ذکر ہونا چاہئے مثلاً۔ اول متعارف ہوا کی جو قیام صحت کے لئے درکار ہے۔ دوم وہ ترکیبیں جن سے متعلقہ مصلوبہ حاصل ہو سکے۔ سوم وہ شرائط جو ہوا کے عمدہ طور پر پہنچنے کے لئے درکار ہیں۔ واضح ہو کہ ون۔ ٹے۔ شن کی نسبت سب سے پہلے تجویز یہ کرنی چاہئے کہ سانچہ چھڑنے سے جو کثیف ہوا بہتر سے باہر نکلتی ہے اسکو مکان سے کس طرح نکال دینا چاہئے یا کس ترکیب سے اسکا مضر اثر ٹکا ہو جاسکتا ہے۔ یاد رہے کہ ایک جوان آدمی کی سانس کی ہر ایک حرکت سے ۳۰ مکعب پنچ ہوا کی گندہ ہو جاتی ہے اور چونکہ علی السوم ہر ایک بشر عرصہ ایک منٹ میں ۱۶ دفعہ دم لیتا ہے تو اس عرصہ میں ۸۰ مکعب پنچ ہوا کی خراب ہو جاتی ہے اور اس حساب سے ایک گھنٹہ کے اندر ۲۸۸۰ مکعب پنچ

یعنی ۵۶ و ۱۶ مکعب فٹ ہو اگر جاتی ہے۔ اور جو ہوا برآمدگی دم سے باہر نکلتی ہے اس کے ہزار حصہ میں ۴۰ حصہ کار۔ با۔ ناکٹ اسٹڈ کا ہوتا ہو اور باہر کی ہوا کے ۱۰ حصہ میں صرف ۴۰ حصہ کار۔ با۔ ناکٹ اسٹڈ کا ہوتا ہے۔ پس اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اُس بگڑی ہوئی ہوا کے اثر کو اس قدر کم کرنے کے لئے کہ جس سے اس میں واسطہ اندازہ کار۔ بو۔ ناکٹ اسٹڈ کا آجادے یہ ضرور ہو گا کہ اس میں ایک سو گنا اتنی ہی ہوا کہ جینز کار۔ با۔ ناکٹ اسٹڈ نہ واصل کرنا چاہئے یعنی شش سے باہر نکلی ہے یعنی ۱۶۶۶ مکعب فٹ فی گھنٹہ ہر ایک آدمی کے واسطے۔ لیکن باہر کی ہوا میں کیتھڈ کار۔ با۔ ناکٹ اسٹڈ بھی ہوتا ہے اور سانس کے کام میں آتی ہوئی ہوا میں صرف کار۔ با۔ ناکٹ اسٹڈ ہے زیادہ مقدار میں نہیں ہوتا بلکہ اُس ہوا میں عسلاوہ کار۔ با۔ ناکٹ اسٹڈ کے جو خون کو صاف کرتے وقت اس میں شامل ہو جاتا ہے پانی کا بخار اور تھوڑی سی دیگر کثافتیں بھی ہوتی ہیں اور پسینہ کے ذریعہ بدن سے جو کثافتیں خارج ہوتی ہیں ان سے باہر کی ہوا کسی کیتھڈ رکشیف ہو جاتی ہے۔ پس ان کثافتوں کے باعث اگر ہوا کے اوپر کی مقدار میں اس کا چوتھائی حصہ اور ہوا شامل کر دیں تب تندرست آدمیوں کے کسی نہ کی جگہ کی ہوا کو پاک اور صاف رکھنے کے لئے خالص ہوا کی کم سے کم مقدار ہر ایک گھنٹہ ۲۰۰۰ مکعب فٹ درکار ہو اور ایک گھوڑے کے لئے ۲۵۰۰ + یکم شش خانہ خانہ اور دیگر کسی ایسے مکانات کے واسطے جہاں بیمار رہتے ہوں زیادہ تر مقدار ہوا کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ بعض بیماریوں میں مریض کے جسم سے اس قدر متعفن بخار مادہ خارج ہوتا ہے کہ اسکی عفونت کو دور کرنے کے لئے کافی مقدار ہوا کی پہنچانی ممکن نہیں ہوتی + اور شفا خانہ کے کسی ڈاکٹر مین جب بہتر سے زخم کے بیمار ہوتے ہیں تو ہر ایک بیمار کے لئے فی گھنٹہ ۵۰۰ مکعب فٹ تازہ ہوا درکار ہوتی ہے اور جب شفا خانہ میں ایسے مریضوں کی کثرت ہو جیسے ہسپتال انگلین اور پاجی۔ میا اور اری۔ سی۔ پے۔ پس

اور ٹامی - منس فیور یا چھپک تب زمین جھنڈر نامی ہوا کی آمد و رفت ہو وہ تھوڑی ہے یعنی مریضوں کو سردی نہ لگ جائے اس بات کا خیال رکھنا شفا خانہ میں ہوا کھلے طور پر آنے دین تاکہ مریضوں کو جلد شفا ہو جاوے اور شفا خانہ میں بیماری کا مادہ پہیلے نہ پاوے۔ تجربہ سے بد بات پائی گئی ہے کہ بعض بیمار لوگ جاندار زہر ہلا مادہ بہ نسبت اور ون کے مازی ہوا میں مل جانے سے کم تر ضرر رسان ہوتا ہے۔ مثلاً ٹامی - منس فیور کا بیمار اگر چوٹے کمرے میں رکھا جاوے کہ جس میں ہوا کی آمد و رفت کا بندوبست اچھا ہو تو اس کی چھت کا زہر نر ایل ہو جا سکتا ہے مگر چھپک اور اسکار - لے - رٹے - ٹا - ٹا کا زہر ایسا موذی ہوتا ہے کہ باوجود مازی ہوا کے افراط کے بھی پہیلیا تا ہے صرف یہی نہیں بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ہینون نمک صاف ہو ا لگی ہے پھر بھی ان بیمار یوں کی چھت پہیل پڑی ہے اور مے - لے - ریا نہر پر صاف ہوا کا اثر استقدر کم ہوتا ہے کہ ہوا کے ذریعہ کو سون تک وہ زہر پہیلیا تا ہے اور بعض طبیب ایسا قیاس کرتے ہیں کہ پیضہ کا زہر ہوا کے ذریعہ جا بجا بہتا پھرتا ہے پھر بھی اسکے اثر میں کمی ہین ہوتی +

علاوہ سو گھنٹے کے کام کے صاف ہوا جلانے کے کام کے لئے بھی رکا رہوتی ہے مثلاً بتیوں کی روشنی کے لئے اور آگ کے جلنے کے واسطے بھی اسے جن کی ضرورت ہوتی ہے اور نیز ان بتیوں سے اور آگ سے جو کثیف دھان پیدا ہوتا ہے اسکے اثر کو زائل کرنے کے لئے بھی اسے جن درکار ہے + نصف سیر کو سید کے جھکر خاکستر ہونے کے لئے ۲۰ مکعب فٹ ہوا چاہئے اور نصف سیر خشک لکڑی کے واسطے ۲۰ مکعب فٹ ہوا چاہئے۔ ایک سہی تیل کے چراغ سے فی گنٹہ آدھ مکعب فٹ کاربائیڈ - نمک اسٹڈ خارج ہوتا ہے۔ پس اسکے اثر کو کمزور کرنے کے لئے ۵۰ مکعب فٹ ہوا چاہئے اور ایک اچھی موم بتی کے جلنے کے لئے ۵۰ مکعب فٹ

کی ضرورت ہوتی ہے * مگر یہ بات یاد رہے کہ جب کوئی مکان ایسا ہو کہ جس میں رہنویا لے بہت اور جگہ کم ہو تو اسمیں ہو کی مقدار زیادہ ہونی چاہئے ورنہ باشندوں کو نقص پہنچے گا * یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ جو چہاونیان بڑے بڑے شہروں کے قریب اور بہاڑوں کے نیچے ہیں انکے باہر کون کے کمرؤں میں ہر ایک آدمی کو ۸۰۰ مکعب فٹ اور ۹۰۰ مکعب فٹ جگہ دیجاوے اور ان چہاونیوں میں جو بہاڑوں پر ہیں ۷۰۰ سے ۱۲۰۰ مکعب فٹ دیجاوے ۔ یورپ میں کے شفا خانوں میں جو نیچے ہیں ۲۴۰۰ فٹ اور ۱۲۰۰ مکعب فٹ جگہ دیجاوے اور بہاڑوں پر ۶۰۰ سے ۸۰۰ فٹ اور ۱۰۰۰ مکعب فٹ * ہندوستان میں کے شفا خانوں میں جو نیچے تعمیر کئے گئے ہیں ۵۰۰ مکعب فٹ اور ۹۹۰ مکعب فٹ اور یورپ میں اور یورپ میں شیٹن کے لاگ ہسپتالوں میں ۱۰۰۰ مکعب فٹ اور ہندوستان میں کو ۶۰۰ اور جلیخانوں کے درمیان میں ۶۴۸ مکعب فٹ اور ۵۴۰ مکعب فٹ جگہ ہر ایک قیدی کے لئے چاہئے * اس بات کا دریافت کرنا کہ کسی کمرے میں اوپر کے حساب کے مطابق جگہ ہے یا نہیں اسطور پر ہو سکتا ہے کہ اسکے مکعب فٹ اور سطح فیٹ کو اس مکان میں بننے والوں کی تعداد پر تقسیم کرنا چاہئے * تاکہ رہنے کے مکانات میں ہو کی اچھی آمدورفت ہو یہ ضرور چاہئے کہ اسمیں بذریعہ دروازوں اور کھڑکیوں کے ہوا کے داخل ہونے اور خارج ہونے کا عمدہ بندوبست ہونا چاہئے ورنہ باشندگان کی صحت کبھی اچھی نہیں رہ سکتی *

ہندوستان کے شہروں اور دیہاتوں میں ہوا کے کثیف ہو جانے کے اسباب جن غرابیوں کا ذکر اوپر ہوا ہندوستان کے ہر شہر اور گاون میں پائی جاتی ہیں مگر ان کسی میں کم کسی میں زیادہ اور ان میں دو قسم کے مکانات ہوتے ہیں ایک تو صحن دار - دوسرے جو نیچے صحن دار مکانات کے صحن چار دیواری سے گہرے ہوتے ہیں جن میں روشنی اور ہوا کی آمدورفت کے لئے نہ دروازہ ہوتا ہے نہ کھڑکیاں ہوتی ہیں

چونکہ وہ نکاح حال میں ہے کہ اگر انکا دروازہ بند کر دیجئے تو انہیں ہوا اور روشنی کسی طرح
 آجی نہیں سکتی۔ رہنے والوں کا یہ حال ہے کہ بہت سے آدمی ملکہ ایسی تنگ کوٹھروں میں
 سوتے ہیں کہ تو انہیں سے سانس کے کام آئی ہوئی ہوا اچھی طرح باہر نکل سکتی ہے
 نہ انہیں باہر کی لطیف ہوا آسانی سے آسکتی ہے تاکہ اُس کثیف ہوا کا مبادلہ ہو سکے
 پس جو ہوا دم لینے سے کثیف ہو چکی ہے اُسکے کچھ حصہ سے بار بار سانس لیتے ہیں
 اور فقط یہی خرابی نہیں ہے بلکہ اس سے بدتر ایک اور خرابی یہ ہے کہ لوگوں
 کا یہ عام قاعدہ ہے کہ اپنے سر منہ کو کیل میں خوب لپیٹ کر سوتے ہیں عموماً وہ
 انہیں جو آگ کہاں لپکانے میں جلتی ہے اور چوڑے چوڑے ٹیل کے چراغ جو رات کو
 روشن ہوتے ہیں وہ ہوا سے صرف اُسے جن ہی کو نہیں کہنچتے بلکہ اُسہیں زہریلی
 ہوا دینا اور اور اجڑا ہی ملا دیتے ہیں اُن سے ہوا اُڑ رہی کثیف ہو جاتی ہے۔

گہروں کے پاس اکثر مڑے ہوئے فن کرتے ہیں یا توڑے ہی حاصل پراد ہو رہا جلا
 دیتے ہیں۔ جانور جہاں مرے وہیں پڑے رہے جب تک اُنکو پرندے یا درندے کہا
 نہ جائیں اور ناکارہ نباتات دروازوں کے حین سامنے لگتی ہیں ہین گرتی ہیں ہین
 سڑتی ہیں اُٹھا کر پھینک بھی نہیں دیتے جسم کی صفائی پر جیسا چاہتے خیال نہیں کرتے
 نہاتے ہیں اور میلے ہی کپڑے پہن لیتے ہیں جن کا فون کو اڑ رہے ہوتے ہیں وہ پسینہ
 اور جسم کے آؤر فضلوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہات کے پہننے کا بندوبست
 اچھا نہیں کرتے۔ راستہ کے اُس پاس بلکہ شام عام میں ہی نجاست پڑی رہتی ہے
 یہ لوگ اکثر ایسا ہی کہتے ہیں کہ بہت سویرے اُٹھ کر اُن کہتیوں میں نفع حاجت کے
 لئے جاتے ہیں جہاں اونچے کیت کھڑے ہوتے ہیں یا جہاں پردہ کی جگہ پاس بلجاتی
 ہے وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور بعض دفعہ گہروں کی چتوہن پر بھی پاخانہ پھرتے ہیں
 وہ وہیں پڑا رہتا ہے سو کہہ کر خاک ہو جاتا ہے اور گرد کے ساتھ ہوا میں اُڑتا پھرتا

یا مینہ مین بہ کر نیچے پھیلتا ہے۔ جہاں جاذبہ زمین وہ اکثر گندگی سے بہرے رہتے ہیں انکی نجاست تو پڑی بہت پاس کی زمین میں بہتی ہے یا بازار میں یا گھر کے صحن میں یا حد بہر کو رستہ پاتی ہے بہ جاتی ہے۔ اگر کسی طرف نکاس نہیں ہوتا تو نیچے کسی گوشہ میں یا گھر کے خارجہ یا سنڈاس میں جا گرتی ہے۔ اور پیشاب تو جس گوشہ میں چاہیں کر دیتے ہیں۔ گو بہر کا یہ حال ہے کہ یا تو بے غوری سے روذن میں رُل جاتا ہے یا کھٹ میں ڈالنا ہوتا ہے تو گھر کے پاس ٹھہر گنا دیتے ہیں تاکہ گلجائے اس سے ہوا کثیف ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں بدبو پیدا ہوتی ہے یا جب وہ مٹرنے لگتا ہے تو پہلے زمین پر اس کے نیچے کی ہوا کثیف ہو جاتی ہے اور ان دونوں سے یکساں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بلکہ دوسری صورت میں میل کے سبب زمین جلد تر گندی ہو جاتی ہے۔

نہانے کا یہ حال ہے کہ جہاں موقع پاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں نیز پر جو گلنے قابل چیزیں ہوتی ہیں پانی انہیں لیکر زمین میں پیوست ہو جاتا ہے پانی کے نکاس کا بھی اچھا انتظام نہیں۔ مینہ کا پانی یا تو گڑھوں میں بہت سا جمع ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے یا گھر کے پاس کھڑا رہتا ہے اور یہ اس سے بھی بُرا ہے کیونکہ گھر کا فرش بہ نسبت باہر کی زمین کے اکثر نیچا ہوتا ہے پہر جب اس فوج میں ایسی دلدل بھی ہوتی ہے جسکے پانی کا نکاس نہ ہو تو وہاں کی گلی سٹری ہوئی نباتات اور سیل کی کثافت سے ہوا بگڑ جاتی ہے اور اس کثافت کو گرد و نواح میں پھیلاتی اور وہ بیماریاں پیدا کرتی ہے جو دلدل کے آس پاس کے مقامات میں عام ہوتی ہیں۔

باد چنچا نکا آخو راو بعض دفعہ میلے کپڑوں کا دھون ہی جہاں جی چاہتا ہے پھینکتے ہیں لیکن کپڑے اکثر کوؤں اور تالابوں پر دھوئے جاتے ہیں اسکا ذکر آگے آئیگا۔

قصابوں کا جس جگہ بس چلتا ہے وہیں جانوروں کو فوج کر ڈالتے ہیں اور انکے اندر کی آلودگی بھی وہیں پھینکتے ہیں۔ چمڑا رنگنے والے رنگر نیز اور پیشہ و سر بازار اپنا

اپنا کام کرتے ہیں جس سے ارد گرد کے لوگوں کو ایذا پہنچتی ہے۔

کیا ترکیب ہے کہ ہوا کثیف ہونے پاوے۔ اب یہنا چاہئے کہ جو کثیفیز پیدا ہوتی ہیں انکی روک یا دفعہ کیس طرح ہو ہی سکتا ہے یا نہیں۔ زمین سے بعض تو ایسی ہیں کہ انکا دفعہ ہو ہی نہیں سکتا مثلاً سانس کا چلنا اور آگ کا چلنا کیونکر بند ہو۔ اور جہاں یہ ہونگی وہاں ہوا کا اصل خبر واکسے جن ضرور خرچ ہوگا۔ پھر اسکی جگہ وہ ہو ہی ضرور ہی پیدا ہوگی جو زندگی کو زہر ہے لیکن جب تک قدرتی قاعدوں میں کچھ خلل نہ پڑے گا اسوقت تک اس سانس لینے اور جلنے کے عمل سے کچھ خرابی عائد نہیں ہو سکتی چنانچہ اس ہوا کی اصلاح کے لئے گہر میں ایسا بندوبست ہونا چاہئے کہ باہر کی ہوا آتی جاتی رہے کیونکہ اگر چہ کسی گہرا کمرے میں ہوا کا چلنا معلوم نہیں ہوتا مگر ہوا ہمیشہ اُلتی بدلتی رہتی ہے۔ ہاں اسلئے کہ لطیف ہوا پہنچ سکے مگر نیز ہوا چاہئے کہ ایک ہی کمرے میں ایک ہی وقت بہت آدمی نہیں در نہ وہ لوگ اس مکان کی ہوا کو اتنا کثیف کر دیں گے کہ اس عرصہ میں باہر کی لطیف ہوا اتنی وہاں نہیں پہنچ سکتی یعنی اس مکان میں آدمیوں کا ہجوم نہ چاہئے۔

مکان کی مکانات مثلاً بار کون اور جینیا نون میں ہر ایک آدمی کے رہنے کے لئے جتنی جگہ درکار ہے وہ خوب سوچ سمجھ کر مقرر کی گئی ہے اس جگہ کی مقدار کعب پیمائش سے دریافت ہو سکتی ہے مثلاً اگر کوئی کمرہ دس فٹ چوڑا دس فٹ لمبا دس ہینٹ اونچا ہو تو اسی میں ہزار کعب فٹ ہوا ہوگی۔ ہر ایک قیدی کو ۶۸۸ مکعب فٹ دیا جاتا ہے اور یہ بات مکان کی سطح زمین کی پیمائش سے ہی دریافت ہو سکتی ہے مثلاً جو مکان دس فٹ لمبا دس فٹ چوڑا ہو اسی میں ۱۰۰ فٹ مربع جگہ ہوگی۔

ایسی سپاہیوں کو ۶۴ مربع فٹ مین دیجاتی ہے اور قیدیوں کو ۶۴ فٹ وجہ یہ ہے کہ قیدیوں کی بار کون کی چتہیں عام دلیسی مکانوں سے بہت اونچی ہوتی ہیں اور

۱۔ جو ضرور نہیں ہوگا کہ ہوا کی اصلاحی

انہیں کٹھرے پہی ہوتے ہیں جن سے ہوا کی آمد و رفت اچھی طرح ہوتی رہتی ہے، معمولی کارروائیوں کی واسطے سطحی مربع فٹ کی پیمائش کافی ہے اگر ممکن ہو تو ایک آدمی کی واسطے ۸ فٹ مربع چاہئے، یعنی اس قدر زمین جو ۸ فٹ لمبی ۶ فٹ چوڑی ہو اور کمرے کی دیوار میں اوپر کی طرف کھڑکیاں ہونی چاہئیں تاکہ سانس کی کثیف ہوا انہیں سے نکل جایا کرے کیونکہ اکثر مسمومین سانس میں سے نکلی ہوتی ہو اب نسبت ارد گرد کی ہوا کے گرم ہوتی ہو اس واسطے اکثر اوپر کو جالی ہے رہنما لون کی تعداد کے بموجب ہر کمرے کی کھڑکیوں کو فلیچ رکھنا چاہئے ۱۰

یاد رکھو جب باہر سے کسی ایسے مکان میں داخل ہو جس میں ایک یا کئی آدمی بستے ہوں اور اُس میں بدلہ معلوم ہو تو جان لیوا ماکر اس کمرے میں ہوا کی آمد و رفت کا بندوبست کافی ہینر ہے جب فی آدمی کے حساب سے جگہ کی مقدار مقرر کرنی ہو تو خیال رکھنا چاہئے کہ بیماروں کو بہ نسبت تندرست آدمیوں کے زیادہ مقدار کی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو حالت صحت کی نسبت اُسکی جلد اور ہڈیوں سے زیادہ کثافتت نکلتی ہیں اور اُن سے جلدی عفونت پیدا ہو جاتی ہے۔ پس اسلئے کہ بیماروں کے ارد گرد کی ہوا آغوش کے قابل ہو یہ چاہئے کہ ہوا معمولی مقدار سے زیادہ ہو بلکہ جو تندرست بیمار کینڈست کرتے ہیں اُنکے لئے بھی یہ بات واجب ہے +

بچوں کو لطیف ہوا کی ویسی ہی ضرورت ہوتی ہے جیسے جوانوں کو + یہ بات رسم میں داخل ہو گئی ہے کہ بچہ کو ایسے کمرون میں بند رکھتے ہیں جن میں ہوا کا بالکل دخل نہ ہو اُس طرح یہ کہ ہمایوں اور رشتہ داروں کا ہجوم ہو تاکہ یہ بات صرف بچہ ہی کے لئے مضر نہیں ہے بلکہ خاص بچہ کی واسطے ہی نہایت پرخطر ہے + بہت سے بچے پیدا ہو کر چند ہی روز کے اندر مر جاتے ہیں سبب یہ ہے کہ دم لینے کو خاص ہوا کی کافی مقدار نہیں ملتی جس کمرے میں لوگ بستے ہیں اگر وہ ان دو دکش یا کوئی اور رستہ کثیف ہوا اور

دہوان نکلنے کا نہ ہو تو زمین آگ نہ جلائی جائے۔

روشنی کے لئے مٹی کے بوندے چراغ جلاتے ہیں اور ان سے دہیان اور کثیف ہوائیں پیدا ہوتی ہیں مگر انکے نکلنے کا بھی کوئی ویسا ہی آسان بندوبست ہو سکتا ہے جیسا آگ کے دہیئیں وغیرہ ہو سکتا ہے۔

سڑاند کے سبب سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں انکے دفعہ کے لئے اس عام اصول کو مد نظر رکھنا چاہئے کہ کل ہر سے ہوتے حیوانات اور مرجہائی ہوتی نباتات کو جہاں تک ممکن ہو سڑنے سے پہلے احتیاط کے ساتھ کسی جگہ پہنکوا دیا کریں۔ اور مردوں کو آبادی سے دور اچھی طرح دفن کر دیا کریں یا حبس دیا کریں۔ دفن کرنا ہو تو قبر بشرط امکان کم سے کم ہافٹ گہری ہو۔ اور مٹی سے خوب طرح بند کر دیں جیسا نا ہو تو خوب اچھی طرح جلائیں۔ مردار جانوروں کو فوراً اٹھوا کر دور گرڈا دیں اور اوپر خوب دبا دیا کر مٹی جادیں۔ گلے سڑے گھاس بھوس اور اوروں کو جیسے لید گوہر وغیرہ جو کھات میں کام آتے ہیں جمع کر کے کم سے کم آبادی سے .. اگڑے فاصلے پر سب کا ڈھیر لگا دینا چاہئے اگر اُس ڈھیر پر کبھی کبھی تھوڑی مٹی ڈال دیا کریں تو اُس سے توبہ و پیدیا ہوگی نہ زراعت پر اسکا اثر کم ہوگا۔

جلد کو درست رکھنے اور اُس سے میلے پن کی حالت میں جو عفونت پذیر مادہ نکلا کرتا ہے اُسکے دور کرنے کے واسطے جسم کو صاف اور مستہرا رکھنے کے سوا کوئی ترکیب نہیں۔ سارے بدن کو روز پانی سے ضرور دھو ڈالنا چاہئے پانی خواہ سرد ہو خواہ گرم۔ البتہ جان اور طاقتور آدمیوں کے واسطے اکثر مہر پانی بہتر ہے لیکن بڑے ہون اور کمزور آدمیوں اور بیمار آدمیوں کے لئے شہر گرم زیادہ مناسب ہو۔

جلد سے بھی بڑے بڑے کام تعلق ہیں اور ان کا ہون کو بخوبی انجام دینے کے لئے اُسکا پاک صاف رکھنا ضرور ہے۔ جلد اگرچہ جسم کا بیرونی حصہ ہے مگر تین کسٹھوں میں

عضو سے کم ہنہیں ۱۰ اسہین جو بے حساب مسامات ہین وہ بے فائدہ ہنہیں ہین ان سے ہمیشہ بدبودار فضلے نکلتے رہتے ہین پس اگر جلد کو صاف نہ رکھو گے تو وہ بند ہو جائینگے اور بیماری پیدا ہوگی لیکن اگر تمہارے پینے کے کپڑے اور سونے کا بستر میلہ ہوگا تو جلد کے صاف رکھنے سے بھی بہت فائدہ ہوگا اسلئے ان سب کو بھی ہوا دیتے رہو اور جو با صاف رکھو *

یورپ میں جو شہر صحت کے لحاظ سے اچھے شمار کئے جاتے ہین انہیں زمین کے نیچے موریانہ بنی ہین شہر کی ساری گندگی جیسے بول و برانہ باد چچانے اور نہانے دھونے کا پانی انہیں سے نکل جاتا ہے ان سب کو اصطلاح میں سو-راج یعنی گندگی کہتے ہین۔ عام ٹیٹوں کی جگہ گہروں میں جا کے ضرور ہوتے ہین۔ انکی گندگی اور ہر قسم کا گندہ پانی جو حوض اور گڑھوں میں جمع ہوتا ہے یہ سب ملکر لوہے کی نلیوں میں جا پڑتا ہے اور گہر گہر کی نلیاں ملکر بڑے بڑے نلوں میں جا ملتی ہین۔ یہ نل ملکر یا تو ان سے بھی بڑے بڑے نلوں میں یا خشتی برروں میں جا گرتے ہین۔ ان سب کی گندگی کچھ سمندر میں جا پڑتی ہے یا ایک مفید کام میں صرف ہوتی ہے یعنی کسی خاص قلعہ زمین کی پیداوار کو قوت دیتی ہے۔

جب ایسی صفائی کو سامان ایک مرتبہ بیگلے تو پھر انکی مرمت میں بہت لاگت ہنہیں آتی خیال کرو اس بند و بست میں اس محنت اور لاگت کی نسبت کتنی بچت ہے جو آدمیوں سے اٹھانے میں پڑتی ہے کیونکہ اس ترکیب سے گندگی اپنے ہی بوجہ سے ڈھان کی طرف بہ جاتی ہے بعض دفعہ جہاں گندگی کے بہنے کے لئے ڈھان کافی ہنہیں ہوتی وہاں اسکو پہلے کسی نیچی جگہ میں جمع کرتے ہین پھر پیپ سے اونچی جگہ چڑھاتے ہین مگر اس میں زیادہ خرچہ نہیں جاتا ہے انوس ہے کہ ہندوستان میں یہ وقت بارہا پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ ملک ہموار ہے اور اس میں ڈھان کم ہے مثلاً کلکتہ میں اس قسم کی دشواری پیش آئی تھی اسلئے ایسی کل کے مرتزہ بڑی جس سے گندگی اتنی اونچی چڑھ جائے کہ پھر آپ ڈھک کر شورجیلو ہنہیں جا پڑے

گلتہ میں جو صفائی کا طریقہ جاری ہے وہ کل شہر میں یکساں نہیں اور ہر شہر کے جن حصوں میں بدرویں بنگئی ہیں وہاں بھی یہ کامل انتظام نہیں ہے کہ گہروں کی چھوٹی چھوٹی موریان باہر کی بڑی بدرو سے ملی ہوئی ہوں بلکہ خاک و ب نجاست اور مائٹ کو اٹھا اٹھا کر موریوں میں ڈال دیتے ہیں جہاں سے وہ ڈھلک کر ان کہتیوں میں جا پڑتی ہیں جو سہک ریا اور لوگوں کی طرف سے اسی کام کے لئے بنے ہیں ۔

ہندوستان کے شہروں کی صفائی نڈوں اور بدروؤں سے ہونے میں کمی مشکوک نہیں اول یہ کہ اگرچہ پینے بنا پاؤں سے پہر ہی سکے جاری کرنے میں پہلے پہل بڑی لاگت آتی ہے ۔ دوسرے پانی کا سامان کافی بہم نہیں پہنچ سکتا ۔ تیسرے نڈوں اور موریوں کی نسبت آدمیوں سے کم لاگت میں اٹھ سکتا ہے لیکن انہیں سے بعض قباحتیں نفع ہی ہو سکتی ہیں چنانچہ بہت کھلے کھلے نل نہوں پتلی نڈیوں سے بھی بڑی آبادی کی گندگی صاف ہو سکتی ہے بشرطیکہ انہیں ڈھلاؤ ہی ڈالا جاوے کیونکہ یہ نڈیاں زمین کے نیچے صرف نجاست ہی کے لیجانے کے لئے ہیں اور پانی کے نکاس کے لئے زمین کی سطح پر الگ بند و بست کرنا چاہئے اسکا ذکر آئندہ آئیگا ۔ اگر یہ نل مٹی کے پختہ پھین کہ شاید رفتہ رفتہ ہندوستان میں بن جائیگے تو لوہے کے نلون سے اور خشتی بدرو سے بہت کم لاگت بٹھائیگی ۔ اسوقت امید ہے کہ شہروں کے پینے کے پانی کا انتظام بھی بخوبی ہو جائیگا بالفعل بہت کم ہے اگر اسقدر پانی بہم پہنچ سکے جس سے گہر کے روزمرہ کے کام بخوبی چل جائیں تو وہی پانی نڈیوں کے رستہ نجاست پہنچانے کو ہی کافی ہو سکتا ہے ۔ آدمیوں سے ڈلاؤ اٹھانے میں بڑی قباحت ہے کہ ہمیشہ انکی گردن پر سوار ہو تو وہی اچھی طرح صفائی نہیں ہو سکتی اور اسکی نسبت نڈیوں میں بہاؤ کا انتظام بہت عمدہ ہے ۔

بالفعل ہم بدرو کی بحث کو یہیں ختم کرتے ہیں کیونکہ ہندوستان میں ایسی موریوں کا

کم رواج ہے جسکے رستہ زمین کے نیچے نیچے نجاست اور حفاظت پہا کر دریا میں ڈالی جاتی ہو اور بڑے شہروں میں بھی اس سطح کے جاری ہونے کو ایک عرصہ چاہئے *
 بلکہ چھوٹے شہروں اور گاؤں میں تو یہ کام آرمیوں کے ذریعہ ہو سکتا ہے اور زمین ہے کہ عرصہ دراز تک یونہی رہیگا لیکن احتیاط رکھنی چاہئے کہ نجاست زمین پر نہ گرنے پائے مٹی کے ٹشتوں میں رہے اور اسے اٹھا کر کم سے کم دن میں دو دفعہ کمیز دور حفاظت سے ڈال دینا چاہئے *

مختلف نمونوں کے پائے خانے بنانے کی تجویز کی گئی ہے لیکن خواہ سرکاری ہوں خواہ گہر کے عموماً پانچون کے بنانے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ گندگی زمین پر گرنے نہ پاوے اور اگر ہر دفعہ پانچا نہ پہرنے کے بعد اسپر توڑی خشک مٹی ڈال دی جائے تو ہوا بھی صاف رہ سکتی ہے اشیاء سے دفع عفونت کی کچھ ضرورت نہیں ان پر روپیہ مفت ضائع ہوتا ہے۔ اکثر اوقات صرف کارندوں کی غفلت کو چھاپتی ہیں *
 پس بہتر یہی ہے کہ ڈالائو کوڑا ہوا اگر گڑھوں میں ڈال دیا کریں۔ یہ گڑھے فٹ بہر چڑھے فٹ بہر گہرے ہونے چاہئیں جنہیں چھانچ تو ڈال دیا ہو اور باقی چھانچ مٹی بہر دین بہر زمین پر زراعت کریں کیونکہ جب تک زراعت نہوگی اس ترکیب سے فائدہ نہوگا وجہ یہ ہے کہ زراعت سے نجاست کے اجڑا لگ لگ ہو جاتے ہیں یہ کہتی ہیں زمین اپنی غذا کے لئے جذب کر لیتی ہے اور انکا نام نشان تک نہیں رہتا *

اگر ہو سکے تو غسل خانے اور پاد چھانے کے پانی کو بھی اس ترکیب سے اٹھو اگر کہتی ہو زمین پر پہنچو ادا کریں کہ کہتی اسے جذب کر لے اگر دینہ پیہنکے نیچے تو زمین پیہنکی اور چھاندارا دے اس میں ہوتے ہیں ان سے یہ کثیف ہو جائیگی جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ میل کے انسداد کیلئے پانی کا نکاس ضرور ہے تاکہ بارش کا پانی کسی پاس کی ندی میں جا پڑے ورنہ اتنا تو ضرور ہو کہ مکانوں کے پاس پانی کھڑا نہ رہنے پائے

نہ اٹھو اینکے تو انکے طرحانے سے ہی ہو اکثیف ہو جائیگی ۔ ایسے پشونکا بھی انتظام کرنا چاہئے جسے بدبو پیدا ہوتی ہے مثلاً بوچڑخانے اور قسایوں کی دکانوں کو پاک صاف رکھیں تاکہ گوشت پر کبھی بیٹھنے نہ پادے اور بوچڑخانے کے آخر کو باحتیاط اٹھو دیا کریز رسیطح رنگریز - چڑا رنگے والے اور اس قسم کے آؤر پیشہ وریا تو شہر اور گاؤں کے باہر رہیں اور شہر کے اندر ہی بسنا نہ ہو تو ایسی جگہ بسائیں جہاں آمد و رفت کم ہو ۔ اگر ان سب باتوں پر توجہ کیجائے تو ہوا صاف رہیگی ۔

تیمام صحت کے لئے ہوا سے خوش کئی باتوں سے مفید ہے چنانچہ اس قسم کی ہوا کے سونگھنے سے تنفس کی حرکات اچھے طور پر انجام پاتی ہیں اور اعصاب اور عروق شعیریہ (کے - پے - لے - رینز) بیرونی کو بھی تروتازگی حاصل ہوتی ہے اور اکلی تروتازگی سے سارے جسم کو فرحت پہنچتی ہے مثلاً دیکھئے کہ حالت غشی میں جب بنگہا کیا جاتا ہے یا کسی آؤر طور سے مریض کے جسم کو تازی ہوا لگتی ہے تب بیمار فوراً ہوش میں آجاتا ہے اور باغات اور کھلی جگہ میں سیر کرنے سے طبیعت کیسی خوش ہوتی ہے ۔ ہوا کی مختلف خاصیتوں کا اثر جسم انسان پر مختلف طور کا ہوتا ہے مثلاً جب خشک ہوا جسم کو لگتی ہے تب جسم کی رطوبات بہت جلد باہر نکل آتی ہیں اور اکثر جسم کی مختلف ساخت کو طاقت آتی ہے چونکہ اس قسم کی ہوا سے جلد کو تحریک بھی ہوتی ہے ۔ اس واسطے بلغمی مزاج کے آدمیوں کو یہ ہوا مفید پڑتی ہے لیکن صفر آدمی دردموسی مزاج کو یہ ہوا مضر ہے ۔ جب ہوا نہایت خشک اور گرم ہوتی ہے تب جلد کی طاقت پسینہ پیدا کرنے کی کم ہو جاتی ہے جس باعث مختلف قسم کے امراض جلدیہ پیدا ہوتے ہیں اور اکثر تشنگی زیادہ اور خجسار ہو جایا کرتا ہے لیکن جب ہوا میں یوست اور حرارت اعتدال پر ہوتی ہے تب شش میں خون اچھے طور پر صاف ہوتا ہے عضلات کو طاقت آتی ہے رطوبات جسم کی اچھے طور پر خارج ہوتی ہیں اور اس قسم کی ہوا سے جسم کے اندر اور باہر کی عفونت سبب

برودت کے پیدا ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ جب ہو امین ہیوست
 زیادہ ہوتی ہے تب ^۱لے۔ لے۔ ریا کم ہو جاتی ہے + خشک ہوا کے حاصل کرنے کے
 لئے ایسی جگہ پر مکان بنانا چاہئے جسکی زمین ریتیلی اور کنکریلی ہو جہاں بارش کا
 پانی ٹپکتے ہی غرق ہو جاوے اور جو زمین اونچی نیچی اور جبرائیل ہو تو ہین خشک
 اور اکثر صحت بخش ہوتی ہے۔ پس یاد رہے کہ زمین کی خاصیت پر ہی ہوا کا خشک ہونا
 حصر کرتا ہے +

مرطوب ہوا خواہ وہ سرد ہو یا گرم بہ نسبت خشک ہوا کے کمتر صحت بخش ہوتی ہے
 کیونکہ اس میں مقدارِ راک - سے جن ہوا کی کم ہوتی ہے اور چونکہ یہ ہوا بہت پھیل نہیں
 سکتی اسلئے حرکاتِ تنفس اس سے اچھے طور پر انجام نہیں پاسکتی اور دوسری ہوا بار
 ہوا کے صحت بخش نہونے کی یہ بھی ہے کہ اس سے عفونت جلد تر پیدا ہوتی ہے +

گرم اور تر ہو اضعف ہوتی ہے اور اس سے پسینہ رگ جاتا ہے لیکن سرد تر
 ہو صحت کو زیادہ تر ضرر پہنچتی ہے کیونکہ اس سے فضلاتِ جسم کے ٹوک جاتے ہیں اور پسینہ
 بھی اچھے طور پر پیدا نہیں ہو سکتا چنانچہ اس واسطے جو مضر فضلات ٹوکے اسٹڈرک
 جاتا ہے اور بعض لے۔ تھک اسٹڈ کے اکٹ - اڈا - لاکٹ اسٹڈ بناتا ہے جس سے
 نقصان یہ ہوتا ہے کہ خون کے اندر لے۔ تھک اسٹڈ کے ہونے سے مختلف قسم کے
 امراض دسوی پیدا ہوتے ہیں اور خون کے دورہ کرنے میں خلل پڑ جاتا ہے چنانچہ
 مجمعِ مفاصل وجع العصب بعض قسم کے امراض جلد یہ اور خنازیر اور سل کی بیماری
 پیدا ہوتی ہے جو سر زمین چکنی مٹی کے اور شیب ہوتی ہے اور جبر عرصہ تک پانی
 کھارہتا ہے اور جبر درختوں کی بہت کثرت ہوتی ہے اور جو زمین کسی بلند پہاڑ
 ۱۔ ایک زہریلی ہوا ہے جو مادہ نباتاتی اور حیوانی کے متعفن ہو جانے سے پیدا ہوتی
 ہے اور جس سے نوبتی امراض شلالت نوبتی وغیرہ پیدا ہوتے ہیں +

کے پیچھے ہوتی ہے اسکی ہوا مرطوب ہوتی ہے لیکن قطع نظر زمین کی خاصیت کے رہنے کا مکان خود اپنے مصالح کی جہت سے کہ جس سے وہ بنا ہو مرطوب ہو سکتا ہے۔
دوم پانی۔ پاک و صاف پانی کی ضرورت۔ تندرستی کی واسطے دوسری بڑی ضروری چیز خالص پانی ہے مگر بعض آدمی پانی کو لطیف ہو اور فوق دیتے ہیں جو جو ترکیبیں ہوا کے صاف رکھنے کے لئے اوپر بتائی گئی ہیں انہی ترکیبوں سے پانی بھی صاف رہ سکتا ہے کیونکہ اسی میں اکثر کثافتیں ہوا ہی سے ملا کرتی ہیں۔ اگر گندگی کے اٹھانے کا مقول بند و بست کیا جائے تو ہوا اور پانی دونوں صاف رہ سکتے ہیں مگر کئی خاص باتیں بھی ہیں جن سے پانی گندہ ہو جاتا ہے وہ کونسی باتیں ہیں اور انکا دفعہ کیونکر ہو سکتا ہے ہم آگے انکا ذکر کرتے ہیں۔

ان سیلون ذکر جن سے پانی بہم پہنچتا ہے

پانی کے بہم پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ بارش ہے جب مینہ برستا ہے تو یکقدر پانی دریا اور ندی اور تالابوں میں بہ جاتا ہے کچھ زمین پی جاتی ہے جس سے جاری کو مین اور چشمے بہرتے رہتے ہیں اور بڑا حصہ دریا اور ندیوں کے پانی کا بھی زمین ہی سے ریس ریس کرتا ہے۔ پہاڑوں پر بجائے مینہ کے برف پڑتی ہے۔ گرمی میں جب برف پگھلتی ہے تو اسکا پانی بہ کر دریا میں جاتا ہے۔ چنانچہ پہاڑی دریا گرمی کے موسم میں چڑھ جاتے ہیں +

یہ بات سب جانتے ہیں کہ خشک سالی میں دریا اور ندیوں کا پانی کم ہو جاتا ہے تو مین اور چشمے اتر جاتے ہیں یا بالکل خشک ہو جاتے ہیں مگر برسات میں جب بہت مینہ برستا ہے تو دریا بہت چڑھ جاتے ہیں اور تالابوں کو دن میں ہی پانی بہ جاتا ہے + ٹھیک ہے کہ مینہ کے قطرے ہوا میں ہو کر زمین تک پہنچتے ہیں اس سے زمین کی مقدار ہوا کی

کٹافٹین لمبائی میں چونکہ شہروں کی ہوا زیادہ کثیف ہوتی ہے اس سبب سے جو پانی شہروں میں برستا ہے اُس میں ہوا کی کثافت زیادہ لمبائی ہے تب بارش کا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے علاوہ اسکے مینہ کے پانی کی خرابی کا ایک اور بھی سبب ہے یعنی جب وہ پانی زمین میں پیوست ہو جاتا ہے تب اُس میں چونہ اور لگنے شیا اور آؤر معدنی چیزیں لمبائی میں لیکن یہ چیزیں ایسی ہنیں ہیں جن سے پانی بالکل خراب ہو جائے گا جب آدمی اُسے گندہ کر دیتا ہے یا جیپلون یا ایسے مقامات سے پانی لیا جاتا ہے جنہیں بہت سے گھاس پہوس گلے ہوتے ہوں تب وہ پانی کام کا ہنیں رہتا *

ہندوستان کے شہروں اور دیہاتوں میں پانی اکثر کیونکر گندے ہو جاتے ہیں اور وہ خرابی کیونکر کر سکتی ہے

ہندوستان کے لوگ پانی دریا یا ندیوں یا تالابوں یا کوؤں سے ہرتے ہیں اب دیکھنا چاہیے کہ یہ کیونکر خراب ہو جاتے ہیں اور کونسی ترکیبیں ہیں جن سے وہ خراب ہوں۔ تم ابھی سن چکے ہو کہ دریا اور ندیوں میں دو طرح سے پانی آتا ہے ایک تو وہ کہ زمین پر سے بہ کر جاتا ہے۔ دوسرا وہ پانی جسکو زمین پی جاتی ہے اور ریس ریس کر دیاؤں اور کوؤں میں پہنچتا ہے پس یہ بات بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے کہ جو کٹافٹین میں کے اوپر ہوتی ہیں اور جو اسکے اندر ہوتی ہیں وہ ساری اُس میں لمبائی ہیں اور اُسکو گندہ کر دیتی ہیں۔ بارش کے بعد کٹافٹین کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور دریاؤں اور کوؤں میں گاد بھی لمبائی ہے جس سے پانی گدلا ہو جاتا ہے۔ علاوہ اسکے دریاؤں میں اکثر ڈلاؤ ڈلاؤ دیتے ہیں اور مڑے بہا دیتے ہیں اور جو مڑے دریا کے کنارے جلاتے ہیں انکی راکھ بھی اُس میں پہنچ دیتے ہیں اور لوگ دریا کے کنارے پانخانہ بھی پیر دیتے ہیں اور ساری نجاستیں مینہ کے پانی سے بہ کر دریا میں جا پڑتی ہیں

اور جس گھاٹ پر لوگ نہاتے دھو لیتے ہیں اسی سے پینے کا پانی بھی بہرتے ہیں *
 پس یہ بات قابل غور ہے کہ بڑے اور نہایت تیز رو دریا جبکہ ان کٹاوتوں سے خراب
 ہو سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ندی لے جنہیں پانی کم اور آہستہ چلتا ہے وہ تو زیادہ تر خراب
 ہو جائیں گے اور انہیں سے لوگ پینے کا پانی بہرتے ہیں اسکا تذکرہ یہ ہو سکتا ہے کہ زمین
 پر نجاست اور گندہ پانی نہ پیشکین تاکہ اسکی سطح بھی صاف رہے اور اسکے اندر بھی گندگی
 کا اثر نہ پھیلے یہ بھی خیال رہے کہ جہاں سے پینے کا پانی بہرتے ہیں وہاں نہانا دھونا نہ چاہئے
 بلکہ بن گھٹ سے دور بہاؤ سے بچنے کی طرف کو نہائیں دھوئیں * دریا کے کنارے ریتے
 میں چند فٹ گہری اگر ایک چھوٹی سی خندق کھود لیں تو وہ چیلنی کا کام دے سکتی ہے
 کیونکہ جب پانی اُس میں نہر جائیگا تو گاد سے صاف ہو جائیگا اور ان کٹاوتوں سے بھی
 سمجھ نہ کچھ صاف ہو گا جو دریا میں ہوا کرتی ہیں *

جو جو خرابیاں دریا اور ندیوں کے پانی میں ہوتی ہیں بہت سی انہیں سے تالاب کے
 پانی میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن تالاب کا پانی چونکہ کھڑا رہتا ہے اس سبب وہ برائیاں
 اُس میں زیادہ مضر ہیں *

بعض اوقات تالابوں میں بول دہرا اور ایسی چیزیں سطح زمین سے برکھالتی
 ہیں یا باس کی زمین میں نجاست بہری ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ جذب ہو کر اندر سر
 اُٹھان جائے پھرتی ہے اور جتنے تالاب کا پانی پیتے ہیں لوگ اسی میں یا اسکے کنارے نہاتے
 دھو لیتے ہیں اور ہند کے بعض مقاموں میں عورتیں تالابوں میں نہاتے وقت اکثر شیشیا
 بھی کر دیا کرتی ہیں *

تالابوں کے کنارے پر اکثر پانے بھی ہوتے ہیں * اور خاص کر صبح کی وقت اکثر ایسا
 میکھا جاتا ہے کہ اسی تالاب میں جبکہ پانی میلا اور مٹھا ہوا ہوتا ہے کوئی تو نہاتا اور نکلی کرتا
 جاتا ہے اور کوئی مسواک کرتا اور اسی میں تھوکتا جاتا ہے۔ کوئی کھانے پکانے کے

برتنوں کو مانجھتا ہے۔ کوئی اپنے میلے کپڑے یا اناج دھوتا ہے۔ اور کوئی جا ضرور سے اٹھکر اُس میں آب دست لیتا ہے۔ اور جاے ضرار کی مواری سے نجاست بھی اُس میں جالتی ہے۔ بعض دفعہ اُس میں مولیشی کو نہلاتے اور پانی پلاتے ہیں اور کبھی رستی پٹنے کے لئے سن یا اُڑ کسی قسم کے ریشہ دار درخت کو بھی اُس میں ڈبو رکھتے ہیں کہ وہیں گھٹا رہے۔ یہ سب خرابیاں اس طرح دفع ہو سکتی ہیں کہ گندگی نہ زمین کے اوپر رہنے پائے اور نہ اُس کے اندر نفوذ کر سکے اور کوئی ایسا امر ہونے پائے جس سے تالاب گندہ ہو جائے اور حسبِ رزمین کا پانی تالاب میں پہونچتا ہو اُسکو اچھا طرح صاف رکھنا چاہئے اور اُس کے آس پاس نہ تو جاے ضرور اور نہ سٹا اس بہتر ہے کہ چند تالابوں کو صاف اور ستھرا کر کہیں تاکہ اُن میں سے لوگ پینے کا پانی بہرہ کریں اور نہانے دھونے کے لئے اُڑ تالاب ہوں *۔

اگر تالابوں کے کناروں پر چوڑے چوڑے کوئین ہوں تو بیچ کی زمین میں سے صاف پانی رس کر آئیگا پھر لوگوں کو پینے کا پانی تالاب کے اُن میں مقاموں سے بہرنا چاہئے جہاں وہ کوئین ہوں۔ پانی میں ہرے پودوں کا ہونا برا نہیں بلکہ اچھا ہے لیکن جو مڑھا جائیں اُن میں باحتیاط لکھ چٹیک دینا چاہئے *۔

ایسے تالابوں میں جو شہر یا گاؤں کے آس پاس ہوں سن یا اسی قسم کی اُڑ چنیروں کو نہ بھگوا کریں کیونکہ اس سے صرف پانی ہی گندہ نہیں ہوتا بلکہ ہا بھی کثیف ہو جاتی ہے *۔

پینے کا پانی نہایت صاف ہونا چاہئے اور یہ بھی سمجھنا کہ خراب پانی سے نہانے دھونے کا کچھ مضائقہ نہیں بلکہ میلے پانی میں نہانا دھونا بیماری کا مول لینا ہو *۔ کوئین زمین زمین کے چشموں سے پانی آنا چاہئے *۔

ہندوستان میں اکثر کوئین پر نشید رہیں ہوتے سیواسطے بارش وغیرہ کا گندہ پانی

اُن میں جا پڑتا ہے اور اکثر کوئین ایسی زمین میں کہو دلیتے ہیں جہاں سالہا سال گندگی جمع ہوتی رہتی ہے۔ اُنہیں جو زمین کے چشموں سے پانی آتا ہے وہ گندہ ہوتا ہے اسلئے بہتیرے پُرا نے شہروں کے کوؤں کے پانی میں اسقدر جاندہ رما دے ہوتے ہیں کہ اُنکا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا *

کوئین کے نزدیک سندس کا ہونا نہایت بُرا ہے کیونکہ جو پانی زمین کے چشموں سے کوئین میں رستا رہتا ہے وہ بھی گندہ ہی رستا ہے پس اگر کوئی سندس کوئینز کے پاس ہو تو اسے اچھی صاف کر دے کہ نہ کر دینا چاہئے۔ ہندوستان کے کوؤں میں ایک اڈبڑائی یہ ہے کہ اُنکے گرد نشیب ہوتا ہے جس میں بہرتے وقت تھوڑا بہت پانی ہمیشہ کتا رہتا ہے یہ پانی آدمی اور مویشی کی لتاڑ میں رہتا ہے اور اُس میں جانور اُنکا گوبر اور مٹائی بھی پڑتی ہے۔ یہی پانی پھر ریس ریس کر کوؤں میں جاتا ہے اور سارے پانی کو گندہ کر دیتا ہے *

بعض کوؤں کے گرد مویشی کے پینے کے لئے پتے حوض بنے ہوتے ہیں لیکن اکثر خراب رہتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں اُنکا سیلا پانی بھی کوئین میں جاتا ہے *

آدمی کوئین پر اکثر نہاتے ہیں یا میلے کپڑے دھوتے ہیں اس سے بھی کثافت کوئینز میں جاتی ہے۔ اکثر کوئین کھلے ہوتے ہیں اسلئے درختوں کے پتے وغیرہ یا تو اُنہی میں گرتے ہیں یا ہوا اڑلاتی ہے۔ پانی اگر میلے دل یا گندہی رستی سے بہا جائے تو بھی خراب ہکتا ہے اور بہرنے والے کے پاؤں کا دھون تو کوئین میں جاتا ہی ہے پس کوؤں کے پاک صاف رکھنے کے لئے ان باتوں کی احتیاط رکھنی چاہئے چنانچہ کچھ پاؤں وغیرہ سے جو جگہ خراب رہتی ہے وہاں کوئین نہ بنائیں۔ کسی موری کا پانی کوئین میں نہ جانے پائے نہ اُسکی دوا سے رستے پائے۔ کوئین کے پاس نہانا دھونا بند کریں کوئین کے گرد منڈیر اور اُسکی چاروں طرف کئی فٹ چوڑا چبوترہ ہونا چاہئے *

کوئین کے قریب ایسے نشیب اور خندق نہوں جنہیں موری یا کسی اور قسم کا پانی جمع ہو۔ پانی اس ترکیب سے بہنا چاہئے جس سے کوآن گندہ نہونے پائے، کوئین پر لوہے یا لکڑی کی جالی رکھیں تاکہ اُس میں نہ پتے وغیرہ گر سکیں نہ ہوائے مڑا کر جا سکیں ممکن ہو تو اُس میں پانی کھینچنے کا ایک پمپ لگا دین لیکن اُس میں لاگت بہت بڑھتی ہے اور جلد بکھر بھی سکتا ہے مگر ان طویل اور رستی کا متنا کر کہنا تو کچھ مشکل نہیں ہے +

پانی کے صاف کرنے کی بہتر سی ترکیبیں ایجاد ہوئی ہیں مگر پانی جب تھوڑی سی ریت لیتا ہے تو گاؤں و نوجو دنیچے بیٹھ جاتی ہے۔ بعض پمپنگ می وغیرہ سے بھی صاف کرتے ہیں اسکے خوب صاف کرنے کے لئے طرح طرح کی چیلیناں ایجاد ہوئی ہیں لیکن اگر وہ صاف جگہ سے ہوا جائے تو چھاننے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ صاف پانی بہنا چاہئے اور صاف ہی رکھنا چاہئے + لیکن چونکہ اتنا صاف پانی جس سے گھر کا کل کام چل سکے ملنا مشکل ہے بلکہ بعض دفعہ ممکن نہیں اس واسطے اکثر شہر و زمین ایسا بند و بست کیا گیا ہے کہ دریا سے یا کسی بڑے تالاب سے جس میں بارش کا بہت سا پانی جمع کیا ہو یا کسی گہرے کوئین سے میکانیوں کے ذریعہ سے شہر میں لاتے ہیں اور بازاروں اور گھروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس ترکیب کے فائدہ مند ہونے میں تو کچھ شک نہیں لیکن یہاں بھی پھر وہی لاگت کا جھگڑا پڑتا ہے خصوصاً شمالی ہندوستان میں تو ایسے شہر بہت کم ہیں جو اسکام کی واسطے روپیہ خرچ کر سکتے ہوں ان لوگوں کو جب اپنی تندرستی کا کامل خیال ہوگا تب البتہ ایسی باتوں میں ضرور حوصلہ کریں گے لیکن اب بھی اگر کوشش کریں تو بہت ہی کم لاگت میں حال کی برائیوں کے زخم کھینکا معقول بند و بست کر سکتے ہیں یہ بات ضرور یاد رہے کہ جیسے انسان کی تندرستی کی واسطے صاف پانی کی ضرورت ہے ویسے ہی حیوان کی واسطے بھی ہے لیکن انھوں نے بے کھچا پارے ٹھہر ڈنگروں کو اکثر اسی گھر ہے میں سے پانی پینا پڑتا ہے جو پاس ہوتا ہے خواہ اس میں آس پاس کی موریوں کی غفلت

ہی کیون نہ بڑھتی ہو ان بے زبانون کے لئے ہر ایک قسم کا پانی اچھا سمجھا جاتا ہے پس انکا ڈبلا پتلا اور میل رہنا کچھ تعجب کی بات نہیں اور یہی سبب ہے کہ اُنکے پیٹ میں کچھ بے پیدا ہو جاتے ہیں اور ڈر بیماریاں ہی ستماتی ہیں *۔

مقدار پانی کی - تاکہ تندرستی قائم رہے تین مطلب کیواسطے پانی کی ضرورت ہوتی ہے - چنانچہ غذا کے واسطے پھانے دہونے کیواسطے اور موسمی وغیرہ کے متناظر کرنے کے لئے - واضح ہو کہ جب قدر پانی کی افراط ہو اسیتقدر اچھا ہے لیکن اکثر اوقات پانی افراط سے بہین مل سکتا پس اس صورت میں اس بات کا جاننا مناسب کہ کم سے کم کقدر پانی کے ہونے سے صحت قائم رہ سکتی ہے - پانی کس ترکیب سے حاصل ہو سکتا ہے اس پر بھی اسکا کم یا زیادہ خرچ ہوتا منحصر ہے مثلاً پانی اگر گہرے چامات سے بہا جائے یا پینپ کے ذریعہ نکالا جائے تو ضرورت سے بھی خرچ میں کم آتا ہے لیکن جب پانی برابر ملتا رہتا ہے یا جب صرف بننے کے پیچ کے گھمانے سے حاصل ہو سکتا ہے تب پانی کا بہت نقصان ہوتا ہے اور ضرورت سے بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے *۔

غذا کیواسطے کچھ تو پانی پیا جاتا ہے اور کچھ پکانے کے کام میں آتا ہے - اگر کوئی شخص معمولی محنت کرتا ہو اور گرمی بھی نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم ہو تو اسکو ۲۰ گھنٹہ میں قریب دو سیر پانی کی ضرورت ہوتی ہے - لیکن محنت اگر زیادہ کرے یا گرمی کی شدت ہو تو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے *۔ چونکہ عورت اور بچے بہ نسبت مرد کے کم پانی پیا کرتے ہیں تو پلٹن کی بار کون اور جلیخانوں کے رہنے والوں اور شہر کے باشندوں اور کینوں کے لوگوں کے ہر ایک آدمی کے لئے وہی دو سیر پانی کافی ہے اور کھانا پکانے کے واسطے تین سیر پانی چاہئے - پس ہر ایک تنفس کے پینے اور کھانا پکانے کے واسطے ہر روز قریب پانچ سیر پانی درکار ہے *۔

علاوہ انسان کے حیوانات کے لئے بھی پانی کی مقدار کا بندوبست کرنا چاہئے

لیکن جیسے انسان مین ویسے حیوان کے پینے کے پانی کی مقدار اگر کمی کی شدت اور کام کی کثرت پر منحصر ہے۔ مگر معمولی حالات مین نفثہ ذیل کی مقدار دن کو کافی سمجھا جائے۔

گھوڑا	۲۰ سیر
بیل یا گائے	۴۰ "
خچر	۳۰ "
ٹٹو	۳۰ "
ماتھی	۱۵۰ "
شتر	۶۰ "
بھیرری	۵ "
خوک	۵ "

مویشی یا گھوڑے کا داند بھگونے یا پکانے کی واسطے سات یا آٹھ سیر پانی کی اُور بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً انسان کے انکا بھی پانی پاک اور صاف ہونا چاہئے۔ انسان معمولی مویشی کے نہانے دھونے اور کپڑے اور مکان اور سبب اور باسن برتن کے دھونے کے لئے پانی کا کھلا بند و بست ہونا چاہئے کیونکہ اس بات پر صحت کا بہت سا کچھ منحصر ہے۔ نہانے دھونے کا پانی بھی پاک صاف ہونا چاہئے کیونکہ پانی جب گدلا اور میل ہوتا ہے اور اس پانی سے جب غسل کیا جاتا ہے تب جلد کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جیسے ہنرہ اور خارش وغیرہ اور پتین بھی چل آتے ہیں۔

حیوانات کے نہانے دھونے کا بھی عمدہ بند و بست کرنا چاہئے کیونکہ انکی بھی صحت بڑی ضروری ہے۔ پس گھوڑا۔ بیل۔ گائے اور بھینس کے لئے پندرہ یا بیس سیر مگر کم سے کم دس سیر تو ضرور ہی چاہئے۔ اور ایسی حساب سے موجب انکے قدر و قامت کے دیگر حیوانات کے نہانے دھونے کے لئے صاف پانی کی ضرورت ہے۔

ہمارے کپڑے چونکہ دھوئی دھولاتے ہیں تو اس بات کا انتظام دھوئی کے سپرد کر دینا چاہئے۔

مکانات کی دیواریں اور صحن چونکہ بچتے ہوئے ہیں اور جو گلی بھی ہوں تو ان کے دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے گاہے گاہے انکو لیسپ دینا یا آپر سفیدی کر دینی کافی ہے لیکن ان گہروں کے ہر ایک رینوالون کی تعداد کے بموجب فی نفر دس یا پندرہ سیر پانی کافی ہے۔ اور باسن برتن دھونے کے لئے پندرہ یا بیس سیر ضرور چاہئے۔

اوپر کے بیان سے یہ صاف ظاہر ہے کہ کسی ایک گروہ کی حاجت ردائی کے لئے جبکہ ربانی درکار ہے اس میں بموجب مختلف حالتوں کے بہت اختلاف ہے پس پانچویں مقدار کے باب میں کسی عام قاعدہ کے قائم کرنے میں کوشش کرنا بے فائدہ ہے۔ مان جو مقدار میں اوپر لکھے گئے تھے افسے اتنا تو ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم کسی خاص صورت میں ضرورت کی وقت پانی کی مقدار کا تکرار کر سکتے ہیں۔ معمولی حالتوں میں ایک آدمی کے لئے کم سے کم روزانہ ۶۰ سیر پانی درکار ہے تاکہ اس کے اور گہر کے کاموں کے لئے کافی ہو مگر ہمیں نہانے کا پانی شامل نہیں ہے۔ پس غسل کا پانی ہی شامل کیا جاوے تو ۸۰ سیر چاہئے مگر اس مقدار میں سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ باخانہ میں ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کیا جاوے جب کسی موقع پر پانی کی نہایت قلت ہوتی ہے تب فی نفر ۲۰ سیر پانی سے کم میں کام نہیں چل سکتا۔

اوپر صرف ان لوگوں کے لئے پانی کی مقدار کا بیان کیا گیا ہے جو تندرست ہوتے ہیں۔ شفا خانوں میں بہ نسبت دیگر مکانات کو پانی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ شفا خانوں میں زیادہ پانی پیا جاتا ہے۔ زیادہ تھقی غذا کھاٹی جاتی ہے۔ بیماروں کو غسل بھی بار بار اور زیادہ کھلے طور پر کرایا جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریضوں کے کپڑوں کو دھوئی کو دینے

سے پہلے پانی مین جویش دیا جاتا ہے عسلا وہ ازین شفا خانوں کے صحن اور دیوارین اور بیماروں کی چار پانچ اور باسن برتن اچھے طور سے دھوئے جاتے ہیں زخموں وغیرہ پر پانی ٹپکانا اور منکبہ دھونا بھی پڑتا ہے جسمین بہت زیادہ پانی خرچ میں آتا ہے۔ پس شفا خانوں مین پانی کی بہت افراط ہونی چاہئے۔ اگر پانی کے بارے میں کفایت کرنا ہی ضرور ہو تو تندرستوں کے حصہ سے کم کر دین مگر شفا خانہ مین پانی اچھی طرح پہنچاؤں اگر شفا خانہ کے استعمال کی واسطے پانی کا تکد مہ بنا نا ضرور ہو تو فی بیمار کے لئے ڈیڑھ سو سیر پانی چاہئے تاکہ اسکے پینے کے لئے کہا نا پکانے کے لئے اور نہانے دھونیکے لئے کافی ہو۔ موریوں مین ہر روز کس قدر پانی بہانا چاہئے تاکہ پاک اور صاف رہیں یہ مقرر ہنن کیجا سکتی کیونکہ یہ مقدار کئی باتوں پر منحصر ہے مثلاً دیکھنا چاہئے کہ موریوں کی صورت کیا ہے اور انکا ڈھلاؤ کس قدر ہے اور انہیں سے کس قسم کی نجاست خارج ہوتی ہے۔ اگر منجھد اور تر نجاست خارج ہوتی ہو تو اس مکان مین ہننے والوں کے فی نفر کے حساب سے ۱۵ سیر پانی موری کے صاف رکھنے کے لئے درکار ہے۔ لیکن علی العموم ہمارے گھروں کی موریوں مین سے باوجود چھانڈ کا آخر رگہ اور باسن برتن کے دھونے اور نہانے دھونے کا پانی خارج ہوتا ہے۔ اور صرف نہانے کا پانی ہی اس موری کے صاف رکھنے کے لئے کافی ہو سکتا ہے بشرطیکہ موری اچھی طرح چربی ہو۔ موریوں کو ہمیشہ دیکھنا بہانا چاہئے تاکہ بند نہو جائیں کہ جس سے اس میں مضر ہوا میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جب ایسا ہو تو انہیں کھلا پانی بہا دینا چاہئے۔

پانی جب کم ملتا ہے تب اسکا اثر بدویسا ہی پیدا ہوتا ہے جیسا گندہ پانی کے پینے یا گندھی ہوا میں دم لینے سے ہوا کرتا ہے۔ پینے کو پانی جب کم ملتا ہے تب ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ پیاس سبھانے کے لئے جیسا ملتا ہے ویسا پی لیتے ہیں بلکہ نہایت گندہ پانی بھی پی لیتے ہیں۔ پانی جب پینے کو کافی مقدار میں نہن ملتا ہے تب ہاتھ

پائون ڈریبلے ہو جاتے ہیں ہلنا جھلنا دشوار معلوم ہوتا ہے اور کام کاج کو طبیعت نہیں چاہتی۔ پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ مشقت اچھے طور پر کیجئے گئے چنے کا پانی عمدہ ہو اور برابر ملتا رہے۔ پلٹن جب کوچ پر ہو یا برسر کار زرار اور مزدور جب کام کرتے ہوں اور قیدی جب سخت مشقت کرتے ہوں تب انکو پینے کا پانی برابر ملتا رہے تاکہ پیٹ سے اور جلد کے ذریعہ جسم کی جو رطوبت تخیّر نہ کر کے خارج ہوتی ہے اسکا بدلا ہوتا رہے۔ جب کہانا پکانے کو کافی مقدار پانی کی دستیاب نہیں ہو سکتی تب وہ کہانا کچا رہ جاتا ہے اور مفہم نہیں ہوتا۔ اس بات کا جتنا نا فضول معلوم ہوتا ہے کہ جسم کی صفائی صحت کے لئے کیسا ضروری امر ہے۔ نہانے دھونے کے لئے جب پانی کم ملتا ہے تب جلد پنا کام اچھی طرح نہیں کر سکتی ہے اور جلد کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور تندرستی میں اور طرح سے بھی خلل واقع ہو جاتا ہے + علاوہ ازیں پانی کی کمی کے سبب جسم جب میلارہتا ہے اور پھٹنے کے کپڑے جب نہیں دھلتے یا کافی طور پر صاف نہیں کئے جاتے تب ان سے مضر ہوائیں کہ جنہیں جاندار مادے ہوا کرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اور صحت کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور پانی حباً ذر باتون کے لئے کم ملا تب موریوں کے دھونے کے لئے تو بہت ہی کم ملیگا اور جب ان موریوں سے صرف نہانے دھونے کا میلا پانی ہی نہیں بلکہ نجاست ہی خارج ہوتی ہے تب ان سے گندہی ہوا پیدا ہو کر ٹامی - فائیڈ فیورا اور ہیضہ اور دیگر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں +

سوم غذا - غذا اس چیز کو کہتے ہیں جس سے جسم کی پرورش ہوتی ہے پس جس صورت میں غذا کافی نہ ہو نچے یا اسکے اجزاء میں کسی طرح کا فرق ہو تو انواع و اقسام کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں چنانچہ قحط سالی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ سبب کمی یا خراب غذا کے لوگ صدہ قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایسے مقامات میں جہاں

لوگوں کا جمع ہوتا ہے جیسے جیلانی نہ جہاز وغیرہ میں جب قیدیوں یا ملا حوں کو غذا کم یا خراب ملتی ہے تو انکو اسکوہ دی کی پیارمی ہو جاتی ہے اور پشیش اور سہمال اور بنجار کی دیا پسلیجاتی ہے *

واضح ہو کہ انسان اور حیوان کے جسم اور روح کی ہر ایک حرکت سے بدن کی بافت گہرے برباد ہو جاتی ہے اور یہی سبب بافت کی بربادی کا ہے کہ بدن کی حرارت غریزی صحت کی مقدار پر قائم نہ کہنے کے لئے اسے جن اور کارہین آپس میں ملتی رہتی ہیں اور جسم کی سطح بیرونی سے رطوبت بخیر بنکر ہمیشہ اُڑتی رہتی ہیں۔ غرض ان نقصانات کو پورا کرنے کے لئے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس وہ کُل اشیاء غذا ہیں جن سے برباد بافت کا بدلا ہو سکے یا بافت کو برباد نہ ہونے دیں یا دیر سے برباد ہونے دیں یا بلا واسطہ ان بافت کی مرمت میں مدد دے سکیں * اور وہ اشیاء غذا کے قابل ہو سکتی ہیں جنہیں یہ ضعیفین موجود ہوں *

الف۔ انہیں ہونا ان مفرد جزو کا جن سے جسم بنا ہوا ہے *
ب۔ وہ مفرد اجزاء آپس میں ملکر ایسی خاص شکلوں میں مرتب ہو جائیں جن سے جسم عموماً طور پر پرورش پاسکے *
ت۔ اور یہ کہ وہ ساری مل جل کر اتنی ہوں جس سے مختلف حالتوں میں جسم کی ضرورتیں بخوبی پوری ہو سکیں مثلاً محنت اور شقت کی حالت میں اور مختلف آب و ہوا وغیرہ میں *
ث۔ علم اور تجربہ کے ذریعہ ہم نے ان غذائی اشیاء کو جن جماعتوں میں تقسیم کیا ہو ان جماعت کی چیزوں کو ایک دوسرے سے مل جل کر خاص مقدار میں مرتب ہونا چاہئے *
ج۔ یہ کہ غذا کی چیزیں ان قسم کے اور ایسی حالت میں ہوں جو انسان یا حیوان جبکہ واسطہ وہ غذا بخیر نہ کی گئی ہو انکی قوت کا فائدہ کے موافق ہو۔
چ۔ یہ کہ غذا اعداد اسکے تیار کرنے کی ترکیب طبع کی ہوئی چاہئے تاکہ کافی طور پر پیچھا ہو جائے

اور کامل طور پر اسکا استحصال ہو سکے ۛ

انسان اور حیوان کا جسم ان مفردات سے بنا ہوا ہے چنانچہ نائے - ٹروجن ۛ
کاربن ۛ اکسے - جین ۛ ٹائیٹر و جین ۛ پوٹاشیم ۛ سوڈیم ۛ کیال - سیئم ۛ
گنے - شیم ۛ ایرن ۛ کلو رین ۛ فاسفورس اور سلفر ۛ

اکسے - جین اور ٹائیٹر و جین کی نسبت زیادہ کھنسنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جن
اغذیہ میں نائے - جین اور کاربن ہوتا ہے انہیں اکسے - جین اور ٹائیٹر و جین بھی کافی مقدار
میں ضرور ہوتا ہے ۛ کل حیوانی اور نباتی اغذیہ میں اور پانی میں بھی وہ دونوں مفرد ہوا ایٹم
موجود ہیں ۛ

یاد رہے کہ جسم کی ان کل بافتوں میں نائے - ٹروجن موجود ہے جنکا تعلق قوت
پیدا کرنے سے ہے جیسے اعصاب اور عضلات اور غدود وغیرہ - پس انکی مرمت کے
لئے نائے - ٹروجن کا ہونا نہایت ضروریات سے ہے اور چونکہ صفر میں اور دیگر طوابع
جسم میں جنکا تعلق ٹافم سے ہے نائٹر و جین ہوتا ہے اسلئے ان رطوبتوں کو صحت
کے درجہ پر قائم رکھنے کے لئے بھی نائٹر و جین کا پہنچانا ضرور چاہئے ۛ پس چونکہ اعضا
کے افعال کی تیزی اور تندہی حسبہ زیادہ ہوگی نائے - ٹروجن کو بھی استیفاء زیادہ
پہنچانا چاہئے اسلئے ان حیوانات کی غذائیں جو مخلوقات میں بڑے درجہ پر رکھتے ہیں
نائے - ٹروجن کا ہونا شد ضروریات سے ہے ۛ محققین کے مشاہدہ اور تجربہ سے یہ
ثابت ہے کہ ایک جوان آدمی کے جسم کے اندر کے کام جو لایہدی ہیں جیسے سانس کا لینا -
خون کا دورہ کرنا اور غذا کا ہضم ہونا کہ وہ کام اچھے طور پر جاری رہیں ۛ گھنٹہ میں ۱۳۸
گرین نائٹر و جین کی ضرورت ہوتی ہے ۛ اور جسم اور دماغ دونوں مست پڑے رہیں
تو کم سے کم روکے لئے ۛ۰۰ گرین اور عورت کے لئے ۛ۰۰ گرین نائے - ٹروجن ضرور چاہئے ۛ
اس سے کم مقدار میں صحت قائم نہیں رہ سکتی ۛ معمولی حالات میں کسی سپاہی یا عورت

پیشہ کے لئے یا کرسان یا کسی جلیجنا کے قیدی کیواسطے کم سے کم نایطرون جن ۰۰ گرین ضرور چاہئے۔ جسمانی محنت اگر بہت زیادہ کیجاوے تو ۰۰ گرین بلکہ اس سے بھی زیادہ چاہئے + غذا کی بہتری چنبرون میں نامے۔ ٹرون بہت افراط سے اور مختلف مقدار میں ہوتا ہے + ان شیارین سے ایک جماعت غذا کی وہ ہے جسکو اصطلاح میں ایل۔ بیو۔ مے۔ ریٹنس کہتے ہیں انہیں نامے۔ ٹرون بکثرت ہوتا ہے + نقشہ کلینر ناکی ان چنبرون کی فہرست دی گئی ہے جنہیں خاص کر نایطرون زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ انکے ایک پاؤنڈ میں کس قدر نامے۔ ٹرون ہوتا ہے اسکی مقدار گرین کے حساب سے درج کی گئی ہے +

مقدار	نام اشیا	مقدار	نام اشیا
۱۹۵-گرین	ماہی	۶۸-گرین	جو کا آٹا
۱۲۰	مکئی کا آٹا	۴۴	گوشت پکا ہوا
۴۴	تازہ دودھ	۳۶	بکورت
۳۰۴	گوشت بڑیا ہٹیری کا ہوا -	۸۸	معمولی روٹی
۱۸۹	خام	۵۸	کا گودا
۲۴۸	مٹر	۷۶	کا چھکا
۲۲	آلو	۴۰۰	کھن
۶۵	چاول	۴۲	لٹی یعنی مٹھا
۱۳	ساگودا	۱۴	گاجرین
۱۳	شلم	۲۶	پنیر
۱۳	ساگ	۱۲۰	نایٹل
۱۱۶	آر و گندم	۱۴۹	بیضہ

کار - بن - جسم کی ساخت کے ہر ایک ریشہ میں کار - بن ہوتا ہے اور بخیر خیر و بقوت کے ہر ایک رطوبت میں بھی ہوتا ہے اور جسم کی حرارت اور قوت کا بھی یہی کار - بن منبع ہے کہ جب یہ اکسے جن کے ساتھ ملجاتا ہے - پس غذا میں اس چیز کا ہونا نہایت ضروریات سے ہے + ایک اوسط جوان کی پرورش کے لئے کہ جب وہ محنت نہ کرتا ہو ۲۴ گھنٹہ میں ۸ آونس کار - بن کی ضرورت ہے + اور چاہے وہ کتنا ہی محنت کرتا ہو سب سے گیارہ آونس کی ضرورت ہے + نقشہ ذیل میں ان اشیاء کی فہرست دی گئی ہے جنہیں علاوہ نامے - ٹروجن کے کار - بن بھی ہوتا ہے - اور چند ایسی بھی جنہیں بن جنہیں نامے - ٹروجن نہیں ہوتا ہے مگر کار - بن موجود ہے + ان اشیاء کے ایک پاؤنڈ میں کار - بن کی مقدار بحساب گرین کے دی گئی ہے +

مقدار	نام اشیاء	مقدار	نام اشیاء
۳۹۳۴ گرین	ناریس	۲۵۶۳ گرین	جو کا آٹا
۱۱۴۴	بغیہ	۱۸۵۴	گوشت گاؤں کا پکا ہوا
۸۷۴	ماہی	۱۵۷۳	گائے کی چربی خام
۲۸۱۹	پکائی ہوئی چربی	۱۰۶۴	گوشت گاؤں کا خام
۳۵۱۶	جوار کا آٹا	۱۹۷۵	روٹی
۵۹۹	شیر	۲۹۲۸	سب کوٹ
۱۸۸۳	گوشت بڑیا بیٹری پکا ہوا -	۶۲۵۶	لکھن تازہ
۲۹۹۹	مٹر دلا ہوا	۴۵۸۵	نمک ملا ہوا -
۷۶۶	آلو	۳۸۷	لسی لینے مٹھا
۲۷۳۲	چاول	۵۰۸	گاجرین
۲۵۵۵	سگودانہ	۳۳۴۴	پنیر

کے ہوتا ہے + اس مرکب کا قریب ۳ گرین ۴۰ گنٹھ میں جاتے ہیں۔ یہ مرکب ہر قسم کی زمین میں ہوتا ہے۔ اسلئے یہ شے حیوانات کو نباتات سے حاصل ہوتی ہے۔ اور پانی میں اکثر ہوا کرتا ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لئے مگ۔ نئے شیم ہی درکار ہے مگر بہ نسبت کیاں۔ شیم کے کم مقدار میں۔ چنانچہ ۲ گرین کافی ہے + خون کے سرخ کیموں کے لئے فولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہی قریب ہر ایک قسم کی غذا میں ہوتا ہے +

کلو۔ رین۔ یہ شے کلو۔ رائیڈ اف سو۔ ویم لینے کہانے کے نمک سے حاصل ہوتی ہے اور کہانے کے اکثر اشیاء میں ہوا کرتا ہے۔ نمک جب جسم میں داخل ہوتا ہے تب اسکے اجزاء الگ الگ ہو کر ٹائیڈرو۔ کلو۔ رک اسٹد بنجاتا ہے جو البیو۔ فرسٹ قسم کی غذا کو مفہم کرتا ہے + فاس۔ فرس شکل فاس۔ فا۔ رک اسٹد کے جسم کی پورٹ کیواسٹے نہایت کارآمد ہے + ہڈیوں اور اعصاب کی ساخت میں فاس۔ فرس بکثرت ہوتا ہے + فاس۔ فرس حاصل ہوتا ہے البیو۔ من دارچینوں سے اور قریب ہر قسم کی غذا میں ہی ہوتا ہے + ۴۰ گنٹھ میں قریب ۴۰ گرین فاس۔ فرس جاتی ہے + غذا میں گندہک کا بھی ہونا چاہئے + البیو۔ من دار اشیاء اور بعض قسم کی نباتات کے ذریعہ جسم میں گندہک داخل ہوتی ہے مثلاً گوہی بیا زو غیرہ اور پینے کے پانی میں بھی گندہک کے مرکبات اکثر ہوا کرتے ہیں +

مقدار غذا کی۔ صحت کے قائم رکھنے کے لئے کس قدر غذا کی ضرورت ہے یہ بات کئی ریون پر منحصر ہے مثلاً عورت اور مرد کے ہونے پر عمر پر۔ اب وہاں پر طبعیتوں پر۔ غذا کی خاصیت پر اور ریاضت کی مقدار پر۔ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہ نسبت مردوں کے عورت کم غذا پر زندگی بسر کر سکتی ہیں لیکن یہ بات بہ نسبت جنسیت کے ریاضت پر زیادہ منحصر ہے یعنی کوئی عورت کسی مرد کی نسبت زیادہ

محنت کرے تو اُسکو اُس مراد کی نسبت زیادہ غذا چاہئے ۔

عمر۔ بلحاظ جسم کے وزن کے شیرخوارہ طفل کے نسبت کسی جوان آدمی کو بھوک
غذا کے کار۔ بن والی چیزیں لگنے اور ناسے۔ ٹرو۔ جن دوا پیر دیکھا چہ گونا جائے ۔ پیچہ
کی عمر جب دس سال کی ہو جاتی ہے تب جوان آدمی کی غذا کی نصف مقدار اور
چودہ سال کی عمر میں جوان کے برابر غذا چاہئے ۔

آب و ہوا۔ بہ نسبت گرم ملکوں اور گرم موسم کے سرد میں زیادہ تر غذا کی ضرورت
ہوتی ہے کیونکہ حرارتِ غریزی کے قائم رکھنے کے لئے غذا کا خرچ زیادہ ہوتا ہے اور
اس صورت میں مشقت بھی زیادہ کی جاتی ہے ۔

طبیعت کا اختلاف۔ ہر فرد بشر کی طبیعت چونکہ یکساں نہیں ہوتی ہر
تو غذا کی مقدار میں بھی اختلاف ہونا چاہئے مثلاً ہر ایک شخص کے قد و قامت یکساں
نہیں ہوتے اور نہ طاقت اور قوت کا ضابطہ اور نہ تیزی دورانِ خون اور دل و دماغ کی
قوت ایک جیسی ہوتی ہے پس ان بواعث سے اُنکی غذا کی مقدار میں بھی فرق ہونا
چاہئے ۔ غذا کی مقدار پر کھانے کی عادت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے مثلاً اگر کچھ سے جس
کی کو بہت کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے اُسکو ضرورت سے زیادہ غذا کی خواہش
ہوتی ہے ۔ پس ٹھیک مقدار غذا کی قائم کرنا دشوار ہے ۔

ریاضت یا مشقت۔ جو لوگ زیادہ محنت اور مشقت کرتے ہیں اُنکو زیادہ
غذا کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً سپاہی یا قیدی یا مزدور کیونکہ جب تک زیادہ غذا
نہیں ملیگی تب تک زیادہ کام نہیں کیا جاسکتا ۔ اوسط قد و قامت کا جوان بواو
درجہ تک محنت کرتا ہو ہم گھنٹہ میں اُسکے جسم کے وزن کا $\frac{1}{4}$ سے $\frac{1}{3}$ حصہ غذا
کی مقدار چاہئے ۔ اس میں پانی کی مقدار بھی آگئی ۔

کسی غذا کی مقدار میں۔ غذا جب کم مقدار میں ملتی ہے تب طبیعت

گرنے لگتی ہے۔ کا د بار گوجی ہنہن چاہتا۔ مرض میں مبتلا ہونے کے لئے طبیعت
 مایل رہتی ہے * اور جب ایسی اشیاء کھاتی جاتی ہیں جنہیں تخذیہ کم ہوتا ہے تب
 بھی جسم کی پرورش اچھی طرح ہنہن ہونے پاتی ہے اور محنت ہنہن ہو سکتی۔ مثلاً پلٹن جب
 ایسے اسٹیشن میں ہوتی ہے جہاں غلہ کی گرانی ہو یا جب پلٹن ایک جگہ سے دوسری
 جگہ بار بار بدلتے رہتے ہیں اور اس سبب سے سپاہی مقرض ہو جاتے ہیں یا جب ان
 کے ساتھ فالتو رشتہ دار دن کو رہنے کی اجازت ہوتی ہے یا جب اپنے بال بچوں کو
 چھوڑ کر پلٹن کے ساتھ کسی غیر ملک میں جاتے ہیں اور اپنی تنخواہ میں سے بچا کر روپیہ یا کپڑے
 کو بھیجتے ہیں اور آپ مختصر غذا پر زندگی بسر کرتے ہیں تب جسم کے اچھے طور پر پرورش نہ
 پانے سے فوجی نوکری کے قابل نہیں رہتے * عرصہ کی فاقہ کشی کا نتیجہ ہیبت ہی بُرا
 ہوتا ہے چنانچہ خون کم ہو جاتا ہے اور سارا بدن بیلا پڑ جاتا ہے۔ بدن لاغر ہونے
 لگتا ہے۔ سارے بدن میں سُستی چھا جاتی ہے۔ زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور تازہ
 میوہ جات اور ترکاری کے نہ کھانے سے اسکرومی ہو جاتی ہے اور اسہال یا
 پیش یا استسقا ہو جاتا ہے۔ جلد خشک ہو جاتی ہے اور اس پر سے سبوسہ جڑنے لگتا
 ہے اور بالوں کی رنگت بھیکی پڑ جاتی ہے اور قوت باہ بھی کم ہو جاتی ہے *۔

غذا کی مقدار میں زیادتی۔ بہترے تندرست آدمی ایسے ہیں کہ غذا ضرورت
 سے زیادہ کھاتے ہیں اور ان کو بظاہر تکلیف ہنہن ہوتی اور گاہے گاہے ایسا ہی ہوتا ہے
 کہ جب عرصہ تک غذا ہنہن ملتی ہے۔ بھوک کے مارے اس قدر کھا لیتے ہیں کہ وہ
 غذا تحلیل ہنہن ہونے پاتی تب معدہ میں متحضر ہو جاتی ہے اور مکمل خرابیاں معنی
 کی پیدا کرتی ہے *۔

زندگی کے لئے اور صحت کے قائم رکھنے کی واسطے صرف یہی ضرور ہنہن ہے کہ
 جسم کے مختلف مفرد اجزاء کی پرورش کے لئے غذا کے مفرد اجزاء جسم میں داخل ہوں بلکہ

جب تک اور شرائط بھی پوری نہ ہوں گی تب تک اس غذا سے جسم کی پرورش نہیں ہو سکتی
مثلاً یہ بات ضرور ہوتی چاہئے کہ غذا کی جتنی پرورشیں اجزاء میں ان سب کو مناسب طور
پر علیحدہ علیحدہ جماعتوں میں ترکیب دینا چاہئے تاکہ غذا میں وہ علیحدہ علیحدہ مرکبات
کی مقدار مناسب طور پر آجائے جس سے ندرستی قائم رہے۔ پس کہانے کی
چیزوں کے مفرد اجزاء کو الگ الگ مناسب مقدار میں ترکیب دیتے ہیں غذائی
اشیاء ان جماعتوں میں خود مرکب بن جاتی ہیں مثلاً البیو۔ مے۔ ریٹس۔ و ہنٹ
یعنی روغن دار، کار۔ بو۔ ٹائیڈ ریٹس۔ ٹیک اور پانی۔

البیو۔ مے۔ ریٹس غذا کی وہ جماعت ہے جس میں حیوانات سے یہ چیزیں
شامل ہیں جیسے البیو۔ من۔ فائی۔ برین۔ کے۔ ٹرین وغیرہ اور نباتات سے
لے۔ گیو۔ مین اور گلو۔ ٹین وغیرہ۔ ان چیزوں میں ناسے۔ ٹروجن موجود ہے اور
کسی قدر گندہک اور فاس۔ فو۔ رس بھی ہے۔ یاد رہے کہ جس غذا میں البیو۔ من
اور چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس غذا سے جتنی اور چالاک اور طاقت نہیں پیدا ہو سکتی
اور ان اشیاء کے ناسے۔ ٹروجن اور کار۔ بن میں جب اکسے۔ جن شامل ہو جاتی
ہے تب جسم کی حرارت غریزی اور دیگر قوتیں بھی پیدا ہوتی ہیں اور وہ چیزیں حرابی
میں ہی بدل جاتی ہیں۔ انسان اور حیوان کا بڑا فرض یہی ہے کہ طاقت کو پیدا
کریں اور اس طاقت کے پیدا ہونے کے لئے خون کے کار۔ بن اور ٹائیڈ روجنز
کو اکسے۔ جن کے ساتھ ملنا چاہئے۔ پس اس بات کے لئے جسم میں ان بافتوں
کا ہونا ضروریات سے ہے جن میں ناسے۔ ٹروجن موجود ہے۔

صحت کے قائم رکھنے کے لئے البیو۔ مے۔ ریٹ قسم کی غذا کی کسی قدر ضرورت
ہے۔ یہ بات ریاضت کی مقدار پر منحصر ہے مگر یہ تحقیق ہے کہ جب مقدار البیو۔ من دار
غذا کی حد سے بہت کم ہو جاتی ہے تب تو خون اچھے طور پر دورہ کر سکتا ہے نہ سائز

اچھے طور پر لیا جاسکتا اور نہ غذا کا مل طور پر ہضم ہو سکتی ہے نتیجہ جیسا کہ ہوتا ہے کہ پہلے تو عضلات کمزور ہو جاتے ہیں اور تب دماغ کی قوت گھٹ جاتی ہے۔ بعد ازاں بخار ہو جاتا ہے اور مضمہ بگڑ جاتا ہے اور اس سبب سے خون رقیق ہو کر اینمیا کی حالت پیدا ہو جاتی ہے +

البیو۔ من در غذا کا حد سے زیادہ استعمال کرنے سے جسم پر کس قسم کا اثر پیدا ہوتا ہے یہ بات مضمہ کی طاقت اور اس غذا کے کہانے والے کی عادت پر منحصر ہے مثلاً ہتیرے آدمی ایسے ہیں کہ جسم کی ضرورت سے زیادہ البیو۔ من در غذا کہاتے ہیں اور اس سے کسی قسم کا نقصان نہیں پیدا ہوتا۔ اور جو لوگ گوشت کی غذا کثرت سے کہاتے ہیں یا بالکل گوشت کی غذا پر زندگی بسر کرتے ہیں اپنے جسم میں حد سے زیادہ نامے۔ ٹروجن دار مادہ داخل کرتے ہیں اور اس سے تب ہی تک نقصان نہیں پہنچتا کہ جب تک خوب ریاضت کرتے رہتے ہیں مگر گوشت کے بکثرت کہانے سے کہیں نہ کہیں نقصان ضرور پہنچتا ہے کیونکہ آخر کار مزاج دوسری جاتا ہے اور جگر میں اجماع خون کا ہو کر وہ عضو بڑھ جاتا ہے + اور جب ریاضت اچھی طرح نہیں کی جاتی ہے تب نامے۔ ٹروجن اکسے جن کے ساتھ اچھی طرح شامل نہیں ہو سکتا نتیجہ جیسا کہ ہوتا ہے کہ اس گوشت کی غذا سے جو نامے۔ ٹروجن دار اجزا پیدا ہوتے ہیں اور جن کا جسم سے خارج ہونا مشکل ہو۔ ریان ریو۔ رکن اسٹکے موجب تندرستی کا ہے خون ہی میں رہ جاتا ہے اور ایسے امراض پیدا کرتا ہے جیسے گاؤٹ یعنی نقرس +

نامے۔ ٹروجن دار غذا میں جن سے جسم کو البیو۔ من در اجزا حاصل ہوتے ہیں ایسی چیزیں ہیں دودھ۔ پنیر۔ گوشت۔ بیضہ۔ گندم وغیرہ اناج اور مختلف قسم کی دالیں +

چربی میں اور ان غذائی اشیاء میں جنکو اصلاح میں کاربوہائیڈریٹس بولتے ہیں کاربوہائیڈریٹس کو نکالا اور اسے چکن اور مایوٹروجن ہوتا ہے۔ ان میں نائے۔ ٹروجن نہیں ہوتا اور جب سانس کی حرکتوں سے ان اشیاء کے تھم اسے چکن ملتا ہے تب بدن کی حرارت غریزی پیدا ہوتی ہے *

یاد رہے کہ غذا میں روغن ذخیرہ نہ ہوتا ہے، بہت ضروری ہے کیونکہ ان سے عضلات اور اعصاب کی ساخت کی پرورش ہوتی ہے۔ اور ذخیرہ کو بھی مدد ملتی ہے کیونکہ معدہ میں جب مدہنات موجود ہوتے ہیں تب البیو۔مین و ارجنیرین آسانی سے ہضم ہو جاتی ہیں اور ہم اوپر یہ بتا چکے ہیں کہ جب روغن ذخیرہ کے ساتھ کتے بڑ شامل ہوتا ہے تب حرارت غریزی اور جسم کی دیگر قوتیں بھی پیدا ہوتی ہیں * غذا میں مدہنات روغن دار یا چربی کے قسم کی چیرین اس مقدار میں ہونی چاہئیں یہ ریاضت کی مقدار پر منحصر ہے مثلاً جب ریاضت زیادہ کیجاتی ہے تب غذا میں مدہنات اور البیو۔مین و ارجنیرین کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے چنانچہ جب ریاضت نہیں کیجاتی ہے تب ایک آؤس سے اور معمولی مشقت میں ڈیڑھ آؤس سے ۴ آؤس تک اور جب زیادہ مشقت کیجاتی ہے تب سارے ۴ آؤس سے سارے چار آؤس تک مدہنات کی ضرورت ہوتی ہے * مگر یہ یاد رہے کہ حیوانات سے جو روغن حاصل ہوتے ہیں وہ بہ نسبت نباتی روغنوں کے زودتر مستعمل ہوتے ہیں مگر جب حد سے زیادہ کھائی جاتی ہے تب کچھ حصہ اسکا اجابت کی راہ خارج ہو جاتا ہے اور جو حصہ خون میں شامل ہو جاتا ہے وہ جسم میں جمع ہونے لگتا ہے اور آدمی کو موٹا کر دیتا ہے اور اسکے بعض اعضاء چربی میں بدل جاتے ہیں پس روغن ذخیرہ کا حد سے زیادہ کھانا خالی از نقصان نہیں ہے جیسے کہی کہیں وغیرہ *

ایک اور جماعت غذا کی ہے جسکو کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں۔ اس جماعت

میں دو قسم کی غذائی اشیاء شامل ہیں۔ ایک اسٹائج دوسری شیرینی + اس قسم کی غذا تندرستی کے لئے اور نہ زندگی کے لئے لابدی ہے۔ لیکن اگرچہ ضروری چیز ہے مگر کوئی جبکہ پیسہ ہے اسکو کہتا ہے۔ شیرینی اور اسٹائج کے قسم کی چیز دنگا اثر جسم پر ایسا ہوتا ہے جیسا روغنہ اشیاء کا ہوتا ہے۔ لیکن ان سے حموضات (ترش رطوبتیں) جیسے لاکٹک، ٹیٹک اسٹو وغیرہ حموضات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اور جب زیادہ مقدار میں کہاں جاتی ہیں تب شکم میں ترشی زیادہ پیدا ہوتی ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔

اسٹائج کے قسم کی غذائیں یہ ہیں جیسے ساگو دانہ۔ اراوٹ۔ گندم۔ برنج۔ آلو۔ دال ہر قسم کی۔ جوار۔ باجرا۔ مکی۔ شیرینی۔ نئی شکر اور کچورا اور شیریں میوہ جات وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے۔

نمک کے قسم کی چیزیں بھی صحت کے لئے بہت ضروری ہیں کیونکہ ان سے جسم کی بافت اور رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ نمکین اشیاء اسطور سے پیدا ہوتی ہیں کہ کہاں چیزیں لاکٹک، ٹیٹک اسٹو اور دیگر نباتی ترش اجزاء کے ساتھ ملکر انکو بنا دیتے ہیں مثلاً پوٹاشیم اور سوڈیم کے کہاں ان ترشیوں کے ساتھ ملکر لاکٹک۔ ٹیٹک اف پوٹاشیم یا لاکٹک۔ ٹیٹک اف سوڈیم بن جاتا ہے اسطور پر ہمارے ٹریٹ اور سمائے۔ ٹریٹ اور اسے۔ ٹریٹ وغیرہ نمک بھی بن جاتے ہیں جس غذا میں اس قسم کی نمکین چیزیں کی کمی ہوتی ہے وہ تندرستی کے لئے بہت مضر پڑتی ہے چنانچہ اسکو دی اسی سبب سے ہو جاتی ہے۔ اور جب غذا میں کھانے کے نمک کی کمی ہوتی ہے تب شکم میں گرم پیدا ہو جاتے ہیں اور معدہ کی رطوبت مضمین ٹیڈر۔ کلورک اسٹو کی کمی ہو جاتی ہے جس سے غذا اچھے طور پر ہضم نہیں ہونے پاتی۔ غذا اگر صرف گندم یا برنج کی ہو تو ہر روز سو گرین نمک کافی ہے مگر چاول کی غذا کے لئے دو فی مقدار

چاہئے لیکن نمک کی بابت کوئی عام قاعدہ مقرر نہیں کیا جاسکتا مگر اتنا کہا جاسکتا ہے کہ نمک کی زیادتی سے نقصان نہیں ہے مگر کمی سے صحت کو نقصان عظیم پہنچتا ہے۔ غذا کے ساتھ کافی مقدار پانی کی بھی نہایت ضروری ہے کیونکہ جسم کی جتنی بافت ہیں اُن ساروں کی پرورش کے لئے پانی کا ہونا اس قدر ضروریات سے ہے درہاں کی زندگی محال ہے۔ مزید بریں جو رطوبت جلد اور گردن کے ذریعہ جسم سے خارج ہوتا ہے پانی کے بغیر اسکا بھی بدلا نہیں ہو سکتا۔

پانی کی مقدار کتنی ہونی چاہئے تاکہ صحت قائم رہے کسی باتوں پر منحصر ہے مثلاً کام کی مقدار پر۔ موسم کی گرمی پر۔ حادث پر۔ لیکن عام طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک جوان آدمی کے لئے ۷۰ سے ۹۰ آؤنس تک پانی ہر روز چاہئے۔ پانی ضرورت سے جب زیادہ پیا جاتا ہے تب نالتو پانی جلد اور گردن کے ذریعہ خارج ہو جاتا ہے لیکن پانی کی کمی سے جیسانی اور روحانی دونوں تین گھٹ جاتی ہیں۔ جتنی منہرہ شیا غذا کی ہیں سب مین پانی ہوتا ہے لیکن جسم کو خاص کر پینے کی چیزوں سے پانی حاصل ہوتا ہے جیسے دودھ چار کافی وغیرہ۔ تم کہو گے کہ شراب مین بھی پانی ہے تو شراب بھی پیا جاتے۔ اسپرلخت ہیچو مان کتوں سے منہ چٹوانا ہے۔ جگر اور دل اور دماغ اور گردن کی بیماری خریدنی ہے اور جوانی موت مرنا ہے تو اسکو منہ لگاؤ ورنہ اسپرلخت ہی ہیچو۔ ہم مند دستا نیون کو تندرستی کی حالت مین چار اور کافی پینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پاک اور صاف پانی صحت کے قائم رکھنے کے لئے کافی اور کافی ہے۔ مگر مان جب کوئی بیماری ایسی ہو تو حسب ہدایت طبیب کے اُن ممنوعات کا استعمال صرف بیماری کی حالت مین کر سکتے ہیں۔ مگر یہ دیکھ لینا چاہئے کہ وہ طبیب خود ہی نہ شراب خوار ہوئے اپنے طبع تم کو بھی شرابی بنا دیگا۔

علامہ اُن شراب کے جکا ذکر اوپر کیا گیا ہے کامل تغذیہ کے واسطے دیگر شرط

کی بھی ضرورت ہے مثلاً غذا ایسی ہونی چاہئے اور اس ترکیب سے تیار کرانی چاہئے جو کافی مقدار میں کہانی جاسکے اور جب کہانی گئی تو آسانی سے ہضم ہو جاسکے جب آدمی تندرست ہوتا ہے تب اسکو ہو کہ اچھی لگتی ہے اور سیر ہو کہ کہا خوب کہا لیتا ہے مگر بیماری کی حالت میں اور نیرایسوں کے لئے جو کھل المراج ہوتے ہیں اشتہا پیدا کرنے کے لئے چٹنی اور اچار کی ضرورت ہوتی ہے - غذا کا ہضم ہونا یا نہ ہونا غذا کی خیریت کی خاصیت اور انکے تیار کرنے کی ترکیب پر بہت سا کچھ حصر کرتا ہے - غذا کی تجویز کیوقت کسی خاص تنفس یا گردہ کی طاقت ماضیہ کا لحاظ رکھنا چاہئے مثلاً جبکی عادت وال چاول روٹی اور ترکاری کھانے کی ہے وہ گوشت کی غذا ہضم نہیں کر سکیں گے - غذائی چیزوں کے ہضم ہونے کے باب میں ذیل میں چند نقشے دیتے ہیں -

حیوانی اشیاء غذا کی

اشیا غذائی	کیونکر کچی ہیں	مدت ہضم ہونے کی
بیضہ	نیم برشت	۳ ساعت ۳۰ منٹ
بیضہ	خام بھینا ہوا	۱ " ۳۰ "
بیضہ	تلا ہوا	۲ " ۱۵ "
ہرن کا گوشت	بھینا ہوا	۱ " ۳۰ "
منغر	بھینا ہوا	۱ " ۴۵ "
گوشت نہیں راج	کبات	۲ " ۳۰ "
حلوان	بھینا ہوا	۲ " ۳۰ "
چوزہ مرغ	بھینا ہوا	۲ " ۴۵ "
گوشت گاؤ	اُبالا ہوا	۲ " ۴۵ "

اشیاء غذائی	کیونکر پچی ہیں	مدت ہضم ہونے کی
گوشت گاو	کباب	۳-۴ ساعت . منٹ
گوشت بڑیا بہیڑی	کباب	۳ // ۱۵
پنیر	خام	۳ // ۳۰
گوشت مرغ	کباب	۴ // ۳۰
بطخ	کباب	۴ // ۳۰

نباتی اشیاء غذا کی

اشیاء غذائی	مدت ہضم کی
چاول	۱-۲ ساعت
سیب شیرین	۱ // ۳۰
ہاگودانہ	۱ // ۴۵
سیب ترش	۲ //
بسم کی پہلیان	۲ // ۳۰
آلو	۲ // ۳۰
روٹی جواریا جرسے کی	۳ // ۱۵
گاجرین	۳ // ۱۵
روٹی آرو گندم کی	۳ // ۳۰
شبنم	۳ // ۳۰
چقندر	۳ // ۴۵
گوہی	۴ //

کہانے کی چیزوں کو اس ترکیب سے تیار کرنا جس سے وہ آسانی سے ہضم ہو سکیں۔
 یہ بات اسطور سے حاصل ہو سکتی ہے کہ انہیں جب مناسب مصالحہ وغیرہ ملا کر انکو آئین
 کے ذریعہ اسطرح پکا ناجس سے وہ اچھے طور پر گلیا جائیں تاکہ آسانی سے ہضم ہو سکیں اور
 مزہ دلا رہی ہوں۔ اسلئے تاکہ اشتہا پیدا ہو کہانے کی مختلف چیزوں کی طرح طرح کی ترکیب
 سے ملانا اور انکو قسم قسم کی شکلوں پر پکنا چاہئے۔ مصالحہ سے عمدہ کی رطوبتیں
 زیادہ پیدا ہوتی ہیں جس سے ماضہ کو مدد ہوتی ہے۔ مگر سبے تجربی احتیاط یہ ہے کہ
 کہانے پینے کی چیزیں تازہ اور عمدہ ہوں کیونکہ جب وہ گندمی اور خراب ہوتی ہیں تب
 ہضم نہیں ہوتی اور بیماری پیدا کرتی ہیں۔ غذا کے باب میں اوپر جو کچھ بیان ہوا
 ہے اُس سے یہ ظاہر ہے کہ جب غذا کا نقشہ تیار کریں تو ان باتوں کو ملحوظ رکھیں۔
 اول یہ کہ جسکے لئے غذا تجویز کریں انکی عمر انکی عادت انکی صحت کا حال انکی طبیعت
 کا حال انکی محنت اور مشقت کا حال وہ جس قسم کی آب و ہوا میں رہتے ہیں اسکا حال
 یہ ساری باتیں دریافت کریں۔

دوم۔ کہانے پینے کی چیزوں کی نسبت ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہئے کہ مناسب قسم کے
 اور مناسب خاصیت کی اور ہضم ہونے کے قابل ہیں یا نہیں اور یہ بھی کہ ان جسم کی پرورش
 ہو سکتی ہے یا نہیں اور یہ کہ خوش مزہ اور شہتی ہی ہیں یا نہیں۔
 سوم۔ اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ وہ چیزیں مختلف قسم کی ہوں اور طرح طرح کی ترکیبوں
 سے پکا ئی جاوے اور جب مناسب مصالحہ بھی پڑے تاکہ جلد ہضم ہو جاوے۔
 چہارم۔ کہانے کے اوقات ایسے مقرر کئے جاوے کہ کہانیوالوں کی عادت کے مناسب ہو
 انسان عموماً جو چیزیں بطور غذا کے استعمال کرتے ہیں اب انکا بیان علیحدہ علیحدہ
 کیا جاتا ہے۔ پہلے غذا کی ان چیزوں کا بیان کیا جائیگا جنکا ذکر اوپر پہلے کیا گیا تھا ایسے
 وہ جنہیں کم و بیش ال۔ بیو۔ مے۔ نیٹس قسم کے اجزاء موجود ہوں۔ پس پہلے وہ وہ کا

ذکر کیا جائیگا کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان اور حیوان دونوں کے بچوں کی پرورش کے لئے دودھ پیدا کیا ہے۔ علامہ ابن زین دودھ ایسی اجزا سے مرکب ہے کہ ہر قسم کی غذائیں کام آتے ہیں پس بیان -

دودھ - دوسمین دوماے - ثروجن کے قسم کے خبر دہوتے ہیں - ایک کو رائی - بیو - مین اور دوسرے کو کے - ثرین کہتے ہیں - دوسرا خرو روغن کا شکل کہن - تیسرا خرو کار - بو - مایند ریٹ یعنی ملاک شوگر اور چوتھا خرو نمک اور پانی - خدا تعالیٰ نے شیر مین ان خروں کو ایسی مناسب مقدار مین شامل کیا ہے کہ بابرکئی جہتے تاک بچہ صرف دودھ ہی پر پرورش پاتے ہیں ۔

اگرچہ ہر قسم کے دودھ مین وہی اجزا ہوتے ہیں جتنکا ذکر اوپر کیا گیا ہے مگر انہیں کئی باتوں سے اختلاف پڑ جاتا ہے مثلاً جانور کی قسم سے عمر سے اور اسکی غذا سے اور ان باتوں سے بھی کہ بچہ پیدا ہونے کو کتنا عرصہ گزرا اور کتنے عرصہ بعد دودھ دیا گیا کیونکہ بعض قسم کی گائے کے دودھ مین روغن لینے کہن بہ نسبت اوزون کے زیادہ ہوتا ہے اور بعض مین کے - ثرین لینے مجذبت زیادہ ہوتی ہے جس سے پیر نہتا ہے - متواسط عمر کے جانور کا دودھ بہ نسبت کم عمر یا بڑے جانور کے دودھ کے بہتر ہوتا ہے - اور اسمین پانی کی مقدار بھی کم ہوتی ہے - جن جانورون کو میٹھی چیزیں کھانے کو ملتی ہیں جیسے گاجیر انکے دودھ مین شکر زیادہ ہوتی ہے - گھاس جب فراط سے ملتی ہے تب دودھ مین کہن زیادہ ہوتا ہے مگر خشکسالی مین کم اور یہ یاد رہے کہ جن چیزوں کے کھانے سے جانور موٹا ہوتا ہے ان سے دودھ پتلا اور اسمین کہن کم ہو جاتا ہے - بعد ہی بچہ بخنے کے گائے کے دودھ مین کہن زیادہ ہوتا ہے - اور جون جون دوسری دفعہ بچہ جننے کا موقع نزدیک آتا جاتا ہے دودھ مین کہن کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے - شام کے وقت جو دودھ دیا جاتا ہے اسمین زیادہ تر پرورش ہی اجزا ہوتے ہیں بہ نسبت اسکے جو

صبح کی وقت دودھ جاتا ہے کیونکہ اس شام کے دودھ میں فیصدی تین حصہ زیادہ منجھ اُخرا اور قریب ۵۴ حصہ فیصدی زیادہ دھنیت اور قریب ۵۰ حصہ فیصدی زیادہ پنیر ہوتا ہے۔ کسی ایک جانور کے دودھ میں اتنی باتوں سے فرق پڑتا ہے کہ نقشہ ذیل کے مختلف جانوروں کے دودھ کی اجزا کو کامل ٹھیک نہ سمجھنا چاہئے بلکہ قریب ٹھیک کے تصور کرنا چاہئے۔

عورت	بکری	بھڑی	گدھی	گھوڑی
۸۹۵۴	۸۵۶۰	۸۱۰۰	۹۰۵۰	۸۹۳۳
۳۴۴	۴۱۰	۶۵۰	۱۲۴۰	۰۲۰
۳۷۷	۵۸۰	۴۵۰	۶۴۰	۸۷۷
۳۳۵	۴۵۰	۸۰۰	۱۰۷۰	۱۲۶۳
۱۰۳۰ سے	۱۰۳۵ سے	۱۰۳۵ سے	۱۰۳۳ سے	۱۰۳۳ سے
تک ۱۰۳۴	تک ۱۰۳۶	تک ۱۰۴۱	تک ۱۰۳۵	۰۰۰

پانی —————
 دھنیت یعنی مکھن —————
 شکر اور محلل نمک —————
 جبن یعنی پنیر اور غیر محلل نمک —————

اسے - سے - نہایت گرا دلی
 یعنی
 وزن متناسبہ

بہ نسبت دیگر جانوروں کے گائے کا دودھ زیادہ تر مقبر ہے کیونکہ اکثر یہی دودھ انسان کے غذائیں شامل ہے۔ اس کے اجزائے دھن پانی ۸۷۳ کے - ترین یعنی جبن یا پنیر ۶۳۰ + شکر ۷۴ مکھن ۶۰ + نمک ۸۰ +

دودھ نہایت عمدہ غذا ہے جو انور بچوں دونوں کے لئے - مگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب معدہ میں شیشی کا غلبہ ہوتا ہے تب دودھ پھٹ جاتا ہے اور اسکا جبن یعنی پنیر ڈلے بنکر تکلیف دیتا ہے اور ریح پیدا کرتا ہے - بعض دفعہ تو دست آنے لگتے ہیں اور کبھی تحض ہو جاتا ہے - ایسی صورت میں کہ جب دودھ ہضم نہ ہو تو ایک کام کریں کہ کچا دودھ یا صرف تھوڑا سا گرم کر کے بلا دین ہنیں تو چونکہ باقی ملاکہ استعمال کریں -

اور شیرخوارہ کو پلانا ہو تو اسمین تیسرا حصہ آب گرم ملا لیں نہین تو بکری یا خرما دودھ کا دودھ پلا دیں جب دودھ کئی گنڈہ تک دہرا رہتا ہے تب اس پر مائی جم جاتی ہے لیکن آنچ دینے سے مائی جلد جم جاتی ہے۔ جب مائی علیحدہ کر لیتے ہیں تب جو کچھ باقی رہ جاتا ہے اسکو اسکاٹھر ملک بولتے ہیں۔ اسمین بہ نسبت تازہ دودھ کے پیئر کی مقدار کم ہوتی ہے اور مکھن ہی قریب نصف ہوتا ہے مگر پانی اور شکر کی مقدار کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب مکھن مہمہ لیا جاتا ہے تب جو کچھ باقی رہ جاتا ہے اسکو انگریزی میں بٹرمیلک یاٹسٹی کہتے ہیں

نمک۔ دودھ میں یہ نمک ہوتے ہیں کلورائیڈ اف سوڈیم دینے کہانے کا نمک (کلورائیڈ اف پوٹاشیم اور فاس۔ فٹ اف سوڈیم اور فاس۔ فٹ اف پوٹاشیم اور فاس۔ فٹ اف کل۔ سم اور فاس۔ فٹ اف مگ۔ نے۔ شیم) بہنیں کے دودھ میں بہ نسبت گائے کے مٹھا اجزا زیادہ ہوتے ہیں خاص کر مکھن۔ پس اس جانور کا دودھ ثقیل ہوتا ہے۔ مگر بہنیں کی خوراک گندمی ہوتی ہے کیونکہ گھوڑے کی لید بہت کہاتی ہے۔ پس اگر بہنیں کے دودھ کا استعمال کرنا ہو تو دانہ گھاس احتیاط سے دینا چاہئے۔ اس دودھ کی اس۔ پے۔ سی۔ فٹ گراوٹی ۱۰۲۵ سے کم ہونی چاہئے۔

بکری کے دودھ میں بہ نسبت گائے کے کم پیئر اور شکر ہی کم ہوتی ہے۔ مگر نہینت کی مقدار زیادہ مگر اسمین سے ایک قسم کی بو آتی ہے جسکو بچے پسند نہین کرتے۔ اس کی اس۔ پے۔ سی۔ فٹ گراوٹی ۱۰۳۲ سے کم ہونی چاہئے۔ بیٹھری کا دودھ بہ نسبت گائے کے کی مقدار زیادہ ثقیل ہوتا ہے۔ گندھی کے دودھ میں ۹۰ و فیصد ہی پانی ہوتا ہے اور بہ نسبت اور دودھ کے اسمین پیئر اور مکھن کم مگر شکر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ خرما دودھ کا دودھ عورت کے دودھ سے بہت ہی مشابہ ہے۔ اور اسمین

پرورش کی قابلیت بھی کم ہوتی ہے مگر بیارون اور بچون کے لئے مفید ہے کہ جب انکا مضمہ کمزور ہو جاوے ۔ گھوڑی کا دودھ گدہ ہی کے دودھ کے مشابہ ہے اور اسی سے وہ شے بنتی ہے جسکی کیو ۔ مِش کہتے ہیں ۔ گھوڑی کے دودھ میں خمیر پیدا کر کے کیو ۔ مِش بناتے ہیں ۔ یہ خمیر سل کی بیماری کے علاج میں مفید خیال کیجاتی ہے ۔ جب جانور مژدرست ہوتا ہے اور اس کے دانہ گھاس کی نگرانی کیجاتی ہے تب اسکا دودھ بھی اچھا ہوتا ہے مگر ان باتوں کی نگرانی بہت کم کیجاتی ہے پس اس واسطے دودھ بھی اکثر اوقات اچھا نہیں ہوتا اور اسکے امتحان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ۔ دودھ میں اکثر پانی ملا دیتے ہیں تاکہ تھوڑا بڑھ جاوے ۔ اسکی ذرت ایسے ۔ سی ۔ بکڑ گراوٹی کے ذریعہ کرنے سے ہو سکتی ہے چکان کر نقشہ بالا میں کیا گیا ہے ۔ پس علاوہ وزن متناسبہ کے جب دودھ کا قوام اور اسکی رنگت دیکھی جاتی ہے اور یہ کہ اس میں کس قدر رکھن اور ملائی ہے تب علی العموم یہ کہا جاسکتا ہے کہ دودھ اچھا ہے یا خراب ۔ مگر جب دیکھیں کہ دودھ کی ایسے ۔ سی ۔ کٹ گراوٹی ۱۰۲۳ سے کم ہے تب یقین جانیں کہ اس میں پانی ملا یا گیا ہے پس اس دودھ کو ناپسند کرنا چاہئے ۔ وزن متناسبہ کے دریافت کرنے کے لئے ایک آلہ کا استعمال کرتے ہیں جسکو اصطلاح میں لکٹ ۔ ٹا ۔ مے ۔ ٹر کہتے ہیں مگر وزن متناسبہ کے دریافت کرنے میں اس بات کو نہ ہونا چاہئے کہ جب دودھ پر سے ملائی اتار لیجاتی ہو تب اسکا وزن متناسبہ بڑھ جاتا ہے مگر پانی ملا تے ہی پر گھٹ جاتا ہے پس مذکور اس دودھ کو بھی درست بتا سکتا ہے جو حقیقت میں ناقص ہے کیونکہ اس سے ملائی اتار لی گئی ہے اور پانی ملا کر اسکا وزن پورا کر دیا گیا ہے ۔ اس صورت میں یہ دریافت کرنا چاہئے کہ اس دودھ میں موہنیت کس قدر ہے یعنی دیکھیں کہ اس میں ملائی کی مقدار کتنی ہے جس کے دریافت کرنے کی ترکیب پیچھے بتلائی گئی ہے ۔

علاوہ مذکورہ بالا خاصیتوں کے ایسے دودھ کا رنگ سفید ہوتا ہے ۔ کوئی شے

اُسکے بچے ہنہن بیٹھ جاتی اور اچھے دودھ کا ذالیقہ اور بو خاص قسم کی ہوتی ہے۔ جوش دینے سے پہٹ ہنہن جاتا اور نہ کسی اور قسم کا تغیر اُسہن پیدا ہوتا ہے۔ باریک بیز سے دیکھیں تو اُسہن روغن کے قطرات اور کبہ قدر ایلے۔ تھے۔ لی۔ ام کے چمکے دکھائی دینگے۔ لیکن یہ چمکے اگر بکثرت ہوں یا اُسہن پیسے کیسے پائے جاویں یا پستان کے غدودوں میں جو دودھ کی نالیان ہوتی ہیں انکے سانچے دکھائی دینے تو ان سے بیمار ہی ثابت ہوتی ہے۔

یہ چاہو کہ دودھ کچھ عرصہ تک نہ بگڑے تو ایسا کرو کہ دودھ تازہ ہو یا اُبالا ہو اُسہن قرارے کار۔ بو۔ نٹ اف سوڈا یا بائی۔ کار۔ بو۔ نٹ اف سوڈا اور تھوڑی سی شکر ملا دو۔ اس ترکیب سے دس بارہ روز تک دودھ بگڑنے ہنہن پاتا۔ کہہ لیتے ہوئے دودھ میں قرارے شکر ملا کر کسی بوتل میں بہر کر خوب مضبوط ڈالناٹ لگا دو اس سے ہینوں تک دودھ بگڑنے ہنہن پاتا۔

پنیر بھی اچھی غذا ہے مگر ثقیل ہے۔ ایک وقت کی غذا کے ساتھ ایک آونس سے زیادہ نہ کھانا چاہئے۔ مگر یہ پنیر جلد بگڑ جاتی ہے تب نقصان دیتی ہے *
نمائے۔ ٹرو۔ جن دارا غذیہ میں گوشت عمدہ غذا ہے مگر گرم ملکوں میں اسکا استعمال کم کرنا چاہئے۔

ہندوستان میں ان جانوروں کا گوشت اکثر کھایا جاتا ہے۔ گائے۔ بھڑی اور بکری اور پرند کا گوشت۔ مچھلی بھی گوشت میں شامل ہے۔ ان گوشتوں کا بیان علیحدہ علیحدہ کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا ذکر ایسا کرنا چاہئے جو سب قسم کے گوشت پر حاوی ہو چنانچہ جس جانور کا گوشت کھانے میں آوے اُسکی عمر نہ تو بہت زیادہ اور نہ بہت کم ہونی چاہئے۔ اور جانور کو سب باتوں میں ندرست ہونا چاہئے۔ اس گوشت میں موافق اندازہ کے چربی اور استخوان بھی ہونا چاہئے۔

کسی قسم کا گرم اسمین نہ ہو اور نہ وہ گوشت گندہ ہو اور اسطور پر لگا یا جاوے کہ کہانی
سے مفہم ہو جاوے ۛ

حلو ان کے گوشت میں پانی بہت ہوتا ہے اسلئے جسم کی پرورش اس سے کم
ہوتی ہے۔ اور بڈ ہے جانور کا گوشت سخت اور دیر مفہم ہوتا ہے اور سمین چربی بھی کم
ہوتی ہے ۛ

تندرست جانور کی پہچان یہ ہے کہ وہ آسانی سے چلتا پھرتا ہے۔ آنکھیں سکی
چمکی ہوتی ہیں۔ تھنوں کے اندر کامیو۔ کس پردہ مرطوب اور سخی۔ سانس آسانی سے
لیتا ہے۔ سانس کی ہوا میں بدبو نہیں ہوتی ہے۔ چمڑا ملائم اور چمکتا ہوتا ہے ۛ
جس جانور کو زچ کرنا ہو گئی گنتے پہلے اسکا دانہ گھاس بند کر دینا چاہئے ورنہ مفہم
خدا بعد زچ کے جلد گندھی ہو جاتی ہے۔ زچ کرنے سے ایک دن پہلے جانور کو باندھ
رکھنا چاہئے۔ دیکھیں کہ زچ کے بعد سارا خون نکلیا دے کیونکہ گوشت میں جب خون
رہ جاتا ہے تب وہ جلد بگڑ جاتا ہے ۛ

گوشت کا ملاحظہ آٹھ یا دس گنٹہ بعد زچ کے کرنا چاہئے۔ گوشت کو ملائم اور چمکدار
ہونا چاہئے۔ رنگت اسکی پیکی ہونی چاہئے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جانور کی عمر
یا تو چھوٹی تھی یا وہ جانور بیمار تھا اور نہ رنگت بہت گہری ہو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ
جانور یا تو بڈ تھا یا اسکے گوشت میں خون رہ گیا تھا۔ گوشت کے ریشوں کے مابین
پیپ یا کسی اور قسم کی رطوبت ہونی چاہئے اور ریشہ مذکور بہت نرم بھی ہونا جس
سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب وہ گوشت گندہ ہو نہ والا ہے۔ اچھے گوشت میں مٹہ
لگانے سے انگلیاں تر نہیں ہو جاتیں کیونکہ خراب گوشت بہگیا ہوا اور پھلا ہوتا ہے
اسمین بولم یا کچھ بھی ہونی چاہئے کیونکہ بیمار جانور کے گوشت میں بسائین بولم ہوتی
ہے ۛ گوشت جب گندہ ہونے پر ہوتا ہے تب ابتدا میں رنگت اسکی پیکی ہونے

گھتی ہے اور ریشہ اُسکے آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں اور اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے
جب سڑاند زیادہ بڑھنے لگتی ہے تب گوشت کا رنگ سبزی مل ہو جاتا ہے اور
اس سے بدبو آنے لگتی ہے۔ جہازوں اور فوجوں میں اکثر نمک ملا ہوا گوشت استعمال
میں آتا ہے کیونکہ تازہ گوشت ہمیشہ میسر نہیں ہوتا۔ پس بھینا جائے کہ وہ گوشت بچا
ہوا ہو۔ بڑھے جانور کے گوشت میں جب نمک ملا جاتا ہے تب وہ سخت ہو کر سکڑ
جاتا ہے۔ نمک ملانے سے پہلے اگر گندہ ہو گیا ہو تو یہ بات اُسکی بو سے دریافت ہو سکتی
ہے جس پیپے میں نمکین گوشت ہو اُسکو کھول کر سارے ٹکڑوں کو ملاحظہ کرنا چاہیے
کیونکہ بے ایمان ٹھیکہ دار ایسا کرتے ہیں کہ اچھوں کے نیچے گندے ٹکڑے رکھ دیتے
ہیں۔ اُس گوشت کے نمکین پانی کو بھی امتحان کرنا چاہیے کیونکہ بعض دفعہ ایسا کرتے
ہیں کہ ایک ہی پانی میں جب کئی دفعہ گوشت کو نمکین کرتے ہیں تب وہ پانی بگڑ جاتا
ہے اور گوشت کو زہر ملا کر دیتا ہے +

گوشت کے پکانے سے یہ غرض ہوتی ہے کہ اس کے ریشوں کے اندر جراثیموں
اور خون ہوتا ہے وہ جم جاوے اور گوشت مزہ دار ہو اور جلد بڑھم ہو جاوے اور نیز اسکی
اندز جو کرم ہوں وہ ہلاک ہو جاوے۔ جب گوشت ۱۵۰ سے ۱۶۲ درجہ کی گرمی تک
پکا جاتا ہے تب کرم ضرور ہلاک ہو جاتے ہیں درندہ میں تک پانچ کافی ہے کہ جہاں تک
پانی کے جوش کہانے کو چاہئے۔ اس سے ایسا ہوتا ہے کہ گوشت پر ایک پر وہ البیو میں
کا جم جاتا ہے جس سے اسکا عرق جسمیں پرورششی اخرا بہت ہوتے ہیں ضائع نہیں ہونے
باتا۔ گوشت تین ترکیب سے پختا ہے یا تو کباب کرتے ہیں یا صرف اُبال لیتے ہیں یا اسکا
قلیہ پکاتے ہیں۔ چاہے کسی ترکیب سے پکا دیں پانچ دہائی ہونی چاہئے کیونکہ گوشت
جب تیز آنچ پر پختا ہے تب وہ گوشت دیر بڑھم ہو جاتا ہے اور اخرا پرورششی کے بغیر
بنکر اڑ جاتے ہیں +

گوشت کے کھانے سے یہ نائد سے ہیں کہ اس میں اجزاء اقسام البیو۔ مے نیقش کے موجود ہیں اور حیثیت اور دماقی اجزاء بھی ہوتے ہیں جیسے کلورائیڈ اف پوٹاشیم اور فاس۔ فٹ اف پوٹاش اور کاک۔ ٹریٹ اف پوٹاش اور کسقد رنولاد وغیرہ۔ یہ کل اجزاء ایسے ہی ترکیب سے ملے جلتے ہوتے ہیں جیسے انسان کے جسم کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ علامہ ازین گوشت آسانی سے پاک سکوتا ہے اور آسانی سے ہضم ہی ہوتا ہے۔ مگر گوشت میں اجزاء اقسام کار۔ بو۔ ٹائیڈ ریٹ کے کمی ہے سو وہ بذریعہ روٹی چاول اور آلو کے جسم میں پونچایا جاتا ہے۔

گائے یا بیل کے گوشت اگر استعمال کرنا ہو تو جانور کی عمر ۳ سے ۸ سال تک کے ہونی چاہئے۔ جانور کے عمر ذیہ یک طور پر اس کے سینک اور دانتوں کے ملاحظہ سے دیا ہو سکتی ہے۔ مثلاً دیکھیں کہ اس کے سینک پر کتنے چکر ہیں کیونکہ پانچ سال کی عمر تک سینک پر ہر سال ایک ایک چکر پیدا ہوتا ہے اور بعد اُس عمر کے پہلے تین سال کے چکر میٹ جاتے ہیں اور جس جانور کے سینک کے کل چکر میٹ کئے ہوں اُسکی عمر کم سے کم آٹھ سال کی ہوتی ہے۔ چوتھے سال کی عمر تک کل پچھ دانت اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں۔ پانچویں سال کی عمر میں ان۔ سائی۔ سردانت کسقد رگس جاتے ہیں۔ چھٹے برس اول کے مو۔ سردانت گسکر ان۔ سائی۔ سردانت کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اور آٹھ سال کی عمر میں وہ دانت بہت ہی گس جاتے ہیں۔

جب جانور دن کے دانتوں کے باہر کی سطح پر کوئی چوڑا یا گول نشان نظر آوے تب سمجھ جانا چاہئے کہ وہ جانور بہت ہی بڑا ہے اور اسکا گوشت کام کا نہیں۔ گائے کے گوشت میں کسقد ر پرورش اجزاء ہوتے ہیں اس نقشہ سے معلوم ہوتے ہیں۔

نمک	چربی	البیو۔ سے۔ نٹ	اخر اگرین کے حساب سے
۳۵۷ -	۲۵۲ -	۱۳۵۱ -	بلیو چربی کا گوشت -
۳۰۸ -	۲۰۸۶ -	۱۰۳۶ -	چربی دار گوشت -
۲۱۰ -	۲۸۷ -	۱۳۶۳ -	جگہ
۱۶۸ -	۱۱۴۸ -	۹۳۲ -	اُبھڑی بچون سے
۳۲۹	۱۱۰۶ -	۱۱۵۵ -	بجھیرے کا گوشت

بھڑی کے گوشت کے باب میں جانور کی عمر ۱۸ مہینے سے ۵ سال تک کی ہونی چاہیے۔ ۱۰ مہینے کے عمر میں بچے مٹو۔ آروانت کے چاروٹا پانچ جوڑے نکل آتے ہیں۔ بعد اس عمر کے دانتوں پر گہس جلنے کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاکم چربی دار بھڑی کے گوشت کے نصف سیر میں البیو۔ سے۔ نٹ قسم کے اخرا ۱۲۸۱ گرین ہوتے ہیں۔ چربی ۳۲۳ نمک کئی قسم کے ۳۳۶ گرین، چربی دار گوشت میں ۸۶۸ گرین البیو۔ سے۔ نٹ ۲۱۷۷ گرین چربی۔ اور ۵۵۴ گرین تقسام نمک +

بکری کا گوشت بہ نسبت بھڑی کے مزہ میں کھٹ کا ہوتا ہے۔ اور چربی بھی اس میں کم ہوتی ہے۔ ہرن کا گوشت بھی مثل گائے اور بھڑی کے گوشت کے طاقت میں کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ تر زود ہضم ہے۔ مگر ہرن کے گوشت میں خون زیادہ ہوتا ہے۔ بہ نسبت ان جانوروں کے جو معمولی طور پر ذبح کئے جاتے ہیں +

مچھلی بھی اچھی غذا مگر گرم ملک کی بعض مچھلیوں میں یا بعض موسم کے اندر مچھلیوں میں نہ ہر ملا مادہ پیدا ہوتا ہے جس کے کھانے سے دست و پاؤں لگتے ہیں + کھائی ہوئی مچھلیوں میں بہ نسبت تازہ مچھلی کے پرورش اخرا اور نصف کے کم ہوتے ہیں +

مرض تیتیر بیٹر کیوز وغیرہ پرند کا گوشت عمدہ غذا ہے اور اسمین بر نسبت گائے کے گوشت کے بھی نامے۔ ٹروجن دار مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ مگر اس گوشت میں چربی اور نمک کے اجزاء کم ہوتے ہیں۔

نصف سیر پرند کے گوشت میں ال۔ بیو۔ مے۔ زٹ قسم کے اجزاء ۲۰۰ گریں ہوتے ہیں۔ چربی ۲۶۶۔ نمک ۸۴۔ ہنس راج اور بطخ کے گوشت میں چربی زیادہ ہوتی ہے مگر دیر ہضم ہے۔ جس پرند کا گوشت کالاسکتا ہے وہ دیر ہضم ہوتا ہے پس اس کے پکانے میں احتیاط چاہئے۔

بھضہ۔ انڈون میں نامیٹرو۔ جن اجزاء بہت کثرت سے ہوتے ہیں لیکن کاربن کی کمی ہوتی ہے۔ پس انڈون کے ساتھ چاول اور روٹی ضرور کھانی چاہئے اور روغن کے استعمال سے بھی کار۔ ہن کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ مرغی کا معمولی انڈا تقریباً ۶۰۰ گریں وزن میں ہوتا ہے۔ اسمین سے چھلکے کی واسطے فیصدی ۱۰ منہا کر دینا چاہئے کیونکہ وہ کھانے میں ہنیں آتا۔ سفیدی کا وزن بر نسبت زروچی کے دونا ہوتا ہے۔ انڈے کی سفیدی میں فیصدی ۸ پانی ہوتا ہے ۲۰ و ال۔ بیو۔ مے۔ زٹ اور ۶ وانمک۔ اسمین روغن ہنیں ہوتا۔ انڈے کی زروچی میں روغن بکھرت ہوتا ہے یعنی فیصدی ۳۰ اور ۱۶ فیصدی ال۔ بیو۔ مے۔ زٹ اور ۳ وانمک اور ۵۴ فیصدی پانی ہوتا ہے۔ کل انڈے میں ۴۴ فیصدی پانی۔ ٹرو۔ جن غذا ہوتی ہے اور ۵ و ۱۰ روغن اور ۵ وانمک انڈے جب استعد پر کائے جاتے ہیں جس سے سفیدی بالکل جم کر سخت ہو جائے تو جلد ہضم نہیں ہوتے مگر نیم برشت انڈا زود ہضم ہوتا ہے۔ انڈے جب عرصہ تک پڑے رہتے ہیں تب انکا وزن گھٹ جاتا ہے اور وہ ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ انڈا جب تازہ اور چھا ہوتا ہے تب کسیتہ رشفاف ہوتا ہے اور نمکین پانی میں ڈوب جاتا ہے کہ جبکہ فیصدی میں ۱۰ حصہ نمک ملا ہو۔ خراب انڈا تازہ پانی میں تیرتا رہتا ہے اور جبکہ اچھا ہونے میں

شک ہوتا ہے وہ اوپر کے نمکین پانی میں تیرتا ہے ۔

انڈے جب ایسی ترکیب سے رکھے جاتے ہیں کہ جس سے چھلکے کے اندر ہوا کا گزر نہ ہو سکے تب عرصہ دراز تک بگڑتے نہیں ہین مثلاً اپر گوند مڑہ دین یا چربی لگا دین یا سیٹھ تیل میں موم پکا کر اسکا لیپ کر دین یا کھڑکی کے برادہ میں سجا کر ڈھانپ دین یا ایسا کر بن کر چونہ کے پانی میں قدرے کوبم اف ٹار۔ ٹار حل کر کے اس عرق میں انڈوں کو ڈبو رکھیں ۔

اب ایسی باتیں غفلت کا بیان کیا جاتا ہے جس میں بکثرت ال۔ سیو۔ نے نہ اجزاء جو دہین۔ اس قسم کی دو بڑی جاغیتیں یہ ہین ایک تو اناج دوسری دالین ۔

اناج کی قسم میں سے دو مقبہ غذائیں یہ ہین ایک تو چاول دوسری گندم ۔ جوار یا جوار کنگنی بھی اناج کی قسم سے ہین مگر بہ نسبت چاول اور گندم کے گھٹ ہین ۔

چاول۔ آدمی چاول بکثرت کھاتے ہین اور یہ عمدہ زود ہضم غذا ہے جس میں اسٹارچ بکثرت ہوتا ہے اور البیو۔ نے نہ اور نمک بھی سبقت ہوئے ہین مگر نایاب اور خیر دار اجزاء بہت ہی کم۔ پس ہمیشہ چاول کے ساتھ گوشت مچھلی یا دال یا دودھ یا لسی بنی جاتے ۔ اور چونکہ اس میں روغن نہیں ہوتا تو کہیں یا گھی سکے ہمراہ ضرور کھانا چاہئے اور چاول میں نمکین اجزاء بھی بہت کم ہوتے ہین پس چاول کی خوراک میں زیادہ نمک ضرور ہونا چاہئے ۔ نئے چاول کو کم سے کم چھ مہینے رکھ کر کھانا چاہئے ورنہ بد ہضمی اور اسہال پیدا کرتا ہے اور نیا چاول پکاتے وقت گھلتے بچاتا ہے ۔

گندم۔ گندم میں پانی فیصدی صرف پندرہ حصہ ہوتا ہے اور قریب ۔ حصہ ال۔ سیو۔ نے نیٹیشن اور کار۔ بو۔ ڈیٹریٹشن بکثرت اور نمکین اجزاء ہی ہوتے ہین جیسے فاس۔ فٹ اف مگ۔ نے شیم اور فاس۔ فٹ اف پوٹا۔ شیم مگر گندم میں روغن دار اجزاء نہیں ہوتے پس اسکے ساتھ گھی یا کہیں ضرور کھانا چاہئے ۔ گندم جب

پیشی جاتی ہے تب اس میں دو حصہ ہوتے ہیں ایک تو چوکروں کے آٹا، گندم کے چوکریں دو حصہ ہوتے ہیں ایک بیرونی جو بالکل ناکارہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے اندرونی حصہ جس میں نمک اور نمکے - ٹرو - جن دارا بکثرت ہوتے ہیں، آٹے اور سوجی میں تھوڑا بہت چوکریں ہوتا ہے مگر باریک میدہ میں نہیں، جس کے آٹے میں چوکریں اندر کا حصہ خوب باریک ہوتا ہے وہ زیادہ تیز پورش کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن جس کے آٹے میں چوکریں بالکل نہیں ہوتیں اس کے نصف میں ال - بیو - سے - نیٹ اوسط ۵۶ گرین اور روغن ۴۱ گرین اور اس کے ٹائپ وغیرہ ۶۴۱ گرین اور شکریہ ۴۹ گرین اور نمک ۱۱۹ گرین ہوتا ہے۔

اچھا آٹا سفید مگر جب چکر ملی ہوئی ہوتا ہے تب بوجب چوکریں مقدار کے آٹے میں کچھ پوری رنگت آجاتی ہے۔ نسخ گندم کے آٹے میں نہایت خف سرخی ہوتی ہے۔ گوشت کے آٹے میں لیس ہونا چاہئے اور کسی قسم کی بدبو ہونی چاہئے۔ آٹا جب عرصہ کا ہو جاتا ہے تب رنگت اس کی زرد ہوتی ہے اور ذائقہ کٹا اور دھنیز کر کے ہٹ معلوم ہوتی ہے۔

والیکن - ہندوستان میں مختلف قسم کی دالوں کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے جیسے مونگ - سور - ماش - چنا - کھسائی وغیرہ - ان ساروں میں یہ اجزاء ہوتے ہیں - ال - بیو - سے - نیٹس + روغن + کار - بو - ٹائپ + ٹائپس اور نمک + کہتے ہیں کہ کھسائی کی دال جب بکثرت کھائی جاتی ہے تب بے - را - پلی - جیا کی بیماری ہو جاتی ہے۔

مہذبہات لعینے روغن - یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک چوانی - دوسری بناتی - حیوانی روغن یہ ہیں جیسے چربی اور کھن یا گہنی + چربی کا بیان ہم اس واسطے نہیں کرتے کہ ہندوستان میں یہ چیز بطور غذا بہت کم استعمال میں آتی ہے کیونکہ

ہضم نہیں ہوتی۔ اس کے کھانے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور دست آٹنے لگتے ہیں یا تنبض ہو جاتا ہے۔ غذا میں زہ کھن یا عمدہ گہی کا ہونا ہی ضرور چاہیے کیونکہ ان سے جسم کی حرارت غریبی قائم رہتی ہے۔ کھن اگر عرصہ تک رکھ کر چھوڑنا ہو تو فیصلہ چار سے آٹھ حصے اس میں نمک ملا دیں۔ اور شکر میں قدرے نمک ملا کر کھن میں ملا دینے سے کچھ عرصہ تک بگڑتا نہیں اور چند دن کے مچ سیاہ کے ملا دینے تو بھی چھا ہے۔ ایک گیلن پانی میں دو آؤنس اسے ٹھک یا ٹار۔ ٹا۔ رکن اسٹاکر اس میں کھن چھوڑ کر خوب بند برتن میں رکھ دینے سے بہت عرصہ تک بگڑتا ہی نہیں۔

کار۔ یو۔ مائیڈرٹیس۔ غذا کی اس جماعت میں اسٹارچ اور شکر کے قسم کی چیزیں شامل ہیں۔ اگرچہ نباتات کی بہتری چیزوں میں اسٹارچ موجود ہے مگر غذائیں اکثر آلو اور اراروٹ اور ساگودانہ استعمال میں آتا ہے۔ شکر دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ جو شکر سے حاصل ہوتی ہے دوسری کچور کی رس سے۔

آلو۔ میں اسٹارچ کا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ علاوہ اسکے نمک اور سیقدر

ال۔ بیو۔ مے ٹیس اور روغن اور شکر ہی ہوتی ہے۔ آلو کے سو حصہ میں ۵ حصہ پانی ہوتا ہے۔ اور آدھ سیر آلو میں تین آؤنس اسٹارچ ہوتا ہے اور ۱۴ گریں شکر

اور ۴ گریں ال۔ بیو۔ میں ۱۱ گریں اور ۱۴ گریں روغن اور ۹ گریں نمک ہوتا ہے۔ آلو بہت اچھی غذا ہے اور خاص کر اسکے دھوس کی بیماری میں بہت مفید ہے۔ اور اراروٹ

اور ساگودانہ بیا روغن اور بچون کے لئے سیر الہضم غذا ہے۔ غذا کے نقصان میں مختلف قسم کے میوہ کو بھی شامل کرنا چاہئے جیسے انگور سیب آب شریف وغیرہ وغیرہ۔ علاوہ ازیں تاکر اشتہا پیدا ہو کہنا ہضم ہو اور غذا خوش مزہ ہو مختلف قسم کا مصالحہ بھی شامل غذا ہونا چاہئے۔

شرب یعنی پینے کی چیزیں۔ ہماری ہندوستان میں سب عمدہ پینے

شراب - ہمارے نئی روشنی کے ہندوستانی نوجوانوں کا یہ خیال ہے کہ اگر دنیا کی مہذب قوموں میں اپنے کو شمار کرنا چاہو تو شراب ضرور پوچھیں جو شراب بے پناہ ہے اس کا نام مہذب قوموں کی فہرست میں درج ہونے کے قابل نہیں ہے۔ تھرپڑکان سنگدلوں کی عقل پران کی عقل پر ایسا پردہ چھا گیا ہے کہ عہد سچا دیکھتے ہیں کہ جن قوموں میں شراب بے پناہ ہے وہ بھی اب اس کو ترک کرتی جاتی ہیں۔ کمیٹیاں درسوسائٹیاں قائم ہوتی جاتی ہیں حلف اٹھائے جاتے ہیں کہ شراب نہ پینی جائے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ سارا جھگڑا کس لئے کیا جاتا ہے۔ شراب اگر اچھی چیز ہوتی تو لوگ اس کو کیوں ترک کرتے۔

مگر ہم کو اور تو مون سے کچھ غرض نہیں۔ ہمیں ہندوستانیوں سے واسطہ ہے پس
انکی خام خیالی و در کرنے کے لئے حکمت کی رو سے شراب کی مضر توں کا کچھ تہوڑا سا نیچے
ذکر کرتا ہوں۔ سنو۔ شراب جب پی جاتی ہے تب پہلے پہل مدہین و اخل ہوتی ہے۔
گلوٹن سے مثل اور اغذیہ کے اسکا کیموس (کائیم) اور کیلوس (کیل) نہیں بنتا۔
اسکو ایک سیدھی شرک ماتہ جاتی ہے جس سے دماغ بازو دشمن کی طرح ایک جھٹم زون
کباب کرنے کے لئے جگر میں آمجود ہوتی ہے۔ یعنی رو دوں میں گزر کر گٹرک۔ دین
کے ذریعہ پورٹل۔ دین کے رستہ جگر میں آ جاتی ہے۔ اب اسکو بہون بہا کر خون میں پیچ
جاتی ہے اور اسکو کثیف کر دینی ہے۔ پھر اسی خون کے وسیلہ سے دماغ پر اپنا مسقط جاتی ہے

جس سے عقل کا چرچا گل ہو جاتا ہے اور آدمی جو اشرف مخلوقات کہلاتا ہے حیوان سے بدتر بن جاتا ہے۔ پہر اس سے افعالِ شنیعہ کیونکر نہ سرزد ہوں۔ گردے بیچارے صفت میں گرفتار رہا ہو جاتے ہیں۔ جہانِ تنگ ان سے ہو سکتا ہے خون کے صاف کرنے میں کمی نہیں کرتے۔ مگر تاجکے۔ آخر کار تھک کر وہ بھی رہ جاتے ہیں اور اپنے بیوقوف خمر نوش کو یہ کہہ کر مار کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اسکو راہ خدا پر چڑھو چاہے خدا جو ہو سو ہو۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل اعضاء و ریسہ مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے کبھی توفالچ۔ کبھی سکتہ۔ کبھی دیوانگی اور گاہے آتشک اور بعض اوقات ہستیا ہی ہو جاتا ہے اور شرابی کٹھن کی موت مر جاتا ہے۔ جنازہ کے پیچھے پیچھے خلیش و اتار ب تو گریہ و زاری کرتے جاتے ہیں مگر شراب یہ کہہ نہ سکتی جاتی ہے دیکھا میرے سہل لگانے کا کیسا مزہ چکھا۔ تم حیران ہو کر یہ کہتے ہو گے کہ شراب کے پینے سے آتشک کیونکر ہو جاتی ہے۔ میان شراب آتشک کی اکسائے ٹھنک کا رنجاتی ہے۔ اسکا ذکر آگے بلکہ آتشک کے باب میں کرونگا۔

غذا کی وقت از روئے حکمت شراب پینی اس خیال سے کہ اشتہا پیدا ہو اور غذا ہضم ہو قطعی منع ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ اس نابکا رچیز کے پینے سے جو بہوک لگتی ہے وہ اشتہا کا ذب کہلاتی ہے۔ پس اس جھوٹی بہوک میں جو غذا کھائی جاتی ہے وہ ہرگز ہضم نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شراب کے پینے سے معدہ کی رطوبت ماضم جبکہ بغیر غذا کا ہضم ہونا ممکن نہیں بالکل مایہ نین ہوتی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حالتِ شکر میں آدمی کو کھانا کھانے کا بہوک ہو جاتا ہے جس سے نہایت جلد جلد منہ کے اندر نوالے داخل کرتا ہے اور بلا اچھے طور چبانے کے اس لقمہ کو نگل جاتا ہے جس کی وقت کھانے کا رفق شکم اور اسہال یا قبض وغیرہ تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں۔ شراب جب تھوڑی مقدار میں پیا جاتی ہے تب بہوک خوب لگتی ہے اور کھانا بھی

خوب کہا یا جاتا ہے۔ ہمنے ابھی سب بات کا ذکر کیا ہے کہ شراب کے نشہ میں جو بہوک لگتی ہے وہ ہشتہا سے کا ذب کہلاتی ہے اور یہ کہ جو غذا اُس حالت میں کھائی جاتی ہے وہ مضم نہیں ہوتی پس یہ محض غلط ہے کہ شرابی کو ہشتہا سے صادق کہی ہوئے سے بھی لگتی ہو۔ کیونکہ شراب معدہ کے اُس پردہ کا ستیاناس کر دیتی ہے جس میں حکیم مطلق نے اپنی حکمت کا مد سے مثل عطار کی دوکان کے عرقیات مضم کے شیشہ اور قرا بے چین دے دیں۔ حالت غیر سکر میں کہا نا کہا یا جاتا ہے تب وہ رطوبتیں (گشکر۔ جس) اُن قرا بون سے (گشکر۔ گلاٹ) نکل کر غذا میں مل جاتے ہیں اور اُسکو مضم کر دیتے ہیں۔ شرابی کو یہ بات کہاں نصیب۔ شرابی کا معدہ تو ہمارے کاٹھ ہے۔ جب شراب کا کوڑا لگتا ہے تب ہی چلتا ہے ورنہ مردہ حالت میں پڑا رہتا ہے۔ اب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ شراب کی مقدار پر کوئی بھی قادر رہ سکتا ہے۔ کوئی نہیں۔ کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ جب چار یا رمل بیٹھتے ہیں اور شراب کا دور چلتا ہے اُس وقت مضم کے خم لڑھ جاتے ہیں سپر ہی یہی صد مچتی ہے کہ

بیت

ساقیا بر خیز و درہ جام را خاک بر سر کن غنیم ایام را
اب بتلائے اعتدال کہاں رہا۔ جب شراب سے پیٹ مشک ہو گیا تب کہاں کی دیکھا
پڑتی ہے اور کہاں ہنوز چنبا ہی نہیں گیا کہ جو کچھ سامنے آیا دونوں ہاتھوں سے ہونٹے جاتے
ہیں بال در کہی کا ہی تو خیال نہیں رہتا پھر بتلائے غذا کیونکر مضم ہو۔ پس ہم نے
گاہت کرویا کہ غذا کے وقت شراب کا پینا نہایت مضر ہے۔ بہوک نہیں لگتی حکیم کی صلا
لین اور دوا سے اسکا علاج کرا لیں ۛ

یہ کتاب چونکہ حکمت کی ہے اخلاق کی نہیں اسلئے ہم شراب کی اُن برائیوں کا ذکر
نہیں کرتے جو منسوب باحسناق ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ صد کا نوجوان اس شراب

کے پنجہ میں اگر کہ بنائے اپنی جانیں گنوا تے ہیں۔ کتون کی موت مرتے ہیں۔ تم نہیں دیکھتے کہ شراب جگر کا کیا حال کر دیتی ہے۔ کبھی تو جگر پھول جاتا ہے کبھی سُکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے اور اکثر بڑے بڑے دہنل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تم نہیں دیکھتے کہ شراب بیچارہ گردن کو جو خدا کی طرف سے انسان کے جسم کے لئے داروغہ صفائی کے مقرر ہیں کس حالت کو پہنچا دیتی ہے۔ کبھی تو گردن میں درم ہو جاتا ہے کبھی وہ بیچارے سُکڑ کر ایسے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ بعد از وفات نعش کے امتحان سے انکا پتہ نہ نکال سکتے ہیں ملتا انکی ساخت ایسی بگڑ جاتی ہے اور شرابی مستحق ہو کر فی النار والستقر ہو جاتا ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ شراب دماغ کو جو خدا کی طرف سے جسم انسان کا وائیسر اور گورنر جنرل مقرر ہے کیسا بگاڑ دیتی ہے جس سے شرابی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ آدھے یا سارے جسم کا فالج ہو جاتا ہے۔ کبھی پرنزدہ درگور پڑا رہتا ہے۔ آخر کار تھوڑے عرصہ میں جہنم داخل ہو جاتا ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ اسی شراب کے پینے سے وہ اسلحہ مضر پیدا ہو جاتا ہے جسکو اصطلاح میں ذیابیطس کہتے ہیں اور موت سے موندے شرابی مرجھاتا ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ اسی شراب کی بدولت آشک ہو جاتی ہے اور شرابی کی ناک گل جاتی ہے۔ تالو میں سورج ہو جاتا ہے۔ نرطرا زخمی ہو کر چھپ جاتا ہے تب شرابی سے بولا چلا تا کہ نہیں جاتا۔ تم نہیں دیکھتے کہ شراب کے پینے سے خون کیسا کثیف ہو جاتا ہے جس سے دل کی مہلک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور نفرس اور وجع مفاصل کے بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں جن سے شرابی لنگڑا اور لولا بن کر جینوں گنج پڑا رہتا ہے۔ شراب کے پینے میں جو ذلت و رسوائی منسوب باخلاق ہیں وہ اظہر من الشمس ہیں۔ لے ہو طنو اس موذی کو منہ نہ لگاؤ سر چڑھ جائیگا۔ بہت کی طرح چمٹ جائیگا۔ تب یہ جلاؤ گے کہ نبی جان پر اب + شراب کو سنہکھیا سے بڑھ کر نہ ہر قاتل سمجھو اور سچ جانو طب کی رو سے تندہ رستی کی حالت میں شراب کا پینا اپنی جان پر کھیلنا ہے۔ اتنا

مطب میں شراب کی مضرتیں جو دیکھی ہیں میں تم سے کیا کہوں۔ انکو اس شرخ پر قسم کرتا ہوں۔

شعر

اپنے یا دل سے موت چند کہ جی چھوٹ گیا ہم نے جو دیکھا کسی کو وہ نہ دکھلائے خدا
تن سے دم عین جانی میں لکھتے دیکھا دیدے تجھ شیون کو آنکھوں سے بدلتے دیکھا
شراب مثل سنیکیا کے زہر قاتل ہے جسطح سنیکیا کے شیشہ پر لفظ زہر کا کھٹ لگا کر بگر سمیت
کے ساتھ علیحدہ کس میں مقفل کہتے ہیں اور بیماری کی حالت میں نہایت احتیاط سے برتتے
میں اس طرح شراب کو بھی برتنا چاہئے۔

تبنا کو۔ اگرچہ غذا نہیں ہے مگر بہت لوگ پیئے ہیں اسکے جوہر کو نے۔ کوٹین کہنے
ہیں جو ایک ستم قاتل ہے۔ تبنا کو ایک مفرح چیز ہے جھکے پینے سے چین آجاتا ہے اور
بھوک کی تکلیف کبھی کم ہو جاتی ہے اور دردوں کو اجابت کی تحریک ہوتی ہے پر غنہ مال
پر پیا جائے تو مضر نہیں ہے لیکن جب اسکی کثرت کی جاتی ہے تب دل کمزور ہو جاتا ہے۔
اطراف میں عشاء آجاتا ہے۔ اور بصارت میں فرق پڑ جاتا ہے + سب سے عمدہ ترکیب اسکے
پینے کی ہندوستانی حقہ ہے اور گڑا گڑے سے بہتر بیچو ان ہے۔ چڑا اور پائپ
بن تبنا کو پینا مضر ہے۔ وجہ یہ کہ چڑا اور پائپ کا دھواں خالص شش تک پہنچ جاتا
ہے جس سے تبنا کو کا جوہر نے۔ کوٹین جسم میں بکثرت داخل ہو جاتا ہے عسلادہ ازین
چڑا اور پائپ پینے والوں کے لب پر کن۔ سر (سرطان) کی بیماری پیدا ہوتی
ہے اور انکے منہ سے سخت بد بو آتی ہے خاصکہ جب اسپر شراب کی گھونٹ بہر لی جاتی
ہے۔ مگر ہندوستانی حقہ ان برائیوں سے محفوظ ہے وجہ یہ کہ جو تبنا کو حقہ کے ذریعہ
پیا جاتا ہے اس میں عسلادہ مصالحہ کے آدھے سے زیادہ گڑا یا جاتا ہے۔ اور جب پیا جاتا
ہے تب اسکا دھواں حقہ کے پانی میں غوطہ کھاتا ہے پروٹان سے ہٹا دھوکہ اور بہت

ساحۂ تنہا کو گئے۔ کوہِ ٹہن کا جو اشد درجہ کا زہر قاتل ہے اُس پانی میں چھوڑ کر نہ کے
 وند یہ دور و دراز کا سفر کرتا ہے اور تب منہ کے اندر داخل ہوتا ہے عسلا وہ ازین وہ
 دیوان سرد ہوتا ہے اسے حقہ کے پینے سے لبون پر سلطان کی بیماری نہیں ہوتی
 حقہ کی نسبت ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے - شعر

مگر حقہ کے پینے سے دیوان لکھتا ہے صنم پوچھے سلگنا ہے کہو مان جی سلگتا ہو
 چرٹ پینے والے حقہ کی نسبت یہ عرض کرتے ہیں کہ دم زور سے کہینچا جاتا ہے جس سے
 پہ پٹرون کو صدمہ پہنچتا ہے۔ انہوں نے کوئی ٹھٹھل سا حقہ پیا ہوگا جو دم چراتا ہے
 اس وقت جو حقہ میں پی رہا ہو ان اگر قرینہ سے اُسکی گہونٹ بہرین۔ اپنی چرٹ پھول
 جائیں۔ پر بیچ وان کوئی نہ چلے۔ چل کے رشتہ کا جانکا قصہ کرنا پڑے۔

غذا کی تجویز کرنے کے باب میں حکیم کو اس امر کا تجربہ حاصل کرنا چاہئے کہ جس ملک میں
 طبابت کرتا ہو اُسکے باشندوں کی خوراک کس چیز کی ہے مثلاً ہندوستان میں
 بڑی قویں بستی ہیں ایک مسلمان دوسرے ہندو۔ اہل اسلام کی غذائاتی اور حیوانی ہے
 اور اہل ہندو کے بعض فرقے حیوانی غذا سے بالکل نفرت کرتے ہیں اور اس فرقہ کی عورت
 کو حیوانی غذا سے استغناء ہے کہ گوشت یا مچھلی اپنے گہا تک نے نہیں دیتیں اگرچہ
 مرد اُنکے لحم استعمال باہر کر لیا کرتے ہیں۔ حکیم کو ان باتوں کا ضرور لحاظ رکھنا چاہئے کیونکہ
 دُش کیجئے کسی مریض کو گوشت سے نفرت ہے اور علاج نے ماہِ اُفیت سے اُسکے گوشت
 کھانے پر اصرار کیا تو مریض کا اعتقاد اُس حکیم پر گر نہ نہیں جھنجھکا اور جلال علی کے سبب مرینر
 نے گوشت کھا ہی لیا تو اُس غذا سے فائدہ نہ ہوگا بلکہ نقصان متصور ہے کیونکہ وہم کا
 اثر جسم انسان پر بہت ہوتا ہے ایسے موقع پر دال کی تجویز کرنی چاہئے۔ دال کے اندر کل
 پرورششی خزا موجود ہیں در نہ ہندوستان کے گوڑ برہمن اور قوم مینوں کی زلیست
 کیونکہ ہو سکتی یہ لوگ بباعثِ ممنوعات مذہبی گوشت کے نزدیک تک نہیں جاتے

اور صرف بقولات کی غذا سے زندگی بسر کرتے ہیں *

علامہ اسباب کے غذا کی تجویز کرنے کے وقت حکیم کو اپنے مریض کی طاقت کا ملحوظ رکھنا چاہئے چنانچہ بیمار اگر کمزور ہے تو بجز پتلی غذا کے اشیاء سے تعقل و مرکز تجویز نہ کریں مثلاً ادرادٹ - ساگو دانہ - آب گوشت جسے منجی - دال وغیرہ - لیکن مریض کو اگر ان اشیاء سے پرہیز ہو جیسے بل بند کو اکثر ہو کرتا ہے تو اس صورت میں نخود آب یا صرف شیر مادہ کا وادبشر کہ بیمار کو ہضم ہو یا دال مونگ تجویز کریں *

ہماری دانست میں بہتر ترکیب یہ ہے کہ جب غذا تجویز کرنے لگیں اس وقت بیمار سیوریہ فیتہ کر لیں کہ کون کونسی چیز اسکے ناموافق ہے * غذا کے کہلانے کی ترکیب سے بھی طبیب کو واقفیت پیدا کرنی چاہئے مثلاً جب مریض کو غذا سے نفرت ہو یا وہ اس قدر کمزور ہو کہ غذا ہضم نہ ہوتی ہو یا بعد غذا کے تھے ہو جا یا کرتی ہو تو ان صورتوں میں غذا تھوڑی تھوڑی اور دو تین کئی مرتبہ وقت مقررہ پر دیا کریں - فرض کیجئے صبح یا شام کی غذا کے بعد سیکیو تھے ہو جا یا کرتی ہے تو ایسا کریں کہ اس بیمار کی غذا بدلدین اور ایک وقت کی غذا کو تین یا چار دفعہ کہلا دین اور کمزوری کی حالت اور نفرت کی صورت میں بھی اسی ترکیب سے غذا کہلانی چاہئے کیونکہ کمزور دیا بگڑے ہوئے معدہ کے اندر اگر تم نے ایک ہی دفعہ میں بہت سی غذا بھر دی تو اس بیچارہ عضو کو اس غذا کے ہضم کرنے میں بڑی وقت پڑیگی اور اس مقدار کو کوئی مرتبہ تھوڑا تھوڑا کہلاؤ گے تو معدہ اس تھوڑی مقدار غذا کو بخوشی تمام ہضم کر لے گا اور دوسری مرتبہ کی غذا کی اسکو تمنا رہیگی - دیکھتے دودھ ایک ایسی شے ہے جسکو ہر کوئی ہضم نہیں کر سکتا لیکن بہت تھوڑا تھوڑا اور بار بار بلانے اور تدریجاً سکمی مقدار بڑھاتے جاتے تو چند روز کے اندر بیمار سیرور دودھ ہضم کر لے گا کہ جسکا ایک قطرہ بھی پہلے زہر قاتل کے طور پر ضرر تھا *

غذا کے کہلانے میں بہت سی احتیاطیں چاہئیں چنانچہ کہانا آہستہ کہانا چاہئے

اور دہن کے اندر جب نوالہ داخل کریں تو خوب طرح چباویں اور تپ لگیں۔ غذا جب اچھ طور پر چبا لی نہیں جاتی ہے تب دیر سے ہضم ہوتی ہے کیونکہ فضل انہضام طعام ہن سے شروع ہوتا ہے اور دماغ کے طبعی معرکہ کا جزو ہے طرح طرح کے دین لیا تا کر تاکہ معدے میں تپ ہی خوشہ بخیزد ہو جائے۔ یہ کہنا نا کہانے وقت طبیعت کو خوش رکھنا چاہئے کیونکہ رنج و غم فائدہ غصہ سے ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ فصل از غذا پانی نہ پینا چاہئے کیونکہ اس سے معدہ کی رطوبت ہاضمہ دگر ٹھک (جس) تپلی ہو جاتی ہے اور غذا پر اپنا اثر اچھے طور پر کر نہیں سکتی۔ درمیان اور بن غذا کے بھی پانی کم پینا چاہئے۔ کہانے کے ظرف و فو و جگہ کو صاف و ستھرا ہونا چاہئے کیونکہ میلے پن سے جو کہنا نا کہنا جاتا ہے وہ اچھے طور پر ہضم نہیں ہوتا۔ اجزا غذا کے جہان تک مختصر ہونگے بہت جلد ہضم ہو جائیگی کیونکہ جب کئی قسم کا کہنا نا اکاب ہی وقت کے اندر کہنا یا جاتا ہے تو دیر سے ہضم ہوتا ہے کھلے کر بعض کہنا نا مسہین ثقیل اور بعض لطیف ہوتا جس کہانے میں زیادہ مصالحہ اور گھی پڑتا ہے وہ بھی دیر ہضم ہو جاتا ہے۔

ایک اور بات غذا کی نسبت ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کہانے کو ہمیشہ وقت معمولی پر کہنا نا چاہئے اس سے یہ فائدہ ہے کہ معدہ کو اس معمولی وقت کی جب عادت پڑ جاتی ہے تب منتظر غذا کا رہتا ہے اس وقت جب اس میں غذا پڑتی ہے تو نہایت خوشی سے ہضم کر لیتا ہے۔ کوئی خاص وقت غذا کا ہم مقرر نہیں کر سکتے۔ ہر ایک شخص کو چاہئے کہ اپنی عادت کے بموجب اوقات خاص کہنا نا کہانے کے مقرر کر لیں بھر دیکھنا کہانے کے حرکت نہ کرنا چاہئے کیونکہ حکمت سے ثابت ہے کہ بعد غذا کے جب حرکت کیجاتی ہے تب وہ کہنا نا ہضم نہیں ہوتا چنانچہ اس واسطے یہ غذا کے قیلولہ مفید ہے چہارم پو شاک۔ جسم کو کپڑوں سے پوشیدہ رکھنے میں کئی فائدے متصور ہیں چنانچہ پوشاک سے جسم کی حرارت غریزی قائم رہتی ہوگا دورہ سارے جسم میں برابر ہوتا رہتا ہے مساوات بعد کے کپلے رہتے ہیں جن سے عرق آتا رہتا ہے

اور جسم کے بیرونی اعصاب کا حس بھی قائم رہتا ہے علاوہ ان باتوں کے جو جسم کی طرف سے پوشیدہ رہتا ہے تو بدن صدمات بیرونی سے محفوظ رہتا ہے مثلاً سردی اور گرمی خشکی اور رطوبت، مختلف ملک اور موسم میں مختلف قسم کی پوشاک کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ موسم سرما میں ایسے کپڑے پہنے جائیں جن سے جسم کی حرارت غریزی یا ہنری ٹکفے پاوے جیسے پشمینہ اور روئی و اکیڑے ہیں۔ اور گرمی کے موسم میں سوئی کپڑوں کا استعمال کرنا چاہئے۔ اور اس بات کا ضرور لحاظ رہے کہ سردی کی پوشاک گرمی کی آسکینقت دفعہ نہ بدل ڈالیں بلکہ جب خوب طبع گرمی شروع ہوئے تب پوشاک سرما کو تبدیل کر کے گرمی کے ہندوستان میں پارچہ سرما کو ماہ اپریل کے ابتدا یا چچ میں بدلنا چاہئے مگر گرمی کی پوشاک کی نسبت ہرگز یہ قاعدہ راست نہیں تا بلکہ ماہ ستمبر میں جب راتیں سفید سرد اور دن گرم ہوتا ہو تب سردی کے کپڑوں کو پہنا شروع کریں اور جون جون سردی زیادہ ہوتی جاوے گرم کپڑے زیادہ پہنے جائیں۔

پوشاک کی نسبت ایک اور بات یاد رہے کہ بعض حالات جسم کے ایسے ہیں جنہیں حرارت غریزی کم ہوتی ہے اس واسطے گرم کپڑوں کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے مثلاً عہد طفلی اور زیادہ بڑھاپے میں۔ امراض شدید سے جو وقت صحت ہونے لگتی ہے جب آدمی تھک جاتا ہے اور دیگر حالات کمزوری میں۔ امراض قلب میں کہ جب دوران خون مست ہو جاتا ہے حالت فاقد کشی میں اور جب ادویات مہملہ اور معرقہ کا استعمال ہوتا ہو۔ اور جب ریاضت اچھے طور پر نہیں کی جاتی ہے۔ اگرچہ از روئے حکمت سرما کو سرد اور پاؤں کو گرم رکھنا مناسب ہے لیکن اس بات کو ہر شخص کی عادت پر چھوڑ دینا چاہئے کیونکہ ہمارے ملک میں اکثر لوگ اس قاعدہ کے خلاف سے تندرست رہتے ہیں یعنی پاؤں کو ننگے اور سر پر بکڑی باندھتے ہیں اور اس عادت سے انکو کبھی صبح کا ضرر نہیں پہنچتا بلکہ یہ فائدہ ہے کہ تمازت آفتاب کے صدمہ سے محفوظ رہتے ہیں۔

پہنچم ریاضت - اسباب امراض میں اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ ریاضت کا بالکل نہ کرنا اور مست رہنا باعث امراض کا ہے اور یہ کہ جب ریاضت حدت زیادہ کیجاتی ہے تب بھی سخت میں عمل واقع ہوتا ہے پس آدمی کو لازم ہے کہ ریاضت حد اعتدال پر کرے اور جب ہوا خوش میں پیدل یا گاڑی پر ہو اور یہی کرنے میں نب جسم کے اکثر فعل اور خاص کر افعال تنفس اور دوران خون کو ترمازیگی جوتی ہے فضلات خارج ہوتے ہیں اور بدن کی حرارت غریبی کم ہونے نہیں پاتی عضلات مضبوط اور خون کی رگوں کو طاقت آتی ہے جس سے ہر ایک عضو کی پرورش کیواسطے خون باسانی اور برابر مقدار میں پہنچتا اور کبھی حصہ جسم میں خون کا اجتماع نہیں ہونے پاتا علاوہ ازیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب ریاضت اعتدال پر کیجاتی ہے نب بھوک کھلتی ہے طاقت ماضیہ بڑھتی ہے - امحاک کی قوت و افہ باقاعدہ ہوتی رہتی ہے تبض ہونے نہیں پاتا ، مائتہ پاؤں کو طاقت اور کل جسم کی حرارت غریبی بخشنا درجہ پر رہتی ہے اور طبیعت کو فرحت اور جسم ملکا معلوم ہوتا ہے ، چونکہ یہ ساری باتیں ریاضت کی مقدار اور قسم اور وقت اور آدمی کی طاقت اور عادات اور پیشہ اور عمر اور دیگر حالات پر منحصر ہیں اسلئے انہیں سے چند اہم باتوں کی نسبت جو احتیاطیں درکار ہیں انکا مختصر ذکر کرنا واجب ہے چنانچہ عہد طفلی اور ابتدا سے جوانی میں مائتہ پاؤں میں قوت اور طبیعت کو حرکت سے رغبت اور سکوت سے نفرت ہونی ہے اسلئے ایسی ریاضت کرے چاہئے جس سے کل عضلات جسم کے حرکت میں آجادیں مثلاً دوڑنا و ہوپنا کودنا چہانڈا تیرنا گنتی گدہ رانا بانٹیا اور گنگا اور گیند کھیلنا وغیرہ ، لیکن یاد رہے کہ اس عمر میں طبیعت کو زیادہ ہکاؤ کی برداشت نہیں ہے اسلئے بعد ریاضت کے آرام کرنا چاہئے - جب آدمی پورا جوان ہو جاتا ہے اسوقت طبیعت اسکی ایسی بازیوں سے نفرت کرتی ہے جنہیں زیادہ حرکت کرنی پڑتی ہے - اس عمر میں کسی خاص وقت کے اندر ذہنیہ زیادہ حرکت نہ کرنی چاہئے بلکہ ہر روز یکساں کثرت کریں اور بڑھاپے میں اگر طاقت ہو تو پیادہ ہوا خوری کریں

یا گھوڑے یا گاڑی کی سواری پر ہو اخوری کریں *

بلحاظ غذا پیشہ اور آسائش کے ریاضت کا وہی وقت اچھا ہوتا ہے کہ جب جسم سبب بے خوابی یا فاقہ کے کمزور نہوا ہو۔ قبل از غدا صبح وہی لوگ ریاضت کر سکتے ہیں جنکے جسم میں طاقت ہوتی ہے یا وہ جو رات کی غذا دیر سے کرتے ہیں۔ فوراً بعد غذا کے ریاضت منع ہے کیونکہ اس سے کھانا ہضم نہیں ہونے پاتا اور ضعیف الجسم آدمیوں کو گھٹنہ یا دو گھٹنہ پیدل پہننا ہی کافی ہے۔ ریاضت کی قسم میں بھی فرق ہے چنانچہ پیدل پہننے سے انگلیوں میں طاقت آتی ہے اور چونکہ اس صورت میں جسم اسفل کا دوران خون تیز ہو جاتا ہے تو یہی سر اور سینہ کا ایک نوع کا آمالہ ہو جاتا ہے۔ گھوڑے کی سواری سے مکر کو طاقت آتی ہے اور چونکہ اس قسم کی ریاضت میں غلکم اور سینہ کو یکساں حرکت ہوتی رہتی ہے تو عضلے شکم اپنا اپنا کام اچھے طور پر انجام دیتے ہیں *

ششم فضلات۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ایسے فضلے جیسے بول براز اور پسینہ میں اگر جسم سے معمولی وقت پر اور معتدراً معمولی میں خارج نہوں تو صحت قائم نہیں ہو سکتی اور اگرچہ ان فضلوں کا بے وقت امداد خارج ہونا بیماری میں داخل ہے اور علاج طلب ہے۔ یہی سبب کو یاد رکھنا چاہئے کہ تدابیر حفظ صحت کے اچھے طور پر پابند رہنے سے فضیہ ان فضلوں کا آسانی ہو سکتا ہے کہ جس سے صحت قائم رہ سکتی ہے۔ مگر ان فضلوں کا کامل طور پر خارج ہونا کسی باتوں پر منحصر ہے مثلاً خون اس طور پر دورہ کرے کہ جن اعضا سے فضلات پیدا ہوتے ہیں اُس خون سے انکی پرورش اچھے طور پر ہو سکے۔ سانس اچھے طور پر لیجاوے تاکہ خون کامل طور پر صاف ہو جاوے۔ غذا اچھے طور پر ہضم ہو جاوے تاکہ اسکا استحصال بخوبی ہو سکے اور فضلوں کی اجزا میں کمی نہ ہونے پاوے۔ عضلات کی معمولی حرکتیں اچھے طور پر ہوتی رہیں تاکہ جسم سے فضلات کامل طور پر خارج ہو جائیں اور بدن کے اندر جمع نہ ہوں یا وہیں جس سے بیماری کا اندیشہ ہے اور اعصاب کی حس مز

کی طرح کمی نہ ہونے پاوے تاکہ اُن فضلات کے دفع کرنے کی ضرورت بروقت معلوم ہو جا سکے۔ پس وہ ساری توہین جب تک توہی نہ ہو گئی تب تک فضلات اچھے طور پر دفع نہیں ہو سکتے اور فضلہ جب جسم کے اندر جمع ہو جائے ہیں تب انواع و اقسام کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جنکا مفصل بیان آئندہ کیا جائیگا »

اب ہم اُن فضلاء کے دفع کرنے کی نسبت چند نکتے اس موقع پر بتاتے ہیں جن کے پابند رہنے سے قیامِ صحت مقصود ہر چنانچہ تاکہ پانچ اچھے طور پر آجاوے ہر روز جاسے ضرور جانے کی عادت ایک معمولی وقت پڑا لینی چاہئے اور جب کو تبص کی عادت ہو انکو چاہئے کہ اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت اس کام کے لئے ہی صرف کریں اور جب تک اجابت اچھے طور پر نہ آئے تب تک سکے منقطر بیٹھے رہیں اور جلدی کے مارے براز کے خارج کر دینے لئے زور سے نہ کوشش کریں کہ اس حرکت سے دماغ میں خون کا غلبہ ہو سکتا ہے جس سے سکے لیں ۱۔ پو۔ پلکسی کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے ۲۔ اُن لوگوں کی نسبت جبکو عرصہ تک کام کی دُشمن میں گنتھوں بیٹھے رہنا پڑتا ہے اور کثرتِ کار کے باعث رباخت ہنوز کر سکتے ہم یہ صلاح دیتے ہیں کہ ہر روز کسی ملین دوا کا استعمال رات کے وقت کر لیا کریں مثلاً لے۔ کوئیڈ اسکرکٹ اف ریکس۔ را سکر۔ ڈا خیمہ بنفشہ یا گلفندہ یا صبر بار یونڈ کی گولیاں یا بلیڈ زرو تاکہ صبح کو ایک اجابت با فروخت آجایا کرے کیونکہ اس عادت کے آدین کو ہمیشہ تبص کرتا ہے۔ اس بات کے بیان کرنے کی کچھ ضرورت نہیں کہ تبص کی عادت جبکو ہوتی ہے وہ صد ماسم کی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں اور یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ جس روز کو تبص کرتا ہے اُس روز نہ تو بہوک لگتی ہے اور نہ طبیعت کا بار کی طرف متوجہ ہوتی ہے کپٹی کی رنگین تڑپتی ہیں اور دوسرے رہتا ہے »

پیشاب۔ اگرچہ اس فضلہ کی نسبت توجہ کم ہو اگرتی ہے پر جب عمر زیادہ ہو جاتی ہو اُسکے کم یا زیادہ آنے سے طبیعت میں ایک طرح کی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ پیشاب کی کمی

نسبت مختلف آدمیوں کی عادت مختلف طور پر ہوتی ہے بعض کو پیشاب کے روکنے کا ہنڈیہ
ضبط ہوتا ہے کہ گھنٹوں تک مثانہ پیشاب پر رہتا ہے اور تکلیف نہیں ہوتی اور بعض
کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ مثانہ میں پیشاب ترا نہیں کہ انکو حاجت ہو ہی نہیں یہ دونوں عادتیں
خراب ہیں یعنی زیادہ دیر تک پیشاب روکنے سے اس کے منجھ افرامثانہ میں جمع ہو جاتے
ہیں کہ جس سے پتھری پیدا ہونے کا خوف ہوتا ہے اور جبکہ پیشاب روکنے کا بالکل ضبط
ہی نہیں ہوتا انکو محض میں بڑھی دقت پڑتی ہے اور نیند میں خلل آتا ہے۔ پانی کم پینا
اور سرد چیزوں کے کم کھانے سے یہ عادت جاتی رہتی ہے ۔

پسینہ۔ اس فضلے کے خارج ہونے سے کئی فائدے ہیں چنانچہ کثرت محنت
یا شدت گرمی سے جب جلد کی گرہیں خون سے پُر ہو جاتی ہیں تب پسینہ کے ذریعہ
خون کی فضول مائیت اور مہنت اور محوصات خارج ہو جاتے ہیں اور جب بدن گرم ہو
اور اسوقت پسینہ آوے تو اس کے بخیر سے بدن سرد ہو جاتا ہے اور جلد کے مسامات
پسینہ کی حالت میں کھلے رہتے ہیں تو باہر کی ہوا کا اثر خون پر اچھی طرح ہو جاتا ہے جس
سے وہ خون صاف ہو جاتا ہے ، گہکھر پسینہ آنے کے لئے پتھر کے گرم پہننے یا سینے
اور ریاضت کرنی چاہئے ۔ علاوہ ازیں نہانا دھونا اور بدن کو ملنا ہی پسینہ لاتا ہے
چنانچہ جب آب گرم سے غسل کیا جاتا ہے تب جلد کی رگوں میں خون کا دورہ تیز ہوتا ہے
اور پسینہ آتا ہے جس سے اعضا کے اندرونی میں اجتماع خون کا نہیں ہونے پاتا لیکن
یاد رہے کہ گرم پانی سے اگر دیر تک غسل کیا جائے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے ۔

ہضم خواب۔ نیند وہ شے ہے جس کے قواعد سے ہر ایک واقف ہے۔ قیام صحت
کیلئے نیند بہر سونا شد ضروریات سے سارے دن کی مصروفیت سے آدمی جب تھک
جاتا ہے تو جسم اسکا کمزور ہو جاتا ہے اور جب کئی گھنٹے برابر سولیتا ہے تو اپنے کو بہتر تازہ
پاتا ہے ، جب نیند آتی ہوتی ہے تو پہلے اس سے ادگتھاتی ہے اور جائیوں اور مکانوں

آنے لگتی ہیں اور جب نیند آجاتی ہے تب آدمی کے ہوش و حواس مغلط ہوتے ہیں اور حرکات تغیر
بر نسبت جھاگنے کے سُست اور سستہ قدر لینے ہو جاتے ہیں اور نبض بھی کمزور ہو جاتی ہے پس
چونکہ نیند کے وقت حرکات تغیر اور ان خون سُست ہو جاتا ہے اسلئے حالت خواب میں
حرارت غریزی بھی کم ہو جاتی ہے۔ جن حالات سے نیند کو ترغیب ہوتی ہے وہ یہ ہیں
تھک جانا، بیچ و غم، فکر اور ترو کا ہونا۔ ایسی کروٹ پر سونا جس سے ہاتھ پاؤں اور
کل عضلہ کو آرام آ جاوے۔ تھوک۔ پیاس اور طبیعت کے اندر اشتہا کا ہونا۔ سردی
اور گرمی کا ہونا۔ آجانا سونے کے معمولی وقت کا۔ اور رات کے اندھیرے اور سفیدان کا ہونا۔
علامہ ابن باتون کے قصہ اور کہانی کا کہنا اور آہستہ آہستہ گیت گانا اور آہستہ آہستہ جھلانا
بچوں کو کیا کرتے ہیں۔

جن باتون سے نیند نہیں پڑتی یا بد خوابی ہو جاتی ہے وہ مرتب مذکورہ بالا کے خلاف
ہیں مثلاً طبیعت میں فکر اور ترو کا ہونا خواہ تعزیت یا تنہیت کا ہو۔ بے آرام کروٹ پر سونا۔
نہایت درجہ کا تھکان، تنگی نفس، دھڑکنے والے تھوک، پیاس، نا آہ طبیعت کی شکم میں تپنے یا
کسی قسم کی بے چینی کا ہونا۔ نہایت سردی یا گرمی کا ہونا۔ ہاتھ پاؤں کا سرد رہنا وقت
معمولی پر سونا۔

چونکہ بے خوابی سے صحت کو نقصان عظیم پہنچ سکتا ہے اسلئے ہم چند نکتے ایسے بتاتے
ہیں جو کار آمدان کو گون کے ہیں جنکو نیند لیجے طور پر نہیں آتی چنانچہ اگر گون کو علی البصباح
اُٹھنے کی عادت ڈالنی چاہئے پہلے پہل تو یہ بات مشکل سے ہوتی ہے لیکن تھوڑے عرصہ میں
بے عادت پڑ جاتی ہے۔ کھانا کھانے اور ریاضت کے وقت کو مقرر کریں اور ان باتون کی
عادت دوپہر سے پیشتر ڈالیں جب سونے کے وقت قریب آ جاوے تو کُل تردوات کو دل سے
دور کریں۔ ضرورت ہو تو اس وقت ایسی گھٹو کریں یا ایسی کتاب پڑھیں جسکے سمجھنے میں زیادہ
وقت نہ ہو، ورنہ تو بھر کی بہت ضرورت ہو۔ بستر کو صاف ستھرا کر لیں اور پہلے دھنی کروٹ پر

سوئین کیونکہ اس سے جگر اور قلب کو ایسا سہارا ہوتا ہے کہ جس سے شش اور معا
دب نہیں سکتے ۔

کستور سونا چاہئے ۔ یہ بات ہمیشہ اور عادت پر منحصر ہے چنانچہ نئے بچوں کا درشتب
وروز سونے ہی میں گزرتا ہے جب بچہ کی عمر ہر سال کی ہو جاتی ہے تب تک بارہ گنٹہ تک
سونا چاہئے اور ایک یا دو گنٹے دن کو ہی آرام کرنا چاہئے اور جب عمر دس سال کی ہو جاوے تب
ایک دو گنٹہ کم کر دیں اور بعد اس عمر کی بلوغت تک نو یا دس گنٹے کافی ہیں جب جسم کی نشوونما پور
ہو جاوے تب ایک دو گنٹہ کم کر دیں اور بعد اُس عمر کے بلوغت تک نو یا دس گنٹے کافی ہیں
جب جسم کی نشوونما پوری ہو جاوے تب اب ڈیڑھ ایک یا دو گنٹہ سونا کافی ہے اور ڈیڑھ پلے
میں بھی اس قدر سونا چاہئے کہ پانچ سو نیند نہیں پڑتی اور بے خوابی ستاتی ہے مصرع
پیری صغیب چنین گفت اند ۔

عورتوں کو بہ نسبت مردوں کے زیادہ سونا چاہئے خاص کر ایام حمل اور رضاعت میں
کیونکہ جہاں علامات میں نیند نہیں پڑتی ہے تب صدمہ مسم کی تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں
مثلاً طبیعت بے چین رہتی ہے ۔ بصارت میں فرق پڑ سکتا ہے ۔ سماعت کم ہو جا سکتی
ہے فالج کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے ۔ دل یا وہ دھڑکنے لگتا ہے ۔ ہوک مر جاتی ہے
کمزوری لاحق ہوتی ہے اور ہضمت و تشنج بھی ہو جا سکتا ہے ۔ جو لوگ شدید امراض سے
رو بصحت لاتے ہیں یا کسی اور باعث سے کمزور یا لاغر ہو جاتے ہیں انکو نیند زیادہ آتی
ہے گویا طبیعت اس ترکیب کے جسم کو مستور کرنا چاہتی ہے ۔ اگرچہ نیند ہر سونا
ایک نہایت فائدہ مند بات ہے پر زیادہ یا غیر وقت میں سونا بیماری کا گہرے کھنڈے
کو زیادہ سونے سے دوران خون کمزور ہو جاتا ہے ۔ فضلات جسم کے وقت سے خارج
ہو تے ہیں فضلات کی پرورش میں مستور رہتا ہے مزاج دموئی اور جابجا اجتماع خون
کا ہوتا ہے اور جسم میں عربی زیادہ پیدا ہوتی ہے امراض عصبی کا اس صورت میں زیادہ

کم کر کے سونا اور جب عمر پوری ہو جائے تو کچھ زیادہ

خلجہ ہو جاتا ہے چنانچہ اس میں اسطے جو لوگ عصبی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں مثلاً مرگی وغیرہ انکو کم سونا چاہئے۔ رات کی وقت بہر صورت نصف شب سے پیشتر سونا چاہئے

مقالہ سینروم

میڈیکل - تھر - ما - مٹری
یعنی

حرارت شناسی طب میں

بیماری کی تشخیص میں آلہ تھر - ما - مٹر کثرت رکاز آمد ہے -

اطباء زمانہ حال نے مرض کے پہچاننے کے لئے طرح طرح کے آلات اور ترکیبیں بنائی ہیں مثلاً سینہ کے امراض کی تشخیص کے لئے اسکل - ٹے - رشن اور پرکشن کی ترکیبیں مرض کے شمار کے لئے اور دم کشی اور برآمدگی دم کی ہوا کی مقدار کے دریافت کرنے کے لئے۔ انگس کے مضمون کے پہچاننے کے واسطے جسم کی حرارت کو بھی بذریعہ آلے کے دریافت کرتے ہیں جسکو اصطلاح میں کالے - نی - کل تھر - ما - مٹر کہتے ہیں۔ مگر اطباء کی فوج اس ترکیب پر صرف چند سال سے مبذول ہوئی ہے سابق میں یہی کہ بدن کو صرف ہاتھوں سے چھونا مرض کی تشخیص کے لئے کافی سمجھتے تھے مگر جب سے کالی - ٹے - کل تھر - ما - مٹر ایجاد ہوا ہے تب سے ہم ٹھیک ٹھیک ہند سونین بنا سکتے ہیں کہ جسم کی حرارت کس درجہ پر ہے اور اس درجہ کی حرارت کی کمی یا بیشی سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیماری کس درجہ پر ہے اور کیا شفا عنقریب ہے یا دور۔ اگر یہ باتیں مرض کی دوا کا متون سے ہی بتائی جاسکتی ہیں تاہم اس قدر جلد نہیں کہ جس قدر

الانعام اسم کی ترکیبیں اور اسکا نام ہے بدن - اسطے در بیماری کی تشخیص کو بہتر

آلہ تہرہ۔ مٹر سے کہی جاسکتی ہیں کیونکہ وہ مسلمانین اکثر و نفعہ نہیں پیدا ہوتے ہیں بلکہ
بتدریج ظاہر ہوتی ہیں مسلا وہ انہیں روزمرہ ہماری مطب میں اس بات کی تشخیص کے
ضرورت پڑتی ہے کہ آیا مسلمان شخص حقیقت بیمار ہے یا نہیں۔ غرض یہ بات جبکہ جلد
آلہ تہرہ۔ مٹر سے دریافت ہو سکتی ہے کسی اور ترکیب سے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس آلہ
کو بدن پر لگا تم ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ جسم کی حرارت صحت کی مقدار پر ہے یا نہیں
غرض کہ کوئی شخص اپنی بیماری کی علامتوں کو ایسے طور پر بیان کرتا ہے جس سے
تم کوئی کافی نتیجہ نہیں نکال سکتے آلہ تہرہ۔ مٹر فوراً بتا دیگا کہ وہ شخص حقیقت میں بیمار
ہے یا مرض کا بہانہ کرتا ہے۔ بعض بیمار مطب میں ایسے بھی آتے ہیں کہ اپنے کو بیمار نہیں
تصور کرتے یا اپنے کو بالکل تندرست قیاس کرتے ہیں حالانکہ تہرہ۔ مٹر کے ذریعہ بدن
جب صحت سے زیادہ گرم پایا جاتا ہے تب ہم فوراً کہہ دے سکتے ہیں کہ بیماری کی ابتدا
ان کے جسم میں اب تک قائم ہے اور یہ کہ انکو ہنوز زیر علاج رہنا چاہئے مگر اس آلہ کے
ذریعہ صرف یہی نہیں معلوم ہو سکتا کہ بیماری ہے یا نہیں بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ بیمار
شدید ہے یا خفیف مثلاً حرارت کا درجہ اگر صحت پر ہو یا صحت سے کسی قدر کم و بیش تو ہم
یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرض خفیف ہو اور کوئی اندیشہ نہیں جو کہ اگر حرارت جسم کی صحت سے
بہت منحرف ہو گئی ہو تو بدشیک مقام اندیشہ کا ہے۔ پس بچہ یا تم نے کہ تہرہ۔ مٹر کے مدد
سے ہم کیسے ٹھیک طور پر بتا سکتے ہیں کہ بیماری خفیف ہے یا شدید۔ مثلاً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ
بچوں کی کسی بیماری کی علامات اچھے طور پر ظاہر نہیں ہوتی ہیں تب حکیم انکل سے ایسا
علاج کرتا ہے کہ اسکا اثر مرض پر بالکل نہیں ہوتا یا شاید علاج کو کام میں لاتا ہے جس سے
بعض فائدہ کے نقصان ہوتا ہے مگر ایسی صورت میں تہرہ۔ مٹر استعمال کیا جائے
تو اس سے صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ علامات خفیف ہیں یا کسی مرض شدید کی علامت
سند رہ ہیں۔ پوسٹل بیماریاں اس آلہ کی مدد سے اکثر گرفت میں آ جاتی ہیں اگر کوئی بیمار

تم سے صرف یہ کہے کہ میرا جی اچھا نہیں ہے لیکن تہر۔ مارٹر دکھلا دے کہ اُس کے جسم کی حرارت تیز ہے تو جان لو کہ اُس شخص کو شدید بیماری ہوئی ہوگی ہے۔ مگر اس آگ سے صرف بیماری کی تشخیص ہی نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے ذریعہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مرض ایک درجہ سے دوسرے درجہ پر منتقل ہو گیا ہے یا نہیں یا اس کے سبب کوئی اور مرض عارض ہو گیا ہے یا نہیں یا اس مرض کو کس وقت شدت اور کس وقت تخفیف ہوتی ہے۔

جب تک جسم کی حرارت کسی بیماری میں درجہ صحت پر رہتی ہے تب تک معالج کو کسی بات کا اندیشہ نہیں ہوتا مگر جب حرارت کے درجہ میں بہت فرق پڑ جاتا ہے تب مقام خوف کا ہے۔

جب بیماری کو تخفیف ہونے لگتی ہے اور مریض رو بہ صحت لاتا ہے تب بھی ہم تہر۔ مارٹر کی مدد سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرض کو درحقیقت تخفیف ہے یا ہم صرف دہوکا کہا رہے ہیں کیونکہ اگر دیگر علامتوں کو تخفیف ہو مگر جسم کی حرارت تیز ہو تو جان لو کہ ہنوز نفا دور ہے۔ برعکس اس کے ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب بیماری کو تخفیف ہونے لگتی ہے تب علامتوں کو نہایت شدت ہو جاتی ہے لیکن تہر۔ مارٹر اگر یہ دکھلا دے کہ جسم کی حرارت میں چند دن فرق نہیں ہے تو ان علامتوں سے ہم کو ڈرنا نہ چاہئے۔ علامتوں میں سے کسی ایک کے وسیلہ سے ہم کو اپنے علاج کا فائدہ مند ہونا یا نہ ہونا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ غرض آگ تہر۔ مارٹر کے ذریعہ ہم بیماری کو پہچان سکتے ہیں اس کی تخفیف یا شدت کو آسانی سے دریافت کر سکتے اور اس کا انجام نیک یا بد بھی کہہ سکتے ہیں۔ بدن کو صرف مائتوں سے چوکے مرض کے ہر آن کے خفیف تغیرات کو ٹھیک طور پر نہیں کہا جاسکتا کیونکہ ہمارے مائتوں کا حس ایسا باریک شناس نہیں ہے جس جیسے مرض کی تشخیص کو تب آگ تہر۔ مارٹر کو ضرور کام میں لاؤ ورنہ غلطی کہا جاوے گی۔ لیکن صرف ایک ہی فہم کا امتحان کافی نہیں ہے بلکہ اس آگ کو کم سے کم دینیں و دودھ تو ضرور دیا

لگانا چاہئے۔

پس واضح ہو کہ تہر-ماہیٹر کے ذریعہ بیماری پہچانی جاسکتی اسکا انجام نیک یا بد کہا جاسکتا ہے اور اُس بیماری کے علاج میں بھی وہ آلہ مدد دے سکتا ہے۔
ان باتوں کا مفصل ذکر ذیل میں ہی کیا جاتا ہے۔

تندرستی کی حالت کی حرارت اور اس حرارت میں جن باتوں سے فوق
پڑ جاسکتا ہے۔ واضح ہو کہ حالت صحت میں بخل کے اندر گرمی کا درجہ قریب ۳۷ و ۹۸ ہوتا
ہے اور بعض دفعہ ۳ و ۹۷ درجہ سے ۵ و ۹۹ درجہ بلکہ تھوڑے تک بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ ۹۷
درجہ سے کم یا ۱۰۰ درجہ سے گرمی زیادہ بڑھ جاتا تو جاننا چاہیو کہ جسم کے اندر کوئی نہ کوئی
خرابی ضرور ہے۔ تندرستی کی حالت میں جسم کی حرارت کے اندر ان باتوں سے فرق
پڑ جاتا ہے مثلاً وہ حصہ جسم کا جسکی حرارت دریافت کی جاتی ہے چنانچہ جسم کے اندرونی
حصوں کی حرارت بہ نسبت بیرونی حصوں کے کی قدر زیادہ ہوتی ہے جیسے مقعد
یا عورت کے اندام نہانی کی مانی جسم کے اُن حصوں کی حرارت زیادہ ہوتی ہے جو
کپڑوں سے پوشیدہ رہتے ہیں بہ نسبت اُنکے جو کھلے رہتے ہیں اور بہ نسبت اطراف
کے سینہ اور شکم زیادہ تر گرم ہوتا ہے۔

عشر۔ بہ نسبت جوانی کے بچوں اور بالغوں میں حرارت زیادہ ہوتی ہے
اور ایسا بھی کہتے ہیں کہ بڑے بچے میں گرمی پہ بڑھنے لگتی ہے۔

وقت۔ صبح سے لیکر شام تک جسم کی گرمی بڑھتی جاتی ہے اور تب سہری
صبح تک بتدریج گھٹتی جاتی ہے اور تب پھر بڑھنے لگتی ہے۔ غرض اسطورہ ۵۰ و ۵۱
درجہ کا فرق شب و روز میں پڑ جاتا ہے لیکن اس قسم کا فرق بچوں میں زیادہ پڑا
کرنا ہے۔

موسم اور گرمی اور سردی کا لگ جانا۔ بہ نسبت متوسط اور سرد ملکوں کے

ممالک گرم میں جسم کی حرارت کی مقدار زیادہ ہوتی ہے چنانچہ ۵۵ و ۹۹ بلکہ ۱۰۰ درجہ تک بھی ہو جاتی ہے۔ عرصۂ تک گرمی یا سردی کے لگنے سے بھی حرارت کے درجہ میں تغیر فرق پڑ جاتا ہے۔

اکل و شرب۔ سیر ہو کر کھانا کھانے کے بعد حرارت کا درجہ پہلے تو گھٹ جاتا ہے لیکن جو ان جو ان وہ غذا ہضم ہوتی جاتی ہے حرارت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ فاقہ کے وقت بدن کی گرمی کم ہو جاتی ہے۔ شرب کے پینے سے حرارت جلد کی گھٹ جاتی ہے لیکن یہ بات تو طر سے ہی عرصۂ تک رہتی ہے ریاضت سے بدن کی حرارت خاص کر ناہتہ پاؤں کی بڑھ جاتی ہے بشرطیکہ ریاضت اس قدر نہ کیجیے جس سے تھکان پیدا ہو **طبیعت کے حالات**۔ عرصۂ دراز تک مطالعہ کرنا یا طبیعت کو کسی امدادات میں زیادہ عرصۂ تک لگانے سے بھی جسم کی حرارت کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔

استعمال آلہ تھرم۔ مائٹروکائیپاسمی میں

اکثر صورتوں میں بیماری کے سبب سے جسم کی حرارت بنسبت صحت کے طرہ جاتی ہے اور توڑی بہت تپ ہتی ہے۔ مغرض جسم کی اسی متجاوز حرارت کے دریافت کرنے کے لئے اس کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ تندرستی کے درجہ کی نسبت جسم کی حرارت گھٹ بھی جاتی ہے یا جسم کے مختلف حصوں میں حرارت کے درجہ میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ پہر بھی یہ قاعدہ ہے کہ ان اختلافات سے بیماری کی تشخیص میں چنداں فرق نہیں پڑتا۔

اس آلہ کے ذریعہ بیماری کی تشخیص اور انجام نیک یا بد کہنے میں اور علاج کرنے میں مدد مل سکتی ہے مثلاً مرض کی تشخیص کے باب میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی شدید بیماری کے شروع ہونے سے پہلے چند علامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں مگر علامات مذکور اس مرض کے

مندرجہ عملاتین میں ہائین اسبات کا شک حرارت کے دریافت کرنے سے رفع ہو سکتا ہے شگاب بیمار ایسی عملاتین کی شکایت کرے جو اسکے نزدیک چھپک یا اسکار۔ لٹ فیور کی عملات مندراجہ میں تب اس آلہ کے لگانے سے اسبات کی تصدیق ہو جا سکتی ہے کہ وہ عملاتین جنکی شکایت بیمار کرتا ہے واقعی میں لمرض مذکورہ کی مندراجہ عملاتین میں ہائین کیونکہ آلہ مذکور کے لگانے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بخار ہے یا ہین اور جو تو کقدر بے عملادہ ازین آلہ کے ایک یا دو دفعہ کے لگانے سے ہیک طور پر لگا ہے گا ہے یہ بھی دریافت ہو سکتا ہے کہ وہ بخار کس قسم کا ہے شگاب بیمار اگر چھپکا بہلا ہو اور اسکے بدن کی حرارت وقتہ ۱۰۴ یا ۱۰۵ اور جب تک بڑھ جاوے تو اس سے ہم کو مے۔ لے۔ ریا کے قسم کے بخار کا گمان ہو سکتا ہے اور جو چند گھنٹہ کے اندر جلد کم ہو کہ پہر اصلی حالت پر آ جاوے تب تو ہمارا گمان پکا ہو جاتا ہے کہ ان بخار مذکور مے۔ لے۔ ریا ہی قسم کا ہے زمانہ حال کی تحقیقات سے یہ بات دریافت ہوتی ہے کہ بخار کے قسم کی بہتری بیماریوں کے شروع سے لیکر اخیر تک حرارت کے ختلافات باقاعدہ اور ایک جیسے ہو کر نے ہیں اور شب و روز میں اس حرارت کے اندر ایک خاص قسم کی کمی بیشی پائی جاتی ہے اور حرارت مذکور جیسے مندرستی کی حالت میں ایسی ہی ان بخار کی بیماریوں میں بنسبت دن کے رات کیوقت اکثر زیادہ ہو جاتی ہے۔ پس ان بیماریوں میں جو یہ خاص بات پائی جاتی ہے تو تھر۔ ما۔ میٹر کے ذریعہ اسکو ضرور دریافت کرنا چاہئے تاکہ اعلیٰ تخفیر ایک دوسرے سے اور ان بیماریوں سے کیجا کے جنکی شکل بعضہ دفعہ وہ پکڑ لیتے ہیں + عملادہ ازین جب کسی طبیب کو اس آلہ کے استعمال کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تب یہ بھی بتا سکتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی ہمب رسی موجود ہے گو بظاہر اس مرض کی کوئی علامت موجود نہ ہو + کیونکہ بظاہر کسی مرض کی کوئی علامت موجود نہ ہو بہر جہی جسم کی حرارت بنسبت صحت کے اگر زیادہ پائی جاوے تو دل کے اندر مرض کے ہینکا

شک ضرور پڑنا چاہئے اور تب اس بیماری کی تشخیص کی طرف بہ دل متوجہ ہونا چاہئے
چنانچہ پاکھانوں میں ایسا اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کسی اڈر ترکیبے پاکھانوں میں سل کی بیماری
دریافت نہیں ہوئی ہے تب اس لہ کے ذریعہ وہ مرض پہچان گیا ہے ۔ جب تب
کے مضمون کے دور میں یا کسی مرض سے شفا پانے کے اثنائ میں اس لہ کے لگانے سے
یہ پایا جاتا ہے کہ ان مضمون کے خاص درجہ حرارت میں فرق پڑ گیا ہے کہ جس سے بچا
اُترتا نہیں ہے یا بچا اُتر کر حرارت پہر پڑ گئی ہے تب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ان مضمون
کے اثنائ میں کوئی نہ کوئی اڈر بیماری ضرور عارض ہو گئی ہے پس سیدھے یا شدہ ضرورت
ہے کہ جب تک بیمار کو شفا ملتی ہو جائے اس لہ کو بلانا غلبہ کا کہ جسم کی حرارت ضرور دریافت
کہتی چاہئے ۔ بعض بیماریوں میں اس لہ کے وسیلہ سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ بیماری
زور و شور سے بڑھتی جاتی ہے یا قائم ہے مثلاً اسل کی بیماری میں اثنائ مرض کے اندر
جب یٹو - برکل کے مادہ کا نیا غلبہ پیدا ہونے لگتا ہے تب اس لہ کے ذریعہ یہ باجمعلوم
ہو سکتی ہے کیونکہ اسوقت بخار کی شدت ہو جاتی ہے عکساً وہ ایندیز آ لہ کے ذریعہ
گا ہے گا ہے اسل کے مختلف اقسام بھی دریافت ہو سکتے ہیں ۔ جب نفث الدم یعنی
ہے - ماب - ٹے - سس میں شش کی ساخت میں خون پکڑا نفٹیشن پیدا ہو جاتا ہو
تب بھی وہ بات اسی لہ کے ذریعہ دریافت ہو سکتی ہے اور ا - پلو - پلس کی بیماری میں بھی
وہی بات اسی لہ کے وسیلہ سے معلوم ہو سکتی ہے کہ جب دماغ میں خون پکڑا نفٹیشن
ہو جاتا ہے ۔

اس لہ کے ذریعہ جب جسم کی حرارت کم معلوم ہو تب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ مریض بہت کمزور ہو گیا ہے مثلاً حالت ردی میں (کولیس) یا لاناہایت جلد نیچے اُتر
جاتا ہے اور یہی بات اسوقت بھی ہوتی ہے کہ جب نخاع کے اوپر کے حصہ میں سخت ضرب
پہونچتا ہے اور دماغ اور نخاع کی بعض تہیں یا خونین فاقہ کشی ہیں اور خون کے زیادہ نکلیجائے

میں اور بعض بعض ایسی بیماریوں میں بھی جسم لاغر ہونے لگتا ہے تب بھی لڑکے اندر کی پیرائیچے اتر آتا ہے کیونکہ امراض مذکورہ بالا میں جسم کی حرارت گہرے طبعی ہے اور شش اور قلب کے بعض بعض نرمن امراض میں بھی جسم کی حرارت نسبت بہت صحت کے کیس قدر کم ہو جاتی ہے اور حرارت کا بھی حال نرمن برائیشش ڈیزیز میں بھی ہوا کرتا ہے اور یہ یاد رہے کہ حالات مذکورہ بالا میں اگر تپ عارض ہو جائے تب بھی جسم کی بیرونی سطح کی حرارت کم ہی رہتی ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسم کی بیرونی سطح کی حرارت تو کم مگر اندر کی زیادہ ہوتی ہے جیسے ہیفیہ میں +

جب جسم کے مختلف حصے میں حرارت کمین کم اور کبیر بن زیادہ ہوتی ہے تب سب سے فالج اور دیگر امراض عصبی کی تشخیص ہو جاتی ہے چنانچہ مفلوج مانتہ باپاؤن کی حرارت نسبت جانب تندرست کے زیادہ یا کم ہو سکتی ہے + ہے - ہے - پلے - جیامین اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جانب تندرست کی نسبت مفلوج جانب کے حرارت نصف یا دو تہائی درجہ زیادہ ہوتی ہے + نیو - رجمیامین ایسا ہو سکتا ہے کہ خاص درجہ کی جگہ کی حرارت کیس قدر زیادہ ہو جا سکتی ہے اور یہی بات ہس - ٹے - ریامین بھی ہو سکتی ہے جب کسی خاص مقام میں خون کا اجتماع ہو جاتا ہے اسوقت اور اس اجتماع خون کے سبب جو غریبان پیدا ہوتی ہیں ان میں بھی حرارت کم ہو جاتی ہے مگر یہ بھی یاد رہے کہ جسم کے مختلف مقامات کی حرارت کی کمی بیشی اسباب خارجی کے باعث سے بھی پیدا ہو سکتی ہے + بچوں کی نسبت یہ بات ضرور یاد رہے کہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جسم کی حرارت بالکسی خاص سبب کے نہایت جلد بہت بڑھ جاتی ہے - پس بلا سوچے سمجھے اس سے نتیجہ نکالنا چاہئے کہ اگر تھر - م - مٹر ہے چونکہ جسم کی حرارت بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے تو بچہ کو کوئی مشکوئی اندیشناک بیماری ضرور ہوگی کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حرارت جیسے جلد بڑھ جاتی ہے ویسی ہی جلد گھٹ ہی جاتی ہے +

مرض کے انجھام (ڈا۔ یاگ۔ نو۔ سس) نیک یا بد کہنے میں بھی آلہ
تہر۔ ما۔ مٹر مدد دے سکتا ہے لیکن بعض دفعہ تو صرف حرارت کے دریافت ہونے سے ہی
اور بعض دفعہ جب حرارت کے ساتھ نبض کی چال نفس کی حرکت اور فضلات کی مقدار بھی
محاط رکھا جاتا ہے تب مرض کا انجھام کہا جاسکتا ہے مثلاً کسی تپ کی قسم کے مرض کے تہلہ
درجہ میں جب جسم کی حرارت کے درجہ کو دیگر بیماریوں کے ساتھ شامل کر کے
نتیجہ نکالا جاتا ہے تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاص بیماری جس کا انجام کہنا چاہتے ہیں
خفیف ہوگی یا شدید چنانچہ اگر حرارت کا درجہ کچھ بھی زیادہ ہو تو اس سے یہ معلوم
کرنا چاہئے کہ مرض مذکور شدت پکڑ لیا اور یہ کہ اُس مرض کے سبب خون میں جو مفعول
پیدا ہو گئی ہے اُس باعث بیماری مذکورہ بالا میں اثر بیماریاں عارض ہو سکتی ہیں
اس صورت میں مرض کا انجام خوب سوچ سمجھ کر کہنا چاہئے کہ حرارت کا درجہ جب
بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے خاص کر اگر جلد بڑھتا جاوے اور علی الخصوص اس وقت فضلات
بھی کم خارج ہوں تو یہ باتیں نہایت خوفناک ہیں۔

حرارت کے درجہ میں اگر دفعہ کسی بیشی ہو جائے تو اس بات کو کسی مرض کی ایک
علامت مندرہ سمجھنا چاہئے۔ خاص مرض کے ظاہر ہونے سے کسی دن بیشتر بات معلوم
ہو سکتی ہے مثلاً ٹائی۔ فائبرڈ۔ فیور میں جب حرارت دفعہ گم ہو جاتی ہے تو یہ بات اکثر
رودہ سے خون بہنے سے پہلے ظہور میں آتی ہے جب ایسا ہو تو یہ سمجھنا چاہئے کہ اب خون کا
سیلان غفریب ہوگا۔

اگر درجہ حرارت کا نہ بڑھے یا اگر صبح سے شام تک گھٹتا جاوے تو اس کو ایک نیک
علامت سمجھنا چاہئے لیکن پہلے شام کی وقت کی نسبت حرارت کا درجہ صبح کے وقت
زیادہ ہو جاوے تو اس سے یہ سمجھنا چاہئے کہ بیماری شدت پکڑتی جاتی ہے
پس اس صورت میں اُس مرض کا انجام بد کہنا چاہئے۔

بہتیری بخار کی بیماریوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص من بخار اکثر آتا رہتا ہے۔ پس اس کو دیکھ کر تمہارے بیمار کی حرارت کا درجہ کم ہو جاوے اور بخار باقی عہد برابر کم ہوتا جاوے تو اس بات کو نیک تصور کرنا چاہئے۔ اگر اس کا خلاف ہو یا اگر بخار کبھی کم کبھی زیادہ ہو جاوے تو اس کو برا جاننا چاہئے *

پس شدید بخار کی بیماریوں میں جیسے نیو۔ مونیا یا مانی۔ فس فیورین اگر حرارت کا درجہ بہت جلد کم ہونے لگے اور ان امراض کی دیگر علامتوں کو تخفیف نہ ہو بلکہ علامات مذکور شدت پکڑ جاوے تو یہ بات نہایت بُری ہے اور ایسے امراض میں جب صرف حرارت ہی کا درجہ کم ہوتا ہے تب بھی یہ بات بڑی اندیشناک ہے۔

درجہ حرارت کا جب بہت کم چلتا ہے جیسے حالتِ ردی میں ہوا کرتا ہے (کو لیس) تو یہ بات بھی تو بڑی بہت اندیشناک ہے اور جب حرارت کا درجہ ۹۲ سے بھی کم ہو جاوے تب تو مریض اکثر تلف ہی ہو جاتا ہے *

یہ بات بھی ضرور یاد رہے کہ جیسے صحت کی حالت میں ایسے ہی بیماری میں بھی اتفاقیہ حالات کے سبب کچھ عرصہ کے لئے حرارت میں کمی پائی جاسکتی ہے جیسے غذا۔ ریاضت۔ طبیعت کا جوش وغیرہ وغیرہ۔

اور پیشاب کے رک جانے اور تبص ہو جانے سے بھی کچھ عرصہ کے لئے جسم کی حرارت کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور جب پیشاب نکال دیا جاتا ہے اور بیمار کو دست آجاتے ہیں تب حرارت بھی اکثر کم ہو جاتی ہے *

جب سخت دائمی ستم کے بخاروں سے بیمار رو بہ صحت لاتا ہے تب حرارت کا درجہ اکثر عرصہ تک گھٹا ہوا ہوتا ہے اور حرارت کی یہی حالت اُس وقت بھی ہوتی ہے کہ جب ان۔ ٹر۔ مے۔ ٹرنٹ فیورین مریض بخار کی نوبت سے محفوظ رہتا ہے اور یہی بات رمی۔ می۔ ٹرنٹ فیور کی رمی۔ مے۔ ٹرنٹ کی وقت بھی ہوتی ہے *

حرارت شناسی سے علاج کو بھی مدد ملتی ہے یہ بات اوپر کے بیانات سے ثابت ہے مگر بطور نمونہ کے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب جسم کی حرارت بہت ہی تیز ہو اور بڑھتی جاوے اس وقت فوراً مفری لگانی چاہئے * بخار کی بیماریوں سے جب بیمار کو شفا ہونے لگتی ہے تب جسم کی حرارت بعض دفعہ بڑھ جاتی ہے چنانچہ جب غذا میں کئی طرح کی بے اعتدال کھجاتی ہے یا بعض دوا کا استعمال کیا جاتا ہے غرض ان باتوں کو دریافت کرنا چاہئے تاکہ طبی علاج کی غلطی ہو تو فوراً اس کا تدارک کیا جاسکے *

ترکیب حرارت شناسی کی

فقہہ - اول - جسم کی حرارت کئی طور سے دریافت ہو سکتی ہے - چنانچہ ماہر سے بھی جسم کی حرارت دریافت ہو سکتی ہے مگر اس پر عطا دہنیں کیا جانا کیونکہ ماہر تمہارے اگر سرد ہوں تو ان سے ٹھیک درجہ حرارت کا دریافت نہیں ہو سکتا البتہ سرسری طور پر تم کہہ سکتے ہو کہ بدن مریض کا نسبت صحت کے زیادہ گرم یا زیادہ سرد ہے لیکن یہ بات بھی حریف مریض کے ماہر یا چہرہ کے چہونے سے معلوم نہیں ہو سکتی بلکہ ان حصہ جسم پر ماہر لگانا چاہئے جو کپڑوں سے ڈکے ہوں -

فقہہ دوم - پس بدون گون کے جسم کی حرارت کا ٹھیک درجہ دریافت نہیں ہو سکتا چنانچہ سیما ب کا تھر - ما - مٹر اس بات کے لئے کام میں لاتے ہیں * حرارت شناسی کی اسطے جو تھر - ما - مٹر بتاتے ہیں وہ اکثر ۹۵ سے ۱۰۰ یا زیادہ لگنے ہوتے ہیں اور ان پر ۸۵ یا ۹۰ یا ۹۵ درجہ سے ۱۱۰ یا ۱۱۵ درجہ تک کے نشان ہوتے ہیں اور ہر ایک درجہ کے مابین کی جگہ کو ۱/۱۰ حصہ بنین تقسیم کرتے ہیں مگر ایک درجہ سے کم کا بھی حصہ اسانے ہے پتہ لایا جاسکتا ہے *

حرارت شناسی کے تھر - ما - مٹر میں ایک قلم پارہ کے نشان کیو اسطے ہوتی ہیں

جسکو انڈے کس کہتے ہیں۔ ترکیب ان ٹوکس کے تیار کرنے کی یہ ہے کہ تھر۔ ما۔ مٹر کے
 کی گھنڈی یعنی بکٹ کے سیلاب اور نشان کے سیلاب کی قلم کے مابین تھوڑی سی
 ہوا بند کر دیتے ہیں جس سے بکٹ یعنی گھنڈی کے سیلاب کی قلم اور نشان کے سیلاب
 کی قلم علیحدہ ہو جاتی ہے + ترکیب اس تھر۔ ما۔ مٹر کے استعمال کرنے کی یہ ہے کہ
 ان ٹوکس یعنی نشان کو پہلے ٹھیک موقع پر لگانا چاہئے چنانچہ ایسا کرین کر گھنڈی یعنی
 بکٹ کے پارے کی قلم کو انگلیوں کی گرمی لگا دیں تاکہ وہ قلم بکٹ سے قریب ایک
 پنج کے اوپر چڑھ جاوے۔ اب آدھ کی نوک کے سرے کو دھننے مائتہ سے پکڑ کر مائتہ کو
 کندھے تک اٹھا کر پھر نیچے جھٹکے کے ساتھ گرا دیں۔ اس طرح ایک یا دو دفعہ کرین
 جب تک نشان کی قلم ۹۵ درجہ کے خط پر آ جاوے۔ ہینن تو ایک اور کام کرین کہ آدھ
 کی نوک کے سرے کو دھننے مائتہ سے پکڑ کر مابین مائتہ کی ہتھیلی پر آہستہ چند مرتبہ ہلکے
 اس سے ہی نشان کے سیلاب کی قلم نیچے اتر آئیگی۔ مگر نشان کے سیلاب کی قلم کو ہتھیر
 حرکت نہ دیں جس سے گھنڈی یعنی بکٹ کی قلم سیلاب میں آ کرے +

فقہہ سوم۔ اگر تھر۔ ما۔ مٹر کے لگانے کی نہایت مناسب جگہ ہر حالت میں
 یکساں ہینن ہوتی بلکہ طبیب کو اپنی ضرورت کے بموجب جہاں موقع ملے لگانا چاہئے +
 جب جسم کے کسی خاص حصہ کی حرارت دریافت کرنی ہو تو آدھ کو اسی حصہ پر لگانا چاہئے
 اور جب عام جسم کے درجہ حرارت دریافت کرنی ہو تو بغل کا مقام سب سے بہتر ہے بعض
 طبیب آدھ کو مریض کے منہ کے اندر رکھ کر حرارت کا قیاس کرتے ہیں مگر یہ جگہ اچھی ہینن
 ہے کیونکہ جو سرد ہو انفس کے ذریعہ اندر جاتی ہے اُس سے منہ کے اندر کی حرارت کم جاتی
 ہے۔ بعض طبیب عقد کے اندر آدھ کو خسل کرنا بتاتے ہیں۔ اس میں کمی قیاسین ہیں۔
 ایک تو یہ کہ بیمار کو پسند ہینن کرنا۔ دوسرے آدھ کو خسل کرنے سے پاخانہ نکلنے کا
 اندیشہ ہے۔ جب بغل میں آدھ کو رکھ کر حرارت کا درجہ دریافت کرنا ہو تو ان باتوں کی احتیاط

درکار ہے چنانچہ نفل میں سینہ زیادہ ہو تو اسکو پونچھ کر خوب خشک کر ڈالیں اور آلہ کے رکھنے سے پیشتر بازو کو پہلو پر لگا کر نفل کو بند کر دیں اور تب اس میں آلہ کو رکھ دیں * مگر ادھر کے طور پر نفل کو پہلے بند رکھنے اور تب آلہ کو داخل کرنے سے بعض دفعہ دیر گنجائی ہے اس صورت میں آلہ کو پہلے ہاتھ میں دبا کر گرم کر کے بٹن کے سیما ب کو ۸ یا ۹۰ درجہ تک لانا چاہئے اور اگر آلہ میں ان ڈکنس لگا ہو تو اسی ترکیب سے ۸۰ یا ۹۰ درجہ تک قائم کرنا چاہئے جسکا ذکر اوپر کیا گیا ہے * غرض جب سیما ب اپنے ٹھکانہ پر آجائے تب تک - ٹورل مسل کی جانب نفل میں آلہ کی بٹن کو داخل کر کے مریض کے بازو کو کسی قدر پہلو کی طرف لاکر سینہ کی جانب ترچھا کر کہہ دیں اس سے بلب بالکل نفل کے دیواروں سے ڈھکا رہیگا اسکو ہوا بالکل نہیں لگیگی * بیمار بے چین ہو یا ہٹ کرے - خواب میں ہو یا اسکو بالکل خیر نہ ہو یا نہایت لاغر ہو اور ان سبوں سے آلہ اپنی جگہ پر اچھی طرح قائم نہ رہ سکے تب طبیب کو اپنے ہاتھ سے قائم رکھنا چاہئے * مگر ہر حالت میں گاہے گاہے دیکھنا چاہئے کہ آلہ اپنی جگہ پر قائم ہے یا نہیں * ایک ہی دمنٹ کے عرصہ میں یہ معلوم ہو سکتا ہو کہ آلہ کا پارا اوپر کو چڑھتا ہے یا نہیں اور بخار کی حالت میں تو چند سکندھ ہی کے اندر یہ بات دریافت ہو سکتی ہے - آلہ جب نفل میں لگایا جاتا ہے تب ۱۰ دمنٹ سے کم بلکہ اکثر ۱۵ دمنٹ بلکہ بعض دفعہ ۲۰ دمنٹ سے کم میں بھی سیما ب اُس موقع کے حرارت کے درجہ پر قائم نہیں رہتا - یہ بات قابل یاد رکھنے کے ہے کہ پہلے پہل تو پارہ خوب جلد چڑھنے لگتا ہے اور جب جسم کی اصلی حرارت تک پہنچنے کو ایک درجہ کا دسواں (۱/۱۰) حصہ باقی رہ جاتا ہے تب اُسکے چڑھنے کو کئی دمنٹ کا عرصہ لگ جاسکتا ہے - پس تاکہ تحقیق میں غلطی نہ ہو پارہ کے قائم ہو جانے کے بعد بھی آلہ کو اپنی جگہ پر کئی دمنٹ تک رکھا رہنا چاہئے مگر بہت عرصہ تک بھی نہ رہنا چاہئے کیونکہ جب بیمار اپنے بازو کو غیر معمولی حالت میں جو کہ آلہ کو نفل میں دبا رکھنے سے پیدا ہوتی ہے عرصہ تک جبراً رکھتا ہو

تب بے چین ہو جاتا ہے اور اس عجز معمولی حالت کے سبب عضلات بھی عرصہ تک تنے ہوئے رہتے ہیں غرض ان سببوں سے پارہ کے قائم ہو جانے کے بعد جسم کی حرارت کی مقدار بڑھ جاسکتی ہے جس سے سیلاب اور بھی چڑھ جاسکتا ہے اور شاید کا غلط نتیجہ نکل سکتا ہے * آگ کو منہ کے اندر رکھنا ہو تو زبان کے نیچے رکھ کر منہ بند رکھیں اور ناکوں سے دم لیں *

جسم کی حرارت کس وقت اور کتنی دفعہ دریافت کرنی چاہئے۔ یہ باتیں مرض کے حالات پر منحصر ہیں۔ مگر علی العموم دینین و دفعہ دریافت کرنا چاہئے ایک تو صبح کو نئی سات آٹھ یا نو بجے جب ٹھنڈا وقت ہوتا ہے اور دوسرے شام کو کوئی چار یا پانچ بجے جب وقت گرم ہوتا ہے۔ لیکن مشاہدہ سے یہ معلوم ہو کہ کسی خاص بیماری کی شدت تخفیف کا کوئی اور وقت ہو تو انہیں وقتوں میں حرارت دریافت کرنی چاہئے اور خاص کر جب کسی سخت بیماری کی نسبت کوئی خاص بات دریافت کرنی ہو تو دو دو یا چار چار گھنٹہ بعد آگ کو لگنا چاہئے *

یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ طبعی ہی حرارت کو دریافت کرے کیونکہ اکثر طبعی جینکا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ انکو نہایت کم فرصت ہوتی ہے مگر ان حرارت کا دریافت کرنا اگر صرف دو ہی دفعہ صبح یا شام ہو تو مضائقہ نہیں مگر شب و روز میں کئی دفعہ دریافت کرنا ایسے عظیم الضرر صفت طبعیوں سے نہیں ہو سکتا اور اس بات کی کچھ ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی سمجھوہ عقلمند آدمی جسکی بنیادی بھی ہو نہیں تو عینک لگا لے آگ کا استعمال کرنا جلد سیکھ جاسکتا ہے پس بیمار کے کسی شہداء کو آگ کا استعمال کرنا سکھا دینا چاہئے اور آپ خود اس کے نتائج کو ملاحظہ کرنا چاہئے *

ترکیب آگ کے استعمال کرنے کی یہ ہے کہ مریض کے پاس تے ہی اسکی فضل کو

پونچھ کر اور آگ کو ماتہ سے پہلے گرم کر کے اس کے اندر رکھ دین اس ترکیب سے آگ کی بلب اور بغل کے درمیان کوئی کپڑا نہ آجائے اور اسی وقت اپنی گھڑی میں وقت بھی دیکھ لیں اب ایسا کریں کہ جب تک بغل میں آگ ہو بجیا رکھیں اور زبان کا ملاحظہ کریں اور بول و براز کو بھی دیکھیں۔ بعد دو یا تین منٹ کے آگ کو دیکھیں کہ پارہ جلد اوپر چڑھتا ہے اور بلب اس کا اپنی جگہ پر قائم ہے یا نہیں۔ بغل کے کھولنے کی کچھ ضرورت نہیں ایک انگلی سے بلب کو ٹٹولیں اور آگ کی ڈنڈی سے سیما ب کا اوپر کو چڑھنا ملاحظہ کریں۔ جب پارہ کپڑا موقوف ہو جاوے اور وہ قائم کھڑا ہے اور اس بات کو عرصہ ۵ منٹ کا گزر جاوے تب آگ کو نکال کر حرارت کا درجہ ملاحظہ کریں + اور کسی رول کئے ہوئے نقشہ میں ہر دفعہ کے درجہ حرارت کو درج کریں اس ترکیب سے ایک مسلسل پیچیدہ خط بن جائیگا جس سے حرارت کی کمی بیشی بخوبی معلوم ہو جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں نبض اور نفخ کے تو اثر کو بھی سطح سنج یا سنبرنگ کی نیل سے درج کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے رول کئے ہوئے نقشے دوا کی دوکانوں میں فروخت ہوا کرتے ہیں۔ فائدہ ان نقشوں کا یہ ہے کہ شروع سے اخیر تک مرض کا دور نقشہ پر نگاہ ڈالتے ہی معلوم ہو جا سکتا ہے +

باب چھپارم

بیان امراض عامہ

مقالہ اول

نیا دتی خون کی

اصطلاح میں لایکو پے۔ تہو۔ راکتے ہیں۔ یہ وہ حالت جسم کی ہے جس میں مزاج

دموی ہو جاتا ہے اور بدن کے اندر خون زیادہ پیدا ہوتا ہے ۛ

ایسے آدمیوں کا مزاج دموی ہو جاتا ہے جو نہایت تندرست ہوتے ہیں جب تکی شہتہ نہایت تیز اور کھانا خوب کھاتے ہیں ریاضت کم اور فضلات کے دفع کرنے پر توجہ کم کرتے ہیں ان لوگوں کے بدن میں خون زیادہ پیدا ہوتا ہے اور رگین بھی زیادہ خون سے پُر ہو جاتی ہیں جس سبب سے انکا چہرہ - آنکھیں - لبیں - سونڈے وغیرہ مریخ ہو جاتے ہیں اور نبض نہایت پُر - قلب کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور اُس پر نہایت بوجہ پڑتا ہے جس سے دل دھڑکنے لگتا ہے اور تنگی نفس کی ہوتی ہے - اونگھ آتی ہے اور طبیعت کا روبرو سے نفرت کرتی ہے - عموماً وہ ان بوجھت کے جینکا ذکر اوپر کیا گیا ہے طبیعت ان سببوں سے بھی موی ہو جاسکتی ہے مثلاً جب عرصہ تک کسی مقام سے خون یا کوئی اور رطوبت جاری ہے اور ہر کم ہو جاوے یا جب کوئی مدت کا جسم خشک ہو جاوے یا محل جراحی سے ماہتہ پاؤں کاٹ کر علیحدہ کر دیا جائے ۛ یہ حالت دوسم کی ہوتی ہے ایک تو وہ جسمیں مریض طاقتور ہوتا ہے - اور دوسری باوجود ہونے زیادہ خون کے بھی بیمار کمزور ہو جاتا ہے ۛ قسم اول میں خون کے زیادہ ہونے سے قلب کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور نبض پُر اور باقاعدہ چلتی ہے - رطوبات جسم کے باخراط پیدا ہوتی ہیں - پٹھو کنا حس تیز ہوتا ہے - حرارت غریزی تیز ہوتی ہے اور طاقت جسمانی اور قوت روحانی تیز و تند ۛ اگر خون کی مقدار یہیں تک قائم رہے تو بیمار کی صحت میں کبھی طرح کا خلل نہیں پڑتا - لیکن جب خون اس مقدار سے زیادہ پیدا ہونے لگتا ہے تب مزاج دموی طرف بیماری کی مائل ہو جاتا ہے چنانچہ اس صورت میں طلب کی حرکت بہت تیز ہو جاتی ہے - نبض سیرج پُر اور سخت ہو جاتی ہے - چہرہ مریخ و تمکنا ہوا معلوم ہوتا ہے اور حرارت غریزی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ مثل تپ کی حرارت کے ہو جاتی ہے - غدودون کی رگون میں طرح طرح کی خرابیاں پڑ جاتی ہیں جس سبب سے

کبھی تو ان سے رطوبت بکثرت پیدا ہونے لگتی ہے اور بعض دفعہ وہ رگین خون سے اس قدر پُر ہو جاتی ہیں کہ خون بہنے لگتا یا انفلیکشن ہو جاتا ہے اور تب امراض صفری پیدا ہونے لگتی ہیں تے آتی ہے۔ پیشاب میں لے۔ تھک اسڈ کی ریت چنے لگتی ہے اور پیشاب سرخ اور تیز ہو جاتا ہے اور بیمار نقرس (گائوٹ) کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے *

اس قسم کی زیادتی خون میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو جوان اور چست چالاک ہوتے ہیں یا جن کا مزاج پیدلش سے دوسری ہوتا ہے * دوسرے دوم کی زیادتی خون میں غلبہ اور دیگر اعضا سے بعض چست ہونے کے خون کچے بوجہ سے پسپ ہو جاتے ہیں اور نبض باوجود دیکھ پڑتی ہے مگر لمبی ہو جاتی ہے * مریض کی طبیعت بیوشی (کوہما) کی طرف مایل رہتی ہے اور اس کا دل دھڑکتا ہے۔ قلب بیمار کا بڑا ہو جاتا ہے اور چہرہ بعض سرخ ہونے کے ادا ہو جاتا ہے۔ وریدیں (وینس) اکثر خون سے پُر اور ماتہ پاؤں بعض دفعہ سرور ہو جاتے ہیں۔ پانچا نہ قبض۔ پیشاب کم سرخ یا گدلا سر کی تیزی کم ہو جاتی ہے۔ عضلے کمزور۔ قوالے روحانی شست اور بیمار کو ادھنگاتی ہو چستی اور چالاک کی جاتی رہتی ہے اور بیمار بالکل پست ہمت ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی بیماری میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو سبب زیادہ عمر کے کمزور ہو جاتے ہیں اور جنہیں فصدتہ اچھ طور پر خارج نہیں ہوتے * جسکے جسم میں اس قسم کی زیادتی خون کی ہوتی ہے وہ استقا کی بیماری اور اجتماع خون کے مریضوں میں اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں اور جب یہ حالت دیر تک رہتی ہو تو بعض اعضا کی ساخت میں تو پڑ جاتا ہے مثلاً قلب پہلی جاتا اور جگر بڑھ جاتا ہے اور بعض دفعہ سکتہ (ایپوپلیکسی) یا فالج (پالسی) یا دماغ میں کسی اور قسم کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے *

علاج۔ یہ حالت چونکہ زیادتی خون کے باعث پیدا ہوتی ہے تو اس کا علاج

تیقہ سے کرنا چاہئے مثلاً قسم اول میں فصد لین اور مرکبات انٹے - مو - فی اور ٹمکین
 دو اونکا استعمال کریں اور وی - جی - ٹے - لس - اکو - نائیٹ اور ٹائیڈور سیانک اسٹ
 بھی مفید ہیں - نیبو کا عرق بھی اس مرض کو نہایت فائدہ کرتا ہے اسکے استعمال سے
 نبض کی طاقت اور سرعت گھٹ جاتی ہے اور مرکبات سیٹما اور کالجی - کم بھی اس بیماری
 کو فائدہ بخشتے ہیں + اگر کسی خاص حصہ جسم میں یہ حالت پیدا ہو جاوے تو دماغ سے
 خون لینا چاہئے - قسم دوم کے علاج میں بھی فصد لے سکتے ہیں مگر بعد ہی فصد کے
 مقویات اور مضرعات کا استعمال کرنا چاہئے چنانچہ عرصہ تک مرکبات سیاب ہمارا دوسرا
 اور ایلوڑ اور ٹراگ - زئی - کم کے استعمال کریں اور تبا ٹیرک اسٹ یا آیو - ڈائیڈاف
 پو - ٹا - سیم کھلاوین ، بعد ازاں مقویات مثلاً فولاد یا سٹکو - نا - بارک اور کھلیو کا
 استعمال کرنا چاہئے +

اس بیماری میں غذا کی بڑی احتیاط چاہئے چنانچہ قسم اول میں غذا کم دیوین تاکہ
 خون زیادہ پیدا نہ ہونے پاوے + گوشت بالکل موقوف کر دیں صرف دال روٹی مایا چل
 اور بقولات پر غذا کو منحصر رکھیں نخر کا استعمال ایک قلم مذکر دین + قسم دوم میں
 بہت ہی احتیاط سے غذا کو کم کرنا چاہئے اور غذا گرم اور زیادہ مرغن کا استعمال ہرگز
 نہ کریں + صبح شام کی ریاضت حسب طاقت بیمار کے عین مناسب ہے +

مقالہ دوم

کمی خون کی

جسم کی اس حالت کو اصطلاح میں انے - میا کہتے ہیں - یہ وہ حالت ہے جس میں خون ترقق
 اسکے سرخ کیسے کم اور سفید کیسے زیادہ ہو جاتے ہیں اور خون کی مقدار گھٹ جاتی ہے

انے۔ میا کے معنے بڑے وسیع مین مگر مطب مین اکثرین قسم کے انے۔ میا کے بجائے
 مین۔ اول وہ جسکے بدن مین خون کی مقدار کم ہوتی ہے۔ دوم وہ جسکے خون کی خاصیت
 مین فرق پڑ جاتا ہے۔ سوم وہ جسکے بدن کی شرائین کامل طور پر خون سے پر نہیں ہوتی
 لیکن اکثر یہ تینوں حالتیں ایک ہی بیماری مین پائی جاتی ہیں۔ خون کی خاصیت مین
 اس قسم کا تغیر واقع ہو جاتا ہے کہ اسمین شرح کیسے کم ہو جاتے ہیں در اکثر البیو۔ مین
 کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے۔ مگر خون مین مابیت اور نمک کی کثرت ہوتی ہے اور سرم
 کی اسپے۔ سی نہایت گراؤٹی کم ہو جاتی ہے اور ویدون مین خون آسانی سے جم جانے
 کے قابل ہو جاتا ہے۔

اسباب۔ انے۔ میا بہترے سببوں سے پیدا ہو سکتا ہے مگر بیماری سبب
 اسکے یہ ہیں کہ ایک ہی دفعہ زیادہ خون کا نکل جانا یا توڑے توڑے خون کا بار بار نکل جانا۔
 حفظ صحت کے قواعد کے خلاف وقوع مین آنا خاصکر ایسے مکانات مین سست پڑے
 رہنا یا سر گرمی سے کام مین مصروف رہنا جن مین ہوا کی آمد و رفت کا اچھا بندوبست
 نہ ہو اور مکان بند ہو کہ جس مین ہوا اور روشنی کا گزر نہ ہو۔ غذا کی کمی اور ایسی چیزوں کا کھانا
 جن سے جسم کی پرورش چھٹی سوجھ نہ سکے۔ ماضیہ کا بگڑ جانا۔ زیادہ عرصہ تک بچہ کو
 دودھ پلانا۔ اسہال جسم کے کسی مقام سے زیادہ عرصہ تک پیپ کا جاری رہنا۔
 عرصہ وراثت کے۔ لے۔ ریا ہوا کے اثر مین رہنا چاہے تپ لرزہ ہو یا نہ ہو مختلف قسم
 کی فرمیں بیماریاں جن مین جسم کی پرورش مین خلل واقع ہو جاتا ہے۔ جیسے سئل کی بیماری۔
 سرطان۔ گردہ کی بیماریاں۔ معدہ کا جسم۔ کثرت مجامعت اور خلق رنج و غم و تروہ۔
 عرصہ تک سیہ اور بار بار ویدون کا خون کا اثر جسم مین ہونا۔ مائٹل۔ وائٹو یا یا رٹک۔ وائٹو
 کے وائٹیک بیماری یا خود ایڑا کا مرض۔ خاصکر عورتین جنکی عمر ۱۵ سے ۴۰ سال کی ہو
 اس بیماری مین اکثر مبتلا رہتے ہیں تب اس مرض کو کلو۔ رو۔ سس کہتے ہیں +

نے۔ میا ایک خاص قسم کا ہوتا ہے جسکو پر۔ نے ریش شائے۔ میا کہتے ہیں (سین خون کے کیسے بکثرت ہو جاتے ہیں اور یہ مرض کم عیلاج پذیر ہوتا ہے۔

علامات۔ مریض کمزور اور ادنیٰ باعث سے اسکو غش (رسن۔ کو۔ پی) آجاتا ہے اور تھوڑی سی محنت میں بے دم اور تھک جاتا ہے۔ نبض کمزور اور دل دھڑکنے لگتا ہے۔

اطراف سرد و ہوک مر جاتی ہے۔ ماضیہ بگڑ جاتا ہے۔ پاخانہ کم اور رطوبات جسم کی بد بجاتی ہیں۔ خون اچھے طور پر پیدا نہیں ہوتا اسکی مائیت زیادہ اور ریڈ۔ کار۔ سپل کم ہو جاتے ہیں۔ جلد کی رنگت پھسکی اور چہرہ لین مسوڑے اور زبان بھی پھسکی پڑ جاتی ہے اور بسبب پتلا پڑ جانے خون کے قلب کے مقام پر ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ جھکوانے۔ کٹ (درمر) کہتے ہیں۔ عصبی افعال کو بھی اس بیماری میں بعض دفعہ تحریک ہوتی ہے چنانچہ مریض کو آواز اور روشنی کی برداشت نہیں ہوتی۔ آنکھوں کے سامنے چنگاریاں گھومتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ کانوں میں طرح طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور جسم میں جابجا عصبی درد پیدا ہوتے ہیں۔ سر گھومنے اور دوڑ کرنے لگتا ہے۔ اونگھ آتی ہے۔ اور بیمار بالکل پست ہمت ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ آنکھ کے پردہ قرنیہ (کار۔ نیا) میں زخم پڑ جاتا ہے اور مسوڑے اور ناک سے خون جاری ہونے لگتا ہے۔ جسم کے مختلف مقاموں میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔

عیلاج۔ چونکہ خون اس بیماری میں کم پیدا ہوتا ہے اور پتلا بھی پڑ جاتا ہے اسلئے ایسا عیلاج کرنا چاہئے جس سے یہ باتین رفع ہوں چنانچہ تجربہ سے ثابت ہے کہ مرکبات فولاد اچھی غذا ہوئے خوش میں ریاضت کرنا محنت کم اور طبیعت کو خوش کہنا ان ساری باتوں سے خون زیادہ پیدا ہوتا ہے لیکن انکے استعمال میں احتیاط چاہئے مثلاً اگر ماضیہ بگڑا ہو تو غذا تھوڑی اور لطیف دین اور تقویات کے باب میں ایسی تجویز کریں جو بیمار کی طبیعت کے موافق ہو اور بشرط موافقت فولاد سب سے عمدہ مقوی دوا ہے

لیکن اسکے مختلف مرکبات کے استعمال میں احتیاط و رکاوٹ ہے چنانچہ اگر عمدہ قبول کرے اور دردِ سر اور بخار نہ ہو تو سلفٹ یا فاس - فٹ یا آیوڈائیڈ آف ایرن مناسب ہے اور نیکو آف اسٹیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب انکی برداشت نہ ہو تو ہلکے مرکبات کو کام میں لادیں مثلاً ڈا - یا - لائینرڈ ایرن یا سٹ ریٹ آف ایرن اینڈ ایمو - نیا یا سٹ - ریٹ آف ایرن اینڈ - کونین یا کاربونیٹ آف ایرن یا اسے - ٹٹ آف ایرن اور بیمار کو فولاد کی بالکل برداشت ہی نہ ہو تو نباتی مغویات کا استعمال کریں مثلاً کلیمو * سنکو - نا - بارک * چریتا - کو - ایشیا وغیرہ * بعضی عملاتین ظاہر ہوں تو دوائیں ایمو - نیا * ایتھر اور وی - لے - رینین اور سبیل وغیرہ کا استعمال مناسب ہے * بیمار کو غلامقویٰ میں اور تبدیل آج ہوا کر اوین

مقالہ سوم

انفلامیشن

سنے اس لفظ کے آگ لگ اٹھنے کے ہیں - یہ وہ بیماری ہے جسکے سبب خون اور اعضا کی ساخت میں طرح طرح کے تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں چنانچہ یہ بات اسکی ماہیت سے معلوم ہو جائیگی *

ماہیت تشترجی - واضح ہو کہ انفلامیشن ایک وہ حالت غیر طبعی ہے کہ جس مقام پر پیدا ہوتی ہے اسکی ساخت اور فعل میں مستور پڑ جاتا ہے خون اور عروق شعیرہ (کے - پے - لے - رینر) کی حالت بھی تغیر ہو جاتی ہے اور اکثر اس مقام پر یہ چار عملاتین پیدا ہوتی ہیں - تھرخ (یعنی ریڈ - ہنس) (درم (یعنی سوے - لنگ) (درد (یعنی پین) اور گرمی (یعنی ہیٹ) * اور اس مرض کا اثر چونکہ سارے

جسم پر ہوتا ہے تو تھوڑا بہت بجا رکھی ہو جاتا ہے جسکو انفلا۔ مٹری فیور بولتے ہیں۔ فرض کرو کسی کی جلد میں کوئی کانٹا چھبا اگرچہ اثر اسکا اُس مقام کے ہر ایک جز پر ہوگا لیکن دھن کے اعصاب ہی زیادہ تر متاثر ہو جائیں گے۔ پس اس واسطے کانٹے کے چبوتے ہی پہلے دروہو کرتا ہے اور تب دھن پر خون کا غلبہ ہوتا ہے جس باعث باریک شریانیں اور عروق شعیریہ کی نالی تنگ ہو جاتی ہے لیکن تھوڑے ہی عرصہ بعد وہ رگیں پھیلکر مفلوج ہو جاتی ہیں اسلئے جون جون خون زیادہ آتا جاتا ہے وہ رگیں زیادہ تر ہیلتی جاتی ہیں لیکن جب بہت زیادہ پہیل جاتی ہیں تب خون کا دورہ سست پڑ جاتا ہے اور مائیت اُسکے مقام ماؤف کی ساخت میں تراوش پانے لگتی ہے + پس یہ جو اد پر بیان کیا گیا ہے انفلامیشن کا درجہ اول کہلاتا ہے یعنی اس درجہ کے اندر مقام نعیم میں خون زیادہ آتا ہے اُسکا دورہ نہایت تیز ہو جاتا ہے اور اُسکی مائیت رگوں کے مسامات سے تراوش پا کر مقام مرض کی ساخت میں لغو ذکر جاتی ہے۔ اگر اس درجہ میں دھ کا ٹائل نکل جاوے تو وہ مقام بھی اپنی اصلی حالت پر آسکتا ہے ورنہ انفلامیشن درجہ دوم میں منتقل ہو جاتا ہے »

درجہ دوم۔ مقام مذکور کی شریانیں پہیلنے اور زیادہ تر پنے لگتی ہیں اور دھ پیر خون جون جون زیادہ آتا جاتا ہے باریک شریانیں اُسکے بوجہ سے ناچار ہوا کر زیادہ پہیل جاتی ہیں اور خون کا ٹٹا ہو جاتا ہے اُسکا دورہ سست اور مائیت اور فاسفی۔ برین اُسکی نسبت درجہ اول کے زیادہ تر تراوش پانے لگتی ہے + پس یاد رہے کہ اس دوسرے درجہ میں شریانیں کی تر پ تیز ہو جاتی ہے لیکن خون کا دورہ سست اور رگیں چونکہ خون سے بہت پُر ہو جاتی ہیں اسلئے اُنکی طاقت انقباض جاتی رہتی ہو اور دھان کے خون کی خاصیت بھی بدل جاتی ہے کیونکہ مقدہ اُس خون کے فاسفی۔ برین کی زیادہ ہو جاتی ہے اور اُسکی مائیت اب کثرت سے تراوش پانے لگتی ہے اور مقام

ماؤف کے فعل اور پرورش میں ہی مستور پڑ جاتا ہے + اگر اس حالت میں بھی کاٹا نکال لیا جاوے تو مرض منع ہو سکتا ہے ورنہ درجہ سوم یعنی خاص انفلا میشن کے آثار پیدا ہونے لگتے ہیں +

درجہ سوم - یعنی خاص انفلا میشن - جو تغیرات خون کے درجہ دوم میں شروع ہوئے تھے اب کامل ہو جاتے ہیں - اور باریک رگیں بھی اب خون سے خوب پُر ہو جاتی ہیں انکی طاقت انقباض اور انبساط کی جاتی رہتی ہے اور خود انکی ساخت میں ایسا تغیر پیدا ہو جاتا ہے - کہ وہ اب بالکل یا قریب گلنے کے ہو جاتے ہیں - خون کا دورہ جو پہلے صرف سست تھا اب مرکب جاتا ہے اور عروق شریح سرخ اور سفید خون کے کیوں سے پُر ہو جاتے ہیں - مائیت خون کی اب کثرت سے بننے لگتی ہے اور ملائم رگوں کے پھٹ جانے سے خون بننے ہی لگتا ہے اور اب پیپ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور مقام ماؤف کی ساخت بھی گلنے لگتی ہے + غرض خاص مقام انفلا میشن میں جو از بالکل ٹھہر جاتا ہے مگر اسکے گرد و دورہ خون کا نہایت تیز ہو جاتا ہے اور جب تک انفلا میشن رہتا ہے تب تک نغولھاٹیکس اور نہ ویدین اس مقام کے مادہ کو جو سبب انفلا میشن کے پیدا ہوتا جاتا ہے جذب کرتے ہیں لیکن جو وقت مرض رفع ہونے لگتا ہے اس وقت مادہ بھی کم پیدا ہوتا ہے اور جب قدر پیدا ہوا ہے وہ جذب ہونے لگتا ہے جس باعث مرض کا مقام اکثر حالت اصلی پر آ جاتا ہے مثلاً جب سیرس جمین میں انفلا میشن ہوتا ہے تب ایک مادہ آبی اس پر وہ کسے جو ف میں کثرت سے پیدا ہونے لگتا ہے اور تا ایام مرض یا تو وہ مادہ اتنا ہی رہتا ہے جتنا پہلے تھا یا بڑھنے لگتا ہے جب انفلا میشن رفع ہونے لگتا ہے اور وہ مقام حالت اصلی پر آ جاتا ہے تب وہ مادہ بھی کم ہوتا جاتا ہے اور توڑ سے ہی عرصہ میں بہت ہی کم ہو جاتا ہے +

تغیرات خون سبب انفلا میشن کے - اول سی - کو ارسنگوی - نیش کے مقدار

زیادہ ہو جاتی ہے اور اُس کے سیرم یعنی مائیت مین البیو مین زیادہ ہوتا ہے ۔
دوم مقدار خانی - برین کی بنسبت منج کار - پیکل کے زیادہ ہوتی ہے اور سیرم
کم ہو جاتا ہے ۔ سوم منج کار - پیکل کی تعداد گھٹ جاتی ہے اور اُن کے آپس میں جڑ جاکے
کی استعداد زیادہ ہو جاتی ہے ۔ چہارم سفید کار - پیکل کی تعداد اکثر زیادہ ہو جاتا
ہے خلاصہ خاص انفلامیشن کا یہ ہے کہ خون حالت اصلی سے بہت بدل جاتا ہے اور
بعض دورہ کرنے کے ہٹیر جاتا ہے ۔ عروق شعیریہ خون سے اس قدر بھر ہو جاتی ہیں
کہ انکی طاقت انقباض اور انبساط کی جاتی رہتی ہے اور انکا پردہ ملائم ہو کر گلنے
لگتا ہے ۔ مقام مرض کے قرب کا دوران خون تیز ہو جاتا ہے ۔ لائیکوار - گلوکوز
زین کثرت سے خارج ہوتا ہے ۔ بسبب پھٹ جانے عروق شعیریہ کے بیماری کے
مقام مین خون بہ جاتا ہے ۔ اُس مقام کی قوت جاذبہ جاتی رہتی ہے اور اُس
کی پرورش اور فعل مین مستور پڑ جاتا ہے ۔ پیپ پیدا ہو جاتی ہے اور مقام مرض
کی ساخت گلنے لگتی ہے ۔

علامات خاصہ انفلامیشن کی - واضح ہو کہ چار علامتوں سے انفلامیشن
بچا جاتا ہے اولی رڈ - فیش لینے سرخی ۔ دوم سوے - لینگ لینے دم ۔ سوم
ہیٹ لینے حرارت ۔ چہارم پین لینے درد ۔ لیکن ایسا نہ سمجھنا چاہیے کہ جب
کسی مقام مین انفلامیشن ہوتا ہے تو صرف اسی مقام پر اس مرض کا اثر محدود رہتا ہے
بلکہ بقول سعدی رحمۃ اللہ بیت

چو عضوے بدرد آورد در کار / در عضو کار انما نہ تراہ

اثر اس مرض کا سارے جسم پر نمایان ہوتا ہے چنانچہ سیواسطے انفلامیشن کی بیماری تیز
علامہ اُن چار علامتوں کے جو خاص مقام مرض پر پیدا ہوتی ہیں بیمار کو بچا رہی
ہو جاتا ہے جسکو اصطلاح مین انفلامٹری تیسور کہتے ہیں ۔

علامات عامہ - علامات اس بخار کی بعینہ مثل اور بخاروں کے ہوتی ہیں لیکن شدت کا زیادہ یا کم ہونا اس نافت پر منحصر ہے جو انفلمیشن میں مبتلا ہو۔ انفلمیشن میں جب پیپ ٹرینولی ہوتی ہے تب بیمار کو لرزہ ہوتا ہے + اب ہم اُن چاروں علامتوں کا بیان الگ الگ کرتے ہیں جو انفلمیشن کے خاص مقام پر ہوتی ہیں

اول - رڈ - نش لینے سرخی - جب ہم انفلمیشن کی ماہیت کو دیکھتے ہیں تو سبب اس سرخی کا ہم کو صاف معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہم نے دیکھا کہ جس مقام میں انفلمیشن ہوتا ہے وہاں پر خون زیادہ آتا ہے اور یہ کہ سبب نکل جانے اسکی نائیت کے خون کا ڈٹا بھی ہو جاتا ہے پس سراسر وہ مقام سرخ نظر آتا ہے + مگر انفلمیشن کی سرخی میں ایک بات زلزلی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ سرخی تودقتہ رفع ہو جاتی ہے اور نہ بڑھ جاتی ہے بلکہ جب تک مرض رفع نہیں ہوتا تب تک ایسا قائم رہتی ہے لیکن تادقتیکہ اورتینوع سلامتین نہ پائی جاوین صرف اس سرخی کے ہونے سے کسی مقام پر انفلمیشن کا ہونا ثابت نہیں ہوتا +

دوم سوے - رنگ لینے درم - انفلمیشن کا مقام سوچ جاتا ہے + یہ بھی سبب عیان ہے کیونکہ مقام انفلمیشن میں خون کا زیادہ ہونا ہی کافی سبب درم کا ہے لیکن قطع نظر اس کے مقام مذکور کی ساخت میں درجہ اول کے اندر سرم ہی تو تراوش پاتا ہے اور درجہ دوم میں فائی - برین جو ایک نہایت گاڑا جزو خون کا ہے اور درجہ سوم میں علامہ فائی - برین کے خون اور پیپ پیدا ہو جاتی ہے + یاد رہے کہ خاص مقام انفلمیشن کا درم دبانے سے ملائم محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر خون اور پیپ ہوتی ہے مگر اسکے گرد کا درم سخت اور دبانے سے رفع نہیں ہوتا اور بہ نسبت اگلے درم کے زیادہ پھیلا ہوا اور اکثر کمتر اونچا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر خون سے فائی - برین نکل کر جمع ہو جاتا ہے لیکن ان دونو مقاموں کے گرد جو درم ہوتا ہے وہ ملائم اور اسکے دبانے

سے دماغ پڑ جائے مین اور یہ ورم بنسبت اگلے دو نو مقاموں کے زیادہ تر
پھیلا ہوا ہی ہوتا ہے کیونکہ دماغ پر خون کا سیسہ ہوتا ہے + لیکن صرف ورم کے ہونے سے
انفلامیشن ثابت نہیں ہوتا اور کلا متون کا ہونا بھی ضروریات سے ہے کیونکہ صرف تھج
(ا۔ ٹی۔ ما) کے ہونے سے بھی ورم ہو جاتا ہے لیکن دماغ پر انفلامیشن نہیں ہوتا +
ایک اندبات اس ورم کی نسبت ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ انفلامیشن کا ورم رفتہ
رفتہ پیدا ہوتا ہے اور تھوٹے عرصہ کا ہوتا ہے نہ کہ دفعتہ سے ورم قیق (یعنی ہر نیا)
یا کسی جڑ کے اکٹڑ جانے سے وہ مقام جوڑ کا پھول جاتا ہے +

سوم ہیٹ لینے حرارت - انفلامیشن کا مقام بنسبت معجم مقامات
کے حقیقت میں زیادہ تر گرم ہوتا ہے کیونکہ حالت صحت میں سینہ اور قلب پر ۹۸
سے ۱۰۰ درجہ تک کی حرارت غریزی ہوتی ہے اور اطراف میں کچھ کم لیکن انفلامیشن کے
مقام پر ایسا تجربہ کیا گیا ہے کہ حرارت غریزی ۱۰۱ یا ۱۰۴ یا ۱۰۵ یا ۱۰۷ درجہ تک
کی بڑھ جاتی ہے + سبب اس بات کا عیان ہے کیونکہ حالت صحت میں جو حرارت
پاشی جاتی ہے وہ عروق شعیریہ کے اند خون کے متغیر ہونے سے پیدا ہوتی ہے - پس
انفلامیشن کے مقام کی عروق شعیریہ میں چونکہ خون کی کثافت (یعنی کاربن) اور
اک - سے جن میں تبادلہ نہایت جلد جلد اور تیزی سے ہوتا رہتا ہے اس واسطے چہونے
سے وہ مقام بنسبت معجم جسم کے زیادہ تر گرم معلوم ہوتا ہے + مزید برین مقام مآذف
کے بعض محسوس بھی چونکہ مرض میں شامل ہوتے ہیں تو انکے بھی افعال کو تحریک ہوتی ہے اس واسطے
مرض کو زیادہ گرم معلوم ہوتی ہے - پس یاد رہے کہ انفلامیشن کی حرارت کی مقدار تو معلوم ہوتی
ہے کہ چہونے یا بذریعہ آئینہ - مٹکے محسوس ہوتی ہے اور کی مقدار عصاب کے فعل کے
بگڑ جانے سے پیدا ہوتی ہے کہ جسکو صرف بیمار ہی معلوم کر سکتا ہے + لیکن ثبوت انفلامیشن
کی واسطے علامہ اس سلامت کے اور بھی مسلمانوں کا ہونا ضرور ہے انفلامیشن

کی گرمی جرم کثافت اور قسم کی حرارت کے اکثر قائم رہتی ہے +

چھام پین لینے درد۔ انفلامیشن کے مقام پر درد بھی ہوتا ہے وہ اسکی یہ ہے کہ خون کے زیادہ آنے اور اسی مقام میں لمفاور سیرم کی ترشح پانے سے وہاں کے اعصاب بجاتے ہیں اسوسلے وہ درد کرنے لگتے ہیں سلاوہ اسکے چونکہ مقام مرض کی جگہ میں خون زیادہ آتا ہے اسلئے دل کی ہر حرکت میں بڑھتی رہتی ہے جو جاتی رہتی ہے یہی سبب اسکا یہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار ایک اعصاب کی شاخیں جو واسطے حس و حرکت کے اُن رنگوں کے پر و پیر پہلے ہیں (وا۔ سا۔ وی۔ سوئم) رگہائے مذکورہ کے پہلنے اور پڑ جانے سے وہ بھی سہتارتن جاتی ہیں اور درد کرنے لگتی ہیں + لیکن ماسوائے انفلامیشن کے درد اور سبب بھی پیدا ہو سکتا ہے مثلاً صرف تشنج اور خوش سے بھی درد ہو جاتا ہے لیکن تشنجی درد عین تبدیلی سے تیز ہوتا ہے اور اگرچہ مدت مرض میں تھوڑا بہت کم بھی ہو جاتا ہے پر شدت اسکی جتنی تبدیلیں ہوتی ہے اُس سے زیادہ نہیں بڑھتی برعکس اسکے انفلامیشن کے سبب سے جو درد پیدا ہوتا ہے وہ پہلے تو کم مگر تدریج بڑھتا جاتا ہے تا وقتیکہ یا تو بیماری رنج مقام مؤف مردار پڑ جاوے علاوہ اذین تشنجی درد کو دبانے سے اکثر آرام آجاتا ہے لیکن انفلامیشن کے درد کو دبانے کی برداشت بالکل نہیں ہوتی مثلاً قولنج میں شکم کو جتنا دبائے آسان ہی آرام آجاتا ہے لیکن مرض پے۔ ری۔ ٹو۔ نامی۔ ٹین میں آسان چونا بھی قیامت دکھلا دیتا ہے اور عصبی دردوں کا حال یہ ہے کہ مثل تشنجی درد کے ابتدائیں یہ بھی شدید ہوتی ہیں لیکن پھر کم ہو جاتے ہیں اور اکثر نوبت بنوبت ظاہر ہوتے ہیں لیکن انفلامیشن کا درد شاید کیسوقت ڈرام کم ہو جاوے پر نوبت نہیں ہوتا۔ اور جب یہ درد وقفہ غائب ہو جاتا ہے تو پھر نہیں لوٹتا کیونکہ مقام مؤف مردار پڑ جاتا ہے + پس یاد رہے کہ انفلامیشن کا درد پہلے خفیف اور بعد ازاں بڑھتا جاتا ہے اور جب تک یا تو بیماری رنج نہ ہو یا عضو تقسیم مردار نہ پڑ جائے

یکسان رہتا ہے *

اسباب - سبب انفلا میشن کے دو خصوصیتیں منقسم ہیں ایک پری-ڈسپوزیشن اور دوسرا اکسائی-ٹنگ کا زہ *

اول - پری-ڈسپوزیشن - زنگ کا زہ کل مایوسی خاصیت جسم میں زیادہ خون کا ہونا - کل مایوسی خاصیت جسم کا کمزور ہو جانا *

دوم اکسائی-ٹنگ کا زہ - تیز حیرت انگیز اور ضربہ وزخم گرمی اور سردی اور دباؤ - زیادہ مشقت کسی ہر جسم کے اندر سرایت کر جانا *

نتیجہ انفلا میشن کے - اول - زہ ہو جانا انفلا میشن کا جسکو اصطلاح میں تی زہ کہتے ہیں جب انفلا میشن اول اور دوم درجہ میں ہوتا ہے تب علاج سے یہ نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے لیکن تیسرے درجہ میں یہ ممکن نہیں کہ ری - زہ - لیوشن ہوا اور عضو ماؤف کی خست یا فصل میں کئی طرح کا نقص نہ ہو جاوے *

دوم - مقام مرض میں یا تو سیرم یا فائی - برین یا دونوں باہم پیدا ہو سکتے ہیں *

سوم - پیپ کا پیدا ہونا - جب کئی عضو اندرونی میں انفلا میشن ہوتا ہے اور اُس میں پیپ پڑنیوالی ہوتی ہے اسوقت یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ سارے جسم میں لرزہ ہوتا ہے اور کثرت سے ٹھنڈ پڑتا ہے - نبض سیرج اور سخت ہو جاتی ہے - زبان کانپتی ہے اور اسپر ایک بدبودار اور بد رنگ فرجھ جاتی ہے اور وہ سخت اور خشک ہو جاتی ہے - پیشاب کم اور سرخ رنگ کا اور بدبودار آتا ہے - بعض دفعہ دست آنے لگتے ہیں یا قبض ہو جاتا ہے - بیمار بے چین اور چہرہ اسکا کرمند ہو جاتا ہے اور نفس جلد جلد لبتا ہے - سسہ پر بوجہ معلوم ہوتا ہے اور بعض دفعہ ہڈیاں بھی ہو جاتا ہوتا ہے *

چہارم - چوتھا نتیجہ انفلا میشن کا یہ ہوتا ہے کہ مقام ماؤف میں زخم پڑ جاتا ہے *

پنجم - بافتوں کا ملامت ہو جانا یعنی صافی ننگ *

ششم - وہ مرد ابھی پڑ جاتا ہے *

اقسام انفلامیشن کے - انفلامیشن میں قسم کا ہوتا ہے ایک اکیوٹ یعنی حاد -

دوسرا سب اکیوٹ یعنی کچھ کم تیز اور تیسرا کرائیک یعنی مزمن قسم حاد کی بیماری شدید ہوتی ہے اور اسکی علامات خاصہ اور عامہ نہایت تیزی سے اور جلد ظاہر ہو کر نتیجہ نیک یا بد جب پیدا کر دیتی ہیں - لیکن قسم مزمن کی علامتیں ابتدا ہی سے خفیف اور عرصہ تک انکا نتیجہ نہیں پیدا ہوتا - اور اس قسم کے مرض میں بہت کم پیپ ٹرٹی ہے اور یہ تمام مرض شاذ و نادر مردار پڑ جاتا ہے *

بیان ان اختلافات کا جوہم کی مختلف بافت کے انفلامیشن میں پائے جاتے

میں جسم کی ہر ایک ساخت کا انفلامیشن ایک ہی طور کا نہیں ہوتا ان میں کچھ نہ کچھ اختلاف غور پایا جاتا ہے چنانچہ اری - اور لڑے - شیو میں جب انفلامیشن ہوتا ہے تب اکثر محدود و نسل پیدا ہوتے ہیں اور اس ساخت میں سبب کچھ ٹ کے درد زیادہ ہوتا ہے مگر بعض دفعہ محدود و نسلوں کے عوض اس ساخت کا انفلامیشن پسلیا جاتا ہے جیسے

اری - سے - پے - کس میں ہوا کرتا ہے *

جسم کے بڑے بڑے غدود اور ٹھوس اعضائے کا انفلامیشن اری - اور لڑے شیو

کے ہوتا ہے یعنی اگر اری - زو - لیویشن ہو تو پیپ ٹر کر و نسل پیدا ہو جاتا ہے جیسے جگر اور دماغ کے انفلامیشن میں ہوا کرتا ہے مگر شش میں و نسل بہت ہی کم پیدا ہوتا ہے *

اور پھر پے کی ساخت مردار ہی بہت کم پڑتی ہے اور جب کہ مردار پڑتا ہی نہیں اور گردن میں بھی بہت ہی کم گنگ - رین ہوتا ہے *

کرائیک انفلامیشن کے باعث اری - اور لڑے شیو مٹا ہو کر سخت ہو جاسکتا ہے

اور یہی حال اندرونی اعضائے کا بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ جلد کے نیچے یا سر میں میو کس بمیز کے نیچے واقع ہوتے ہیں *

سی۔ رس۔ ممبرین مین جب انفلامیشن ہوتا ہے تب نہایت شدت کا تیز درد ہوتا ہے۔ نبض سخت چلتی ہے۔ خون کے سُرخ کیسے آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ یہ انفلامیشن پہلے کی طرف مایل رہتا ہے اور اس میں خون کا سیرم اور لف اخراج پاتا ہے * بعض دفعہ جب انفلامیشن نہایت شدید ہوتا ہے یا مرض کے مقام میں ہوا کا گڑ ہوتا ہے تب پیپ بھی پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ بات اکثر نہیں ہوتی بلکہ اس پردہ کے انفلامیشن میں لف اور سیرم ہی اکثر پیدا ہوتا ہے * اس انفلامیشن میں لف کے کاؤب پردے بھی بن جاتے ہیں اور مقابله کی سطحوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پردہ کی شکل نہ بن کر لف کے چوٹے چوٹے دانے بن جاتے ہیں *۔

ساجی - نو - وی - ال - ممبرین - یہ پردہ بہ نسبت سی۔ رس۔ ممبرین کے انفلامیشن کی بیماری میں کمتر مبتلا ہوتا ہے اور اس کے انفلامیشن میں لف شاید دونا در پیدا ہوتا ہے اس واسطے اسکے دونوں مقابله کی سطح آپس میں بہت کم جڑ جاتی ہیں۔ چنانچہ اسی واسطے جب جوڑوں میں انفلامیشن ہوتا ہے تو سائے - نو - وی - ال - ممبرین کے آپس میں جڑ جانے سے وہ جوڑ نہیں جڑ جاتے بلکہ جب اس سائے - نو - وی - ال - ممبرین کی سطحوں پر زخم ٹر کر انگوڑ پیدا ہوتے ہیں تب البتہ وہ جوڑ جڑ جاتا ہے * سائے - نو - وی - ال - ممبرین کی تیلی میں پیپ شاید دونا در پیدا ہوتی ہے اگر اسباب ضرب یا زخم کے جب جوڑ کے اندر ہوا داخل ہو جاتی ہے اس پردہ کے انفلامیشن میں سیرم بہت جلد پیدا ہو جاتا ہے *۔

جلد پر جب انفلامیشن ہوتا ہے تب طرح طرح کے نتائج پیدا ہوتے ہیں چنانچہ کبھی جلد میں سوجھ بوجھ ہوتی ہے جیسے مرض ای۔ تی۔ مین ہوا کرتا ہے اور کبھی اس کی بیرونی فرد کے

بچے صرف سیرم ہی پیدا ہوتا ہے اور کبھی پیپ پڑ جاتی ہے وغیرہ *

میو۔ کس ممبرین۔ اس پردہ میں اڑ ہے سیو (جڑنیوالا) انفلامیشن نہیں ہوتا جیسے سیرس پردوں میں ہوا کرتا ہے اس میں کیم مطلق کی کاریگری یہ ہے کہ سیرس ممبرین کے طور پر اگر میو۔ کس ممبرین کے انفلامیشن میں بھی لف پیدا ہوتا تو اس کی دونوں سطحیں آپس میں جڑ جاتیں تب مریض کا بچنا محال ہو جاتا کیونکہ ہوا کی نالیان بند ہو جاتیں۔ مائیزہ مسدود ہو جاتا اور رودوں کی نالیان جڑ جاتیں کو سٹے کہ جسم کے ہی تینوں مقام میں جنکا تعلق باہر کی ہوا سے ہے اور چنبر میو۔ کس پردہ چسپا ہے * بلکہ میو۔ کس پردہ کے انفلامیشن میں یا تو سیرم پیدا ہوتا ہے یا لیسڈار میو۔ کس (ملغم) یا پیپ یا خون بہ جاتا ہے مگر ان بعض دفعہ انفلامیشن کے سببے ایک شے نہایت مشابہ لف کے پیدا ہو بھی جاتی ہے جیسے کروپا درڈف۔ تھے۔ ریا کی بیاری میں ٹرسے۔ کیا اور بران۔ کیا کے اندر اور ایسا۔ فی۔ گس (مری) اور رودہ اور مائیزہ میں مگر اس لف میں اور اسپین کسی باتوں کا فرق ہے جو سیرس ممبرین کے انفلامیشن میں پیدا ہوتا ہے چنانچہ یہ ملائم ہوتا ہے۔ پردہ کی سطحوں کو عرصہ تک مضبوطی سے جوڑ نہیں دیتا بلکہ سیرم یا پیپ کے ذریعہ پردے کی سطحوں سے کیتھرائٹ ہوتا ہے اور اس لف میں نشوونما کی بھی طاقت نہیں پیدا ہوتی ہے جیسے سیرس ممبرین کا لف ہوا کرتا ہے * غرض تا وقتیکہ انجین خرم نہ پڑ جائیں میو۔ کس ممبرین کے مقامات آپس میں جڑ نہیں جاتے * میو۔ کس اور سیرس پردوں کے انفلامیشن کے درمیان بھی فرق ہے چنانچہ میو۔ کس پردہ کے انفلامیشن میں درد اکثر دہیا ہوتا ہے بھڑان تینوں مقامات کے مخرجوں میں جہاں یہ پردہ جلد کے ساتھ مل جاتا ہے مثلاً وہن اور گلو اور نے۔ زنگس اور ریکٹم اور مائیزہ اور عورت کی شرمگاہ * اور جیسے میو۔ کس پردہ کے انفلامیشن میں درد کم ہوتا ہے ایسے ہی نسبت سیرس پردہ کے اسپین بخار بھی کم ہوتا ہے *

مس-کیو- لہٹے۔ شیو (عضلاتی ریشہ) اس ریشہ میں انفلامیشن بہت کم ہوتا ہے اور اسکی رگون سے سیرم اور لف بہت کم تراوش پاتا ہو مگر سل پر انفلامیشن کا اثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکے اینٹیٹن کی طاقت جاتی رہتی ہے ۔

آر-ٹیرٹر (شرائین) شرائین میں جب انفلامیشن ہوتا ہے تب لف بھی پیدا ہوتا ہے اور انکے اندر کا خون جم جاتا ہے مگر سپ اکثر نہیں پڑتی ۔ اور شرائین میں انفلامیشن بھی آسانی سے نہیں ہوتا آٹا ضرب و زخم کے باعث ۔ اور شرائین مردہ بھی شاف و نادر پڑتی ہیں ۔

علاج۔ ناظرین جو وقت انفلامیشن کی ماہیت کو پڑھیں گے تو اسکے علاج کا یہی اصول نکالیں گے کہ اس بیماری میں مقام مازف میں چونکہ حد سے زیادہ خون آتا ہے اور سارے جسم کا دوران خون تیز ہو جاتا ہے اور بخار بھی ہوتا ہے تو ایسی تدبیر کرنی چاہئے جس سے وہ خون ہٹ جاوے اور دورہ اسکا کمزور ہو جاوے اگرچہ یہ اصول از روے قیاس کے درست ہے تاہم تجربہ کی شہادت اسکے مخالف ہے کیونکہ اطباء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب انفلامیشن کا علاج مضعف دوا یا مضعف ترکیبوں سے کیا جاتا ہے تب اس سے نقصان ہوتا ہے ۔ اور یہ بات ہم روزمرہ اپنے تجربہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب نیور مو۔ نیا یا پلو۔ رمی۔ سی کی بیماری کا علاج مضد اور ٹار۔ ٹار۔ اے۔ ٹیکٹ یا کیا۔ لو۔ مل سے کیا جاتا ہے تب بعض رفق ہونے کے بیماری بڑھتی جاتی ہے ۔ اور مرض کمزور ہوتا جاتا ہے اور جب ان بیماریوں کا علاج مقویات سے کرتے ہیں تب مرض کو شفا ہو جاتی ہے ۔ یہ باتیں دو طور سے حاصل ہو سکتی ہیں ایک تو پرہیز اور دوسرے دوا سے چنانچہ انفلامیشن کے علاج میں ان باتوں کا پرہیز چاہئے کہ اول غذا ایسی ہونی چاہئے جس سے خون پیدا ہونے پاوے اور پانا ایسی خیرین کا جو سرد ہوں ۔ انکو تھوڑی تھوڑی مقدار میں اور بار بار دینا چاہئے ۔ دوم آرام و چین

روحانی اور جسمانی ہر قسم کا ایسا مکان میں کہ جسمیں ہو اکی آمدر وقت اچھی اور
جوشب و روز کیسان درجہ پر گرم ہو ہر دوامدوا مثلاً خون نکالنا جلاب دینا اور مرکبات
انٹے۔ مو۔ فی اور سیما اور سیون اور ادویات کہا ریا نیکین کا استعمال کرنا ہر دونوں
قسمین علاج کی علاج عام میں داخل ہیں علاج خاصہ کا ذکر نیچے ہو گا اگرچہ یہ اصول
علاج کا جو ناظرین نے نکالا ہے درست ہے لیکن اسکو کام میں لانے کے لئے
کئی باتوں کا لحاظ رکھنا چاہئے جنکا ذکر ہر ایک کی نسبت الگ الگ کیا جا دیگا ۔

اول خون نکالنا ۔ یہ بات دو طور سے حاصل ہو سکتی ہے ایک تو فصد اور
دوسرے حجامت (کپنگ) یا جو کون کے نکانے سے ۔ اول بیان فصد کا جب کسی
رگ میں شگاف دیکر خون لیتے ہیں تب اس عمل کو فصد کہتے ہیں ہر فصد کے لینے سے
کل جسم کا دوران خون سست ہو جاتا ہے اور مریض کمزور ۔ پس اس سے صاف ظاہر ہے
کہ اس عمل سے کمال درجہ کا ضعف پیدا ہوتا ہے ۔ اب ہم کو دیکھنا چاہئے کہ فی زمانہ
ہم اس عمل کو جو اشد درجہ کا مضعف ہے انفلامیشن کے علاج میں کام میں لے سکتے
ہیں یا نہیں اور جو لا سکتے ہیں تو کین کن حالتوں میں اور کس وقت ۔ یہ بات ہمارے
دیکھنے کی ہے اور اسکو عرصہ ہی کل ۔ ہم بریکہ گزرا ہو گا کہ اطباء کے اہل فرنگ تھوڑی
سی بات کیواسطے فصد کیا کرتے تھے اور کسی مرض شدید کے علاج میں تو ناہل ہی نہیں
کرتے تھے پہر ایک زمانہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جرجا اس عمل کا اس قدر کم ہو گیا کہ غلطوں
زمان اس بندہ کے اشتہاد جناب استطاب ایڈیٹور ڈوگلو ویو صاحب مرحوم
و مضعف ہم کو مطب کی وقت یہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے تمہارے اسلام میں بعض شعیاء
حرام ہیں اور انکا کہنا نا منع لکھا ہے الا اشد ضرورت کیوقت کیطور پر ہم فصد کو بھی
سمجھ لیتے ہیں ہرگز فصد لینا تا وقتیکہ اسکی نہایت ضرورت نہ ہو ۔ ایام طالب علمی میں
ہم نے کل عمل جرجا کے اپنے ہاتھ سے کئے ۔ ماناگ بھی کاٹی امداد تہہ ہی کاٹا

پتھری بھی لگنا لی لیکن کیسی کبھی فصد نہیں لی + جب فارغ تحصیل ہو کر در سہ سہ قلعے
اور مرلیضیوں کا علاج و معالجہ بطور خود کرنے لگے اور جون جون تجربہ حاصل ہوا گیا تصدیق
اپنے استاد جیسا کہ قول کی ہوتی گئی حقیقت میں فصد مجری چیز ہے اور ہم ہندوستانیوں
کو یہ نہایت نا موافق پڑتی ہے بفضل خدا ہم کو نہایت وسیع میدان تجربہ کا ملتا ہوا ہے
کہ جس سے ہر روز یہ بات حاصل کرتے ہیں کہ جن انفلامیشن کی بیماریوں کی نسبت کتابوں
میں فصد کے لئے تاکید بھی ہے انکو ہم ایسے علاج سے رفع ہوتے دیکھتے ہیں جس
سے خون پیدا ہوتا ہے مثلاً ذات الحذب (یعنی مرض پلو - رہی - سی) اور ذات الریہ
(مرض نیو - مونیہ) کے ابتدا ورجون میں اگلی کتابوں کے اندر فصد کی نہایت تاکید
کی ہے اور اطباء روایتی تو اب بھی دینی سی بات کے لئے لہو کی تمسین و کیرکریوگوں کی
فصدین کہلاتے ہیں مگر اپنا تجربہ ان ساروں کے خلاف ہے - ہم نے اب تک کسی بیمار
کی کبھی فصد نہیں لی بلکہ برعکس اسکے امراض مذکورہ بالا کا علاج شروع سے لے کر
انتہا تک مقویات سے کرتے ہیں اور بفضل خدا انکو شفا ہو جاتی ہے + حقیقت تو یہ
ہے کہ آج کل فصد مضر پڑتی ہے جس کیسیکی فصد لی جاتی ہے اسکو ہم نے کبھی نہیں
نہیں دیکھا ساری عمر کیواسطے وہ شخص ائم المریض ہو جاتا ہے + اگرچہ بہاری اے
فصد لینے کے بالکل جہتلاف ہے لیکن صرف بخمال اسکے کہ شاید انفلامیشن کے
علاج میں کیوقت فصد کی نہایت ضرورت ہو اسواسطے اس عمل کے باب میں چند
احتیاطین بتاتے ہیں +

اول فصد لینے کیوقت مرض کی شدت اور قسم اور مریض جس ملک اور موقع پر ہوا اسکا
محاطہ کہہ کر فصد لینا چاہئے +

دوم جب انفلامیشن کی ہیبیائی جسم میں کسی زہر کے سرت کر جانے سے پیدا ہوا اس
وقت فصد لینا لیکن لین یا صرف تھوڑا ہی خون نکالنے پر اکتفا کریں کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ

جسم کے اندر جب کوئی زہر سما جاتا ہے تو چاہے کچھ ہی کیجئے اپنا اثر وہ ضرور پیدا کرے گا۔
پھر فصد لینے سے کیا حاصل ؟

سوم۔ انفلامیشن کی علامات خاصہ در عامہ کی شدت اور دور کو بغور ملاحظہ کریں اور
تب اگر مناسب سمجھیں تو فصد لین۔

چہارم۔ انفلامیشن کے عین ابتدائین کہ جب عضومادف کی ساخت میں فامی۔ یرین
تراوش نہ باقی ہو فصد کے لینے سے فائدہ متصور ہے۔

پنجم۔ جب علامات انفلا۔ مٹری فیور کی نہایت شدید ہوں اور مرض ایسے آدمی کو
ہو جائے جسکی صحت میں پہلو کی طرح خرابی نہ آئی ہو تب فصد لے سکتے ہیں۔

ششم۔ لیکن ابتدا مرض میں اگر انفلا۔ مٹری فیور کے آثار خفیف ہوں کہ جس سے بیماری
پہلے درجہ سے بغیر اطلاعیابی حکیم کے بڑھ گئی ہو یا جب یہ مرض کسی کمزور آدمی کو ہو جاوے
یا جب ساتھ اس بیماری کے کوئی عضو اندونی بھی مشرک ہو گیا ہو یا جب بخار مذکور
کی علامتیں کمزوری کی یا ردی ہوں تو ان حالات میں ہرگز فصد نہ لین۔

ہفتم۔ اگر بخار شدت کا ہو اگر تخفیف تھا رہی سببات پر درست ہو کہ عضومادف میں
خون کا نہایت غلبہ ہو اور خون اسکی ساخت میں ٹھہر گیا ہے اور اسکی ریگن خون سے
اسقدر پرہیز کہ پیٹنے والی ہین یا پٹ گئی ہین اور ان سے خون نکل کر عضومادف کو رکی
ساخت میں نہ گیا ہے اور اس خون میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے مگر هنوز درجہ
خفایت کو نہیں پہنچا اور اگر بیمار کو فصد کی برداشت ہی ہے تو فصد لینا مضائقہ نہیں
ہشتم۔ ہر عضو کے یا پردوں کے انفلامیشن میں فصد مفید نہیں پڑتی مثلاً جب سیرس
پر وہ اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تب بیمار کو فصد کی اچھی برداشت ہوتی ہے اور اس
سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور در باب اعضائے اندرونی کے یہ بات ثابت ہے کہ دماغ کو
بہ نسبت جگر کے فصد سے کم فائدہ ہوتا ہے اور جگر کو بہ نسبت بہتر ہی کے ۔

دوسری ترکیب خون لینے کی بذریعہ جو کون یا کیننگ گلاس کے ہے۔ جو کون سے
 اس وقت خون لیتے ہیں کہ جب کیننگ گلاس کے لگانے کا موقع نہیں ہو تا جس مقام
 پر جو کین لگانی منظور ہو اُس کو اچھے طور پر دھو کر خشک کر ڈالیں تاکہ اگر اسپر کوئی بدلہ دار
 یا تیز خمدیا روغن لگا ہو وہ صاف ہو جاوے ورنہ جو کین نہیں لگنیگی۔ جو کون میں شہتا
 پیدا کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ لگانے سے پیشتر تھوڑے عرصہ تک اُن کو پانی سے نکال کر
 باہر رکھیں اور لگاتے وقت برابر ایک کپڑے سے اچھے طور پر مکر آہستگی سے پونچھ کر خشک
 کر ڈالیں تب سیر بھی نہ لگیں تو اُس مقام پر روغن یا تازہ خون مدین اور جب پُر ہو کر گر ٹرین تو
 اُس مقام کو اچھے طور پر آب گرم سے سینک ڈالیں تاکہ زخون سے اوپر ہی خون بہ جائے
 بعض دفعہ زخون سے اسطور پر خون رستا رہتا ہے کہ مشکل بند ہوتا ہے اس صورت میں
 اُس زخم کو دبا رکھیں یا اسپر مار۔ ٹیکو کی پتے لگا کر دبا دیں۔ اگر اس سے ہی خون بند نہ ہو تو
 ٹائپرٹ اف سکور کی قسم کو چھری سے چھیکر اُسکی ہار ایک نوک بنا دیں اور اُس نوک
 کو جس زخم سے خون آتا ہو اُسکے اندر چند لمحو تک دبا رکھیں اور تب لگا کر خشک لٹک کی
 گدی سے اُس زخم کو دبا کر باندھ دیں اکثر تو یہ ترکیب خون کے بند کرنے کے لئے کافی
 ہوتی ہے لیکن فرض کیجئے اس سے ہی خون بند نہ ہو تو زخم پر مضبوط ٹانگا لگا دیں۔
 بچوں کی نسبت یہ بات یاد رہے کہ انہر چند جو کون کے لگانے سے اثر فصد کا ہو جاتا ہے
 اور یہ کہ ایک سال کے بچہ کی واسطے تین جو کون کا خون برابر ایک بوجے فصد کے خون
 کے ہوتا ہے ادا اگر پانچ سال کی عمر تک ہر سال کے لئے ایک ایک جوک بڑھاتے جا دیں
 تو اُن عمر کو کیواسطے اتنی ہی جو کین برابر فصد کے ہوتی ہیں اور بعد پانچ سال کے اگر
 اشد ضرورت ہو اور مرض بھی شدید قسم کا انفلا میشن ہو تو جو کون کے بدلے فصدینی
 بہتر ہے۔ عملادہ اُن کے جنکا ذکر اوپر کیا گیا ہے ان احتیاطوں کو بھی مد نظر رکھنا
 چاہئے چنانچہ

اول۔ جو کین ایسی جگہ پر نہ لگا دیں جسکے ہمیشہ حرکت رہتی ہے مثلاً گھوا اور سپلیون پر
ورنہ خون کے بند کرنے میں وقت پڑیگی ۔

دوم۔ جو کون کو خاص کر عورتوں کی ایسی جگہ پر نہ لگانا چاہئے جو ہمیشہ برہنہ رہتی ہیں مثلاً گلو
اور چہرہ ورنہ اُنکے داغون سے حُسن پر بڑے لگ جائیگا ۔

سوم۔ بچوں کی بڑی وریہ وں پر خاص کر گلو کی وریہ وں پر جو کین نہ لگادیں ۔

چہارم۔ ایسے مقاموں پر جو کین نہ لگادیں جہاں کی ساخت ڈھیلی اور ملائم ہو مثلاً آنکھوں کے
پہلوں پر ورنہ وہاں پر خون جم جائیگا اور وہ مقام سوج جائیگا ۔

پنجم۔ جس مقام کی جلد کے نیچے ہی بہت سی شاخیں پھولن کی ہوں وہاں پر بھی جو کین
نہ لگانا چاہئے ورنہ نہایت درد اور اسی۔ سپلس کی بیماری کا اندیشہ ہے مثلاً جب بازو
پر جو کین لگانا ہو تو بہ نسبت اندر کی طرف کے بازو کی پشت پر لگانا بہتر ہے ۔

ششم۔ جو کون کو عین مقام انفلمیشن پر نہ لگانا چاہئے کیونکہ اگر کثیر تعداد نہ ہوگی
تو بوجہ فائدہ کے ضرر متصور ہے اور بعوض روکنے کے جو کون کے زخم سے اس مرض کو
اوتربہنی یا دتی ہوگی ۔

ہفتم۔ جو کون کو کسی ایسے زخم کے قریب نہ لگانا چاہئے جو نہایت شدید ہو اور کسی
خاص قسم کے زہر کے سبب پیدا ہو مثلاً زہر آتشک وغیرہ ورنہ اُنکے زخموں میں وہ زہر ملاو
سرایت کر جائیگا۔ اور زہر دم بڑھنے لگنے کے جس سے انفلمیشن بعوض رفع ہونے کے
بڑھ جائیگا ۔

حجامت یعنی کیننگ گلاس۔ ترکیب انکے لگانے کی اگرچہ آسان ہے تاہم
جس شخص نے اپنے ہاتھ سے گلاس نہیں لگایا ہے وہ کتابوں کے پڑھنے سے ہرگز نہیں
لگا سکتا۔ اس ترکیب کو اپنے ہاتھ سے کئی مرتبہ کرنا چاہئے ۔

دوم سہمات۔ انفلمیشن کی بیماری میں سباب بھی تھے میں جن سے اٹھا

تثقیق ہو جاتا ہے اور رستیق پانی کے طور پر دستوں کے آنے سے قلب کی تیزی کم ہوتی ہے اور دوران خون کا زور گھٹ جاتا ہے جس سے مقام انفلامیشن میں خون کم ہو چکا ہے اور وہ مرض رفع ہو جاتا ہے ۔ وہ دماغ اور جگر کے انفلامیشن میں جیلاب سے نہایت فائدہ ہوتا ہے مگر شش کے انفلامیشن میں کم اور وون کے انفلامیشن میں مضر لیکن جب شدت مرض کی کم ہو جاوے اسوقت مضائقہ نہیں کسی ہلکے مہلک استعمال کریں تاکہ امعاء سے سبک خارج ہو جاوے ۔

سوم سیلاب ۔ جب اس کی چند غورائیں کہائی جاتی ہیں تو ان سے مہترہ آجاتا ہے خون پتلا پڑ جاتا ہے اور مریض لاغر ۔ پس سکے استعمال میں نہایت احتیاط چاہئے مثلاً پارہ کو صرف ایسی حالت میں دینا چاہئے کہ جب مریض طاقتور ہو اور مرض شدید لیکن بیمار اگر کمزور اور مزاج اسکا اسکر۔ فیو۔ لس اور اگر بیماری درجہ دومی کو پہنچ گئی ہو تو اسکے استعمال سے ضرور نقصان ہوگا ۔ جب پارہ کا استعمال کریں تو ہر روز بیمار کے سوڑون کو ملاحظہ کریں اور جب دیکھیں کہ وہ سُرخ ہو کر پھول گئے ہیں سیوقت پارہ موقوف کر دیں ۔ اس مطلب کے حاصل کرنے کے لئے اکثر کیا ۔ لو۔ مل کا استعمال کرتے ہیں اور تاکہ پارہ دستوں کے راہ نکل نہ جاوے اسکو مہینوں کے ہمراہ دینا چاہئے ۔

پہرے بمیرن کے انفلامیشن میں پارہ زیادہ تر مفید پڑتا ہے نسبت میوکس ممبرن کے اور کرائیک انفلامیشن میں یہ دوا زیادہ تر مفید ہے نسبت شدید کے ۔

چہارم انٹے ۔ مو ۔ نی ۔ اس دوا کو خاصکر بعد مفسد کے زیادہ تر استعمال کرتے ہیں تاکہ مفسد کا اثر قائم رہے کیونکہ اسکے استعمال سے قلب کی حرکت اور خون کا دورہ مست ہو جاتا ہے عسلادہ اسکے جب انفلامیشن کی بیماری طاقتور آدمی کو ہوتی ہے تب اس دوا کو دینا چاہئے مثلاً کروب اور براکٹائی ۔ ٹیس اور نیو ۔ مونیہ کے مرض میں یہ دوا فائدہ مند ہے ۔ انٹے ۔ مینی کا وہ مرکب اکثر استعمال میں آتا ہے جس کو

ٹار۔ ٹار۔ اے۔ ٹیک کہتے ہیں *

کہا اور ٹیکین دوا سے خون کا فانی۔ برین سل ہو جاتا ہے اور کم پیدا ہوتا ہے *
انسیون۔ انفلامیشن کی ہر حالت میں انسیون کا استعمال مناسب ہے اس سے
 درد کو آرام آ جاتا ہے اور مرض کو تسکین * دماغ اعضاء کے دردوں کے انفلامیشن میں
 (ان۔ کف۔ لائی۔ ٹیس) انسیون دینی چاہئے اور جو کہا دین ہی تو نہایت احتیاط
 سے کیونکہ اس کے استعمال سے دماغ میں زیادہ خون کے رجوع کرنے کا اندیشہ ہے *

علاج خارجی انفلامیشن کا۔ اول سردی۔ یاد رہے کہ مرضی انفلامیشن
 کے عین ابتداء میں لگانی چاہئے کہ جوت مقام ماؤف پر جو ٹکا غلبہ ہوتا ہے اور یہ کہ جتنی
 دیر تک سردی لگانی منظور ہو اتنے عرصہ تک ایکیسان درجہ کی سردی ہونی چاہئے
 ورنہ نقصان متصور اور تیسری بات یہ کہ دماغ کے انفلامیشن کو ہمیشہ مٹری سے خاندہ ہونا ہی
 اور شکم اور سینہ کے انفلامیشن پر ہمیشہ گرمی ہی لگایا کر کے ہیں *

دوم گرمی۔ گرمی ہمیشہ اس وقت لگاتے ہیں کہ جب مقام مرض کی ساخت میں
 سیرم یا فانی۔ برین کے پیدا ہو جانے سے وہ مقام زیادہ تن جاتا اور اس کے اعصاب پر
 زیادہ بوجھ کے پڑنے سے درد کی شدت اور چھبک اور پسین پیدا ہوتی ہیں۔ غرض ایسا
 میں جب گرمی لگائی جاتی ہے تو درد کو بڑا آرام آ جاتا ہے کیونکہ گرمی کا قاعدہ پہلایکا ہی
 تو مقام ماؤف کی ساخت گرمی کے لگانے سے پہلایکا ہی ہے جس سے اعصاب پر سے بوجھ
 کی مقدار کم ہو جاتا اور درد کو آرام آ جاتا ہے *

کاؤن۔ ٹر۔ اری۔ لٹے۔ شن۔ عربی میں اس ترکیب کو امالہ کہتے ہیں
 مطلب اس علاج سے یہ ہے کہ مثل خاص مرض کے اُس کے قرب میں ایسا دوا انفلامیشن
 پیدا کیا جاوے تاکہ غلبہ مرض کا خاص مقام تقیم سے ہٹ کر جہاں انفلامیشن گویا مصرعی
 ترکیب سے پیدا کیا گیا ہے اُسکی طرف رجوع لاوے * لیکن اس علاج کے کرنے میں کئی

احتیاطین در کار ہیں مثلاً: ابتدا انفلا میٹین مین ہرگز کاؤن - ٹر - اری - ٹے - شن نہ لگانا چاہئے اس سے نقصان متصو ہے جب بیماری کرائیک یعنی مزمن ہو جاوے اس وقت عین وقت کاؤن - ٹر - اری - ٹے - شن کا ہے - دوسرے یہ کہ خاص مقام مرض پر اسی علاج کو نہ کرنا چاہئے بلکہ اس سے کہی قدر فاصلہ پر کاؤن - ٹر - اری - ٹے - شن لگا دین مگر بہت دور ہی نہ لگا دین کہ جس سے خاص بیماری پر اسکا اثر ہونے پاوے - کاؤن - ٹر - اری - ٹے - شن یہ چیزیں ہیں جیسے عرق ایمو - نیا - ام - پاٹرٹم - ٹے - ٹینکچر آف آیو - ٹوین - مار - مار - اے - ٹیکس کا مرہم سے - ٹن - اور اے - شیو وغیرہ

مقالہ چہام

کن حبش چن نیسی اجتماع خون

جب کسی مقام کی رگیں خون سے پُر ہو جاتے ہیں اور وہ خون رُک رُک کر حرکت کرتا ہے تب اسکو اصطلاح میں کن - حبش - چن کہتے ہیں - یاد رکھنا چاہئے کہ کن حبش کے مقام کی وریدوں ہی میں اجتماع خون کا ہوتا ہے اور اسکی نشانی میں اس سے محفوظ رہتی ہیں - یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے ایک کو اصطلاح میں اکن - ٹیو کہتے ہیں + یہ بیماری طاقت سے تعلق رکھتے ہے + دوسرے کو پے - سیو بولتے ہیں کہ جب مرض مذکور مطلق ضعف کے ہو + مستم اول میں بار بار یک ورید میں خون سے چبھ جاتی ہیں گروہ خون تیزی سے دورہ کرتا ہے اور مقام مرض کی رنگت خوب سمجھ ہو جاتی ہے لیکن دوسری قسم کی بیماری میں عروق شریہ اور بار یک وریدیں سبب زیادتی خون کے پہنچاتی ہیں - اور رنگ مقام مرض کا اودا ہو جاتا ہے - قسم اول کے علاج میں حرکت

لگاؤین یا تذبذبیہ کلاس کے خون لین اور بیماری کی جگہ پر سردی یا دیویات کاؤن۔ طرہ مرضی
 لگاؤین اور تذبذبیہ نیکین جلاب کے متفقہ شکم کر کے مقویات کا استعمال کریں۔ دوسری
 قسم کی بیماری میں یا تذبذبیہ جو کون کے خون لین یا ڈرامی۔ کینک لگاؤین (یعنی
 حجامت بغیر پچنے کے ہلکے سہلات سے تلبین کریں تاکہ خون کی مقدار کم ہو جائے
 تب دیویات محرک سے (اسٹی۔ میو۔ لنٹ) دوران خون کو تیز کریں بعد ازاں مقویات
 کا استعمال کریں تاکہ دوران خون کی طاقت قائم رہے ۰

مقالہ پنجم

ڈراپ۔ سی

جب کسی مقام میں بانی جمع ہو جاتا ہے تب اسکو ڈراپ سی کہتے ہیں۔ یہ پانی یا تو جسم
 کے کسی جوف میں یا سی۔ لیو۔ لرٹے رشیو کے شبک میں یا ان دونوں مقاموں میں ایک
 ہی وقت کے اندر جمع ہو جاسکتا ہے ۰ بعض دفعہ بانی انفلامیشن کے سبب سے بھی
 جمع ہو جاتا ہے لیکن اکثر بغیر انفلامیشن کے بھی یہ بات ہو سکتی ہے ڈراپ سی بذاتہ
 مستقل مرض نہیں ہے بلکہ ایک نہایت بہاری عیالست کئی مرض کی ہے اور اصل
 سبب اس مرض کے تین ہیں۔ اول وریدوں میں دوران خون کا رُک جانا ۰
 دوم پتلا پڑ جانا خون کا جیسے انے۔ میا کی بیماری میں ہو کر تا ہے ۰ سوم جمع ہو جانا
 فضلات کا خون میں ۰ لیکن اکثر یہ تینوں باتیں باہم ملکر ڈراپ۔ سی کی بیماری پیدا
 کرتی ہیں یعنی ڈراپ۔ سی کے مرض میں خون رُک رُک کر دورہ کرتا ہے۔ اس میں پانی
 کی زیادتی ہوتی ہے اور جب گر یا گردن کے فعل میں خلل پڑ جانے کے سبب سے اس
 خون میں صفرا یا پشیا کے اجزا بھی ہوتے ہیں جن سے خون بگڑ جاتا ہے۔ پس
 ہر ایک ڈراپ۔ سی کے بیمار (مستقی) میں دو قسم کی عیالستیں پانی جانگی یعنی

ایک تو وہ جو اصل مرض کے سبب سے پیدا ہو گئی اور دوسری وہ جو پانی کے جمع ہو جانے سے ظاہر ہو گئی۔ جب پانی دماغ کے بطون میں جمع ہو جاتا ہے تب اصطلاح میں ایسٹم کٹی ڈراپ - سی کوٹائیڈ رو - کے - نے - ٹسٹ بولینگے - جب پانی پلو راکمی تھیلی میں جمع ہو جاتا ہے تب اسکوٹائیڈ رو - تھو - راکٹس بولتے ہیں اور جب پے - ری - کار - ڈی - ام میں اجتماع پانی کا ہو جاتا ہے تب اسکا نام ٹائیڈ رو - پیری - کارڈیم رکھتے ہیں اور جب پانی پے - ری - ٹو - نی - ام کے جوف میں جمع ہو جاتا ہے تب اس مرض کو اسائی - ٹسٹ کہتے ہیں اور جب پانی کا اجتماع انٹین کے پردہ ٹیو - نے - کا دی جھیٹے میں ہوتا ہے تب اس مرض کو ٹائیڈ رو - سیل کہتے ہیں اور جب کسی خاص مقام جسم کے کن - ٹک - ٹیو - ٹے - شید میں پانی جمع ہو جاتا ہے تب اس جگہ کے تہج کو ڈیٹا بولتے ہیں لیکن جب کل جسم کی کن - ٹک - ٹیو - ٹے - شید میں پانی جمع ہو کر مریض کا جسم پھول جاتا ہے تب اس حالت کو ا - نارسار - کا بولتے ہیں اور جب تہ - ا - نارسار کا کے پو - رایا پے - ری - کار - ڈی - ام یا پے - ری - ٹو - نی - ام کی تھیلی میں بھی پانی جمع ہو جاتا ہے تب اس بیماری کو جے - نے - رل ڈراپ سی کہتے ہیں ۔

ڈراپ - سی کے مرض میں پانی کیونکہ جمع ہو جاتا ہے اس بات کے سمجھنے کے لئے اسکویا و رکھنا چاہئے کہ صحیح و سالم جسم کی اندرونی سطحوں سے پانی بڑبڑکتا رہتا ہے مگر ساتھ ہی اسکے قوت جاذبہ اس پانی کو جذب بھی کرتی جاتی ہے - پس جب تک یہ دونو قوتیں یعنی ایک تو پانی پیدا کرنے کی اور دوسری اسکے جذب کرنے کی مناسب مقدار میں جاری رہتی ہیں تب تک پانی جمع نہیں ہونے پاتا بلکہ وہ سطحیں جن سے پانی پیدا ہوا ہے صرف مرطوب ہی ہتی ہیں لیکن فرض کرو کہ مقدار ان قوتوں کی کسی سبب سے کم و بیش ہو گئی یعنی فرض کرو کہ پو - رایا پے - ری - ٹو - نی - ام کی تھیلی یا جسم کے کسی اور جوف میں پانی نسبت صحت کے زیادہ توجہ پیدا ہوتا جاتا ہے اور کمتر جذب ہوتا ہے یا یہ فرض کرو

کہ پانی تو پیدا ہوتا جاتا ہے لیکن جذب نہیں ہوتا تو ان صورتوں میں صاف ظاہر ہے کہ ڈراپ سی کی بمیسی ضرور پیدا ہوگی۔ جسم کے پانی یا کسی اور رطوبت کو جذب کر نیوالے آلات دیتے دیرین اور لم۔ فائٹکس یعنی عروق جاذبے لگاتے لگاتے اپنے ماسارے میں چنانچہ ویریدین بلکہ وریڈی جانب عروق شعیرہ کے پانی کو جذب کرتے ہیں اور ان اشیاء کو بھی جو پانی میں ملی ہوئی ہوتی ہیں اور عروق جاذبہ جو اعضا کی ساخت کے مشک میں ہوتی ہیں اس پچھے ہوئے پرورش کر نیوالے جزو کو پھر خون میں پہنچاتے ہیں جو اعضا کی پرورش کرا سٹے اس خون سے نکلتا ہو اور سلاوہ اس جزو کے عروق جاذبہ کے ذریعہ وہ اشیاء بھی گزرتی ہیں جو حل نہیں ہو سکتیں اور ماسا۔ رلیقہ کا کام ہی امحاسے کیلوس دینے کا میل کو لچا نیکا ۔

جب ڈراپ سی کی جیاری دوران خون کی رکاوٹ سے پیدا ہوتی ہے تب ویرید اور انکی عروق شعیرہ ہی کا خاص تصور ہوتا ہے ۔ مثلاً فرض کرو کہ کسی حصہ جسم کی بڑی وریکسی رسولی سے دب گئی اور اس سبب اسکے اندر خون کی آمد و رفت اچھو طور پر نہ ہو سکے تو نتیجہ اس دباؤ کا یہ ہوگا کہ اسکے پیچھے جو ویریدین اور عروق شعیرہ اور شہر ہونگی پھر بھی اس رسولی کے دباؤ کا اثر پیدا ہوگا یعنی وہ رگیں خون سے اس قدر بوجھ جائیں گی کہ انہیں رطوبت کے اور جذب کرنے کی گنجائش نہوگی اور تاکہ خون کے بوجھ سے سکڑ دیش ہو جاوین انکے پردوں کے مسامات سے سیرم لینے آب خون تراوش پانے لگیگا مگر عروق شعیرہ اور چوٹی ویریدون ہی سے سیرم زیادہ تراوش پاتا ہے کیونکہ انکے پردوں کے مسامات سے وہ سیرم نہایت آسانی سے تراوش پاسکتا ہے ۔

جب قوت جاذبہ کم ہو جاتی ہے اور اس سبب سے ڈراپ سی پیدا ہوتی ہے اسکا اصطلاح میں کرائک یا پے سیو ڈراپ سی کہتے ہیں اور جب سیرم بہت تراوش پانے لگتا ہے تب اس ڈراپ سی کو اک۔ ٹیو یا کیوٹ ڈراپ سی کہتے ہیں ۔

قسم اول کی ڈراپ۔ سی ایسے دل کی بیماری سے پیدا ہوتی ہے جس سے دوران خون کو روکا دیا ہوتا ہے اور اس باعث خون میں کسی نہ کسی نوع کا تیسر پیدا ہو جاتا ہے اور ایکوٹ ڈراپ۔ سی یا قومروسی کے لگجانے یا پیشاب یا پسینہ کے دفعہ رک جانے یا مرض اسکار۔ لے۔ لے۔ نا وغیرہ کے نہر سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان حالات کے پیدا کر نیوالے سبب جن سے ڈراپ۔ سی کے بیماری ہو جا یا کرتی ہیں بہرین کہ

اول وہ سبب جن سے بانقون کا خون وریدی وریدوں میں چمے طور پر لوٹ نہیں سکتا اور اس باعث ورید و نمین اجتماع خون کا ہو جاتا ہے *

ٹائفک یا بازو کی محدود ڈراپ۔ سی اس طور سے پیدا ہو سکتی ہے کہ جب ان مقامات کی ورید کسی سوئی یا کوئی بڑی ہنوی غر دیا اینو۔ نیزم سے دب جاتی ہے یا جب خود اس ورید میں کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ جس سے یا تو وہ دب جاتی ہے یا مانی اس کی بالکل مسدود ہو جاتی ہے۔ کل جسم کی وریدوں کے خون میں اسوقت رکاوٹ ہوتی ہے کہ جب دل کے بائین جانب کے کیوڑوں میں بیماری ہوتی ہے اور جب ان کیوڑوں میں بیماری ہوتی ہے تب پہلا اثر اس مرض کا یہ ہوتا ہے کہ خون شش سے قلب کی طرف ٹک کر لوٹتا ہے کہ جس سے کہانسی ہوتی ہے اور بیمار اچھے طور پر دم نہیں لے سکتا وغیرہ آخر کار جسم کی کل وریدوں کے دوران خون میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے نتیجہ جس میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے بیمار کے پاؤں سوج جاتے ہیں اور یہ سوجن فرست رفتہ ٹانگوں، فوط، قصب یا اندام نہانی اور تباہ جسم میں پیدا ہو جاتی ہے اور بے رسی ٹوٹی ام کی تہلی میں بھی بانی پیدا ہو سکتا ہے تب مریض کو جنرل ڈراپسی ہو جاتی ہے *

اور شش کی مریض بیمار یون کے سبب سے ہی مثلاً کہ انک برا نکائی۔ ٹس اور ام فانی سے وغیرہ کے سبب سے ہی جنرل ڈراپ۔ سی پیدا ہو سکتی ہے اسوقت یہ مرض بھی بعینہ اسے طور پر پڑتا جاتا ہے کہ جب طور پر مذکور ہوا ہے اور جب اسامی ٹس جنرل ڈراپسی

کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے تبہ اکثر جگر کی بیماری کے سبب پورٹل - وین کے دوران خون میں روک پڑ جانے سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب اس ورید میں خون رُک کر آتا ہے تب ان ورید وین بھی خون رُک جاتا ہے کہ جن سے پورٹل - وین بنتی ہے نتیجہ جکا یہ ہوتا ہے کہ اُنکے پرووں کے مسامات سے سیرم نینے آب خون تراوش باک پرودہ پے - رسی - ٹو - نی - ام کی تیلی میں جمع ہو جاتا ہے نینے اسائی - ٹس کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے مزید بریں جب پورٹل - وین خود کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سبب یا کسی رسولی کے دباؤ کے باعث جگر میں داخل ہونے سے پشتیرہ ورید میں ہو جاتی ہے تب ہی اسائی - ٹس کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے + اور شکم میں تغلیر کے سبب بھی بانی جمع ہو سکتا ہے +

دوم جب سبب کمی غذا کے یا خون کے بہت نکل جانے سے یا ضعف پیدا کر نیوالی بیماریوں کے باعث اور امراض اسکر - وی اور انے - میا اور کلو - سوسس اورے لے یا زہر کے باعث جسم کی بافت بگڑ جاتی ہے اور خون ہی تپا پڑ جاتا ہے تب بھی آپ سی کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے +

سوم گردہ کی بیماری کے سبب جب خون متغیر ہو جاتا ہے تب بھی آپ سی کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ اس صورت میں خون کی کثافت خون ہی میں جاتی ہے جس سے وہ خون کثیف رُک رُک کر دورہ کرتا ہے وہ مرض گردہ کا یا توحا یعنی اکیوٹ یا کرونکسینی فرمن ہو سکتا ہے جب مرض مذکور اکیوٹ یعنی حاد ہوتا ہو تو سردی کے لگ جانے سے یا پسینہ کے رُک جانے سے یا مرض اسکا رے لے - نا یا دیگر امراض کے زہر سے پیدا ہوتا ہے + یاد رہے کہ گردوں کی اکثر بیماریوں میں پیشیا یا جے طور پر پیدا ہونے کے سبب سے خون زیادہ تر تپا پڑ جاتا ہے اور ان امراض گردہ میں چونکہ پیشیا کے ہمراہ البیو - من بھی خارج ہوتا رہتا ہے اسلئے

جسم کا خون کمزور ہو جاتا ہے اور ان بیماریوں میں چونکہ پیشاب کے اجزاء خون سے خارج نہیں ہو سکتے اس واسطے وہ خون زہریلا ہی ہو جاتا ہے جس سبب اچھے طور پر دورہ نہیں کر سکتا *۔

چہارم بعض حالتیں جن سے اکن - ٹیو کن جیش - چن ہو جاتا ہے مثلاً جب جلد کی کوئی پُرانی بیماری جلد رفع ہو جاتی ہے یا جب کوئی رطوبت عرصہ سے جاری رہے اور دفعتاً ٹھک جاوے تب اکن - ٹیو کن - جیش - چن ہو جاتا ہے اور آب خون تراوش پس نکلتا ہے *۔

بانتون میں جو پانی جمع ہوتا ہے تو صرف دورانِ خون میں مزاحمت پڑ جانے سے ہی نہیں ہوتا بلکہ خون اور ان ہستون کے رشتہ میں چونکہ فتور برپا ہو جاتا ہے اس واسطے بھی سیرم یعنی آب خون انہیں جمع ہو جاتا ہے - پس اس واسطے تہیج صرف جسم اسفل ہی میں محدود نہیں رہتا بلکہ ابتدا ہی سے چہرہ اور آنکھوں کے پنجے کے پوٹے تسوج جاتے ہیں اور اس مرض کا ٹانگوں کو درم بنسبت اس تہیج کے جو دل کی بیماری کے سبب ٹانگوں میں پیدا ہوتا ہے زیادہ تر سخت ہوتا ہے *۔

کن - ٹکٹ - ٹیو - ٹے - شیو کی ڈراپ - سی میں درد نہیں ہوتا الا جب پانی کے جمع ہونے سے جلد بہت ہی تنجاتی ہے * اس صورت میں اگر انفلامیشن ہو تو مقام مژمر تسخ نہیں ہوتا بلکہ برعکس سکے وہ جگہ بہکی پڑ جاتی ہے اس واسطے تو کنکے کن - ٹکٹ - ٹیو - ٹے - شیو کی ڈراپ - سی میں اگر مقام مرض کو انگلی سے دبائے تو وہ تیر غار پڑ جاتا ہے اور جب اس قسم کی ڈراپ - سی میں پانی بہت بہر جاتا ہے اور عرصہ تک دبا نہ پڑتا ہے تب دبانے سے ہٹ نہیں جاتا جس سبب غار بھی بہت کم نمایاں ہوتا ہے اور وہ جگہ سخت ہو جاتی ہے اور جب وہ کنکی جلد میں انفلامیشن ہوتا ہے تب وہ جگہ جابجا سے ہٹ جاتی ہے اور شقوق سے پانی اترنے لگتا ہے *۔

اسامی۔ ٹس لینے جب سپٹ مین پانی بہر جاتا ہے تب شکم ٹڑہ جاتا ہے اور
مریض کے کھڑے ہونے کی حالت میں زیادہ بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے اور لیٹے رہنے
کی حالت میں زیادہ پہنچتا ہے۔ اس صورت میں شکل کی سکی نہ یا وہ تبدیل جاتی ہے نسبت
اُس شکل کے جو حمل اور رسولی کی بیماری میں شکم کی ہوتی ہے۔ جب شکم میں بہت
پانی ہوتا ہے تب بیمار کے چست لینے رہنے کی حالت میں شکم کو دونوں جانب پر ٹھونکنے
سے آواز ٹھوس پیدا ہوتی ہے اور مقام ناف پر آواز صاف ہوتی ہے کیونکہ جب بیمار چست
پڑا رہتا ہے تب پانی شکم کے ارد گرد ہر ہو جاتا ہے اور امعا اوپر کو تیرنے لگتے ہیں۔
خاصیت ڈراپ۔ سی کے پانی کی۔ اکثر یہ رطوبت پانی کی طرح ترقیق ہوتی ہو
اور یا تو بالکل بے رنگ یا خفیف زردی لیل ہوتی ہے لیکن گاہے گاہے اس میں خون یا
صفر کی رنگت بھی جاتی ہے۔ رطوبت مذکور صاف اور قدرے شفاف بھی ہوتی ہے
اور اکثر نوکھاری مگر گاہے گاہے خفیف تریش اور نہکھاری ہوتی ہے۔ کیما کی خاصیت
اس رطوبت کے خون کے سیرم کی طرح ہوتی ہے اور اسکے پانی میں البیو۔ من اور کھارے
نمک خاص کر کلورائیڈ کے قسم کے نمک ہوا کرتے ہیں۔ جب ڈراپ۔ سی گرو وکی ہا رہی کے
سبب سے ہوتی ہے تب اسکی رطوبت میں یو۔ ری یا بھی ہوا کرتا ہے۔

علامات اور دور۔ قاعدہ تو یہی ہے کہ ڈراپ۔ سی اکثر آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہو
مگر بعض دفعہ نہایت جلد پیدا ہو جاتی ہے لینے چند گھنٹہ کے اندر سارا بدن سوج سکتا
ہے۔ درجہ جسم کے اُن حصوں میں پہلے اور بکثرت ہوا کرتا ہے جتنا میلان نیچے کی طرف
ہوتا ہے اور خاص کر جھول سے دو واقع ہوتے ہیں اور وہ حصے جو کھلے ہوتے ہیں اور
جسم کی ایسی جگہ واقع ہوتے ہیں جن بکثرت ڈھیلے سی۔ لیو۔ لڑے۔ شب ہو تے ہیں۔
جس حصہ جسم میں انا۔ سار۔ کا یا اے۔ ڈی۔ ما ہوتا ہے وہ جگہ سوج جاتی ہے اور
دبانے سے بچ جاتی ہے اور دان کی سبب اکثر پیچیدہ رنگ کی ہوتی ہے مگر بعض دفعہ

سُرخ بھی ہوتی ہے + ڈراپ - سی کی جگہ کچھ تر تباہی ہے اور چکنے لگتی ہے اور بعض دفعہ اُتر
 کچ جاتی ہے کچر جاتی ہے اور وہ جگہ زخمی ہو کر گلنے لگتی ہے ۱۰ جن بائوئین پانی جمع
 ہوتا ہے وہ اکثر کم جاندار ہوتے ہیں سِلئے اذنی سبب سے اور خود بخود ہی ان میں
 اری - سی - پے - نٹ اور روتی قسم کا انکلامیشن ہو جاتا ہے + جب سیرس ممبرین کے
 جوف میں پانی جمع ہو جاتا ہے تب وہ جوف پھولا ہوا نظر آتا ہے اور پھولا ہوا نہ ہی ہو
 پھر ہی اس میں پانی کا ہونا چند ماستون سے دریافت ہو سکتا ہے جبکہ ذکر کسی موقع پر
 کیا جائیگا + جب جسم کے کسی بیرونی حصہ میں پانی جمع ہو جاتا ہے تب اس جگہ تھوڑی
 بہت بے چینی یا سختی معلوم ہوتی ہے مگر دروہنیں ہوتا + ڈراپ - سی کی رطوبت کے
 جمع ہوجانے سے اعضا دب جاتے ہیں اس سبب سے اُنکے فعل میں خلل واقع ہو جاتا
 ہے اور بعض مقامات میں مہلک بھی ہو جاتا ہے جیسے اسوقت کہ جب درم گلا - ٹس
 کے قرب وجوار میں ہو جاتا ہے + علامات عامہ کا کم یا زیادہ پیدا ہونا ڈراپ - سی کے
 سبب پر منحصر ہے لیکن جب پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تب رطوبات طبعی
 اکثر بہت کم خارج ہوتی ہیں +

تشخیص - ڈراپ - سی ہے یا نہین - یہ بات آسانی سے دریافت ہو سکتی ہے - مگر
 ڈراپ - سی کی تشخیص کی نسبت بڑی بہاری بات جسکے دریافت کرنے کی بڑی ضرورت
 ہے وہ یہ ہے کہ کس سبب سے ڈراپ - سی پیدا ہوئی پس اس سبب کے دریافت کرنے
 کے لئے بیمار کے پہلے حالات کو دریافت کرنا چاہئے اور یہ کہ علامہ ڈراپ - سی کے
 اوز کون کن اعضا میں موجود ہیں اور یہ کہ کن کن اعضا کی بیماری کے سبب سے وہ ڈراپ سی
 پیدا ہو سکتی ہے چنانچہ اس خاص سلامت کے دریافت کرنے کے لئے یہ چند باتیں
 نہایت توجہ کے قابل ہیں چنانچہ

اول ڈراپ - سی کہاں سے شروع ہوئی کس جگہ پر ہے اور کس قہر ہے - مثلاً جب دل

یہ سبب شراک سبب بیجا ڈراپ ہے۔ سی ہوتی ہے تب پالون اور ٹخنوں سے شروع ہو کر اہر کی
طافہ پانی جانی ہے۔ یہاں تک کہ تھوڑی بہت عام جسم میں بھی پہل جاتی ہے *
مادی۔ ٹش نی ڈراپ۔ سی اکثر اس وقت میں پیدا ہوتی کہ جب عرصہ تک جگر کے دور
نہیں آتا، کادہ پڑ جاتی ہے *۔

سبب ڈراپ سی گردن کے سبب پیدا ہوتی ہے تب اکثر پہلے چہرہ اور جسم اعلیٰ پر
ظاہر ہوتی ہے خاص کر انکھوں کے پوٹے سوچ جاتے ہیں کیونکہ ٹان ٹھہریں سی۔ لیو۔ لہ
ٹے۔ یہ پوچھت ہو تا ہے او۔ دونو ہا تہ بھی درم کر آتے ہیں کیونکہ وہ کھلے رہتے ہیں اس قسم
کی ڈراپ سی سارے جسم میں پہل جاسکتی ہے اور ایسین سی۔ رس جہرین کے جوفن ہیز
بھی پانی پیدا ہو جاسکتا ہے اگرچہ اکثر بہت نہیں ہوتا * جگر کی بیماری کے سبب جب
ڈراپ سی ہوتی ہے تب پانی پہلے پے۔ ری۔ ٹو۔ نی۔ ام کے جوف میں پیدا ہوتا ہے اور
پیٹ پھول جاتا ہے کیونکہ پورٹل۔ وین کے دوران خون میں رکھا ڈٹ ہوتی ہے اور اس قسم
کی ڈراپ سی میں اگرچہ پیٹ میں پہلے پانی جمع ہوتا ہے مگر اکثر کچھ عرصہ بعد ٹانگیں سوچ
جاتی ہیں کیونکہ شکم کے پانی کا دباؤ ان۔ فے۔ ری۔ آر۔ وی۔ نہا۔ کے۔ داپر پہنچتا ہے کہ جب
درید مذکور دایا۔ فرام کے سولج سے گزرنے سے پہلے دب جاتی ہے۔ اس وقت میں ایسا
بھی ہو سکتا ہے کہ پیٹ میں پانی پیدا ہوتے ہی ٹانگیں ہی سوچ جاتی ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا
ہے کہ رگ مذکور تمام بالا سے نیچے پہنچ جاتی ہے۔ اس حالت میں دونو ٹانگیں سوچ
جاسکتی ہیں *۔

صرفانے۔ میا کے ہونے سے ڈراپ سی بہت ریح نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ جلد کے نیچے
کے سی۔ لیو۔ لہ۔ ٹے۔ ریمو ہی میں محدود رہتی ہے اور ایسین اکثر پاؤں اور ٹخنے سوچ جاتے
ہیں یا آنکھوں کے پوٹے متورم ہو جاتے ہیں * جب ڈراپ سی کسی خاص مقام پر محدود رہتی
ہے جیسے ٹانگ یا ایک بازو میں تب ان مقامات کے کسی درید میں رکھا ڈٹ ہو جانے

سے پیدا ہوتی ہے +

دوم ڈرپ سی کا اندازہ اور سرفیہ اسکے بڑھنے کا۔ جو ڈرپ سی مل کی بیماری کے سبب سے پیدا ہوتی ہے وہ آہستہ اور بتدریج بڑھتی ہے اور بموجب موقع کے اسکی مقدار میں تھوڑا بہت اختلاف پڑ جاتا ہے۔ لیکن آخر الامران باتوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا اور شش کی کسی کمیوٹ بیماری کے سبب اس قسم کی ڈرپ سی جلد بڑھ جاسکتی ہے، اگر وہ کی بیماری کے سبب سے جب ڈرپ سی ہو جاتی ہے تب اگر وہ مرض کمیوٹ ہو تو نہایت جلد بڑھ جاتی ہے یعنی بعض صورتوں میں تو چند گھنٹہ کے اندر سارے بدن سوج کر کٹا ہو جاتا ہے اور چہرہ کا نقشہ بگڑ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ صرف اسی قسم کی ڈرپ سی میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جنکا ذکر اوپر ہوا ہے اور اس ڈرپ سی کا یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب قدر جلد بڑھ جاتی ہے اسی قدر جلد رنج بھی ہو جاتی ہے۔ جب جگر کے مرض کے باعث ڈرپ سی پیدا ہوتی ہے تب استقامت کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے + اور جب ڈرپ سی

انے۔ میا کے سبب سے پیدا ہوتی ہے تب وہ جلد پیدا ہو جاتی ہے اور جلد رنج بھی ہوتا ہے چنانچہ شام کی وقت پاؤں اکثر سوج جاتے ہیں اور رات کے آرام کے بعد سوجن دور ہو جاتی ہے اور صبح کی وقت پوٹے سوج جاتے ہیں +

سوم۔ دل اور گردوں کی بیماریوں کے سبب سے جو ڈرپ سی ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ جلد کے سوجن کو دبانے سے ان دونوں فرق کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً گردوں کی ڈرپ سی میں جلد کی سوجن کو دبانے سے وہ جگہ کمتر بچتی اور اسپرنگلی کا جو نشان پڑ جاتا ہے وہ زیادہ ویرسک قائم رہتا ہے مگر اس سلامت پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا + چہارم۔ ڈرپ سی کے متعام کے ملاحظہ سے بھی تشخیص کو مدد مل سکتی ہے۔ مثلاً گردوں

کی بعض بیماریوں میں جلد کی رنگت ایک خاص طور کی سفیدی مل ہو جاتی ہے اور دل کی بیماری کے سبب سے جو ڈرپ سی ہوتی ہے اس میں وریدیں اکثر خون سے پر نظر

آتی ہیں اور جلد چمکیلی اور تہنی ہو سکتی ہے *

پنجم ڈراپ - سی کی رطوبت کی خاصیت - سی - نل ڈراپ سی کے پانی کی اس - پے - سی - فاکت گراڈٹی بہت ہی کم ہوتی ہے اور اس میں بہت ہی تھوڑا البیو - من ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں یو - ریہا بھی پایا جاتا ہے *

خلاصہ اوپر کے بیان کا - فرق درمیان مختلف قسم کے ڈراپ - سی کے یہ ہے کہ جب ڈراپ - سی مل یا شش کی بیماری کے سبب سے پیدا ہوتی ہے تب تبدیلہ چڑھتی ہے اور پاؤں سے شرمع ہو کر تبدیلہ چڑھ جاتی ہے *

جب ڈراپ - سی گروہ کی اکیوٹ بیماری کے سبب سے پیدا ہوتی ہے تب نقصان ظاہر ہو کر جنرل یعنی عام ہوتا ہے اور پہلے پہل اس میں چہرہ صبح جاتا ہے خاص کر جب بیمار صبح کو اٹھتا ہے تب صرف پوٹے ہی ہنہیں بلکہ سارے چہرہ سوجا ہوا معلوم ہوتا ہے اور گروہ کی ڈراپ - سی میں چاہے وہ گراڈنگ ہو چاہے اکیوٹ چہرہ پر تہج ہوتا ہے اور آنکھوں کا نیچے کا حلقہ سوجا ہوا ہوتا ہے اور بہت دل کی ڈراپ - سی کے اس میں ٹانگوں کا درم زیادہ تر سخت ہوتا ہے اور فوطہ بھی زیادہ تر سوج جاتا ہے *

جب یہ مرض جگر کی بیماری کے سبب پیدا ہوتا ہے تب پہلے پیٹ میں پانی جمع ہوتا ہے اور اس سبب سے جسم کے کن - نمک - ٹیوٹے - شیوین بھی اجتماع پانی کا ہوتا ہے *

انجام - ڈراپ - سی کی بیماری کا سبب پر موقوف ہے مثلاً کسی متبر غرض اندرونی کی ساخت میں جب کوئی بیماری ہنہیں ہوتی ہے تب ڈراپ - سی کو شفا ہو سکتی ہے اور جب گروہ یا دل یا جگر میں بیماری ہوتی ہے تب تھوڑے عرصہ کے لئے ڈراپ - سی روک جاسکتی ہے *

شش - علاج کا اثر ڈراپ - سی پر - انے - میا کی ڈراپ - سی کو علاج سے

جلد ناکھ ہوتا ہے اور سی ڈراپ سی علاج مناسب ہوتا ہے۔ اگر نہ کے لئے
اکثر نہ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے بالکل ہی دور ہو جاسکتی ہے لیکن دل کی بیماری کی ڈراپ سی
اگر زیادہ ہو جائے تو اسکا پانی شکون سے جذب ہوتا ہے اور جذب ہو ہی جائے
تو جلد بہر جاتا ہے ۔

علاج ڈراپ سی کے علاج کے مطالبین ہوتے ہیں ایک تو وہ کرنا ڈراپ سی
کو ۔ دوسرے پہنچنے دینا ۔ اور سوم روکنا اور اس کے اثر بد کا علاج کرنا ۔ پس
دل سبب کو دور کرنا ۔ جب کسی اور پر کسی قسم کا دباؤ ہو چکے یا وہ ورید سکڑ جائے
تو اسکا تدارک کرنا ۔ دل کی بیماری کے سبب جب ڈراپ سی ہو جائے تو اس میں
اکثر برا کٹھاٹی ۔ ٹیس ہو جایا کرتی ہے تو اس کہ نشی کو رفع کرنا کیونکہ اس سے ڈراپ سی
مذکورہ بڑھ جایا کرتی ہے ۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب کسی خاص عضو کی بیماری کے
سبب سے ڈراپ سی جاری ہے تو اسپر توجہ کر کے اس مرض کو رفع کرنا چاہئے ہینز
تو ایسی کوشش کرنی چاہئے جس سے عضو ماؤن کا فعل بحال ہے ۔

و دھم ڈراپ سی کے علاج میں گرم دینا اور بیماری کی جگہ کو مناسب موقع پر رکھنا ہرگز
نہ ہونا چاہئے شکار جس حصہ میں ڈراپ سی ہو بشرط ضرورت ہوا ۔ یا کچھ عرصہ رات تک
اٹھائے رکھنا چاہئے چنانچہ ٹانگیں صبح جاوین تو بہ نسبت جسم کے انکو اونچا رکھنا چاہئے
خوط صبح جاوے تو اسکے نیچے روئی کی گدی رکھ کر اونچا رکھنا چاہئے ۔ بہتری صدقوں
میں احتیاط اور داناہی سے درم کے مقام پر دباؤ پہنچانے سے ہی بہت فائدہ
ہوتا ہے ۔

سوم ڈراپ سی کے پانی کہ جذب کرنا ۔ یہ بات معققات اور مددات اور ایسے
سہمات سے حاصل ہو سکتی ہے جو نمکین ہوتے ہیں اور جن سے پانی کی طرح گھل کر
رقیق دست آتے ہیں ۔ پس نہ لانے کے لئے گرم پانی یا گرم ہوا کا ہپا راجیا مفید

پڑتا ہے ویسی کوئی اور معرق دو امفیڈ نہیں پڑتی لیکن یہ ترکیب پسینہ لانے کے
 گردن کے ڈراپ۔ سی خاصکر اسکی اکیوٹ قسم میں نہایت فائدہ مند ہے معرق
 دو این جیسے نامے۔ ٹرو وغیرہ میں پیچہ ہیں مگر ان سے تھوڑا ہی فائدہ ہوتا ہے *
 بعض صورتوں میں جے۔ بو۔ ران۔ ڈائی سے فائدہ ہوتا ہے ڈراپ۔ سی کی بیماری
 میں ایسے مہملات بھی فائدہ کرتے ہیں جن سے پانی کی طرح رقیق دست آتے ہیں۔
 مگر انکے استعمال میں احتیاط درکار ہے کیونکہ بیمار کے کمزور ہو جانیکا اندیشہ ہو۔ بعض
 قسم کی ڈراپ۔ سی کو مدرات سے بہت فائدہ ہوتا ہے جیسے پوربی مقداروں میں
 میں نامے۔ ٹرٹ یا اسے۔ ٹسٹ یا سائی۔ ٹریٹ اف پٹاش یا ٹینکچرف اسکویٹل
 یا اسپرٹ اف جو۔ نی۔ پراو۔ کئے۔ ٹین جی عمدہ معرق دو ہے * اور یہ گولیاں بھی
 بہت ہی فائدہ مند ہیں انکو ہر دوسری رات کھلانا چاہئے چنانچہ
 لشخ۔ ای۔ لا۔ ٹری۔ ام ایک گرین کے چٹے حصہ سے نصف گرین تک *
 باؤڈر اف اسکویٹل نصف گرین سے ایک گرین تک * ڈی۔ جی۔ ٹے۔ کس
 کے پتوں کا سفوف نصف گرین سے ایک گرین تک * اور کٹرکٹ اف ہن بزن
 ڈیٹرہ گرین * سبکو ملا کر ایک گولی بنالین *
 چہارم عمل جراحی پانی نکال لینا۔ مثلاً ٹرو۔ کار سے چمید کر پانی نکالنا۔
 سوزن سے یا چوٹے چوٹے ٹرو۔ کار سے چمید کر پانی کو بہنے دینا *
 پنجم بیمار کو طاقت بخشنا اور خون کی حالت کو بہتر کرنا۔ مثلاً انے۔ میا
 میں فولاڈکا استعمال کرنا اور بیمار کی غذا کا عمدہ بندوبست کرنا *




حصہ دوم عمل طب باب اول

امراض عامہ
مقالہ اول
ارمی - سی - پے - کس

تعریف - ایس بیماری میں تپ ہوتی ہے اور جلد پر بخارات نکلتے ہیں اور ان بخارات کے نکلنے وقت جو انفلا میشن ہوتا ہے وہ پہلیتا جاتا ہے اور جلد کے نیچے تک پہنچ جاسکتا ہے ۔

ماہیت تشریحی - اس مرض میں خون کے اندر ایک خاص قسم کا زہر سرایت کر جاتا ہے جو عصب تک بیکار رہ کر بخار پیدا کرتا ہے ۔ اثر اس زہر کا خاصہ جلد پر بطور انفلا میشن کے ظاہر ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایس زہر کا اثر دماغ کے پردوں پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے ۔

مقام مرض کی جلد سبباً انفلا میشن کے خوب سُرخ ہو جاتی ہے اور اکثر وہ سُرخی دور دراز تک پہنچ جاتی ہے چنانچہ سارا چہرہ سر اور گردن اور سینہ یا ایک طرف کا ہتھ پانچون سُرخ ہو جاتا ہے۔ یہ سُرخی یا تو از خود رفع ہو جا سکتی ہے حسب صورت میں مقام مرض کی جلد پر سے بھوس سیڑ جاتی ہے یا جہاں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے وہاں چھائے نکل آتے ہیں جنہیں ایک شفاف زردی لیل رطوبت ہوتی ہے جب یہ آئے ٹوٹ جاتے ہیں تب انکی جگہ پر خفیف زخم رہ جاتے ہیں ہنہیں تو مقام مرض مُردار پڑ جاتا ہے اور دھان کی جلد ادومی سیاہ ہو جاتی ہے +

علاماتِ مندرہ۔ اس مرض کا زہر دس سے چودہ دن تک بلکہ نصف تین ہفتہ تک بھی بیکار پڑا رہتا ہے اور تب ہمیشہ ہنہیں مگر اکثر یہ چند علاماتِ مندرہ ظاہر ہوتی ہیں چنانچہ مریض اپنے کو بیمار تصور کرتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے اور سارا بدن ٹوٹنے لگتا ہے۔ ماضیہ بگڑ جاتا۔ کھانہ کھنے لگتا ہے۔ ورم سر ہوتا ہے۔ اور خفیف بخار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ علامتیں کئی گھنٹہ سے لیکر چار یا پانچ دن تک رہتی ہیں اور تب خاص بیماری کی علامتیں شروع ہوتی ہیں۔ اور جب خاص علامتیں شروع ہوتی ہیں تب گاہے گاہے نکیسر بھی پہنچتی ہے +

علاماتِ خاصہ۔ جس جگہ یہ بیماری ظاہر ہو نیوالی ہوتی ہے پہلے دھانچہ گرم محسوس ہوتی ہے خراش ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کسی نے اس جگہ کو جکڑ کر باندھ دیا ہے۔ جلد دھان کی ورد کرنے لگتی ہے اور دھانچہ پیر جہیں اور ٹی سینہ معلوم ہوتی ہیں اب اس مقام پر سُرخی اور ورم پیدا ہو جاتا ہے اور وہ جگہ کچھ کرتن جاتی اور جھٹکا ہو جاتی ہے اور ورد کی کل تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں اور اب وہ مقام زیادہ گرم بھی محسوس ہوتا ہے +

ایسی ہی۔ پی۔ لٹس کا انفلا میشن کسی خاص جگہ سے اکثر کسی خاص جانب کو

پھیلتا جاتا ہے مگر بعضہ نفع ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاروں طرف پھیل پڑتا ہے لیکن مرض اور صحیح جلد کے مابین ایک خط کھینچا ہوا انداز نظر آتا ہے کہہ مکہ انہ دو ٹونکیاں ہیں فرق ہوتا ہے۔ اس مرض کی سرخی میں ہی فرق ہے لیکن چون چون مرض پڑتا جاتا ہے وہ سرخی گہری ہوتی جاتی ہے۔ اور جس جگہ سے لہو لڑے شیو بکثرت ہوتا ہے وہاں ورم بھی یادہ ہوتا ہے اور دبا کے تو دھنڑا انگلیوں کے نشان پڑ جاتے ہیں جسم کا جو نسا حصہ کچی ہوا اور سخت ہوتا ہے جیسے سر کی جلد وہاں نسبت استقام کے جو ڈھیلہ ہوتا ہے درد کی شدت بہت ہوتی ہے +

بیماری جب خفیف ہوتی ہے تب انفلامیشن رفع ہو جاتا ہے اور اس جگہ پر سے بہوسی کے طور پر چمکے چڑ جاتے ہیں لیکن اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرض کے مقام کی جلد پر مختلف متعدد کے چالے پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں زرومیائل رطوبت ہوتی ہے اور مرض جب شدید ہوتا ہے تب خوب ابھرے ہوئے بڑے بڑے چالے نکل آتے ہیں۔ جب یہ چالے ٹوٹ جاتے ہیں اور ان سے رطوبت خارج ہو جاتی ہے تب اینرکمرنڈ بندہ جاتے ہیں جبکہ چڑ جانے سے وہاں پر زخم رہ جاتے ہیں۔ لگا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان چالوں میں سپ پڑ جاتی ہے اور بڑے بڑے زخم یادہ جگہ مر دار پڑ جاتی ہے مختلف حالتوں میں اسی۔ سی۔ پی۔ لکس کے انفلامیشن کی جگہ اور حدود میں اختلاف ہوتا ہے مثلاً ای۔ ڈیو۔ یا۔ تھکٹ۔ اری۔ سی۔ پی۔ لکس سر اور چہرہ پر اکثر ہوا کرتا ہے اور اکثر ناک کان منہ کی باچوں نیچے کے پوٹے یا کال سے شروع ہوتا ہے اور استعد جلد پہنچتا ہے کہ چہرہ سر کی جلد اور گردن اس بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے اور سوجن استعد بڑھ جاتی ہے کہ بیمار کا چہرہ بگڑ جاتا آنکھیں پوٹوں سے ڈبک جاتی ہیں۔ ناک کے ہتھے بند ہو جاتے ہیں اور بیمار کی سہاعت میں ہی فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ انفلامیشن منہ اور حلق کے اندر بلکہ لے۔ زنگس تک بھی پہنچا سکتا ہے اور مرض منہ۔ جانیٹس

کے ہو جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے +

علامات عامہ - اس مرض میں تباہی کا قندہ - ہے کہ چون چون علامات خاصہ کو ترقی ہوتی جاتی ہے تو ان علامات عامہ بھی بڑھتی جاتی ہیں - اور یہ کہ اس مرض میں بخار کی علامتیں اکثر پیدا ہوتی ہیں چنانچہ نبض پُر اور طاقتور ہوتی ہے اور عرصہ ایک منٹ میں ۱۰۰ یا ۱۲۰ دفعہ چلتی ہے اور مرض کے شروع میں جسم کی حرارت جلد بڑھتی جاتی ہے اس قدر کہ جس درجہ حرارت ہو تو اس سے تین اسی شام کو ۱۰۴ بلکہ ۱۰۵ درجہ تک چڑھ جاتی ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرض کے تیسرے دن حرارت درجہ اتم کو پہنچ جاتی ہے لیکن حرارت تب ہی کم ہو جاتی ہے کہ جب تک غذا میٹھن ترقی نہ ہو جاتی ہو اور ۱۰۶ بلکہ ۱۰۸ درجہ تک حرارت بڑھ جاسکتی ہے - جب یہ مرض رو بہ تخفیف لایا جاتا ہے تب مرض کے پانچویں یا چھٹے دن بخار کو تخفیف ہو جاتی ہے اور حرارت بھی کم ہوتی جاتی ہے اور ۱۲ سے ۱۴ گھنٹہ کے اندر صحت کے درجہ پر آ جاتی ہے - اور پر کی علامات خاصہ کم آسوت پائی جاتی ہیں کہ جب یہ مرض چہرہ پر پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب یہ بیماری جسم کے کسی ذریعہ میں ظاہر ہوتی ہے تب ان علامات مذکورہ بالا میں بہت اختلاف پڑ جاتے ہیں + اس مرض میں فارورہ شرح آتا ہے اور اس میں یو - ری ایک زیادتی اور کھو - رائیڈ قسم کے مرکبات کی کمی ہوتی ہے اور پیشاب کے اندر البیو - من بھی اکثر پایا جاتا ہے + جب یہ مرض چہرہ پر پیدا ہوتا ہے تب کمال بے چینی ہوتی ہے اور اکثر خاصکرات کی موت ہڈیاں بھی ہلکتی ہے - زبان ہمیشہ خشک اور بہوری ہوتی ہے اور لبون اور موٹون کے کنارے پر سار - ڈیز پیدا ہو جاتی ہے نبض نہایت میرل اور کمزور ہو جاتی ہے اور دیگر علامات ردیہ پیدا ہو جاتی ہیں - شکم میں نفخ ہو جاتا ہے اور پھکیان آنے لگتی ہیں +

عارضات - اس مرض میں سی - سی - برل یا اسپائی نل - مے - زن - جیٹیر

کے ہو جانے کا اندیشہ ہے اور برائے کئی - ٹیس اور گردن میں کن جش - چن یا انفلامیشن

ہی ہو جاسکتا ہے۔ اور اس بات کا ذکر کیا گیا ہو کہ اری۔ سی۔ پے۔ لئس کی بیماری حلق یا لارنکس تک بلکہ سی۔ آر۔س۔ ممبرین مین ہی پہنچا سکتی ہے *۔

اقسام۔ مرض کی شدت اور طریقہ دور اور بخارات کی شکون اور مرض کے خاص مقامات کے تغیرات کے بموجب اری۔ سی۔ پے۔ لئس کی بیماری کئی قسم میں منقسم کی گئی ہے چنانچہ اس مرض کے وائون یا چھانوں کی مقدار کے بموجب اس مرض کو مے۔ لئس۔ اری یا

فلک۔ ٹے۔ لئس۔ اری۔ سی۔ پے۔ لئس کہتے ہیں اور جب اس بیماری میں سوجن بہت ہوتی ہے تب اسکو اڈی۔ مے۔ لئس بولتے ہیں اور جب یہ مرض عمیق ریشون تک پہنچ جاتا ہے اور پیپ پڑ جاتی ہے تب اسکو فلک۔ مے۔ لئس۔ اری۔ سی۔ پے۔ لئس کہتے ہیں *۔ علاوہ اقسام مذکورہ بالا کے جسم کے جس حصہ پر یہ مرض پیدا ہوتا ہے اس بموجب ہی اسکا نام رکھتے ہیں مثلاً جب چہرہ پر ہو جاتا ہے تب اسکو فی شیل اری۔ سی۔ پے۔ لئس * جب فوطہ پر ہو جاتا ہے تب اسکو وٹل * جب چھانوں پر ہو جاتا ہے تب کیرول اور یہ بیماری شکم پر ظاہر ہو جاتی ہے تب اسکو ایڈا۔ مے۔ لئس بولتے ہیں *۔

اسباب۔ پری۔ ڈیو۔ لئس سبب و موی یا خاص مراح۔ جب یہ بیماری ایک دفعہ ہوتی ہے تب طبیعت اس میں دوسری دفعہ مبتلا ہونے کے لئے مایل رہتی ہے اور عالم شباب ہی اس مرض کا میلان طبعاً ہو سکتا ہے اور ان بیماریوں میں ہی یہ مرض ظاہر ہو سکتا ہے جن میں کمزوری لاحق ہوتی ہے مثلاً ڈراپ۔ سی کی بیماری اور خاص کر جب مرض ڈراپ۔ سی گردہ کی بیماری کے باعث پیدا ہوتا ہے *۔

اکسمائے ٹرنک۔ کاز لینے وہ اسباب جن سے میلان جن کو اشتعالک ہوتی ہے

وہ یہ ہیں چھوت۔ سردی زیادہ گرمی۔ دھوپ میں پہنا۔ بولن براؤ کا بند ہو جانا۔ ضرب و زخم۔ بعض دفعہ اس بیماری کی وبا شفا خانہ وغیرہ مقامات میں کہ جہاں لوگوں کا جمع ہوتا ہو

پہلیجاتی ہے *

پیراگ۔ نوکسٹس۔ اس بیماری میں ہمیشہ جانکا خطرہ ہوتا ہے ہوا سٹے
اسکا انجام نیک یا بد کہنے میں نہایت احتیاط چاہئے خاصکر جب یہ بیماری سر کی جلد یا
چہرہ پر پیدا ہو۔ حالات مفصلہ ذیل وہ ہیں جن میں ہمیشہ بیمار کے تلف ہو جانیکا اندیشہ
ہوتا ہے چنانچہ جب بیمار بہت کم عمر یا بہت زیادہ عمر کا ہوتا ہے۔ جب پر پھیری
کے سبب جسم کمزور ہو گیا ہو۔ جب کسی عضو اندرونی میں بیماری ہو خاصکر گردوں
میں اور ساتھ ساتھ سیکے استسقا بھی ہو۔ جب یہ بیماری بائی ہوتی ہے۔ جب اسمین
علامات روئیہ پیدا ہوں یا خون کے اندر کوئی زہر سرایت کر جاوے۔ جب ماعنی علامتیں
خاصکر مے۔ نن۔ جاتی۔ ٹرس کی ظاہر ہو جاوین۔ جب اس بیماری کا انفلامیشن حلق اور
لے۔ رنگس تک پہنچ جاوے۔ جب بخارات کے رنگ سیاہ یا ادوے ہو جاوین جب
یہ بیماری بہت عمیق ہو اور پیپ ٹر جاوے یا مٹر اند شروع ہو جاوے۔ جب بیڑنی
انفلامیشن کی علامتیں فقہاً مغفود ہو جاوین اور انکے کم ہو جاتے ہی ایسی علامتیں
ظاہر ہو جاوین جن سے ثابت ہو کہ مرض باہر سے اندر کی طرف انتقال کر گیا ہے اور ایجنز
کوئی اندرونی عضو مبتلا ہو گیا ہے * یا جب ابتدا کی جگہ۔ کو نہ چوڑ کر اور بھی پھیلتا جاتا
ہو یا جب چہلے ادوے ہو جاتے ہیں۔ نبض سریل اور بے قاعدہ اور مریض مدغال اور
بیہوش ہو جاتا ہے یا جب یہ بیماری دبائی ہوتی ہے یا جب بچوں یا غوطہ یوں کو
ہو جاتی ہے تب اسکا انجام بد ہوتا ہے *

علاج عامہ۔ ارمی۔ سی۔ پے۔ لس کی اکثر صورتیں ایسا علاج نہ کرنا چاہئے
جس سے ضعف پیدا ہو بلکہ مقویات سے اکثر فائدہ ہوتا ہے۔ پس مرض کے شروع ہونے
سے غذا مقوی مینی چاہئے اور پینے کو تبدیلات۔ اور شاید خمر کا بھی استعمال کرنا پڑے
بیمار کو آوزوں سے علیحدہ ایسے مکان میں رکھیں جہاں ہوا کی آمد و رفت کا اچھا

بند و بست ہو کر زور کی ہوا نہ آتی ہو اور حفظِ صحت کے فوائد سے خوب پانچر ہو نا چاہئے
 (دیکھو پوچھو) * اسی۔ سی۔ پی۔ لس کی ہر حالت میں نیکو سیلاب سے تنقید شکم کرنا
 چاہئے۔ بیماری کے روکنے کیلئے نیکو سیلاب کو۔ مائٹ اور پانچر۔ نا بہت مفید ہیں
 لیکن نیکو سیلاب اسٹیل سے عمدہ دوا ہے چنانچہ م سے۔ پانچر کے ایک تین تین یا
 چار چار گھنٹہ بعد پانا چاہئے۔ نیند لانے کے لئے اور درمیان وقت کے ایک دو گھنٹے میں
 کلو۔ دل یا برو۔ مائٹ ان پوٹ۔ مائیم کا بھی احتمال اکثر کرنا پڑتا ہے *

علاجِ خاصہ۔ ایسا کرین کو دھنکی ہوئی روئی پر پید او ایسا مائٹ ان رنگ
 چٹک کر بیماری کے مقام پر پہنچا دیں۔ مرض چہرہ پر ہو تو اسی روئی کا کٹنا کر مبینہ
 اور ناک اور آنکھوں کے لئے سوراخ ہوں چہرہ پر رہ دیں۔ بعض مرض کے مقام پر
 کلو۔ ڈی۔ ان یا فلکٹ۔ رسی۔ بل کا۔ ڈی۔ ان لگاتے ہیں۔ بعض مائٹ سیٹ ان سکوا
 خشک یا اسکا عرق لگانا بتلاتے ہیں۔ بعض اکثر کٹیلے۔ نی میٹ ان بلا۔ ڈونام
 کی تفریق کرتے ہیں۔ بعض طبیب ہموزن اکثر کٹ ان بلا۔ ڈونام اور گکائی سی ریزر
 کالپ کر دیتے ہیں اور کبھی گکائی۔ سی۔ رین ان کار۔ با۔ لاک اسٹ بھی لگاتے
 ہیں۔ درو بہت ہو تو پوست کی تحمید کر کے مقام مرض کو پہنچ کر دھنکی ہوئی روئی
 جادین۔ مرض کی حد سے ذرہ تفادیت صحیح جلد پر مائٹ سیٹ ان سلور رگر دیتے
 ہیں تاکہ بیماری آگے کو بڑھنے نہ پاوے۔ اس سے کبھی فائدہ ہوتا ہے اور کبھی
 نہیں پیپ پڑ جادے تو نشتر سے اچھی طرح کبولین اور سو جن ویس ہو تو نشتر سے پچھنے
 لگا دیں + عارضات کا علاج حسب مناسب کرنا چاہئے۔ اور جب گکائی۔ لیس سو جاتا
 ہے تب میو۔ کس ممبرین کو پانچر دینا پڑتا ہے بلکہ لے۔ رنگا۔ ٹی یا ٹریے۔ کیا۔ ٹی
 ہی کرنی پڑتی ہے *

علاجِ حفظِ ماقدم۔ لینے جب بارس بیماری کی کسی جگہ پہنچتی ہو تب

حالت میں ایسی ظاہر ہوتی ہیں جو ہر قسم کے بخار کی بیماریوں میں عام ہوتی ہیں وہ علامتیں یہ ہیں کہ۔

اول بڑھ جانا جسم کی حرارت کا۔ یہ ایک علامت ہے جو ہر قسم کے بخار میں ضرور پائی جاتی ہے بشرطے کہ کچھ عرصہ تک قائم رہے۔ بدن زیادہ گرم ہے یا نہیں یہ بات اگرچہ مریض کے جسم کو چھونے یا مریض کو غود گرم معلوم ہونے سے دریافت ہو سکتی ہے مگر بجز آگ تھر۔ ما۔ میٹر کے لگانے کے ایسی نہیں دریافت ہو سکتی ہے جس سے اطمینان ہو چنانچہ آگ مذکور کے لگانے سے درجہ حرارت کا ۱۰۰ یا ۱۰۱ یا ۱۰۲ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے مگر اکثر ۱۰۱ یا ۱۰۲ سے زیادہ نہیں ہوتا جب حرارت کا درجہ ۱۰۱ سے کم ہوتا ہے تب اس بخار کو خفیف کہتے ہیں اور جب ۱۰۳ تک ہوتا ہے تب متوسط بخار کہا جاتا ہے اور جب ۱۰۵ ہوتا ہے تب اس کو تیز بخار کہتے ہیں اور جب حرارت کا درجہ ۱۰۶ سے اوپر ہوتا ہے تب اس حالت کو اصطلاح میں مائی۔ پر۔ پائی۔ رکسیا بولتے ہیں۔ یہ حالت میں بیمار جب تلف ہو جاتا ہے تو بعد موت کے بھی کچھ عرصہ تک حرارت بڑھتی جاتی ہے۔

تغییرات جسم کی رطوبتوں میں بخار کی حالت میں۔ بخار کی حالت میں جسم کی رطوبتیں کم پیدا ہوتی ہیں اور جسم کی بافت کثرت سے ذائل ہونے لگتی ہے جس سبب جسم کی رطوبتیں کم پیدا ہوتی ہیں اور کم ہی خارج بھی ہوتی ہیں اور انکی خاصیت بھی بدل جاتی ہے جس سبب بعض چند بیماریاں علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں چنانچہ جلد خشک سے کرکھوری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ علامتیں بعض دفعہ نہیں بھی پیدا ہوتی ہیں بلکہ بعض اوقات تھوڑا بہت پسینہ آتا ہے نہیں بلکہ زیادہ پسینہ بھی آجاتا ہے +

بخار کے سبب شکم میں خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں مثلاً زبان میلی جاتی ہے۔ منہ خشک چھپچھا اور دہن کا ذائقہ بُرا ہو جاتا ہے۔ پیاس شدت ہوتی ہے مگر ہوک نہیں لگتی نفس سے بدبو آتی ہے اور تبص ہو جاتا ہے غیاں اور تھے بھی اکثر ہوتی ہے +

تغییرات پیشاب میں۔ چنانچہ پیشاب کم آتا ہے بہت ترش اور سبز رنگ کا ہوتا ہے
 بو اسکی تیز اور وہ وزنی ہوتا ہے۔ اس میں یو۔ رک اسٹڈ اور یو۔ ریڈاکٹر ہوتا ہے اور جب
 کچھ عرصہ تک ٹھہرا رہتا ہے تب اس برتن میں مرکبات از قسم یو۔ ریڈاکٹر اور یو۔ رک اسٹڈ
 شیبہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ اس پیشاب میں مٹی۔ پیو۔ رک اسٹڈ اور مرکبات
 از قسم سلفٹ اور فاس۔ فٹ اور پوٹاش بھی زیادہ ہو جاتے ہیں مگر مرکبات از قسم
 کلور۔ رائیڈ اکثر کم ہو جاتے ہیں یا بعض دفعہ بالکل نہیں ہوتے۔ اور مرکبات سو۔ ٹو کے
 بھی نسبت صحت کے کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ پیشاب کے غیر معمولی اجزاء بھی ہو سکتے ہیں
 اور بخاروں میں پیشاب کے اندر کی مقدار البیو۔ من بھی اکثر ہوا کرتا ہے ۴

ترابیان لطف نام و مومی کی۔ چنانچہ نبض اس قدر سہل ہو جاتی ہے کہ عرصہ ایک
 منٹ میں ۴۰ یا ۵۰ یا ۶۰ تک چلنے لگتی ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ چون جو جسم کی حرارت
 تیز ہوتی جاتی ہے تو نبض بھی جلد چلنے لگتی ہے۔ مثلاً یہ دریافت ہوا ہے کہ
 جب جسم کی حرارت ایک درجہ زیادہ ہو جاتی ہے تب نبض کے ضربان ایک منٹ کے اندر
 اڑھ گونہ بڑھ جاتی ہے مگر ایسے اعتدال نہیں کیا جاسکتا ۵ اگرچہ مختلف حالتوں میں نبض کی حالت
 میں اختلاف ہوتا ہے پہر بھی بخار کی نبض پر تیز اور سخت ہوتی ہے۔ لیکن بخار جب
 عرصہ کا ہو جاتا ہے یا سخت ہوتا ہے تب دل کی حرکت پست ہو جانے کے سبب سے
 نبض کمزور اور بے قاعدہ چلنے لگتی ہے بلکہ ضربان میں اس کے وقفہ پایا جاتا ہے ۶ بخار
 کی حالت میں خون کے اجزاء میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلاً اسکے کہاں اجزاء کم ہو جاتے
 ہیں اور اسکے سیرم کی کھاریت بھی کم ہو جاتی ہے جو کچھ عرصہ کے البیو۔ من اور خون کے
 نسخہ کیسے بھی کم ہو جاتے ہیں اور سفید کیسوں کی تعداد اکثر بڑھ جاتی ہے اور بعض بخاروں
 میں خون ریشہ اور رنگت اسکی سیاہی مل ہو جاتی ہے ۷

حرکات تنفس میں خلل واقع ہو جانا۔ بخار کی حالت میں دم جلد پیدا جاتا ہے

لیکن حرارت کی کمی یا بیشی تنفس کے حرکتوں کا بڑھ جانا یا گھٹ جانا منہر نہیں ہے ۔

نظام عصبی میں خرابی پیدا ہو جاتی۔ بخار کی حالت میں ایسی حالتیں
ہیں کہ شدید بہہ جاتی ہیں جن کا تسلسل احصاب سے ہوتا ہے۔ مثلاً بخار کے ابتدا و درمیان پیری
یا لرزہ ہوتا ہے۔ عضلات درو کرنے لگتے ہیں۔ اعضا شکنی ہوتی ہے۔ بیمار کمزور و تھکا ہوا
اور کاروبار سے اسکو نفرت ہو جاتی ہے۔ بعض بیمار و نحیح جسم کے خاص خاص مقام پر
درو محدود ہوتا ہے مگر دروسر دروران سر اکشر ہوا کرتا ہے۔ بے چینی اور بے خوابی اور
رات کی وقت کی سقدردنیاں بھی ہو جاتا ہے۔ بعض حالتوں میں نظام عصبی میں اسقدر
فیور بر پا ہو جاتا ہے کہ بیمار نہایت بڑھل ہو جاتا ہے۔ شدت کا ہدیان یا بیمار ہستہ آستہ
لکھنے لگتا ہے بخود دگی یا بیہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ عضلات میں ایسی خرابیاں یا جاتی
ہیں کہ بدن کانپنے لگتا ہے یا صرف ہاتھوں کی انگلیاں کانپنے لگتی ہیں رسبیل۔ ٹن
ٹن۔ ڈوسی۔ غم) یا بیمار اپنی انگلیوں سے بستر کے کونو چتا رہتا ہے یا اسکو تشنج ہو جاتا ہے
یا دیگر عصبی علامات خاص خاص قسم کی پیدا ہو جاتی ہیں۔ علامات عامہ کا حال یہ ہے
کہ بخار میں چونکہ جسم کی بافت ایل ہونے لگتی ہے اور چونکہ غذا نہیں کھائی جاتی ہے تاکہ
اسکا بدل ہو جاوے اور چونکہ غذا کھائی بھی جاتی ہے اسکا بدل بالتحیل نہیں ہونے
پاتا ہے اسواسطے بیمار لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے اور انے۔ میا کی عملاتیں بھی پیدا ہو جاتی
ہیں۔ بخار کے اقسام کئی ہوتے ہیں اور یہ قسمیں کئی باتوں پر منحصر ہیں۔ مثلاً

بخار کے دور اور اسکی عملاتوں کے بڑھنے گھٹنے پر۔ چنانچہ ایک قسم
کا بخار وہ ہوتا ہے جسکو اصطلاح میں کن۔ ٹے۔ نیوڈنسیو کہتے ہیں اس قسم کے بخار دن
کا دور کی قدر باقاعدہ ہوتا ہے اور دن کے مختلف اوقات میں حرارت میں بھی چند ان
تغیر واقع نہیں ہوتا چنانچہ اس قسم کے بخار کی مثال ٹامی۔ فس اور ٹامی۔ فائیڈ اور چھپک
اور اسکار۔ لے۔ ٹے۔ نامادغیرہ میں پائی جاتی ہے کیونکہ ان بخار دن میں حرارت

ایک خاص درجہ تک جلد بڑھ جاتی ہے اور تب کچھ عرصہ تک اسی درجہ تک قائم رہتی ہے
انجینین بخار اترنے لگتا ہے *۔

دوسری قسم کے بخار وہ ہوتے ہیں جنکو ری۔ می ٹرنٹ فیور کہتے ہیں ایسا ہوتا
ہے کہ کسی خاص وقت پر بخار کی علامتوں کو کثیف تر خفیف ہو جاتی ہے اور پھر کل علامتیں بخار
کی شدت بگڑ جاتی ہیں ری۔ می۔ رشن کی وقت حرارت صحت کی نسبت ہی کم ہو جاسکتی
ہے۔ یہ باتیں ان بخاروں میں پائی جاتی ہیں جو مے۔ لے۔ ریازہر کے سبب پیدا ہوتی
ہیں اور پاکٹ ٹائک فیور (یعنی تپ و ق) میں بھی ری۔ می۔ رشن پایا جاتا ہے *۔
تیسری قسم کے بخار وہ ہیں جنکو انٹر۔ مے ٹرنٹ فیور کہتے ہیں۔ ان میں ایسا ہوتا ہے
کہ کچھ عرصہ تک بخار بالکل اتر جاتا ہے اور وقت بمقرر پھر چڑھ جاتا ہے مثلاً تپ لرزہ
میں یہ بات پائی جاتی ہے *۔

چوتھی قسم کے بخار وہ ہوتے ہیں جنکو ری۔ لپ۔ سٹاکٹ فیور بولتے ہیں۔ ان میں
ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ تک بخار مدام چڑھا رہتا ہے اور تب ترک کرکے نظر ہر منع ہو جاتا ہے
مگر چند روز بعد پھر چڑھ جاتا ہے۔ یہ بات کئی دفعہ ہوتی رہتی ہے *۔
پانچویں قسم کا بخار وہ ہوتا ہے جسکو م۔ فلا۔ مے۔ ٹری کہتے ہیں۔ اس قسم کا بخار
خاص مقام کے ایکویٹ انفلمیشن میں ہوا کرتا ہے۔ مگر یہ کچھ ضرور نہیں کہ ہر ایک انفلمیشن
کی بیماری میں بخار ہو جاوے اور یہ بھی کچھ ضرور نہیں ہے کہ ہر جب انفلمیشن کے
وسعت اور شدت کے بخار کی شدت ہی ایسی ہی ہو اس قسم کا بخار نسبت اور کے بعض
بعض نافت کے انفلمیشن میں زیادہ شدید ہو جاتا ہے اور جوان اور دوسری مزاج
کے آدمیوں میں زیادہ شدت کا ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے بخار کی علامتیں اچھی طرح
ظاہر ہوتی ہیں *۔

چھٹی قسم کے بخار وہ ہوتے ہیں جنکو لو فیور کہتے ہیں۔ ان میں بخار کی کل علامات

رودی شتم کی ظاہر ہوتی ہیں +

بخار کی ماہیت - اس بات میں نیک بحث چلی آتی ہے کہ بخار کیا شے ہے مگر بخار کے پیدا ہونے کی نسبت یہ تو صاف ظاہر ہے کہ جب کوئی زہر جسم کے اندر یا تو باہر سے داخل ہو جاتا ہے یا خود جسم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تب بخار ہو جاتا ہے یا کسی خاص عضو کی بیماری کے سبب سے پیدا ہو جاتا ہے بیماری مذکور انفلوینزا کے قسم کی ہوتی ہے +

ماہیت - بخار کے پیدا ہونے کی نسبت بعض طبیب کی یہ رائے ہے کہ جب ایک قسم کے گرم (ریک - ٹریا) باہر سے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ان کے ہونے سے جسم کے بافتوں میں تغیرات پیدا ہو کر ٹرانڈ شروع ہو جاتی ہے جس سبب سے نظام عصبی کی حس و حرکت میں فرق پڑ جاتا ہے اور بخار ہو جاتا ہے + ایک ڈر رائے کو بہت ہی غلبہ ہے یعنی وہ یہ ہے کہ نیو - موگیشن - ٹرک یا سم - پے - تے - ٹکٹ نزد یا بعض بعض عصبی مرکزوں کے وسیلہ سے بخار پیدا ہو جاتا ہے - یعنی سیدھا یا تو انہیں اعصاب کے ذریعہ بخار پیدا ہوتا ہے یا ان پر کسی زہر کے اثر کے ہونے سے تب ہو جاتی ہے لیکن بعض محققین عصبی تعلق کو ہدین مانتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جس سبب سے بخار پیدا ہوتا ہے اُس کا سیدھا اثر جسم کے خون اور بافتوں پر ہوتا ہے +

پیراگ - نوئسٹس - بخار کا انجام نیک یا بد کہنا اس سبب پر منحصر ہے جس سے وہ بخار پیدا ہوا ہو لیکن عرف بخار کی حالت کے انجام نیک یا بد کہنے کے لئے ان چند باتوں کو مد نظر رکھنا چاہئے + مثلاً بخار کی شدت جسم کی حرارت حقیقتہً زیادہ ہوگی اُس بخار کا انجام بھی اس قدر بد ہوگا اور حرارت اگر ۱۰۶ یا ۱۰۷ درجہ سے بڑھ جاوے تو اُس بخار کا پیراگ - نوئسٹس بہت ہی خراب ہوتا ہے + اگرچہ ایسی حالت میں بھی مناسب علاج سے بیمار جان بڑھ جاتے ہیں + بخار کے قسم پر بھی نیک یا بد انجام

منحصر ہے مثلاً جب بخار ردی متہم کا ہوتا ہے اور خاصکر جب نظام عصبی کو اس سے بہت ہی صدمہ پہنچتا ہے تب بیمار کی جان کا بہت خطرہ ہوتا ہے *۔

معمولی فضلات جب کم خارج ہوتے ہیں اور خاصکر جب بحالت ین جسم کی حرارت بھی بہت زیادہ ہو تب اندیشہ ہے * عملادہ ایزن جو ان طامتوں اور خنکائیں موی ہوتا ہے انہیں شدت کا بخار ہوتا ہے * بعض بیماریاں ایسی بھی ہیں جن میں بخار اندیشناک ہو جاتا ہے مثلاً نفرس اور جب بخار کیمالت میں کوئی عضو اندرونی مبتلا ہو جاتا ہے جیسے گردہ یا دل یا شش تب بھی یہ بات اندیشہ کی ہے *۔

علاج۔ ذیل میں بخار کیمالت کے علاج کے چند اصول بتائے جاتے ہیں مگر یاد رہے کہ یہ اصول صرف بخار کیمالت کے لئے ہیں کیونکہ جب بخار کیمالت میں کوئی اور بیماری عارض ہو جاوے تب اسکا علاج حسب مناسب کرنا چاہئے۔ پس اول مطلب علاج کا یہ ہونا چاہئے جس سے جسم کی حرارت کم ہو جاوے چنانچہ جسم پر سردی لگانا اُصول میں کہ جب جسم کی حرارت بہت ہی بڑھ جاوے * اس مطلب کے حاصل کرنے کی ایک عمدہ ترکیب جسم پر سردی لگانے کی ہے جسم پر جب سردی لگائی جاتی ہے تب جلد کے مسامات کے ذریعہ اندر کی گرمی خارج ہو جاتی ہے اور اثر اسکا نظام عصبی پر بھی ہوتا ہے عملادہ ایزن اسطور پر سردی لگانے سے جسم کی بافت بھی ایل ہونے نہیں پاتی جسم پر کئی طور سے سردی لگائی جاسکتی ہے مثلاً گرم یا سرد پانی میں اسفنج تر کر کے بدن کو پونچھ دینا۔ واٹر۔ بڈین سرد پانی بہہ کر کپسہ بیمار کو لٹا دینا * بیمار کو آب گرم میں بٹھا کر اس کے سر پر آب سرد چھڑکنا یا اسکا ٹراٹا چوڑنا * بھیگی ہوئی چادر میں بخار کے بیمار کو لپیٹ دینا جسکی ترکیب یہ ہے کہ ایک چادر کو گرم یا سرد پانی میں تر کر کے خوب طرح پھوڑ ڈالیں۔ اب پیلا کر اُس میں مریض کو لپیٹ ڈالیں بعد ازاں اس چادر پر ایک کنبل لپیٹ کر تین یا چار کنبل سپر اور لپیٹ دیں

اب مریض کو کسی کروٹ پر نصف گھنٹہ یا پورے ایک گھنٹہ تک لیٹے رہنا چاہئے۔ اس ترکیب سے اگرچہ پسینہ اکثر بہت کثرت سے نہیں آتا مگر بیمار کے پیشاب میں یو۔ریا اور نمک اور پانی کی مقدار کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور جب بیمار چار گھنٹہ تک برابر لیٹا رہتا ہے تب اجزاء مذکورہ بالا کی مقدار بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ علاوہ ان ترکیبوں کے جنکا ذکر اوپر کیا گیا ہے جسم پر سردی لگانے کی اور بھی ترکیبیں ہیں مثلاً سرد یا شیر گرم پانی میں مریض کو بٹھلانا، برف کی پوٹلی جسم کے مختلف مقاموں پر لگانا، سر پر برف کا لگانا، ریچم کے اندر برف کے پانی کی پچکاری کرنی۔ لیکن ان کُل ترکیبوں کی اکثر ضرورت نہیں پڑتی۔ صرف بدن کو اسفنج بھگو کر پونچھ دینا یا کپڑے کی گدی یا ن ترکر کے سینہ اور شکم پر رکھ دینا کافی ہے۔ جب جسم کی حرارت بہت تیز ہو مگر عرصہ تک قائم رہے تب ۶۰ یا ۶۵ درجہ کا سرد پانی ہی لگانا کافی ہے۔ لیکن ان صورتوں میں جسم کے باہر مری لگانے سے نہایت فائدہ ہوتا ہے جن میں نہایت جلد بڑھتی ہو یا نہایت شدید ہو کر اسی شدید درجہ پر عرصہ تک قائم رہے۔

بخار کی حالت میں ادویات کا استعمال اس غرض سے کیا جاتا ہے کہ جسم کی حرارت کم ہو جائے لیکن جن ادویات کا استعمال کرتے ہیں ان سے صرف حرارت ہی کم نہیں ہوتی بلکہ بعض ہی گہٹ جاتی ہے جیسے اکو۔ نائٹ اور ڈی۔ جی۔ ٹے۔ ٹیس۔ اور مار۔ ٹار۔ ٹیک۔ اور انٹے۔ پائی۔ ریمن۔ بعض طبیب اکو۔ نائٹ کا استعمال اس طور سے کرتے ہیں کہ ایک یا دو نمک کی مقدار میں آدہ آدہ گھنٹہ بعد پلاتے ہیں اور بعض پانچ پانچ منٹ بعد دینا بتلاتے ہیں جب تک ۲۰ یا ۳۰ قطرے تک نہ پی جائیں۔

بخار کے علاج میں دوسری بات طبیب کو یہ دیکھنی چاہئے کہ بواہ براز کا کیا حال ہے۔ بعض طبیب اس امر میں نہایت کوشش کرتے ہیں کہ پیشاب پاخانہ اور پسینہ خوب بھلے آجائے تاکہ جو کوئی خاص نہ ہو جس سے وہ بخار پیدا ہو اور دیکھو بخار

کی ماہیت) وہ زہر اور وہ ردی مادہ بھی جسم سے خارج ہو جاوے جو اس بخار کے سبب سے جسم کی بافت کے ذریعہ ہو جانے سے پیدا ہوا ہو (ویکھو بخار کی ماہیت) لیکن یہ طریقہ بخار کے علاج کا اکثر کارگر نہ بن ہوتا الا اس قدر کہ جس سے اجابت ہلکا کر آجائے اور ہلکے مددات اور معوقات کا استعمال کر کے پیشاب اور پینہ بھی آجاوے۔ بخار جب شدت کا ہو تب اتنا رمرض میں فضلات مگر خاص کر پیشاب کا امتحان ضرور کرنا چاہئے تاکہ معلوم ہو جاوے کہ بافت کے ذریعہ ہو جانے سے جو ردی مادہ پیدا ہوا ہے وہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں۔ اگر نہ ہوتا ہو تو اس کے خارج کرنے کے لئے جلد تدارک کرنا چاہئے۔ بخار کی حالت میں جب ایسی علامتیں ظاہر ہو جائیں جن سے یہ معلوم ہو کہ اس ردی مادہ کے جمع ہو جانے سے زہر کی علامتیں پیدا ہو گئی ہیں تب البتہ اس قسم کا علاج ضرور کرنا چاہئے جس سے دفعیہ اس مادہ کا ہو جائے۔ چنانچہ وہ علاج مددات و معوقات و مسہلات سے کرنا چاہئے چنانچہ فیورکسپر (جسکا نسخہ آگے دیا جائیگا) یا فیور پاؤڈر (ویکھو نسخہ آگے) *

جی۔ بو۔ انڈیائی بھی نہایت عمدہ معرق دوا ہے۔ جب شدید بخار کی حالت میں پیشاب کم آتا ہے تب پیشاب پیدا کرنے کے لئے گردن کو تحریک دینی چاہئے۔ مثلاً مکرپنڈو۔ من۔ ٹے۔ رشن کرین یا السی کے پول۔ ٹکس یا رائی کی چٹائی لگائیں نہین تو خشک لٹکاس لگائیں مسہلات کے دینے میں احتیاط چاہئے کیونکہ ان سے بیمار کمزور ہو جاتا ہے لیکن اکثر دینا ہی پڑتا ہے اس صورت میں نمکیں حسب اتابون سے فائدہ ہوتا ہے۔ بخار کی حالت میں جب سست لگتا ہے تب دفعیہ انکوروکنا نہ چاہئے کیونکہ مسہال کے ذریعہ طبیعت اس ردی مادہ کو دفع کرتی ہے جو بخار میں جسم کے بافتوں کے ذریعہ ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہاں دست بہت زیادہ آدین تو انکوروکنا چاہئے ورنہ بیمار کمزور ہو جائیگا *

غذا بخار کی حالت میں۔ بخار کے بیمار کی غذا کے بارے میں نہایت احتیاط درکار ہے۔ چنانچہ ابتدا بخار میں غذا بہت تھوڑی اور ترقی دینی چاہئے جیسے آتش جو یا نسخہ و آب یا ساگو دانہ وغیرہ لیکن کچھ عرصہ بعد غذا تپکی اور سرخ البھم تھوڑی تھوڑی مقدار میں اور بار بار دینی چاہئے تاکہ بیمار کی طاقت قائم رہے جیسے شور یا انڈے وغیرہ *۔

خمر کا استعمال بخار کی حالت میں۔ اس بارے میں جو کچھ پہری رکے ہے باب حفظ صحت میں لکھا ہے چکا ہوں۔ وہ اس کے طور پر جیسے سنگھیا بعض حالتوں میں فائدہ مند ہوتا ہے اس طرح شراب بھی بعض صورتوں میں اگر دی جائے تو مضائقہ نہیں لیکن یاد رہے کہ بخار کی حالت میں شراب نہ دینی چاہئے اور یہ بھی یاد رہے کہ جنگلوں وخت زر سے محبت زیادہ ہوتی ہے وہی شراب کا استعمال ادنیٰ سی بات میں کیا کرتے ہیں۔ ان جب ویکہ میں کہ بخار کا مریض نہایت کمزور ہوتا جاتا ہے اور دل کی حرکت اور نبض بھی سست چلتی ہے تب خمر کا استعمال کر سکتے ہیں پیشاب اگر کم آتا ہو اور اس میں البیوض ہوں ہو تو خمر کا استعمال نہایت احتیاط سے کرنا چاہئے *۔

حفظ صحت کے قانون کا پابند ہونا بخار کی حالت میں۔ اس امر میں دو باتوں پر نہایت توجہ ضرور کرنی چاہئے ایک تو یہ کہ جس مکان میں بخار بیمار ہو وہ تازہ ہو اور ہوا کی آمد آجی ہو تاکہ اس گہر میں صاف ہوا آتی رہے اور کثیف خارج ہوتی رہے اور دوسری بات یہ کہ بیمار صاف دشتہار رہے بخار کے بیمار کو حرکت نہ کرنی چاہئے۔ بستر پر لیٹے رہنا اشتہادریات سے ہے بخار شدید اور اندیشناک ہو تو خوش و اقرار کو بھی لے سکے پاس نہ آنا چاہئے بلکہ بیمار کو چپ چاپ بستر پر لیٹے رہنا چاہئے کوئی بات بیمار سے ایسی نہ کرنی چاہئے جس سے اس کی طبیعت کو تحریک ہو۔

بخار کی حالت میں بہتری علامتیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جنکے ذریعہ کے لئے کوشش

ضرر کرنی چاہئے تاکہ ہرنجار کے علاج میں انکا ذکر بار بار نہ کرنا پڑے اس واسطے یہاں
کیا جاتا ہے * مثلاً بنجار کی کھالت میں پیاس بہت لگتی ہے تو مینو کا آب شور اہلا دین
یا کچے آبنون کو گرم راکھ میں رکھ کر جب پیلے ہو جاوین انکو پچ کر کر شربت بنا کر بیمار
کو ہلا دین یا اعلیٰ کا پتہ ہلا دین یا سرکہ کی سبجین یا آتش جو ہلا دین اور پانی میں
ٹائیڈ رو-کلو-رک اسٹیا سے ٹکٹ اسٹیا کر ہلا دین یا برف کے ٹکڑے
جو سنے کو دین *

تھے (رو-حے ٹنگ) اور پچکیان (ہے-کپ) بنجار کی کھالت
میں بعضہ فو تھے اور پچکیان بہت ستاتی ہیں۔ بعض طبیوں کا یہ قاعدہ ہے کہ چاہے
بنجار کیسا ہی ہوا بتد میں بیمار کو تھے کروا یا کرتے ہیں۔ لیکن یہ قاعدہ ہمیشہ راست نہیں
آتا ہن معدہ کی خرابی کے سبب طبیعت تھے کرنا چاہتی ہو تو سلفٹ اف زنک یا
اپے-لگت نہیں تو صرف نمک پانی میں گھول کر بیمار کو ہلا دین تاکہ تھے گھل کر آجائے اور
معدہ کی خرابی رفع ہو جاوے۔ تھے بکثرت ہوتی ہو تو غذا کے باب میں احتیاط کریں
مثلاً چونہ کا پانی ملا کر دو دو چار چار تولہ صرف دودھ ہلا دین یا تیس سگودانہ یا صرف
آتش جو کا استعمال کریں۔ بیمار کو برف کے ٹکڑے جو سنے کو دین یا برف میں سرور کر کے
سوڈا واٹر یا لے۔ مونڈ تھوڑا تھوڑا ہلا دین۔ نہ ملے تو مینو کا آب شور یا ہی ملا سکتے
ہیں * اور دوا کے طور پر بنجار کی کھالت میں تھے اور پچکیان روکنے کے لئے یہ نسخہ
ڈائیوٹ-ٹائیڈ رو-سیانک اسٹیا کا بہت خوب ہے۔

نسخہ کار-بو-نٹ اف سوڈا، مگرین اسکی ایک پڑیہ بنا دین اور، اگمین
مار-ٹارک اسٹیا کی ایک پیٹلگ بنا کر ان دونوں کو ایک ایک آونس پانی میں
علیحدہ علیحدہ حل کریں اب اسٹیا کے عرق میں دو بوند سے ہر بوند تک ڈائیوٹ
ٹائیڈ رو-سیانک اسٹیا چھوڑ کر دو نو عرقوں کو ہلا دین اور جوش کھالت میں

۴ نہیں تو برف کا پانی یا سوڈا-واٹر یا لے۔ مونڈ کا استعمال کریں

بیمار کو پلاوین۔ اس سے تھے اور ہچکچایاں دونوں اکثر رک جاتے ہیں۔ اینون دینی مناسب ہو تو اوپر کے اس فرسوی سنگ ٹورافٹ میں تین سے پانچ قطرہ تک لاؤ۔ نم یا ۱۰ سے ۲۰ قطرے تک لائیکوار مار۔ فیالاکر بیمار کو پلاوین۔ ان سے ہی تھے اور ہچکچایاں ہتھین تو قدرے پانی میں دو یا تین قطرے لائیکوار۔ اسٹرکینا پلا سکتے ہیں۔ اس سے اکثر نائدہ ہو جاتا ہے۔ اور معدہ کے مقام پر اسی کے پول۔ ٹین یا راسی کی ٹیپی یا لیٹر کا لگانا بھی نافع ہے۔ اور گاہے گاہے معدہ کی جگہ پر برف کی پوٹلی لگانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ بیمار کے مکان میں کسی قسم کی بدبو نہ ہو اور ہوا بنہ ہو۔ کیونکہ ان دونوں سبب سے ہی بعض اوقات تھے ہونے لگتی ہے۔ بخار کے بیمار کا شکم اکثر بگڑا رہتا ہے مگر قبض کی شکایت اکثر رہتی ہے تو مسہلات سے رفع کرنا چاہئے مثلاً نمک اور سنایا صرف سلٹ اف نگ۔ نے شیا ہمارا و عرق پودنیہ یا سڈ لٹنر یا ڈاکٹر کا جلابین۔ مگر بعض اوقات کیا۔ لوسل اور جلاب یا کپناؤڈ یا کابینی یا ڈاکٹر کا جلاب بھی دینا پڑتا ہے۔

قبض کے عوض بعض دفعہ بخار کے بیمار کو دست آنے لگتے ہیں ان دستوں کو بے سمجھے بوجھے روکنا نہ چاہئے کیونکہ ان دستوں کے ذریعہ طبیعت اس موزنی مادہ کو جسم سے خارج کرتی ہے جو بخار کی حالت میں جسم کے بافتوں کے زایل ہونے سے پیدا ہوتا ہے دیکھو بخار کی مابین (مان بہت آدین کہ بیمار کمزور ہو جاوے تو ہلکے قابضات سے ضرور روکنا چاہئے جیسے چاک یکسچر یا کپناؤڈ چاک پاؤڈر و تھ۔ اوپیم وغیرہ وغیرہ۔

واماعی مسلماتین بخار کی حالت میں۔ بخار جب شدت کا ہوتا ہے تب ماعی مسلماتین اکثر پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلاً بعض دفعہ شدت کا دروسر عرصہ تک ہوتا رہتا ہے تو سر یا گردن پر برف لگا دین ضرورت ہو تو بال کترین یا سٹرنڈا دین بعض دفعہ گردن پر خشک گلاس کا لگانا بھی فائدہ مند ہوتا ہے بیمار جوان اور طاقتور ہو تو کبھی سر

چند جو کین لگا دیں۔ اسی قسم کے علاج سوڈی لے۔ رینم (یعنی ہڈیاں) کو بہنی دے دیتا ہے اور بعضہ فہ گردن پر یا کپڈیوں پر پلٹر کے لگانے سے ہی ہڈیاں رفع ہو جاتا ہے۔ لیکن بخار کی روسی حالت میں جو بیمار آہستہ آہستہ برتا رہے، سین مفرحات دینا چاہئے جیسے ایمو۔ نیا خمر وغیرہ +

بخار کے بیمار کو بے خوابی اکثر ستاتی ہے۔ ایفون اور اسکا جو ہمار۔ دینا ہی دوا تین ہین جنہر اعما دیکھا جاسکتا ہے۔ انکو عرق کے ٹوپو دینا چاہئے جو ابی ہو کر ستا ہو سکے کپڈی کی ریگن تڑپتی ہوں یا ہڈیاں شدید ہو تو ایفون کے ہمراہ ٹار۔ ٹار اسٹک ملا کر دینا چاہئے۔ روسی حالت میں بیمار اگر بڑا نا ہو تو مفرحات کے ہمراہ ایفون دے سکتے ہیں۔ لیکن بخار کی مقصد ذیل حالتوں میں ایفون کا استعمال نخرنا چاہئے مثلاً بخار کے دور میں پہلے اگر مبتلا ہو گئے ہوں اور دم لینے میں بہت تکلیف ہو یا گردے مبتلا ہو گئے ہوں یا غشی طاری ہو نیوالی ہو یا پکی آنکھوں کی بہت سکڑی ہو تو ایفون کا استعمال نہ کرنا چاہئے + بعض طبیب ایفون کی جگہ نیند لانے کے لئے ہائیڈریٹ اف کلورل یا برو۔ مائیڈ اف پو۔ ٹا۔ سیٹم یا ۵۰ سے ۸۰ قطرے تک ٹنکھران ہن۔ ہن کا استعمال کرتے ہیں +

بخار کی حالت میں جب بے عینی بہت ہوتی ہے تو اسفنج پانی میں تر کر کے بدن کو پونچھ دیں یا بیمار کو گرم پانی میں بٹھا دیں۔ آواز کی برداشت نہ تو کا لون میں تھوڑی روسی۔ کہہ دیں + غشی یا بیہوشی (کو۔ ما) طاری ہو نیوالی ہو تو سر پر کپڈی وال سے ہنڈا پانی لگا دیں مائی کی پٹی یا پلٹر گردن اور سینہ اور ہنڈیوں پر لگا دیں اور مفرحات پلاڈر بیہوشی خایت درجہ کی ہو تو سر کو منڈا کر اسپر پلٹر لگا دیں + یا دوسرے کچن عصی اور دماغی عساتوں کا ذکر اور یہاں سے جسم میں موزی مادہ کے ہونے سے بعضہ فہ پیدا ہو جاتی ہیں پس اس بات کو نہ بھولیں کہ جن اعضا کے قلیحہ وہ مادہ جسم سے طرح

ہو سکتا ہے، انکا درمیان رکبین کہ وہ اپنا کام لپچے طور پر کرتے ہیں یا نہیں مثلاً گردے اور رودے اور جگر وغیرہ *
 واضح ہو کہ اکثر بخاروں میں علامات روتہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ پس اسکی حالت میں خوراک

اغذیہ مقوی کا استعمال جیسے شوربانڈے وغیرہ توڑتی توڑتی ہی متعدد میں بار بار کھانا چاہئے اور ساتھ انکے مفرحات (اسٹے میو۔ لٹ) اور مقویات (ٹائٹلک) کا استعمال بھی کرتا ضرور ہے جیسے میو۔ ٹائٹلک۔ شش۔ ان۔ بارک اور کوئین اور معدنی تیزاب اور سیلفور۔ رک یا کلو۔ رک ایہہ اور کلو۔ ر۔ فارم اور کافور اور جسم کے مختلف حصوں پر رانی کی پٹی لگا دیں۔ ضعف بہت ہو گیا ہو تو فاس۔ فورس کا استعمال فائدہ مند ہے۔ ضعف اور بیہوشی اس درجہ ہو گئی ہو کہ بیمار نگل نہیں سکتا تو ریکٹم کے اندر دوا اور غذا کی پچکاری کریں * مثلاً کیمکالت کو نہ ہو لین پیشاب سے پُر ہو تو سلائی سے نکال دیا کریں *

شدید بخاروں کے دور میں اندرونی اعضا اکثر مبتلا ہو جایا کرتے ہیں خاصکر شش بیمار کے چت لیٹے رہنے کے سبب خون سے پُر ہو جاتے ہیں (کن۔ جش۔ چن) یا امین انفلامیشن ہو جا سکتا ہے۔ کروٹین بیمار کی بدلدیا کریں اور سر کو بہت نیچا نہ رکبین اور ایسی دوا دیں جن سے کہانسی ہو اور بلغم خارج ہوتا رہے تاکہ ہوا کی نالیان بلغم سے پُر نہ ہوں پاویں اور گاہے گاہے بیمار کو زور زور سے دم لینا کہیں تاکہ پیپٹھے کے پینڈے میں ہوا پہنچتی رہے اور وہ سُکھنے نہ پاویں بڈ سور کا خیال رکبین کیونکہ اس قسم کے بخاروں میں برکب لیٹے رہنے کے سبب زخم چڑ جایا کرتے ہیں۔ بیمار کو ایسے بستر پر نہ لٹا دیں جو بہت غلام اور گدگدا ہو جو حصہ جسم کا بستر پر ہمیشہ لگا رہتا ہو اسکو جھٹک کر تے رہیں اور خشک اور صاف رکبین کروٹین ہمیشہ بدلدیا کریں اور انکے نیچے گدیاں کہہ دیا کریں ان مقاموں پر ذرا بھی سرخی کے آثار پیدا ہوں تو بیمار کو ہوا یا پانی کے بسترے

پرٹکس وین اور اسپرٹ اف وائٹن خالص یا پانی ملا کر پینرنگا وین یا کسائیڈ اف زنک
 انہی چھڑک وین یا سوپ پلاسٹر چھڑکے پر بچھا کر لگا دین + بخار کا بیمار جب رو بصحت لاتا
 ہے تب اسکی غذا اور دوا کا عمدہ بندوبست کرنا چاہئے اور صفائی کی طرف بھی دھیان
 رکھنا چاہئے چنانچہ مقویات اور ادویات مضمک استعمال کریں اور ایسی حالت میں تبدیل
 آب دھو اسے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے +

اقسام بخار وین کے - وضع ہو کر کھل بخار وین کو دو حصہ میں تقسیم کیا ہے ایک
 غیر متعدی یعنی جنکی چھوت ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی - دوم متعدی جنکی چھوت کا
 اثر دوسرے پر ہو جا یا کرتا ہے +

اول بخار غیر متعدی

جو اینین سے خفیف قسم کا ہے یعنی فیری - کیو - لادہ تو ایک ادنی باعث سے پیدا
 ہو سکتا ہے مثلاً بدھمی قبضیت وغیرہ لیکن انٹر - مے - ٹنٹ - یہی ٹنٹ اوریا - لو فیور
 ہمیشہ - لے - ریا ہوا کے باعث پیدا ہوتے ہیں ان تینوں میں چند ان فرق نہیں ہے
 ان اتنی بات ضرور ہے کہ جب مقدار مے - لے - ریا ہوا کی جسم کے اندر بہت ہی تھوڑی
 سرایت کر جاتی ہے تب انسان کو دوسرے سے دوسرے یا دیر دیر بعد بخار ہو جا یا کرتا ہے
 لیکن جب مقدار اس ہوا کی زیادہ ہوتی ہے تب بغیر انٹر - مے - ٹنٹ فیور کے
 ری - مے - ٹنٹ فیور ہو جاتا ہے جس میں یوم راحت نہیں ہوتا بلکہ تھوڑے عرصہ کے
 لئے بخار کی چند علامتوں کو قدرے تخفیف ہو جاتی ہے اور ہوا نہ کورہ کی مقدار جب
 اس سے پی زیادہ ہوتی ہے تب نو یوم راحت اور نہ تخفیف ہوتی ہے بلکہ بخار
 یکسان برابر چڑھا رہتا ہے اترتا ہی نہیں - اور اعضا کے اندر دنی اس تیسری
 مقدار مے - لے - ریا میں زیادہ تر مبتلا ہو جاتے ہیں بنسبت اول اور دوم مقدار -

کے دوران بخاروں کی نسبت ایک اور بات قابل یاد رکھنے کے یہ ہے کہ مے - لے - ریا کے مؤثر ہونے کے لئے حرارت بھی درکار ہے یعنی جہاں یہ ہوا ہو اگر وہاں گرمی بھی زیادہ ہو تو اثر بڑھ سکا شدت سے ہوتا ہے چنانچہ اسی واسطے زور اسکا مالک مریض بہت کم یا بالکل نہیں ہوتا اور اقلیم گرم میں زیادہ اس موقع پر مہیت محسوس ہوتی ہے یا کی اور حقیقت اس کے پیدا ہونے کی مختصر طور پر بیان کرنی عین مناسب جانتا ہوں -
چنانچہ -

مے - لے - ریا

ماہیت - بقراط سے لیکر آج تک سب سب بات کے قابل مہین کو دنیا کی سطح پر کوئی جگہ تو ایسی ہے کہ جسمیں بیماری کم ہوتی ہے اور کوئی ایسی کہ جس کے باشندے ہمیشہ کسی خاص قسم کے مرض میں ضرور مبتلا رہتے ہیں اور جب اس امر کا تجربہ کیا جاتا ہے اور اس میں عقل و ذراستی جاتی ہے تب سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں مقامات میں زیادہ بیماری پائی جاتی ہے جن کے قریب جو زمینیں ہیں اور دلہن ہوتی ہیں یا جو ایسے نشیب کے انہیں بڑھ کا پانی کھڑا رہتا ہے یا ایسے شہر جو دریا کے کناروں پر ہوتے ہیں یا جنگلی زمینوں پر پانی بہہ چلا کرتا ہے یا دامان کوہ اور جنگلی مقامات جیسے بنگالہ میں سندھ بن کا جنگل جسمیں ہمیشہ پانی بہہ چلا کرتا ہے - پس وہ کونسی شے ہے جس سے ان مقامات کے رہینوالے خاص قسم کے امراض میں مبتلا رہتے ہیں مثلاً ان لوگوں کو اگر دیکھتے تو چہرہ انگا پیلا - لبین پیلی - نبض کمزور اور وہ لوگ ایسے پست ہمت اور کم طاقت ہوتے ہیں کہ ذرا سی محنت سے تھک جاتے ہیں اور اکثر تپ لرزہ میں مبتلا رہتے ہیں - غرض اس سے صاف ظاہر ہے کہ مقامات مذکورہ بالا میں کوئی شے ایسی ہزار ہوگی جس سے وہاں کے باشندے ہمیشہ مرض میں مبتلا رہتے ہیں اس شے کو گرمی کہیں تو نادرست ہے کیونکہ ہندوستان کے جو مقامات بہت گرم ہوتے ہیں وہاں کے

لوگ اکثر تندرست ہوتے ہیں اور اس چیز کو بردوت بھی نہیں کہہ سکتے مکملے کہ دریا اور سمندر میں علاج لوگ مرض سے اکثر محفوظ رہتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ شہ مذکور ہوا تھی ہے کہ جو جہیلون سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس امر کا تجربہ کیا گیا ہے کہ لوگوں نے جہیلون کے پیندے کو خوب پلایا ہے اور اس سے جو ہوا پیدا ہوئی ہے انیکو سونگھا ہے تسیر ہی اس قسم کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں جیسے تپ لرزہ ہے۔ پس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیشہ ضرور کوئی زہر ہوگی جسکا نام اٹبانے ہے۔ لے۔ ریا رکھا ہے اس سے۔ لے۔ ریا زہر کی نسبت اٹبا کے دلون میں دو طرح کے خیالات پیدا ہوئے ہیں یعنی کوئی تو کہتا ہے کہ نباتات کے بیٹھ جانے سے یہ زہر پیدا ہوتا ہے اور کوئی یہ کہے۔ لے۔ ریا ایک خاص قسم کی تخیر ہے جو جہیلون سے پیدا ہوتی ہے اور بعضوں نے عقل کے نکلے لگا کر یہ بات نکالی ہے کہ باعث ہے۔ لے۔ ریا کا ایک قسم کی کاٹی ہے جو نہایت باریک اور بہت جلد پیدا ہوتی ہے لیکن اس بات میں کچھ شک نہیں کہ نباتات کے بیٹھ جانے سے ہے۔ لے۔ ریا زہر پیدا ہوتا ہے کیونکہ تجربہ سے یہ ثابت ہے کہ نشیب مقامات میں جب تک فضل کھڑی رہتی ہے تب تک وہاں تپ لرزہ کے قسم کی بیماریاں پیدا نہیں ہوتیں لیکن بعد دو ہو جانے فصل کے جو نباتی اجزاء اُن میں پررہ جاتی ہیں بارش کے پڑنے سے سٹھ جاتی ہیں تب اُن مقامات میں ہے۔ لے۔ ریا کا زور شور ہوتا ہے اور تب فوٹی بھی اسوقت پیدا ہوتی ہے۔ اور دلون کا بھی یہی حال ہے کہ جب تک اُن میں پانی کھڑا رہتا ہے تب تک تو مرض سے محفوظ رہتے ہیں لیکن جب گرمی کے موسم کی دھوپ پڑتی ہے اور پانی اُنکا خشک ہو جاتا ہے تب ہے۔ لے۔ ریا ہوا کا بھی زہر ہوتا ہے کیونکہ جس مقام کا پانی خشک ہو جاتا ہے وہاں بہت سے نباتی اجزاء پیدا ہوتے ہیں جنکے بیٹھ جانے سے کثرت سے کاٹی پیدا ہوتی ہے جو یا تو خود زہر ہوتی ہے یا

جسکے اندر یہ زہر مے - لے - ریا ہوتا ہے جس سے امراض از قسم تپ فبی پیدا ہوتے ہیں
ہندوستان میں اس زہر کا یہ قاعدہ ہے کہ قبل از شروع یا بعد از ختم ہونے برسات
کے زور شور ہوتا ہے چنانچہ پنجاب میں ایسا ہوتا ہے کہ جولائی سے دیکر نصف
نومبر تک مے - لے - ریا کا زور شور رہتا ہے اور گل امراض جو اس مہر سے پیدا ہوتے
ہیں انکی بھی شدت انہیں ہمینوں میں ہوتی ہے ۔ اس زہر کی نسبت یہ بھی دیکھا
گیا ہے کہ نیچی زمینوں میں اور بنسبت اوپر کے نیچے کی ہوا میں مے - لے - ریا کی شدت
ہوتی ہے ۔

جب سبات کو ہم مانتے ہیں کہ مے - لے - ریا زہر نباتات کے مٹ جانے سے پیدا
ہوتا ہے تو ہم کو یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ اس زہر کے پیدا ہونے کے لئے چار چیزوں کا ہام
ہونا ضروریات سے ہے اول حرارت دوم رطوبت سوم مادہ بنائاتی چہارم خاص قسم
کی زمین - کیونکہ بدون ان چار چیزوں کے نباتات مٹ نہیں سکتے - پس اس سے
یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ بیماریاں جو مے - لے - ریا سے پیدا ہوتی ہیں خاص مقامات
خاص موسم اور خاص بلندی پر ظاہر ہوا کرتی ہیں اور تجربہ سے یہ بھی پایا جاتا ہے کہ
جب دلدلین خشک ہونے لگتی ہیں تب ان بیماریوں کا زور ہوتا ہے اور جب انہیں
پانی ہوتا ہے تب مرض سے محفوظ رہتے ہیں لیکن خشک زمینوں اور پہاڑوں میں
انکا خلاف وقوع میں آتا ہے کیونکہ ان مقامات میں جب بارش کثرت سے ہوتی ہے
تب مرض کا غلبہ ہوتا ہے اور جب بارش کم یا بالکل نہیں ہوتی تب بیماری بھی ہینیز
ہوتی ۔

مے - لے - ریا کی بیماریاں ہر سال کسی خاص جگہ پر محدود رہتی ہیں اور بعض دفعہ عالمگیر
بھی ہو جاتی ہیں اور چونکہ مے - لے - ریا کا اثر نیچی جگہ پر زیادہ ہوتا ہے بنسبت اوپر
کے اسلئے جن مقامات میں اس زہر کا زور ہے وہاں کے باشندوں کو چاہئے کہ اپنے

مکان کے اوپر کی منزل پر ہمیشہ رہا کریں اور چونکہ اس نہر کا اثر درختوں کے سبب سے بہت نازل ہو جاتا ہے تو ایسا کرنا مناسب ہے کہ جن مقامات میں اس نہر کی شدت ہو وہاں پر سردی و خفایاں طبع کر دیں ۔

فقہ اول - انٹرے۔ ٹنٹ فیوریٹی پر زہ

اس قسم کا بخار باری سے ہوا کرتا ہے اور وہ باری چند گھنٹہ تک ہر کرب جب رفع ہو جاتی ہے تب مریض بخار سے بالکل محفوظ رہتا ہے ۔ اس یوم راحت کو اصطلاح میں انٹرے۔ ٹنٹ کہتے ہیں ۔ ہستین اس بخار کی اکثر تین ہوا کرتی ہیں ایک تو وہ بخار جو روز ہو جاتا ہے اور حسین دفعہ ۴ گھنٹہ کا ملتا ہے اس قسم کو اصطلاح میں کو۔ ٹے۔ ڈی۔ آن فیوریبولتے ہیں ۔ ۴ قسم دوم اس بخار کی وہ ہے جس کو ٹریشن فیوریبولتے ہیں ۔ یہ بخار دوسرے روز آیا کرتا ہے اور اس میں مریض ۴ گھنٹہ تک بخار سے محفوظ رہتا ہے ۔ اور چوتھی قسم بخار تیسرے دن آیا کرتا ہے یعنی جس کیس کو آج بخار آیا ہو وہ کل اور پیر سون بخار سے محفوظ رہیگا مگر تیسرے دن پھر مبتلا ہو جائیگا پس اس بخار میں مریض ۴ گھنٹہ تک بخار سے محفوظ رہتا ہے اصطلاح میں اس بخار کو کوار۔ ٹنٹ فیوریبولتے ہیں ۔ یہ بات یاد رہے کہ کو۔ ٹی۔ ڈین بخار اکثر ہو جاتا کرتا ہے مگر ٹریشن بہ نسبت اُسکے کم اور کوار۔ ٹنٹ سب سے کم اور یہ کہ کو۔ ٹی۔ ڈین فیوریبولتے اس موسم میں زیادہ ہوتا ہے کہ جب نے۔ لے۔ ریا کی شدت ہوتی ہے چنانچہ ان مقامات میں کہ جہاں بارش دیکھن چھیم کی ہوا کے ساتھ ہوتی ہے اس قسم کے بخار کی شدت ماہ مئی سے لیکر اکتوبر تک ہوتی ہے اور جہاں اتر پورب کی ہوا ہوتی ہے یہ بخار نومبر اور دسمبر میں ظاہر ہوتا ہے اور جن جگہوں میں دریا کی طغیانی ہوتی ہے وہاں پر اس بخار کی شدت اگست سے لیکر اکتوبر تک رہتی ہے اور ٹریشن فیوریبول

یہ حال ہے کہ اس قسم کا بخار انہیں لوگوں کو زیادہ ہوا کرتا ہے جو کبھی پہلے ہی اس میں مبتلا ہوئے تھے اور جنکے جسم میں زہر اسکا بیکار پڑا رہتا ہے مگر ادنیٰ سبب سے ہر ظاہر ہو پڑتا ہے اور یہ بخار جاڑو نہیں اکثر ہو جاتا ہے چنانچہ اسکے زور و شور کے جینے دسمبر جنوری اور فروری میں اور تبدلات موسم میں بھی یہ پیدا ہوا کرتا ہے مثلاً موسم خزاں اور بہار کے شروع میں اور چونکہ اس قسم کا بخار اکثر انہیں لوگوں کو ہوا کرتا ہے جنکے جسم میں ایسا زہر لپٹے ہوئے ہے۔ لے۔ ریا برابر موجود رہتا ہے اس واسطے اس میں اکثر طحال بڑھ جایا کرتی ہے۔ دوسری بات اٹھڑے۔ ٹنٹ فیور کی نسبت یہ بھی یاد رہے کہ اسکی قسمیں آپسکے اندر ایک دوسری میں بدل جایا کرتی ہیں مثلاً بعض دفعہ جب ایسا ہوتا ہے کہ کو۔ ٹی۔ ڈین بخار ٹر۔ شن میں بدل جاتا ہے تب بیمار رو بصحت لانے لگتا ہے لیکن جب کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ ٹر۔ شن بدل کر کو۔ ٹی۔ ڈی۔ اُن اور کو۔ ٹی۔ ڈی۔ اُن بدل کر می۔ ڈی۔ ٹنٹ ہو جاتا ہے تب اس سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ مرض بڑھتا جاتا ہے اور کوئی عضو میں اس میں شامل ہو گیا ہے اور یہ بھی بات اکثر دیکھنے میں آتی ہے کہ کو۔ ٹی۔ ڈی۔ اُن بخار شام کو اور ٹر۔ شن قریب دوپہر کے اور کو اور ٹن بعد دوپہر کے چڑھتا ہے ۛ

علامات۔ اس بخار کی علامات تین درجہ میں منقسم ہو سکتی ہیں یعنی پہلے بیمار کو سردی معلوم ہوتی ہے بعد ازاں بدن گرم ہو جاتا ہے اور تب پسینہ آکر بخار چوڑا جاتا ہے چنانچہ جب بخار چڑھنے لگتا ہے تو پہلے بیمار سست ہو جاتا ہے لکڑا یاں آتی ہیں ہاتھ پاؤں ٹوٹنے لگتے ہیں اور مریض بار بار جھانک لیتا ہے پھر سردی معلوم ہونے لگتی ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بیمار کو پھریری چڑھ آتی ہے اور جاڑے سے کانپنے لگتا ہے اور دانت سے دانت بجنے لگتے ہیں ہاتھ پاؤں سکیڑ کر گھبرائی جاتے ہیں بتر پڑ جاتا ہے اور اس قدر سردی ہوتی ہے کہ منوں کپڑے اڑھائے تپس رہی لیکن

نہیں ہوتی اور جسم میں چونکہ ہے۔ لے۔ ریا و سر کا اثر ہوتا ہے اس لئے قلب کی حرکت سست ہو جاتی ہے جس سبب سے خون آہستہ آہستہ دورہ کرتا ہے اور بعض اعضا سے ریسیہ میں جمع بھی ہو جاتا ہے چنانچہ جب اس درجہ میں خون دماغ کے اندر جمع ہوتا ہے تب بیمار کو اونگہ آتی ہے سر میں بوجہ معلوم ہوتا ہے اور کانوں میں باجے سے بجے ہیں ۛ

جب قلب میں اجتماع خون کا ہوتا ہے تب سینہ پر بوجہ معلوم ہوتا ہے دم جلد جلد اور تیر تکلیف لیا جاتا ہے اور نبض کمزور اور سست ہو جاتی ہے اور جب سہو یا جگر میں خون جمع ہو جاتا ہے تب ابکائی آن اور تڑپ ہوتی ہے اور جب رودن میں خون کا غلبہ ہوتا ہے تب مریض کو دست آتے ہیں اس سردی کے درجہ میں نبض کمزور۔ جلد کی رنگت پیلی اور چہرہ مریض کا سکڑا ہوا ہوتا ہے ۛ بعد سردی کے مریض کو گرمی معلوم ہونے لگتی ہے چنانچہ رفتہ رفتہ بیمار کا سارا جسم گرم ہو جاتا ہے اسوقت جلد کی رنگت حالت اصلی پر آ جاتی ہے اور چہرہ مریض کا سرخ ہو جاتا ہے قلب کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور نبض سریع اور سرد و کرنے لگتا ہے اسوقت کپڑے برے معلوم ہوتے ہیں اور بیمار نہایت بے چین ہو جاتا ہے بعد کچھ عرصہ کے پیشانی پر نمی آ جاتی ہے رفتہ رفتہ مریض پسینہ سے نہا جاتا ہے تب بخار بالکل ٹوٹ جاتا ہے ۛ

گرمی کے درجہ کی نسبت یہ باتیں یاد رہیں کہ کو۔ ٹے۔ ڈی۔ ان فیور میں یہ درجہ بہت ٹر۔ شن فیور کے دراز ہوتا ہے اور یہ کہ طاقتور آدمیوں میں بھی گرمی بے چینی اور درد و زیادہ ہوتا ہے نسبت کمزور کے ۛ اس درجہ میں زبان کا یہ حال ہوتا ہے کہ کو۔ ٹے۔ ڈی۔ ان فیور میں اور مریض اگر طاقتور ہو تو زبان زیادہ ترسیلی ہوتی ہے نسبت ٹر۔ شن فیور اور کمزور آدمی کے ۛ بعض دفعہ خاص کر جب مریض کمزور ہوتا ہے تو پسینہ کی حالت میں استدر نڈال ہو جاتا ہے کہ پیچھے کی اسید نہیں ہوتی ۛ مدت ان نینوں درجون کی خفا ذکر اوپر کیا گیا ہے ہمیشہ ایک سان نہیں ہوتی چنانچہ سردی کا درجہ چند منٹ سرد یا ۛ گہنٹہ

برابر رہ سکتا ہے اور جب یہ بخار شدت کا ہوتا ہے تب سردی کا درجہ کوتاہ اور گرمی کا درجہ ہوتا ہے اور گرمی کا درجہ نصف گھنٹہ سے کئی گھنٹے برابر رہ سکتا ہے مگر ہم گھنٹہ سے کہی زیادہ نہیں رہتا لیکن پسینہ کا درجہ اور دونوں درجوں سے کم ہوتا ہے اور بعض خوش پسینہ گناہی نہیں اور یہ کہ کو۔ ٹے۔ ڈی۔ اُن فیورین سردی کا درجہ نہایت تھوڑا اور گرمی کا نہایت دراز ہوتا ہے اور ٹریشن فیورین نسبت کو۔ ٹے۔ اُن فیوریکہ سردی کا درجہ دراز اور گرمی کا کوتاہ ہوتا ہے اور کو۔ ارنٹن فیورین نسبت اور دونوں قسم کے سردی کا درجہ بہت ہی زیادہ اور گرمی کا بہت ہی کم ہوتا ہے۔

عوارض - جب یہ بخار مرکب ہوتا ہے تب اکثر اس میں طحال بڑھ جایا کرتی ہے اور مریض کو آنے۔ میا ہوجاتا ہے اور کبھی یرقان کی بیماری بھی ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ مریض پیشانی یا سہال میں منتلا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس بخار کے بیمار کو مرض ہرانکائی، ٹرن۔ (سرفو کھنہ)، یا نیو۔ سو۔ نیار ذات الریہ، یا بردا۔ ٹیزم (وجع مفاصل)، یا اسکابہ پیو۔ ٹس اور دمہ کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔

فقرہ دوم ری۔ می۔ ٹنٹ فیور

علامات - یہ بخار اسطور پر شروع ہوتا ہے کہ پہلے مریض کو خفیف پھر پری معلوم ہوتی ہے بعد اس کے جسم گرم ہو جاتا ہے سرور کرنے لگتا ہے۔ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے نبض سریع ہو جاتی ہے بعض دفعہ تے ہوئی ہے زبان سیلی اور تنگی کا غلبہ ہوتا ہے کمر میں درد اور ہاتھ پاؤں ٹوٹنے لگتے ہیں پاخانہ کم اور بدبودار آتا ہے پیشاب سُرخ اور تھوڑا آتا ہے۔ پیہہ علامتیں کچھ عرصہ تک ہر درجہ تخفیف یعنی۔ بری۔ می۔ ٹنٹ شروع ہو جاتا ہے جس میں اگرچہ نبض کی سرعت کستقد کم ہو جاتی ہے پر حالت صحت پر نہیں آتی۔ اور دوسرا عارضہ شخصی

کو بھی کسب قدر تخفیف ہو جاتی ہے لیکن بالکل جاتی نہیں رہتی حرارت جسم کی کم ہو جاتی ہے لیکن بالکل منقود نہیں ہوتی جلد کسب قدر ظاہر ہو جاتی ہے اور سرد سینہ پر تھوڑا سا پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ تشنگی کم اور زبان کسب قدر صاف ہو جاتی ہے یہ حالت تخفیف یعنی لئی عیش کی تھوڑے عرصہ تک رہتی ہے تب بتدریج بخار کی علامتیں ٹھہرتے ٹھہرتے شدید ہو جاتی ہیں۔ اس بخار کی شدت اور تخفیف کی قوت میں اختلاف ہی چنانچہ بعض دفعہ شدت بخار کی دوپہروں کو ہو جاتی ہے اور دوپہرات کو تخفیف ہونے لگتی ہے اور باقی کی رات تا دوپہر دن بخار کو تخفیف رہتی ہے اور تب پہر شدت ہونے لگتی ہے یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوپہرات کو بخار کی شدت ہونے لگتی ہے اور یہ شدت صبح تک رہ کر تخفیف ہونے لگتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شدت بخار کی دوپہروں کو ہو جاتی ہے اور شام تک رہتی ہے اس وقت سے دوپہرات تک تخفیف رہتی ہے یہ شدت اور تخفیف کے وقت میں اگرچہ کسب قدر اختلاف ہے تاہم یہ قاعدہ ہر کہ صبح کے وقت اکثر تخفیف ہو جاتا کرتی ہے یہ

واقع ہو کہ بعض دفعہ شدت اور تخفیف کی قوت میں بالکل امتیاز نہیں ہوتا یعنی بخار کی حالت یکساں برابر رہتی ہے۔ یہ بات اس وقت ہوتی ہے کہ جب مے۔ لے۔ ریاز نہ بہت زیادہ مقدار میں جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے یا جب کم مقدار مے۔ لے۔ ریاز ہر کی کمزور آدمی کے جسم میں سما جاتی ہے اور یہ بخار برابر اس وقت بھی رہ سکتا ہے کہ جب کسی عضو اندرونی کے شامل ہو نیسے مرکب ہو جاتا ہے یہ جب یہ ترکیبی سی۔ جی۔ ٹنٹ فیو سبب زیادہ ضعف مانع اور ضعف قلب یا سیاحت کسی عضو میں کے شامل ہو جانے کے عین ابتدائیں مہلک نہیں ہوتا تب ایک اور قسم کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں یعنی زبان خشک بہوری اور باہر نکلتے وقت کا پنے لگتی ہے بعض نہایت سیریں اور کمزور ہو جاتی ہے انگلیاں کا پنے لگتی ہیں جس علامت کو اصطلاح میں سب۔ سٹل۔ ٹر۔ ٹن۔ ٹی۔ نم کہتے ہیں پیار کو ندیان ہو جاتا ہے اور ادھم آتی ہے تب نہایت کمزور ہو کر حالت بیہوشی میں مر جاتا ہے یہ بعض دفعہ اسی قسم کے سی۔ جی۔ ٹنٹ فیو میں جسم پر خون

کے چھوٹے چھوٹے داغ پڑ جاتے ہیں (پے۔ ٹے۔ کے) یا مسوڑوں لبوں اور ناک سے خون جاری ہونے لگتا ہے اور کبھی تھے اور دستوں کو راہ بھی خون آ جاتا ہے ۛ

ترکیب۔ ری۔ مے۔ ٹنٹ فیور میں اکثر داغ مثلاً ہوتا ہے اس وقت بیمار کو نہ بیان اور تشخیص ہوتا ہے کبھی مست فتنے شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی جگر اور طحال بڑھ جاتی ہے اور مریض کو یرقان ہو جاتا ہے اور کھانا نہیں کھاتا۔ مویا اور برنگائی ٹس بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی دوا لکن سپیری بھی پھیل جاتے ہیں (پے۔ رو۔ ٹائی۔ ٹس) ۛ
تشخیص۔ فرق درمیان۔ ری۔ می۔ ٹنٹ ۛ ان۔ ٹر۔ مے۔ ٹنٹ اور

آر۔ وٹ۔ کن۔ ٹے۔ نیوڈ فیور کے یہ ہو ۛ ری۔ می۔ ٹنٹ اور انٹری ٹنٹ فیور کا سبب ایک ہی ہے میفرمے۔ لے۔ ریا۔ زہر گر ان دونوں بخاروں میں فرق یہ ہے کہ ری۔ مے۔ ٹنٹ فیور میں تھوڑے عرصہ کے لئے بخار کی علامتوں کو کس قدر تخفیف ہو جاتی ہے (ری۔ مے۔ شن) لیکن انٹر۔ مے۔ ٹنٹ فیور میں ایک خاص وقت تک بخار بخار سے بالکل محفوظ رہتا ہے (انٹر۔ می۔ شن) اور ری۔ می۔ ٹنٹ فیور میں چونکہ بخار کی علامتیں عرصہ دراز تک موجود رہتی ہیں اس لئے یہ بیماری زیادہ تر اندیشناک ہے اور ایس میں مے۔ لے۔ ریا زہر بھی جسم میں زیادہ تر سرایت کر جاتا ہے ۛ

یہ بات کہ ری۔ می۔ ٹنٹ اور انٹر۔ مے۔ ٹنٹ فیور ایک ہی سبب سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ کہ دونوں قسم کے بخار اس سبب مختلف ہے ہیں حالات مفصل ذیل سے ثابت ہو سکتی ہے چنانچہ ایسا اکثر دیکھا گیا ہے کہ جس سال مے۔ لے۔ ریا زہر کی کثرت ہوتی اس سال ری۔ می۔ ٹنٹ فیور کی بھی کثرت ہوتی ہے اور یہ بھی کہ بخار ابتدائیں ری۔ می۔ ٹنٹ تھا اخیر کو انٹر۔ می۔ ٹنٹ ہو جاتا ہے برعکس اس کی ری۔ می۔ ٹنٹ بخار انٹر۔ مے۔ ٹنٹ ہو جاتا ہے اور کا۔ من۔ کن۔ ٹے۔ نیوڈ فیور کو جو ہندوستان میں موسم گرما کے اندر خاص کر اپریل اور مئی اور جون مہینہ میں ہو جاتا ہے ری۔ می۔ ٹنٹ فیور سے اس طور پر فرق کیا جاسکتا ہے کہ

کہ بخار کے موسم کو دیکھیں کہ وہ موسم مے لے۔ ریا کا ہے یا نہین اور گرمی کی شدت ہے یا نہین اور بیمار کو پہلے کیسی مے لے۔ ریا دہرے صدمہ پہنچا تھا یا نہین ۵

علاج۔ انٹر۔ مے۔ ٹنٹ اور ری۔ می۔ ٹنٹ فیور ان دونوں کا علاج یکساں

کیا جاتا ہے یہ انٹر۔ می۔ ٹنٹ فیور کے سردی کے درجہ میں بیمار کو گرم کپڑے پہنا دیں ہو سکے تو گرم گرم چادر پلا دیں۔ بعض دفعہ سردی اس شدت سے چڑھتی ہے کہ مریض نہایت ٹڈل ہو جاتا ہے اور نبض نہایت کمزور ہو جاتی ہے اس صورت میں

اسی میسو۔ لنٹ دوکا استعمال کرنا چاہیے مثلاً کاربونت ان امونیا اور ایتھیر دہ معمولی حالت میں اس نسخہ کا استعمال کرنا چاہیے

نسخہ۔ سلفٹ ان گئے شیا _____ ڈرام ۶

سلفٹ مان سوڈا _____ ڈرام ۴

ٹائٹرس ایتھر _____ ڈرام ۲

کونین _____ ۲۰ گریں

پانی _____ ۹ اونس

سیکولاکر بمقدار ڈیڑھ اونس کے تین تین گھنٹہ بعد شیشے کو ہلکا کر پلا دیں کیونکہ کونین نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ ان دونوں قسم کے بخاروں میں صفر کا استقامت غلبہ ہوتا ہے کہ مریض کو اکثر صفوادی تے کثرت آتی ہے اور تھے کے مادہ میں نرا صفو خارج ہوتا ہے اور بعض دفعہ صفوادی دست بھی آتے ہیں مگر اکثر قبض ہوتا ہے پس نسخہ بالا کے استعمال سے قبض دفع ہو جاتا ہے اور کھلکر صفوادی دست آتے ہیں اور جون جون دست آتے جاتے ہیں بخار فرو ہوتا جاتا ہے اور پسینہ آنے لگتا ہے ۵

ادھر کے نسخہ میں کونین نوبت کے روکنے کے لحاظ سے بہنیں ملائی گئی بلکہ جڑ۔ می۔ سائڈ ر کر کم کشس افایہ کے واسطے شامل کی گئی ہے۔ کیونکہ ان بخاروں کی مابیت سے

کا ہر پہرے کہ ہوا میں جاٹا مارا دے ہو اگر تے میں جن کے خون میں داخل ہو جانے سے بخار ہو جاتا ہے ۛ

واضح ہو کہ اوپر کے نسخہ کا نام سے - لائن مچکر رکھا ہے ۛ یہ نسخہ ہر قسم کے بخار میں کہ جبین صفو کا غلبہ پایا جاوے اور خاص کر قبض موجود ہو نہایت فائدہ کرتا ہے ۛ پس اس کتاب میں جہاں کہیں اس نسخہ کا استعمال کیا جائے گا وہ بعض اور پر نسخہ کے کہنے کے صرف سے - لائن - مچکر - لکھا جائے گا جو نسخہ بالا سے مراد ہوگی ۛ پرانے نسخے فیور مچکر اور فیور پاؤڈر کے ایسی مفید دہنیں ہیں جیسو سے - لائن - مچکر کا نسخہ ہے - مگر شاید کسی موقع پر ان کے بھی استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جائے اس واسطے دو نون نسخہ ذیل میں درج کرتا ہوں ۛ

نسخہ فیور مچکر کا -

لائیکوارامو - نیا اسے - ٹوش ایکٹام ۛ ٹائیسٹریٹ ان پوٹاش - ہ گرین ۛ اسے - ٹٹ - ان پوٹاش - ۛ اگرین ۛ ٹائیسٹریٹ ایٹیر - ۛ قطرے ۛ پانی - ایک آنس ۛ سبکو ملا کر ایک خوراک کریں اور دو دو یا تین تین گھنٹہ بعد جب تک بخار رہے استعمال کرتے جاویں - مگر واضح ہو کہ - انٹر - مے - ٹٹ اور ری - مے - ٹٹ فیور میں اس نسخہ کی کچھ بھی پیش نہیں چلتی - سے - لائن - مچکر کا نسخہ ضرور مفید پڑتا ہے چنانچہ میں اب اسی نسخہ کا استعمال کرتا ہوں ۛ

نسخہ فیور یا ڈورکا - انٹے - مونسٹیل پاؤڈر - ہ گرین ۛ ایپرٹکٹ پاؤڈر - ہ گرین ۛ کیا ٹول - ٹم گرین ۛ ٹائیسٹریٹ - ہ گرین ۛ سب کی ایک پڑیہ بناویں اور دو دو یا تین تین گھنٹہ بعد کہلاویں یہ نسخہ بھی ضعیف العمل ہے ۛ نیو اور امکی آب شورہ بھی نہایت فائدہ کرتا ہے - بدن زیادہ گرم ہو تو نصف سرکہ اور نصف آب گرم ملا کر بعض کے بدن کو پونچھ دیں ۛ در و سر ہو تو کن پٹی پر جو کین لگا دیں اور سر پر برف رکھیں اور برف کے ٹکڑے کہلاویں ۛ چھوٹا پسینہ آنا شروع ہو جاوے سر میں کو کپڑے اڑھاویں اور اس بات کی احتیاط رکھیں کہ حالت

عرق میں ہونے لگ جاوے لیکن اس حالت میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو کمال ضعف ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ مریض بھی جاتا ہے۔ خدا انجواستنبیہا کرکھالت اسقدر ریاضی ہونا چاہو۔ فوراً اودیات سٹی۔ سیولنٹ شٹلائٹہارامبو۔ نیا اور برانڈی یکہ استعمال کریں پکپینہ جیے آجائے سے بخار ٹوٹ جاتا ہے اور ریفریکواریت حاصل ہوتی ہے۔ ایام راحت میں جس کو اصطلاح انگریزی میں۔ انٹر۔ مے۔ شن کہتے ہیں ایسا علاج کرنا چاہیے جس سے بخار کی نوبت پھر نہ ہو پاوے۔ چنانچہ یہ بات اودیات نفعیہ ذیل سے حاصل ہو سکتی ہے کونین۔ پکپینہ پکپینہ کٹ کر بچا۔ گلو۔ پاپیتا۔ رسوت۔ یہ بعض دفعہ اسٹرکینا اور نار۔ کورٹین جیے بھی باری رک جاتی ہے۔ یہ جتنی دواؤں کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ ان سب سے کونین زیادہ تر فید ہے لیکن مثل آڈرون کے ہم اس بات کو نہیں مان سکتے کہ کونین سی بخار کی نوبت ضرور رک جاتی ہے بلکہ اس میں اپنا تجربہ یہ ہے کہ جس موسم میں مے۔ مے۔ ریاضیہ کا اثر کم ہوتا ہے اس میں کونین سے ضرور فائدہ ہوتا ہے لیکن جس موسم میں دیرینہ بخار کا نہایت زور و شور ہوتا ہے اس موسم میں کونین سے بہت کم یا بالکل فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ ایسے موسم میں جس کسی بیمار کو بخار کی نوبت روکنے کے لئے کونین دی ہے۔ اس کا جسم اس شدت سے گرم ہو گیا ہے کہ بیمار لے گیا بلکہ ہم نے بھی پہلے کونین کا نام تک نہیں لیا ہے۔ ایک اور بات اپنی تجربہ کی ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہر حالت میں مے۔ مے۔ پکچر کے نسخہ بالا کا استعمال پہلے کریں اور جب کئی دست خوب کھل کر آجائیں اور بخار بھی اتر جاوے تب کونین کا استعمال باری روکنے کے لئے کریں تب بعض کجیات میں کونین ہرگز نہ دین اسے نقصان مقصور ہے۔

اب سنکپیا کا حال سنئے ہم نے ایسا کیا ہے کہ جب کونین نے جکو دھوکھا دیا ہے تب پھر بیمار کو سنکپیا کہلایا ہے اس خیال سے کہ شاید نوبت بخار کی گڑا دے لیکن اس نے ایسا تاؤ پیدا کیا ہے کہ ہم بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ سنکپیا کو انٹے۔ پے۔ ریاضیہ۔ ڈک مان

محض قیوم صفا نہ ہے شاید خفیف قسم کے تپ نوبتی کی نوبت سنسکیا کے استعمال سے دو چار روز کے بعد رگ جادوے تو رگ جادوے لیکن اس صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نوبت بخار کی قسم خفیف کی سنسکیا ہی کے استعمال سے رکی ہے کیونکہ ایسا بخار دو چار روز کے بعد اکثر خود ہی فروغ ہو جاتا ہے۔ پس جبکہ کوئین اور سنسکیا کا بحال ہو تو تائیں لڑگو اور پاپتیا اور نیم وغیرہ کس شمار میں ہیں وہ پہلے بخار کی نوبت کیونکر رکے۔ اپنا تجربہ اس امر میں یہ ہے کہ بخار کی حالت میں اور رکے سے۔ لائن کسچو کا استعمال کرتا ہوں بعد از جانے بخار کے ایک خوراک ۵ اگرین کوئین کی جیار کوگہلا دیتا ہوں اس سے نوبت بخار کی رگ گئی تو بہت زود نہ پہر اسے سے۔ لائن کسچو کا استعمال کرتا ہوں اور بخار فرو ہو جانے کے بعد پہر کوئین دیتا ہوں۔

کوئین کے استعمال کی ترکیب میں حکما کی رائے میں اختلاف ہے بے بعض کہتے ہیں کہ صحت بیمار پسینہ میں تر بنے ہو اس وقت کوئین دینی چاہیے اور بعض کی رائے یہ ہے کہ نوبت کے آنے سے ۳ گھنٹہ پیشتر کوئین کھلانی چاہئے اور کوئی یہ کہتے ہیں کہ کوئین ۵ سے ۵ اگرین کی مقدار تک کھلانی چاہئے اور کوئی صاحب ۲۰ سے ۳۰ اور ۴۰ سے ۵۰ اگرین تک کوئین کھلانا بتلاتے ہیں اور کوئی حکیم گرمی کے درجہ میں بھی کوئین کے فیض کی صلاح دیتے ہیں لیکن اس میں اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب ہم نے کوئین ۲۰ اگرین سے زیادہ دی ہے تب بیمار نے گرمی اور خشکی اور بے چینی اور درد سر اور تشنگی کی اس قدر شکایت کی ہے کہ پہر کوئی مریض نے کوئین کا نام تک نہیں لیا اور ناچار ہو کر ہم نے کوئین کا دینا موقوف کر دیا ہے اور چونکہ ہمارے ملک کے لوگ اس دوا کو نہایت گرم خشک سمجھتے ہیں تو بار بار ہم نے کوئین کو چھپا کر دیا ہے چنانچہ ایسے لوگوں کو جو صحت اور حرارت کے نہایت معتقد ہیں چاندی کے ورق میں ٹر کر بطور گولیوں کے کوئین کھلاتے ہیں لیکن بخار کی حالت میں کوئین کہی نہیں کھلائی ہے۔ ایک اور ترکیب کوئین کے استعمال کی بندوبست پچکار رکی ہے ہم نے اس ترکیب کا بھی تجربہ قریب ۳۰۰ بیمار میں کیا ہے اور نتیجہ اس کا یہ دیکھا ہے کہ اس ترکیب سے بھی کوئین مفید پڑتی ہے لیکن ایک خرابی بعض دفعہ اس میں یہ پیدا ہو جاتی

ہے کہ جہد میں جس جگہ پچکا ری کی نوک داخل کیجاتی ہے وہ جگہ مسخ ہو کر درم کر آتی ہے اور دو چار روز کے اندر اس میں بڑا سا زخم پڑ جاتا ہے جو نہایت دقت سے خشک ہوتا ہے۔ ایک لڑکے کا حال تو ہم کو خوب یاد ہے کہ اس پچکا ری کے زخم کے باعث اس کو ٹرا۔ مے ٹمک ٹٹے۔ ٹٹے۔ رن ہو گیا تھا یہ کراڑی بیماری ہے جو ضرب یا زخم سے پیدا ہوتی ہے، بہتر یہ کہ لڑکے پر پٹہ بکری بھون کر کھلانے سے بھی نوبت بخا۔ کی رک جاتی ہے مگر وہی نوبت اس واسے رک جاتی ہے جو کسی ٹھیک وقت پر ظاہر ہوتی ہے۔

خوراک گرین پہلی خوراک نوبت سے ۳ گھنٹہ پہلے اور دوسری نوبت سے ایک گھنٹہ پہلے دینی چاہئے۔ کہتے ہیں کہ آئیوڈین بھی نوبت کو روکتا ہے چنانچہ قطرے ٹنکچر کے ایک آؤنس پانی میں تین دفعہ دین میں پلانا چاہئے۔ مگر جب کوئی عضو اندرونی اس مرض میں شامل ہو جاتا ہے تب آئیو۔ ڈین سے فائدہ نہیں ہوتا۔ انٹے۔ پائی۔ رین بھی اچھی ہے مگر اس میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ سپینہ اس کثرت سے آتا ہے کہ مریض نہایت نکل ہو جاتا ہے۔ علاوہ اس کے اس واسے سپینہ اگر کچھ عرصہ بعد بدن پر گرم ہو جاتا ہے۔ سپینہ لانے کے لئے سے۔ لی۔ سے۔ لٹ۔ ان سوڈا بھی بہت اچھی دوا ہے مگر بعض دفعہ اس میں بھی دہی بات ہو جاتی ہے کہ سپینہ اگر کچھ عرصہ بعد پر بخار ہو جاتا ہے۔

تے۔ نا۔ سی۔ ٹین۔ یہ بھی دوا بخار میں مفید ہے۔ اثر اسکا جلد پیدا ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی بُرائی بھی نہیں ہے جب آئہ گرین کی مقدار میں چار چار گھنٹہ بعد کئی خوراک میں کھلائی جاتی ہیں تب حرارت جلد کی کم ہو جاتی ہے مگر اسے بھی بخار بالکل ٹوٹا نہیں۔

انٹے۔ ٹامی۔ بین۔ اس دوا سے بھی سپینہ آ جاتا ہے اور حرارت کم ہو جاتی ہے۔ خوراک ۴ سے ۵ اگرین۔ باب اسکی آئہ گرین کس بخار کو مایہ کو کھلائی جاتی ہے تب جسم کی حرارت کم ہو جاتی ہے اور کئی گھنٹہ برابر کم رہتی ہے مگر پھر بخار ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور جتنی دوا ٹونکا ڈر کر گیا ہے اتنے جسم کی حرارت تو فرو کر کم ہو جاتی ہے مگر بخار پھر ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک

صفراوتوں کے ذریعہ خارج نہیں ہوتا تب تک بخار مغارت نہیں کرتا۔ پس دہی سے لائن۔ یکسچر سب سے عمدہ نسخہ ہے۔

لیکن ری۔ می۔ ٹنٹ فیورین چونکہ یہ اکثر معلوم نہیں ہو سکتا کہ بخار کو کس وقت تخفیف ہوگی اسلئے حکیم کو چاہئے کہ اپنے مریض کو شب دروز کے اندر کئی مرتبہ توجہ سے دیکھے اور آدھ ہڑا۔ مے۔ ٹرنگا دے جسوقت ری۔ می۔ ٹنٹ ہفتہ آدھ سے فوراً کوئین کا استعمال کرے بخار کی علامتیں برابر موجود ہوں اور تخفیف کی صورت نظر نہ آدھ سے اور بیماری کی حالت دبی ہوتی جا دے تو نسخہ مرقہ ذیل کا استعمال کریں یہ نسخہ

سلفیو۔ رس۔ اسڈ وٹھوٹ یا رسلفیو۔ رس۔ اسڈ ہین ۳۰ بوند پے آر۔ نچ۔ فلاد وراٹھ دوڈرام پے پانی چہہ ڈرام پے سبکو ملا کر ایک خوراک کریں اور ایسے ہی ایک ایک خوراک تین تین یا چار چار گھنٹہ بعد پلاوین۔ اگر اس نسخہ کا جزو دوم مہیہ نہ ہو تو سلفیو۔ رس۔ اسڈ کو بمقدار ۱۰ بوند کے دے سکتے ہیں اور اس سے بڑی عمر کے بچوں کو ۱۰ یا ۱۰ بوند تک دیا جاسکتا ہے پے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ سلفیو۔ رس۔ اسڈ کے استعمال سے بخار اتر جاتا ہے اور مریض رو بصحت لائے لگتا ہے پے اور جب ذرہ بھی علامتوں کو تخفیف ہو فوراً کوئین کا استعمال کریں جب سب سئل۔ ٹرن۔ ٹن۔ ڈنیم (انگلینڈ کا کینا) کی علامت اس قسم کے ری۔ مے۔ ٹنٹ فیورین موجود ہوتی ہے تب کا فور کے استعمال سے اس علامت کو بہت فائدہ ہوتا ہے مثلاً کا فور۔ م۔ گرین اور گلقتہ م۔ گرین دونوں کو ہلکا کر ایک گولی بناوین اور ایسے ہی ایک ایک گولی دہین تین دفعہ پلاوین۔

فقرہ سوم کن۔ ٹے۔ نیوڈ فیور

ہندوستان اور دیگر ممالک گرم مین ماسوا انٹر۔ مے۔ ٹنٹ اور ری۔ می۔ ٹنٹ فیور کے ایک قسم کا بخار بسبب تبدلات موسم شدت گرما کثرت سخت تردد و افکار کثرت اکل و شرب

مین صرف بانی ہی ماکر علاوین اگر مریض کی عمر ایک یا دو سال کی ہو تو سلفیو۔ رس۔ اسڈ

استعمال سکرات اور قبض کے پیدا ہوتا ہے یہ بخار و دقہم کا ہوتا ہے قسم خفیف کو
 ۱۔ نے۔ نے۔ ریل فیور یا کا۔ من کن۔ ٹے۔ نیوڈ فیور یا فیری۔ کیو۔ لاکتے ہیں اور قسم
 شدید کو بنام آؤ۔ ڈونٹ کن۔ ٹے۔ نیوڈ فیور نامزد کرتے ہیں ۲۔ اس قسم کا بخار پنجاب
 اور مالک مغربی و شمالی اور دکن میں ماہ اپریل مئی اور جون میں اکثر ہوا کرتا ہے ۳۔

قسم اول کا۔ من کن۔ ٹے۔ نیوڈ۔ فیور۔ جب یہ بخار بہت ہی خفیف
 ہوتا ہے تب اسکو رانے۔ نزل۔ فیور کہتے ہیں ۴۔ اس میں کل علامات بخار کی موجود ہوتی ہیں
 یعنی جسم گرم نبض تیز زبان خشک پاخانہ قبض پشاب کم پسینہ بالکل نہیں وغیرہ بعد ازاں
 پسینہ آکر ۴۴ یا ۴۶ گھنٹہ کے اندر بخار چھوٹ جاتا ہے مگر علامات مذکورہ بالا جب برابر چار یا پانچ
 روز تک ہتی ہیں تب اس بخار کو کا۔ من کن۔ ٹے۔ نیوڈ فیور کہتے ہیں ۵۔

علاج۔ اگر قبض ہو تو ایک جلابین بہنیں تو سے۔ لائن کسچر کا استعمال کریں واسطو پر
 در و کمر پٹی پر جو کین لگا دیں ۶۔

قسم دوم آر۔ ڈونٹ کن۔ ٹے۔ نیوڈ فیور۔ یہ بخار خاص کر انہیں
 مقامات میں اکثر ہوتا ہے جو نہایت گرم ہوتے ہیں ۷۔

علامات۔ اس بخار کی علامتیں دفعتاً ظاہر ہو پڑتی ہیں چہرہ سرخ اور سرگرم ہوتا ہے بخار
 کو روشنی اور آواز کی برداشت نہیں ہوتی جسم نہایت گرم اور نبض سخت پُر اور سریع ہو
 جاتی ہے۔ کمر میں درد و اعصاب شکنی ہوتی ہے اور دم تکلیف سے لیا جاتا ہے۔ فم مدہ پر
 بوجھتی تھکتا اور بار بار صغیر آوی تے ہوتی ہے پاخانہ بعض دفعہ قبض اور کبھی متعفن صفراوی دست
 آتے ہیں۔ زبان سفید اور کنارے اس کے اکثر سرخ ہوتے ہیں۔ پشاب کم اور سرخ آتا ہے
 اگر بخار کی شدت زیادہ ہوتی جا دے تو در و سر زیادہ ہونے لگتا ہے اور مریض کو اکثر نہایاں ہو
 جاتا ہے۔ یہ علامتیں جو دیا تین روز تک کیاں رہ کر جب تخفیف ہونے لگتی ہے اور جسم مروتب
 اس قدر ضعف ہو جاتا ہے کہ بیمار کے مرجانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور جب ماعنی علامات کی شدت

ہوتی ہے تب حالت بخار ہی میں مریض بیہوش ہو کر تلف ہو جاسکتا ہے ۞

اسباب - شدت گرمی - پیش آفتاب - کثرت محنت ترو و افکار - کثرت اکل و شرب - استعمال سکرات اور قبض ۞

علاج - عین ابتدا بخار میں سر کو منڈا کر سرد پانی لگا دین - کپٹی پر حسب طاقت بیمار کے جو کین لگا دین اور ایک تیز مہل کیا - لو - مل اور چالپ یا اسے - لا - ئے - ریم کا دین مہین تو شروع ہی سے اوپر کا سے - لائن کسچر استعمال میں لادین بیمار کے جسم کو سرکہ اور پانی سے پونچھ دین اور شور وغل اور روشنی سے محفوظ رکھیں ۞

فقرہ چہارم ڈنگویاؤندی فیور

تعریف - یہ ایک قسم کا ری - مے - ٹنٹ فیور ہے جس میں جوڑ دن میں اور جسم پر تھوڑے عرصہ کے لئے سرخ سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں اور جلد مفقود ہو جاتے ہیں ۞

علامات - یہ بیماری اکثر لاکسٹی کا مندر کے اناٹا نا ظاہر ہو پتی ہے لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیار پست ہوتا ہو جاتا ہے اور اس کی پشت پر خفیف سروی معلوم ہوتی ہے اور کبھی یہ مرض اسطرح پہنچتا ہے کہ سر اور کمر اور جسم کے کل جوڑ دن میں شدت کا درد ہوتا ہے مگر خاص کر تہہ سخت اور بتورم ہو جاتے ہیں آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے اور چہرہ پر آس اور سرخی آ جاتی ہے - آنکھوں کے دھیلے نہایت درد کرنے لگتے ہیں نبض پر تیز اور سہل ہو جاتی ہے - زبان مرطوب پر میلی اور کنارے اس کے سرخ یا ادھے ہو جاتے ہیں - جسم گرم اور خشک بھی ملتا اور بہک سرجاتی اور لگانہ اکثر قبض رہتا اور نہایت شدید اور ایک جوڑے دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے - بیمار نہایت کمزور اور بے عین رہتا ہے بعد ازاں کہنٹہ کے درد اور چہرہ کی سرخی کم ہونے لگتی ہے اور جوڑ دن کی درد کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے - ایسی پینہ آتا ہے اور بیمار نہایت ٹنڈل ہو جاتا ہے یہ حالت

صنف کے تخفیف کی کل مدت تک ہوتی ہے۔ تیسرے دن بخار کی شدت ہوتی ہے اور کچھ پیر دن پر سرخ سرخ و سب سے مثل اسکار۔ لے۔ ٹے۔ ناک کے پیدا ہوجاتے ہیں لیکن بعض اوقات عین ابتدا میں یہ وہی پہلے چہرہ اور تب سارے جسم پر پیدا ہو کر جلد مفقود ہوجاتے ہیں۔ اب وہی رخ ہونے لگتا ہے اور مریض کو شفا ہوتی ہو مگر بعض دفعہ جب تک بیمار اس بخار میں دو یا تین دفعہ مبتلا نہیں ہولیتا ہے تب تک شفا نہیں ہوتی۔

تشاؤج - برقان ہے۔ پا۔ ٹاسے۔ ٹس۔ بوا سیر اور نیو۔ رلجیا (وجع الحصب)۔
اسباب - پری۔ ڈسپو۔ زنک۔ حرارت رطوبت اور خواب ہوا۔
اکسے ٹنگ کار۔ قصور و غصہ۔

انجام - اکثر بخیر لیکن جب ضعف زیادہ لاحق ہوتا ہے تب مریض کے تلف ہوجانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

علاج - ابتدائین قے کر دین جلاب دین مگر سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے سے لائسن کسچر کا استعمال کریں اور بوقت تخفیف کو مین اور ادویات مقوی کو کام میں لادیں۔

فقرہ پنجم یا لوفیو

تعریف - یہ ایک قسم کا رمی۔ مے ٹسٹ فیور ہے جس میں جلد کی رنگت زرد ہو جاتی ہے اور سیاہ رنگ کی تے آتی ہے۔

علامات - ابتدائین چار سپت بہت اور کمزور ہو جاتا ہے۔ سر گھومتا اور بعض دفعہ غشی طاری ہوتی ہے۔ بار بار پھر پری معلوم ہوتی ہے پشت اور ہاتھ پاؤں میں شدت کا درد ہوتا ہے۔ درد سر چہرہ سرخ آنکھیں سرخ اور پر آب اور جسم گرم اور خشک۔ زبان سفید اور مرطوب درمیان سے میلی مگروں اور کنارے سرخ تشنگی شدت نبض پُر سریع اور سخت تنفس کی تکلیف۔ نرم معدہ پر درد اور بار بار تے ہو ا کرتی ہے۔ پاخانہ قبض رنگ براز کا

سفیدی مائل اور بعض دفعہ پیشاب میں صفرا ملا ہوا ہوتا ہے۔ شدت ان علامتوں کی چند گھنٹہ سے سیام روز تک دکر بالکل تخفیف ہو جاتی ہے پر اکثر بخار کی علامتیں پہرے کو کتنی بین تب مریض زیادہ تر کمزور اور بنفُس اُس کی باریک اور سریع ہو جاتی ہے۔ جلد سرور اور چہرہ کچ جاتا ہے۔ زبان خشک اور اُس پر سیاہ فرسید ہو جاتی ہے۔ فم معدہ پر زیادہ درد اور حلق میں جلن پیدا ہوتی ہے اور تھے نشدت ہوتی ہے۔ بعد ایک دو روز کے بیمار کو یرقان ہو جاتا ہے۔ ہچکچان بار بار اور سیاہ رنگ کی تھے آتی ہے۔ بنفُس نہایت کمزور اور بے قاعدہ ہو جاتی ہے۔ زبان اور دانتوں کے کناروں پر سیاہ رنگ کی ایک سطوت چمٹ جاتی ہے۔ دست سیاہ اور لمبیدار آتے ہیں اور کان ناک منہ اور شکم سے خون جاری ہونے لگتا ہے بعض دفعہ تیسیرے یا چوتھے دن بیمار جاتا ہے پر اکثر گیارہویں دن کے بعد تلف ہو جاتا ہے۔

نتائج شش حجرا و لحمال اور دیگر اعضاے اندر دنی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بنفُس دفعہ شدت سے پیچیش ہوتی ہے۔

اسباب۔ پری۔ ڈسپو۔ رنگ کا۔ موسم گرم۔ بد پر میزی۔ پنکر رنج وغیرہ۔ ایک ٹی۔ رنگ۔ کا۔ مے لے۔ ریا زہر۔

تشخیص۔ جب یہ بیماری خفیف ہوتی ہے تب اسکو۔ ری۔ مے۔ ٹنٹ فیور سے فرق کرنا مشکل ہوتا ہے مگر شدید قسم کے اخیر درجن میں جلد اور آنکھوں کی ٹوی اور سیاہ رنگ کی تھے سے یہ مرض پہچانا جاسکتا ہے۔

علاج۔ ابتدا مرض میں آپے۔ کے۔ کوانا سے تھے کرادین اور ایسے جلاب دین جن سے پانچ سات دست خوب کھلک آ جا دین مثلاً سنا اور نمک یا۔ کیا۔ لو۔ مل اور بلب کا استعمال مناسب ہے۔ بعد ازاں چوتھائی گرین کیا۔ لو۔ مل۔ ہمارہ نصف گرین افیون کے دو دو گھنٹہ بعد کھلاوین اور مریض کی رائون اور ٹیل میں مرہم سیاب

کی مالش کریں۔ مگر بہتر تو یہی ہے کہ اسے سے۔ لائن منسکچر کا استعمال دو دو یا تین یر
گنٹہ بعد کریں۔ وہ نسخہ صرف شکن بہت ہی عمدہ ہے۔ اور جب ری۔ می۔ شن
ہاتھ آوے فوراً اگرین کوئین کہلا دیں جسم گرم اور خشک ہو تو سرکہ اور پانی سے
پونچھ دیں اور سر پر آب برق لگا دیں اور جب کسی عضو اندرونی میں غلبہ خون کا دیکھیں
فوراً جو تک یا بلستر کا استعمال کریں اور حالت ردی میں ادویات اسٹی۔ میولٹ کام
میں لاویں غذا بیمار کی ابتدا میں ملکی اور سریر المہضم اور حالت ضعف میں برانڈی اور
وائن کا استعمال کرنا چاہئے۔

مقالہ سوم

بخار متعدی

فقہہ اولیٰ فی فیس فیور

تعریف۔ یہ ایک قسم کا بخار دماغی ہے جو چودہ سے اکیس دن تک برابر چڑھتا رہتا ہے
اور جسمین بیمار نہایت ٹنڈل ہو جاتا ہے اور افعال جسمی اور روحانی میں فرق چڑھتا رہتا ہے
میں اکثر دماغ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور اکثر اوقات مرض کے ابتدا میں جسم پر ایک
قسم کے بخار نمودار ہو جاتے ہیں۔

علامات۔ یا تو یہ بخار دفعتاً یا تدریج نہایت خفیف علامتوں سے شروع ہوتا ہے
چنانچہ جب یہ بخار دفعتاً چڑھتا ہے تو پہلے کئی دفعہ شدت سے لرزہ ہوتا ہے۔ بعد ازاں
سر میں نہایت درد ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں ٹوٹنے لگتے ہیں۔ بیمار لپٹ مہمت اور
کمزور ہو جاتا ہے اور کاروبار کی طرف سے بھی طبیعت نفرت کرتی ہے جسم سرد

اور پہلا اور جلد مسکڑ جاتی ہے اور نبض یا تو کمزور یا پُر اور سریع ہوتی ہے دم تکلیف سے لیا جاتا ہے چہرہ فکر مند اور گہرا یا سدا اور بعض دفعہ ایسا جیسے حالت نشہ میں ہوتا ہے۔ بہوک مر جاتی ہے اور بعض دفعہ جی متلاتا ہے۔ پاخانہ اکثر متغیر رہتا ہے اور زبان سیلی ۵۔

جب یہ بخار بتدریج پیدا ہوتا ہے تو علامات اسکی ایسے پوشیدہ طور پر ظاہر ہوتی ہیں کہ یہ نہیں دریافت ہو سکتا کہ آیا بیمار کو ٹائیفیڈ، نس فیویر ہے یا بدسطنی یا مہامین قبلہ ہے کیونکہ تنوایہ طور پر لرزہ ہوتا اور نہ سر لشت اور نہ تہہ پاؤں میں شدت کا درد ہوتا ہے پر رنگت جسم کی سیلی پڑ جاتی ہے اور مریض سُست اور تھکا ہوا معلوم ہوتا ہے سر میں خفیف سا درد ہوتا ہے اور کار و بار سے طبیعت متنفر ہو جاتی ہے بہوک مر جاتی ہے زبان پر پیلی سفید رنگ کی فرج مر جاتی ہے پاخانہ قبض نبض بہت سریع اور رات کے وقت نہایت بے چینی ہوتی ہے یہ حالت شک و شبہ کی مہامین روز تک رہتی ہے بعد ازاں بخار اسقدر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے کہ اُس کے شروع ہونے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا جاسکتا ۶۔ دو وزن میں سے چاہے کسی طور پر بخار شروع ہو علامات مندرجہ جلد گزر جاتی ہیں اور تب علامات خاص بخار کی بخوبی اور جلد ظاہر ہونے لگتی ہیں چنانچہ جسم نہایت گرم ہو جاتا ہے یعنی اسقدر گرم کہ بخار کے تیسرے دن اگر آگہ تہرما۔ مٹر مرین کی نبض میں رکھا جاوے تو حرارت ۵۔ اور جوتا ہے جاتی ہے۔ نبض سربے تشنگی در دسر کپنی ٹڑپنے لگتی ہیں چہرہ سُرخ۔ آنکھیں پر آب اور بیمار نہایت بے چین اور چڑچڑا ہو جاتا ہے ۷۔ اگرچہ سوالات سے جواب مریض باہوش دیتا ہے لیکن نہایت آہستہ آہستہ تکلیف کے ساتھ ۸۔ مریض روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہے اور چوتھے دن پیٹھ اُس کی بستہ سے لگ جاتی ہے اور بلا سہارے اُٹھ نہیں سکتا ۹۔ نیند

ہنین پڑتی اور جو پڑتی ہی ہے تو غابات متوحش سے ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہے اور
 مریض خواب میں ہرانا اور چونک اُٹھتا ہے ۔ بعض بیمار کو اونگھ بہت آتی ہے اور
 کبھی نیند بالکل ہنین پڑتی ۔ اس درجہ مرض میں زبان پر ایک میل سیل ہو رہے رنگ
 کی قرحم جاتی ہے ۔ پیشاب کم اور سرج اور مثانہ میں اکثر جمع رہتا ہے ۔
 مرض کے پانچویں یا چوتھے سے ساتویں دن کے اندر سارے جسم پر چوٹے چوٹے
 سرج بخارات مثل رو بیولا کے پیدا ہو جاتے ہیں یہ بخارات ٹھہرے بیگے داغون
 کے طور پر ہوتے ہیں اور رنگ انکا سُرخ یا شہتوت کا سا ہوتا ہے ۔ اور ابتداء میں
 دبائے تو مغقو د ہو جاتے ہیں اور داغ مذکور یا تو چند اور متفرق ہوتے ہیں یا بیشیا
 اور چند داغون کے آپس میں مل جانے سے بڑے بڑے دھبے بن جاتے ہیں
 انکی مقدار اور رنگت کا گہرا ہونا مرض خاص کی شدت پر منحصر ہے عموماً
 ان متفرق داغون کے سارا جسم چنگیرا ہو جاتا ہے ۔ یہ بخارات پہلے پہل شانے
 کے قریب چھاتی کے عضلوں پر پھنچون کی پشت اور فم معدہ کے مقام پر
 (اچھے ۔ گشکر ۔ یہ بجن) ظاہر ہوتے ہیں اور تب کچھ عرصہ بعد دست دیا اور
 سارے بدن پر نمودار ہو جاتے ہیں ۔ ظاہر ہونے سے ایک یا دو روز بعد رنگ
 ان بخارات کا مکدر ہو جاتا ہے اور دبائے سے بہت ہی کم مرجھا جاتے ہیں لیکن
 مغقو د ہنین ہوتے ایک دوسرے سے ملکر دبتوں کی شکل پکڑ لیتے ہیں جیسے
 مرض حالت ردی کو پہنچ جاتا ہے تب دبتوں کا رنگ او دا ہو جاتا ہے
 اور دبے مذکور جب تبدیج مرجھانے اور مغقو د ہونے لگتے ہیں تب آؤر
 نئے بخارات ہنین پیدا ہوتے ۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ٹامی ۔ نس ۔ نسور
 میں اس قسم کے بخارات ہنین پیدا ہوتے مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ مرض کے
 قسم خفیف میں کم نمایاں ہوں اور تھوڑے عرصہ تک زمین بعض دفعہ بدن پر

اودے اودے دہیتے ہی پیدا ہو جاتے ہیں + ساتویں دن خواب سے جاگتے
 ہی مریض کو نہ بیان ہو جاتا ہے سر نہایت گرم اور تنفس اور پسینہ سے مُردار کی سی
 ہوتی ہے اب کبھی تو بیمار آہستہ آہستہ برتا ہے - اور کبھی حالت غشی میں آ جاتا ہے
 بہرہ ہو جاتا اور آنکھوں پر پردہ چھا جاتا ہے منہ کھلا رہتا نکلنے کی طاقت جاتی رہتی ہے
 انگلیاں کانپنے لگتی ہیں اور مریض بستر کو نوچتا رہتا ہے اس حالت سے ہی بیمار کو شفا
 ہو سکتی ہے ورنہ بیہوش ہو کر کلف ہو جاتا ہے *

عوارض - ٹائیفس فیورین دماغ نہایت جلد شریک ہو جاتا ہے چنانچہ
 ایسا واسطے مریض کو دوسرا اور نہ بیان ہوتا ہے نیند نہیں پڑتی بیہوشی طاری
 ہوتی ہے اور بعض دفعہ سارے جسم میں تشنج ہو جاتا ہے + اور چونکہ اس
 بیماری میں جسم کے کل عضلات بھی شامل ہو جاتے ہیں تو وہ درود کرنے لگتے
 ہیں اور مریض نہایت نڈال ہو جاتا ہے چنانچہ عیسائی مانتین مرض کے شروع ہونے
 سے پیشتر بطور علامات مندرہ کے ظاہر ہوتی ہیں اور جب یہ بیماری کی قدر بڑھ
 جاتی ہے تب مثانہ اور مقعد کے عضلات اس - فنکٹر مغلوب ہو جاتے ہیں جس سے
 بیمار کا بول و براز بے معلوم خطا ہو جاتا ہے + جب شش بھی اس بیماری میں شریک
 ہو جاتے ہیں تب بیمار کو مرض برا نکاٹی - ٹس اور نیو - مو - نیا ہو جاتا ہے اور دم لینے
 میں تکلیف ہوتی ہے + ذات الحجب کی بیماری بھی بعض دفعہ اس قسم کے بخاویز
 ہو جایا کرتی ہے + علامہ ازین جگر اور گردے کبھی کبھی اس بیماری میں شریک ہو جاتے
 ہیں + بعض دفعہ جسم پر پھوٹے اور اری - سے - پے - لس کی بیماری پیدا
 ہو جاتی ہے +

اسباب - پری - ڈسپو - زنگ + خراب غذا + ضعف اور متعفن ہوا +
 اکسانٹی - ٹنگ سبب ایک خاص قسم کا زہر جو بیمار کے پسینہ اور تنفس کی ہوا کے

وسید سے آؤر لوگوں میں پہنچاتا ہے اس بخار کی چہوت نہایت جلد گنجاتی ہے *
 حفظہ مآل قدم - بیمار کے پسینہ اور تنفس کی ہوا سے پرہیز کرنا چاہئے بیمار کے
 مکان میں ہوا کی خوب آمد و رفت ہونی چاہئے اور اس کمرہ کے جا بجا کھڑکی کا
 کونٹا رکھ دینا چاہئے * مریض کے کپڑوں کو کھولتے ہوئے آب گرم سے خوب دھو کر
 کار - با - لک - اسٹڈ اور پانی کے عرق میں شوب دینا چاہئے *

علاج - مریض جس مکان میں ہو اس میں خوب دھکتی ہوئی آگ ہونی چاہئے
 اور اگر جسم نہایت گرم ہو تو بیمار کو پانچ چھ منٹ تک آب گرم میں بٹھا رکھیں اور
 جو گرمی جسم کی کم ہو تو آب برف سے تر رکھیں اور دماغی علامتیں ظاہر ہوں تو
 پیشانی یا سارے سر پر ٹیبلٹس لگا دیں اور سہلات مناسب سے نفع قبض کیا کریں *
 اور اس بخار میں بھی وہی سے - لائن - مکیس بہت مفید ہے - حرارت کم کر دینے کے
 لئے انٹے - ہائی - رین کا استعمال کریں بے خوابی اور بے چینی اور نفع ہذا کی واسطے
 ایفون کا استعمال کریں چنانچہ پہلی تھوڑی تھوڑی مقدار میں مثلاً ۱۵ قطرے لاؤ - نم
 اور جو اس مقدار سے فائدہ نہ ہو تو دہنی یا گنی کر دیں * لیکن بیمار کی طاقت کو قائم
 رکھنا سب پر مقدم جانیں چنانچہ مریض کو غذا مقوی درمیر لے الہفم دین مثلاً شوربہ و
 انڈے اور نمک کا استعمال خاص کر براڈی کا اس مرض میں نہایت مفید پڑتا ہے
 چنانچہ شب و روز کے اندر چھ سے سولہ آونس تک براڈی پلا سکتے ہیں ہذا کی اس امر کا
 مانع نہیں ہے * بطور دوا کے ایمو - نیا اور ایٹھراس مرض میں نہایت مفید
 ہیں جبوقت بیمار رو بصحت لانے لگے اسوقت کو نین اور اسٹڈ کا استعمال سبب
 ہے * پیشاب اگر شانہ میں جمع تو بذریعہ سلامی کے نکال دیں اور جو کم پیدا ہو
 تو تیز حساب اور کمر پر پانی کی پٹی لگا دیں اور کل عوارض کا علاج معمولی طور پر
 کریں *

۲۰۰۰ کوہنہ اب گم سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص اگر گرم ہو تو

فقرہ دوم مامی - فائید فیور

تعاریف - اس بخار کو ان - ٹے - رک - فیور بھی کہتے ہیں۔ یہ بخار ان - ڈی - پک اور متعدی ہے اور اجڑے حیوانی کے سٹر جانے سے جو عفونت پیدا ہوتی ہے اُسکے سونگھنے سے ہو جایا کرتا ہے ۔

علامات - یہ مرض اکثر خفیفہ طور پر پھار ہوتا ہے اور اکثر اسکی علامات مندرہ بھی نہیں پیدا ہوتیں لیکن جب شروع ہو نیوالا ہوتا ہے تب بیمار کو اکثر سردی معلوم ہوتی ہے بہوک مر جاتی ہے اور خفیف بخار ہو جاتا ہے جس میں بعض دفعہ جی متلانا اور دست لگواتے ہیں ۔ لیکن کہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بخار دست دتے سے شروع ہوتا ہے اور شکم میں درد ہوتا ہے - زبان میلی اور نوک اور کنارے سرخ ہوتے ہیں نیض سیرج تیز لیکن خون سے پر نہیں ہوتی - چہرہ پیلا اور کیتھڑا سکڑا ہوا لیکن خسارے عنائے ہوئے اور سرخ ہوتے ہیں - شکم دیکھنے سے درد کرتا ہے بیمار کمزور جسم گرم اور یہ گرمی رات کی وقت اسقدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ ۱۰۵ یا ۱۰۵ درجہ تک بھی پہنچ جاتی ہے اور شب کی وقت بیمار نہایت بے چین ہو جاتا ہے ۔ یہ بخار رفتہ رفتہ بڑھکر دق ہو جاتا ہے اور چون چون شام آتی جاتی ہے شدت اسکی بڑھتی جاتی ہے اور اس تپ کی حرارت کی نسبت یہ بات خاص پائی جاتی ہے کہ صبح کی وقت حرارت کم اور شام کو زیادہ ہو جاتی ہے اور لین بہت جاتی ہیں کٹنگی بیشدت بہوگ بالکل مر جاتی ہے ۔ عرض اکثر مریض جب ایک ہفتہ تک اسی حالت میں رہتے ہیں تب حکیم کی صلاح لیتے ہیں - ساتویں اٹھویں یا نویں دن بیمار کے شکم چپاتی اور پشت پر چند گول گول گلابی رنگ - کے داغ پیدا ہو جاتے ہیں - یہ داغ جلد سے کیتھڑا دیکھے اور دبانے سے منقود ہو جاتے ہیں لیکن ہر بیمار میں نہیں پیدا

ہوتے کیونکہ جب یہ سجا رہا تھا کہ ہوتا ہے تب دماغ مذکور پیدا نہیں ہوتے اور سیاہ خام آدمی میں پیدا ہونے کا بھی شکل سے تیز ہو سکتے ہیں دوسرے دن رُف ہونے لگتے ہیں اور انکی جگہ اُتر پیدا ہوتے ہیں اسطوریہ کہ کئی مرتبہ یہ دماغ پیدا ہو کر رُف ہو جاتے اور پھر پیدا ہوتے ہیں۔ اب شکم تھوڑا بہت بھول جاتا اور درد کرنے لگتا ہے یہ درد خاص کر دہنی اسی۔ لایک۔ فا۔ سا کے قریب زیادہ ہوتا ہے اور بانے سے اُس جگہ پر تو قوی معلوم ہوتا ہے اب مریض کو اسپہال شروع ہو جاتا ہے ست پتے اور ہلکے زرد رنگ کے اور نہایت بد بو وار آتے ہیں اور کھارسی ہوتے ہیں مثل حالت صحت کے دست تڑش نہیں ہوتے جب دست آنے شروع ہو جاتے ہیں تب نبض عرصہ ایک منٹ میں اکثر ۳۰ بلکہ ۴۰ تک بھی سیرج ہو جاتی ہے اور تب جلد کی حرارت شام کی وقت پہر ۱۰ تک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے زبان اور منہ کے اندر چھالے پیدا ہو جاتے ہیں اسپہال جاری ہے تو زبان یا تو خشک ہو رہی اور سکڑی ہوئی ہوتی ہے نہیں تو سُرخ اور چمکیلی ہو جاتی ہے و دانت کی جڑوں پر (دفر) رطوبت جم جاتی ہے۔ نبض ۹۰ سے ۱۲۰ تک چلتی ہے۔ سر اور جسم گرم اور ہڈیاں بھی بھج جاتا ہے اور دھناروں پر خفیف سرخی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعد وہنقہ یا زیادہ عرصہ کے بیمار کی خون کے دست آسکتے ہیں یا مریض کا رنگ دفعۃً سیلا پڑ جاتا ہے اور اسی حالت میں تلف ہو جاتا ہے نقش کے امتحان سے امعا خون سے پر نظر آتے ہیں اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی تو خونی دست آتے ہیں اور کبھی بند ہو جاتے ہیں اور مریض نہایت ٹڈال ہو جاتا ہے جب اسپہال عرصہ دراز تک جاری رہتا ہے اور شکم میں درد اور نفخ کی زیادتی ہوتی ہے اور تے اور بچکیاں شروع ہو جاتی ہیں تب یہ سمجھنا چاہئے کہ رودہ چھد گیا ہے اور اب مریض بچنے کا نہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرنے سے ایک یا دو گھنٹہ پیشتر تک

مریض باہوش ہوتا ہے۔ لیکن جب اسہمال عرصہ تک جاری رہتا ہے تب بیمار نہایت اندھا ل ہو جاتا ہے اور رات کی موت اسکو نہیان ہو جاتا ہے۔ جب مریض رو بصحت لایو لا ہوتا ہے تب ستون کی تعداد تدریج گھٹ لگتی ہے اور وہ بستہ آنے لگے ہیں جلدر کی حرارت کم ہو جاتی ہے پسینہ آتا ہے زبان صفا اور بہوک معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس مرض کا نتیجہ نیک یا بد اکثر چار ہفتہ کے اندر معلوم ہو جاتا ہے۔

انجم۔ جب جسم کی حرارت تیز ہوتی ہے یعنی ۱۰۵ درجہ کی اور جب ابتداء سے مرض سے اس درجہ تک بدن گرم ہو جاتا ہے اور وہ گرمی عرصہ تک قائم رہتی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیماری نہایت شدید ہے اور جب بیماری کچھ عرصہ کی ہو جاوے اور اس درجہ مرض میں جسم کی حرارت کبھی بہت زیادہ اور کبھی بہت کم ہو جاوے تو غیر سلامت نہایت اندیشناک ہوتی ہے۔ بیمار مرض کا جب مرنیو لا ہوتا ہے تو بیسویں اور تیسویں دن کے اندر تلف ہو جاتا ہے جب جسم کی حرارت کم ہو جاتی ہے بشرطیکہ ۹ درجہ سے کم نہو جاوے تو اس سے سمجھنا چاہئے کہ بیمار رو بصحت لایو لا ہے۔

عارضات و نتائج۔ اس بخار میں اکثر بانگائی۔ ٹس اور یلوروی۔ سی اور نیو۔ مو۔ نیا کی بیماری ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی لا۔ رن۔ جائی۔ ٹس کا مرض بھی ہو جاتا ہے۔

ماہیت تشریحی۔ اس قسم کے بخار میں رووہ (خامکڑے۔ لی۔ ام) اکثر شریک ہو جاتے ہیں اور انکے غدودوں میں زخم پائے جاتے ہیں بعض دفعہ اینین سوراج بھی پایا جاتا ہے اور جگر اور طحال یا تو اس بیماری میں بڑھ جاتے یا چربی میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس قسم کا بخار ساری دنیا میں پایا جاتا ہے۔

اسباب۔ پری۔ ڈیو۔ ننگ۔ جوانی اور موسم خزان اور یہ بخار اکثر گرم

اور خشک موسم میں بہ نسبت سرد اور مرطوب موسم کے زیادہ ہوتا ہے + اسکے
اکسائی ٹینگ کا زیر ہین - اجزاء کی جوانی کے مٹ جانے سے جو عفونت پیدا
ہوتی ہے اسکے سونگھنے سے یہ بخار ہو جاتا ہے شکر بدرود یا قضا خانہ
کی عفونت ۔

فرق ٹامی - فُس اور ٹامی - فائیڈ فیور مین

اول ٹامی - فُس فیور مین بخار چھ طور پر ظاہر ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ دفعہ حرہ
جاتا ہے اور یہ بخار لرزہ سے چڑھ جاتا ہے اور ساتھ اسکے دروسر اور ضعف لاحق ہوتا ہے لیکن
ٹامی - فائیڈ فیور بتدریج چڑھتا ہے اور بعضہ دفعہ بے معلوم ہی چڑھ جاتا ہے +
دوم ٹامی - فُس فیور مین چہرہ پر تیرگی چھا جاتی ہے - آنکھیں گندہ یا کھست
اور ابتداء ہی سے نڈھال ہو جاتا ہے - لیکن ٹامی - فائیڈ فیور مین آنکھیں روشن ہوتی
ہیں اور مریض ابتداء میں نڈھال نہیں ہوتا ہے +

سوم ٹامی - فُس فیور کے بخارات کی رنگت شہتوت کی سی ہوتی ہے
اور چوتھے اور ساتویں دن کے اندر ظاہر ہوتے ہیں اور تھامے مرض تک قائم رہتے
ہیں اور ساری جلد پر تاریک دھبے پیدا ہو جاتے ہیں + لیکن ٹامی - فائیڈ فیو
مین بخارات گلابی رنگ کے دھبوں کے طور کے ہوتے ہیں اور درمیان ساتویں
اور چودھویں دن کے تسینہ نشیت اور شکم پر ظاہر ہوتے ہیں ایسے دور دور چترے
ہوئے ہوتے ہیں کہ اکثر انکو احتیاط سے تلاش کرنا پڑتا ہے اور تپس بھی فیصدی
وس یا بارہ مریضوں میں پائے جاتے ہیں بعد دو یا تین دن کے مرجھا جاتے ہیں اور
انکے عوض دوسری جگہ پر ایسی قسم کے اور داغ ظاہر ہوتے ہیں ۔

چہارم ٹامی - فُس فیور مین اسہال بہت کم ہوتا ہے لایہت سی تیلی غذا

اگر کہانی جاوے اور اس مرض میں پیٹ سے خون نہیں آتا ہے۔ لیکن ٹامی۔ فائید فیو
 میں اسپہال اکثر ہوتا ہے اور پیٹ سے خون بھی آتا ہے۔
 پنچم ٹامی۔ فائید فیو میں غدد بنام پیارس۔ پے۔ خیر جوائے۔ لے ایم
 ر دو دن میں ہوتے ہیں بعد موت کے امتحان کرنے سے زخمی پائے جاتے ہیں
 اور بعض دفعہ زخم کے سببے رودہ چہرہ بھی جاتا ہے اور تیر بجایرے۔ ری۔ ٹو۔ نائیس
 ہو کر مر جاتا ہے۔ لیکن ٹامی۔ فئس فیو میں اس قسم کے زخم نہیں
 پائے جاتے۔

ششم ٹامی۔ فئس فیو میں نبض اور جسم کی حرارت تیسرے دن تک اب
 بڑھتی جاتی ہے چنانچہ نبض ۴۰ تک اور حرارت ۱۰۵ درجہ تک اور بعد تیسرے دن
 کے چند روز تک یہ دونوں باتیں قائم رہتی ہیں اور تب نوین دن سے ان کی شدت
 کم ہونے لگتی ہے لیکن ٹامی۔ فائید فیو کی نبض اور حرارت میں اس قسم کی لمبائی
 نہیں پائی جاتی یعنی یہ دونوں بالآخر ایک دوسرے کے کبھی بڑھتے ہیں اور کبھی
 گھٹتے ہیں۔ لیکن پندرہویں دن تک دونوں کا زور رہتا ہے۔ صبح کی
 تخفیف اور شام کی شدت ٹامی۔ فائید فیو میں خوب نمایاں ہوتی ہے لیکن
 ٹامی۔ فئس فیو میں کم۔

ہفتم ٹامی۔ فئس فیو میں رن کو بہت کم ہوتا ہے لیکن ٹامی۔ فائید فیو
 بہت غریبوں کے امیرون ہی کو زیادہ ہوتا ہے عسلاوہ این ٹامی۔ فئس فیو
 چاہے کسی جسم میں ہو سکتا ہے لیکن ٹامی۔ فائید فیو بعد۔ ہر برس کے کم ہوتا
 ہے اور یہ بخار جو انون کو اکثر ہو جاتا ہے اور ٹامی۔ فئس فیو بار بار نہیں ٹوٹا مگر
 ٹامی۔ فائید فیو اکثر دوسری فیہ بھی ہو جاتا ہے۔

ہشتم۔ اگرچہ دونوں بیماریوں کی چہوت ایک آدمی سے دوسرے کو لگ جاتی ہے

لیکن ٹائی - نس فیور کی وجہ نہایت سریل الاثر ہے اور ٹائی - فائیڈ کی کم نیکر
ایسا کہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ٹائی - نس کی چھت سے ٹائی - فائیڈ یا ٹائی - فائیڈ
کی چھت سے - ٹائی - نس بخار پیدا ہو بلکہ انکی خاص چھت سے خاص ہی قسم کا
بخار پیدا ہوتا ہے ۔

نہم - ٹائی - نس فیور کی علامتیں ۱۳ سے ۲۱ دن تک رہتی ہیں لیکن
ٹائی - فائیڈ فیور کی علامات ۲۲ سے ۳۰ روز تک رہتی ہیں اور انکے بخار کا خط
دور سے ہفتہ تک بڑھتا جاتا ہے اور تب یہ مرض حد غایت تک پہنچ جاتا ہے لیکن
ٹائی - فائیڈ فیور کی حد غایت ایک ہفتہ سے زیادہ تک کی ہوتی ہے ۔

حفظ ما لقدم - جب کسی گج پر اس قسم کا بخار ظاہر ہو تو اُس نوح کی بدر رو اور
پینے کے پانی کو خوب طرح ملاحظہ کریں اور دیکھیں کہ اگر مریض کے مکان کے ادھر اوص
مردار جانور یا کسی اور قسم کے حیوانی اجزاء گھر گئے ہوں تو فوراً اُٹھو اور دین اور بدر رو
کی صفائی پر متوجہ ہوں ۔ مریض کو فوراً کسی اور مکان میں لیجا کر کہیں دست دئے
کے مادہ میں عرق کلو - رائیڈاٹ - زنگ یا چونہ یا ایڈرو - کلو - رک اسٹ ملا کر فوراً
پہنیکو دین یا کسی مقام سے بدلواتی ہو تو فوراً دور کرادین ۔

علاج - اگر بیمار کو عین ابتدا مرض میں دیکھیں اور دست نہ آتے ہوں تو ایک
ہلکا سا ہل دین اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں پارسے کا استعمال کریں - نہیں تو اسے
سے - لائن - مکسچر کا استعمال کریں - غذا سخت اور ثقیل سے احتراز کریں انڈا وودہ اور
ساگو دانہ کا استعمال کریں مریض کمزور ہو جاوے تو ابتدا مرض سے بچا کر کوشورہ اور خمر
پلا دین کسی درجہ مرض میں پاخانہ قبض ہو جاوے تو دم ڈرام روغن پیدا بخیر کٹھنیل
جہراہ - افلاک لائونم کے پلا دین یا غشیان اور تھے روکنے کے کچھ آب ہون میں چند قطرے
فائیڈ رو - کلو رک - اسٹ ملا کر پلا دین ۔ بیشکم میں درو زیادہ ہو تو دینے

اسی - لایک فا - سیامقہ کے گرد چند جوکین لگا دیں اور جو خفیف ہو تو رات کی سٹی یا صرن آب گرم کی تمکیدیاڑ - پن - ہاین - فو - من - ٹے - شن کافی ہے۔ دوستوں کو بالکل نہ روکین صرف اس قدر قابضات کا استعمال کریں جس میں ہر روز صرف ایک یا دو ست آجایا کریں۔ اسہال کی شدت ہو تو انیون کی پچکاری کریں۔ دوستوں کے ہمراہ خون آرسے تو قابضات کو طبع میں مشا - گیا - لک - اسٹ - یا شو - گراف - لڈ اور انیون یا لو طیا اور انیون کا استعمال کریں اور عرقیات قابض مثلاً پشکری یا ٹنکچر انٹیل کی پچکاری کریں۔ بہ خون بند کرنے کے لئے روغن نارپین ۱۰ سے ۲۰ قطرے مک نہایت مفید ہے۔ اس سے شکم کی نفخ کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کس بخار میں مرض پے - ری ٹو ہائی ہو جاوے تو انیون کا استعمال کریں اور شکم پر تمکیدیا بلشر لگا دیں اور پچکیون کے روکنے کے لئے بیمار کو کلورا - فارم - نگہا دیں، علامات بہت شدید نہ ہوں تو شروع ہی سے اس نسخہ کا استعمال کریں۔

نسخہ - کوئین نصف گرین، ڈائیلٹ - سلفیورک اسٹ ۱۵ یا ۲۰ بوند، ڈریک شن - ان سنگوٹا ایک آونس، سبکو ملا کر دن میں دو یا تین دفعہ کل ایام صر میں پلا دیں، اسی نسخہ اور غذا کو صحت تک جاری رکھیں اور چون چون پہوک زیادہ ہوتی جاوے اور اجابت بستہ مریض کی غذا تبندیج برتے جاویں مگر بعد شفا گلی کے ۱۵ یا ۲۰ روز تک بیمار کو کھانے کے لئے ہرگز گوشت یا ترکاری نہ دیں - حرارت کم کر دینے کو ٹے اس بخار میں بھی ان - ٹے - پاٹی - رین کا استعمال کرنا چاہیے۔

فقرہ سوم ری - لپینگ - فی - من - فیو

تعریف - یہ ایک تندہی بخار ہے جو ۳ سے ۱۰ روز تک رہتا ہے اور اختراع ہر کر قریب ہفتہ بعد پہلا ہر ہوتا ہے۔

علامات مدیض کو دفعتاً شدت سے جاڑا چڑھ آتا ہے جس کی خبر بچار کو پیشتر سر بالکل
 نہیں ہوتی بعد اس کے سخت وروسر اور شدت سے اعضا شکنی ہوتی ہے اور بعد ایک یا دو
 گھنٹہ کے شدت کا بخار ہو جاتا ہے نبض جبین پُر اور تیز ہوتی ہے اور عرصہ ایک منٹ یا
 ۱۴۰ دفعہ حرکت کرتی ہے جسم کی حرارت ۱۰۵ درجہ یا ایک دو درجہ اور زیادہ ہوتی ہے
 جلد خشک زبان میل قمعدہ پر نہایت شدت کا درد صفراوی یا سیاہ رنگ کی قے
 پاخانہ قبض۔ پیشاب گرم اور سُرخ۔ تیسرے چوتھے یا پانچویں دن اکثر یرقان کی علامتیں
 ظاہر ہو جاتی ہیں تب اجابت میلی یا سیاہ یا خون آمیز آتی ہے۔ سر میں درد اور
 ٹیسین ہوش و حواس قائم لیکن اکثر بچو ابی اور کمال بے صبری ہوتی ہے بعد پانچویں
 یا چھٹے دن کے یا کبھی اس سے پہلے یا چھٹے گھنٹہ سے عرق آتا ہے اور اکثر اسہال
 بھی جاری ہو جاتا ہے بعض دفعہ امعاء رحم سے خون بھی جاری ہو پڑتا ہے اسوقت
 سے بخار جاتا رہتا ہے اور مدیض ہو صحت آتا ہے لیکن بعد ایک ہفتہ یا ۱۵ دن کے شل
 سابق مدیض پہر بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بعد تیسرے دن کے بخار کو پہر تخفیف ہو کر
 مدیض کو صحت حاصل ہو جاتی ہے اور یا تو روز بروز طاقت آتی جاتی ہے اور بالکل تندرست
 ہو جاتا ہے یا پہر ایک یا دو مرتبہ بخار آ جاتا ہے لیکن بعض دفعہ آنا نا حالت ردی ملی
 ہو کر مدیض سرد اور بیہوش ہو جاتا ہے اور بخار کے چند گھنٹہ بعد ہی تلف ہو جاتا ہے
 عارضات۔ بعض دفعہ اسہال اور پیش اور کبھی گلابی آ جاتا ہے اور عورتوں کو یا
 تو اسقاط سے یا رحم سے بھرت خون جاری ہونے لگتا ہے۔ بعض دفعہ تہہ پاؤں اور
 جوڑوں میں نہایت شدت کا درد شل وجہ مفاصل کے ہو جاتا ہے۔ کبھی ٹانگیں اور

پاؤں سرخ جاتے ہیں۔

صورتحال تشریحی بعد وفات۔ بعد موت کے لاش کو چیرنے سے جگر اور طحال
 بڑھے ہوئے پائے جاتے ہیں۔

اسباب۔ یہ بخار قحط سالی میں اکثر ہوا کرتا ہے کہتے ہیں کہ فاقہ کشی کے سبب آدمی کے جسم میں ایک خاص قسم کا زہر پیدا ہو جاتا ہے جس سے یہ بخار ظاہر ہوتا ہے اطباء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ مرض متحدی ہے ۛ

علاج۔ اگر تھن آتی ہو تو تھوڑے عرصہ تک اس کو جاری رکھیں اور چونہ آتی ہو تو ادویات مقیمی کا استعمال کریں۔ بعد ازاں کالورسنتھ۔ اور پو۔ ڈوافلین کا جلا دین ۛ نہین تو اسے سے۔ لائن۔ مکسپر کا استعمال کریں مگر یہ محال کے مقام پر درود ہو تو چوکیں لگا دین دوسرے دفعہ کے لئے سر پر آب برف لگا دین۔ پیشاب کم پیدا ہو تو دسرا کا استعمال کریں ۛ

پسینہ کے لئے معرقات کو کام میں لادین رنج چھیش کے لئے افیون کی پچکاری کریں اور تخفیف کے وقت پاخانہ کا خیال رکھیں مرض خفیف ہو تو کونین اور اسٹاکا استعمال کریں ۛ

مقالہ چھپا م

بخارات شرکی

فقہ اول ہک۔ ہک فیور

تشریف۔ فارسی میں اس بخار کو تپ وقت بولتے ہیں جب کسی کمزور آدمی کے کسی حصہ جسم میں کسی قسم کی خراش ہوتی ہے تب یہ بخار پیدا ہوتا ہے ۛ

علامات۔ تھوڑی سی سردی معلوم ہو کر چار کا بدن گرم اور نبض تیز ہو جاتی ہے اور تب پسینہ آکر بخار کو تخفیف ہو جاتی ہے ۛ

بخار کی شدت ہوتی ہے لیکن پہلی دفعہ دوپہر کو شدت ہوتی ہے اور چارپانچ گھنٹہ برابر بڑھتی ہی
 اور تھوڑے عرصہ کی تخفیف کے بعد زیادہ زور سے پہر شدت ہو کر دو بجے رات تک رہتی ہے
 تب پسینہ اگر بخار ٹوٹ جاتا ہے شدت کی حالت میں نبض استقدر سریع ہو جاتی ہے کہ
 ۹۶ سے لے کر ۱۳۰ یا اس سے بھی زیادہ چلتی ہے پیشاب سرخ اور اس میں سرخ رنگ کا دُر د
 ۲۰ نشین ہو جاتا ہے۔ رخصاروں پر سرخ یا دوسے رنگ حلقہ پڑ جاتا ہے جسکو ہبہ کہ
 فلتش کہتے ہیں۔ ۴ ہتھ اور پاؤں کے تلوے جلتے ہیں تخفیف کے وقت نبض کی سرعت اگر چہ
 کم ہو جاتی ہے پر نبض حالت صحت پر نہیں آتی۔ بہوک کم زبان صاف اور مرطوب اور
 سرخ اور مریض نہایت لاغر ہو جاتا ہے۔ آخر کار بخار کی شدت زیادہ ہونے لگتی ہے
 اور تخفیف کا وقت کم۔ بہوک مر جاتی ہے اور کبھی تو زیادہ پسینہ اور کبھی دست آنے
 لگتے ہیں اور جب یہ علامتیں شدید ہو جاتی ہیں اور جس بیماری کے سبب یہ پیدا
 ہوتی ہے۔ جب اسکی شدت ہوتی ہے تب مریض تلف ہو جاتا ہے۔
 اسباب۔ جب کسی عضو میں پیپ پڑ جاتی ہے جیسو شش جگر کہلے کے چور وغیرہ
 میں تب مریض کو وق ہو جاتا ہے۔ لیکن بغیر پیدا ہونے پیپ کے ہی اگر مریض کمزور ہو
 اور اس کے جسم کے کسی حصہ میں خراش تب ہی وق ہو جاسکتا ہے۔
 علاج۔ وق کا اصل مرض پر منحصر ہے جس کے سبب یہ پیدا ہوتا ہے لیکن ظاہر
 جب کوئی عضو اندرونی ماؤں نہ تو مقویات مثل کونین کا استعمال مناسب ہے۔ اور
 بخار کی حالت میں اس سے۔ لائن۔ کسچ کا استعمال کریں۔

فقہ دوم پائے۔ ای۔ میا

تعریف۔ یہ ایک قسم کا شدید بخار ہے جو خون میں پیپ کے لچانے سے پیدا ہوتا ہے۔
 علامات۔ یہ بخار اکثر بعد وضع حمل یا ضرب و زخم (خاص کر ٹیپوں کے) یا کسی مقام

میں انفلامیشن یا ٹرم سے زخم کے سونے سے یا لوجسمیات مستدی کے ہو جاتا ہے پہلے اس میں سخت جاڑا چڑھتا ہے تب شدید بخار مہ جاتا ہے۔ تبضیر اور سخت اور ۱۰۰ سے ۱۰۴ درجہ چلتی ہے زبان خشک اور سہوری ہو جاتی ہے جوڑوں اور عضلات میں درد شدید ہوتا ہے اور تھوڑا بہت ندیان بھی ہو جاتا ہے اگر پاؤں میں چوٹ لگ جاوے یا کوئی عمل جراحی کیا جاوے تو پٹلی ٹخنے گھٹنے اور کولھے کے جوڑوں میں گہرا درد ہوتا ہے اور وہ مقام پھول جاتے ہیں اور اس ٹانگ کی دریدوں میں بھی درد اور درد ہو جاتا ہے اور زانو اور ٹانگ کے عضلون کے اندر پیپ ٹر جاتی ہے۔ اب بخاریا تو رفع ہو جاتا ہے اور بیمار کمزور یا اکثر حالات رومی طاری ہو جاتی ہے اور مریض عالم بیہوشی میں مر جاتا ہے جب پیپ سر کی طرف سے خون کے اندر سرایت کر جاتی ہے تب ابتدا ہی سے شدید علما امراض مے۔ نن۔ جائے۔ ٹس روماع کے پردون کا انفلامیشن اور مرض بلو۔ رونیوینا پیدا ہو جاتا ہے اور جب پیپ اطراف اعلیٰ سے سرایت کرتی ہے تب بازو اور کھائی اور گھنی اور موٹہ ہے اور ہسلی کے جوڑوں میں درد اور درد ہو جاتا ہے اور ان مقامات کی جلد پر انفلامیشن ہو کر پیپ پیدا ہو جاتی ہے جب یہ بیماری سارے جسم میں پھیل جاتی ہے تب جسم کے کل ٹرے بڑے جوڑ سوج جاتے اور درد کرنے لگتے ہیں اور ان میں پیپ پڑ جاتی ہے اور شش میں بھی انفلامیشن ہو جاتا ہے لیکن جب مرض خفیف ہوتا ہے تب صرف ایک ہی پاؤں یا ہاتھ پر محدود رہتا ہے اور ان میں پٹے درپٹے دنبل پیدا ہوتے جاتے ہیں ۴

ماہیت تشریحی جب کسی ٹنگ کا زائس بیماری کا ٹانگ میں موثر ہوتا ہے تب عضلات کے درمیان پیپ پڑ جاتی ہے اور وہ دن کی دریدوں میں انفلامیشن ہو جاتا ہے اور دوید مذکور یا تو منجد خون کے ٹون یا پیپے بہر جاتے ہیں جب یہ سبب رو دن میں دخل کرتا ہے تب جگر میں بے شمار چھوٹے چھوٹے دنبل پیدا ہو جاتے ہیں

اور جب کان کی لمبیاں مروار پڑ جاتی ہیں یا سر کی ہڈیوں میں ضرب پہنچتا ہے تو ان ہڈیوں کے درمیان جو دریدہ ہوتے ہیں ان میں پیپ پڑ جاتی ہے اور دماغ میں بھی پیپ پیدا ہو جاتی ہے اور اس مرض میں اکثر پردہ پوزر اور پے رسی ٹی ٹی ایم کی تہی میں بھی پیپ پائی جاتی ہے :

۱۔ **سپا** - اول پیدا ہونے والے پیپ کا خون کی رگوں میں مثلاً بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قلب اور شریں میں جب زخم پڑ جاتا ہے تو اس زخم کی پیپ خون میں مل جاتی ہے :
 دوم یا ہے کسی زخم کی پیپ خون میں مل جاسکتی ہے اور یہ مرض پیدا ہو جاسکتا ہے :

انجام اسوقت بد ہوتا ہے کہ جب یہ بیماری عمل جراحی سے ہتھ یا پاؤں کے قطع برید کے بعد کسی متدی بخار میں ہو جاتی ہے اور نیک اسوقت جب بخار کم ہونے لگتا ہے اعضائے اندرونی متبلا نہیں ہوتے اور جب یہ بیماری ہتھ یا پاؤں یا عضلوں یا جلد پر محدود رہتی ہے :

علاج - داخلی مرکبات انیون کا استعمال کریں تاکہ بیمار کو نیند آجائے اور درد کو تخفیف ہو اور ابتدا میں زیادہ زیادہ مقدار کو نین کا استعمال مفید ہے۔ خارجی علاج اس مرض کا اس طور پر کریں اگر ضرورت ہو تو سر پر جو کین لگا دیں اور آب سرد سے تر رکھیں اور جن مقاموں میں آثار انفادیشن کے پائے جاویں ان پر گرم کمب دبو پوسٹر باندھیں اور جس مقام میں موجودگی پیپ کی ثابت ہو اس کو بذریعہ نشتر کے اچھوٹو طور پر کھول دیں اور ابتدا ہی سے بیمار کو غذامقوی دیں تاکہ طاقت قائم رہے ۔

مقالہ خوب

اگ۔ زمان۔ تھے۔ مٹا یعنی امراض حد بری

تحریر۔ اس جماعت کی بیماریاں متعدی ہیں اور مدت العمر میں اکثر ایک ہی دفعہ
ہوا کرتی ہیں پہلے ان میں بخار ہوتا ہے اور بعد عرصہ معمولی کے تبسم پر دانے یا بخارات
نکل آتے ہیں۔

اس جماعت کی مختلف بیماریوں کے بیان کرنے سے پہلے فرانس کے
ایکا ڈو۔ اے۔ ان۔ میڈی۔ سین کی انجن مین ڈاکٹر ہے۔ لے۔ رٹ صاحب نے جو اپنا تجربہ
ان امراض کے باب میں بیان کیا تھا اسکا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ
فرانس کے سررشتہ تعلیم کے ڈاکٹر صاحب نے انجن مذکورہ سے یہ دریافت کیا
تھا کہ بناوٹ چھپک وغیرہ متعدی امراض میں جب کسی مدرسہ کا کوئی لڑکا مبتلا ہو
تو کتنے عرصہ تک اس کو اس مدرسہ کے اور لڑکوں سے علیحدہ رکھنا چاہیے۔ غرض اس
باب میں ڈاکٹر ہے۔ لے۔ رٹ صاحب نے یہ تحقیقات کی کہ مدرسوں میں اکثر امراض
مفصلہ ذیل جو متعدی ہیں پیدا ہوا کرتی ہیں لیجئے کاؤ۔ پاکٹس۔ چھپک۔

اسکار۔ لے۔ ٹے۔ ٹا۔ سے ٹنٹس۔ پمپس۔ رکن پٹری اور ٹون۔ تھے۔ رہا۔
کاؤ۔ پاکٹس کا حال یہ ہے کہ اس مرض کا دور بے قاعدہ ہے مگر اکثر دس یا۔ دہ
روز تک رہتا ہے اور اس کے کمرہ سے ۱۰ روز کے اندر جڑ جاتے ہیں اس
بیماری کے لڑکے کو ۲۵ روز تک اور ٹون سے علیحدہ رکھنا چاہیے۔

چھپک کا اکثر قاعدہ یہ ہے کہ اسکا زہر تین یا چار روز تک بچہ رہتا ہے ورنہ
اس کے چار پانچ روز تک پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں تیز روز تک پیپ

پڑتی رہتی ہے اور تین ہی روز خشک ہونے کو لگتے ہیں اور چہ روز کھڑکے چہڑے
میں لگ جاتے ہیں۔ اس بیماری میں لڑکے کو ۲۰ روز تک مدرسہ میں نہ آنے
دینا چاہئے *

اسکار۔ لے۔ ٹے۔ ناک کی بیماری ۶ سے ۸ مہینہ کے بعد اور شاید نو ماہ میں بچے
بعد ظاہر ہوتی ہے۔ پانچ دن سے چھ دن تک واٹھے بکلتے رہتے ہیں۔ چودھویں یا
پندرہویں دن چہڑے چہڑا شروع کرتے ہیں۔ اس بیماری میں بھی لڑکے کو ۲۰ روز تک
اُوروں سے جدا رکھنا چاہئے اور ۶۔ ۷ لڑکے کی بیماری میں بھی چالیس ہی روز تک
علیحدہ رکھنا چاہئے۔ کن پٹری میں ۲۵ روز تک اور ٹوف۔ تے۔ ریامین ۴۰ روز
تک کافی ہے *

صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ مریض لڑکے کو اُوروں سے بالکل جدا رکھنا
چاہئے اور جماعت میں آنے سے پہلے دو دفعہ آب گرم سے غسل کرنا چاہئے۔ کپڑوں
کو گرم پانی سے دھو کر گندہک کی دھونی دینی چاہئے اور ہنسنے کو بھی جو بیماری کی حالت
میں کام آئے تھے اچھی طرح دھونی دیکر اور خوب مسح دھو کر ہوا دکھانا چاہئے *

فقہہ اول مرض می۔ رائی۔ او۔ لا

انگریزی میں اس مرض کو اسمال پاکس اور اردو میں چیچک یا ماما کہتے ہیں *

تعریف۔ یہ بیماری چھوت سے پیدا ہونی ہے اور سادہ چھوت کے باقی بھی جاتی
ہے پہلے اس میں شدت کا بخار ہوتا ہے اور تب جسم پر دانے نکل آتے ہیں *

اقسام۔ یہ بیماری تین قسم کی ہوتی ہے۔ اول سن ٹنٹ اسمال پاکس یعنی
چیچک متفرقہ۔ دوم کان۔ خلو۔ انٹ اسمال۔ پاکس یعنی چیچک متوصلہ موسم
ما۔ ٹومی۔ فائیڈ اسمال۔ پاکس یعنی چیچک متغیرہ *

اول چھپک متفرقہ۔ علامات اس قسم کے چھپک کی یہ ہیں کہ بیمار کو پہلے لرزہ سے بخار آتا ہے۔ اعضا شکنی ہوتی ہے۔ سر اور گردن پر شدت کا درد ہوتا ہے۔ پشت نہایت کمزور ہو جاتی ہے۔ زبان سفید جی متکاتاتے ہوتی ہے اور فم معدہ پر درد بعضہ اور گندہ آتی ہے اور بیہوشی طاری ہوتی ہے اور بچوں کو شنج اور بعضہ فم مرگی کی نوبت ہو جاتی ہے اب شدت کا بخار ہو جاتا ہے۔ نبض نہایت پر اور سیلج جسم گرم اور خشک۔ کمال بے چینی اور بعضہ فم ہڈیاں۔ دانوں کے نمودار ہونے تک یہ حالت رہتی ہے تب اکثر پسینہ آکر داتے ظاہر ہو جاتے ہیں اس وقت بخار کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے۔ لرزہ کے دم گندہ بعد لیکن کبھی اس سے پیشتر اور کبھی چوتھے دن متفرق چوٹے چھوٹے بخارات چہرہ اور پیشانی پر نمودار ہوتے ہیں۔ تیسرے دن یا تیسرے اور چوتھے دن بخارات مذکور سارے چہرہ پر پیدا ہو کر گردن۔ کندھے۔ بازو اور ہاتھوں سینہ اور شکم اور تہ ٹانگوں اور پاؤں پر نکلتے آتے ہیں۔ پانچویں دن ہر ایک دانہ کی جگہ پر ایک چوٹ سا گول وی۔ سیکل پیدا ہو جاتا ہے جس میں شفاف رطوبت ہوتی ہے اور گردن کے ایک سونچے کا لہوتا ہے اور نوک جسکی دبی ہوئی ہوتی ہے اب بخار نہایت جلد رفع ہونے لگتا ہے چوتھے دن حلق میں کیتھارم ورم ہو جاتا ہے گتھے میں تکلیف آواز بیٹھ جاتی ہے اور منہ سے لیسٹا لعاب بہنے لگتا ہے یعنی منہ اور حلق کے اندر جب انے پیدا ہوتے ہیں تب یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ آنکھوں کے پوٹوں اور مرد کے خفہ اور عورت کے اندام نہانی پر پہلی اسی قسم کے دانے نمودار ہوتے ہیں آٹھویں دن دانوں کی دبی ہوئی نوکین ہوا سے پڑھو کر بہرائی ہیں انکے گرد کا حلقہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے اور انکے اندر کی شفاف رطوبت اب گدلی مثل پرکے ہو جاتی ہے چہرہ پھول جاتا ہے اور پوٹے بھی اسی قدر پھول جاتے ہیں کہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور منہ ٹاک اور حلق کے اندر کثرت سے دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آٹھویں اور نوین دن کے اندر دانے اپنے کمال کو

پہنچ جاتے ہیں اور اُنکے بچوں کی جگہ پر ایک بھورے رنگ کا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ گرد کا حلقہ دور ہو جاتا ہے۔ چہرہ کا ورم جاتا رہتا ہے لیکن ٹاٹہ پاؤں پہننے لگتے ہیں۔ بعد ایں مدت کے دانے ٹوٹنے لگتے ہیں اور بدن سے پیپ نکل کر خشک ہو کر کھڑ بنے لگتے ہیں۔ یہ کھڑ تھوڑے عرصہ بعد پھڑنے لگتے ہیں اور جلد دھان کی ادھی سیرخ رنگ کی ہو جاتی ہے کہ جو رنگت ہفتوں تک قائم رہتی ہے۔ ٹاٹہ پاؤں کا ورم بھی تب ہی رُخ رہنے لگتا ہے اور ستروین رنگ میں رُخ رہنے لگتا ہے۔ یاد رہے کہ مرض کے آٹھویں دن پہر سب ہو جاتا ہے جسکو اصطلاح میں سکندری فیور بولتے ہیں۔ اکثر یہ بخار سردی یا لرزہ سے شروع ہوتا ہے اور اس میں کمال بے چینی اور بے خوابی ہوتی ہے۔ نبض میں ہو جاتی ہے زبان اور دھن خشک ہو جاتا ہے۔ جسم کی حرارت ۱۰۴ یا ۱۰۵ آگے ہو جاتی ہے۔ پیشاب کم اور سرخ رنگ کا آتا ہے اور رات کے وقت اکثر نڈیان ہی ہو جاتا ہے پاخانہ اکثر قبض رہتا ہے مگر بعضہ دفعہ نہایت شدت کا قبض ہو جاتا ہے۔

دوم چھپ متوصلہ عینی کان خلو۔ انٹ اسمال پاکس۔ علامات
اس میں نسبت چھپ متفرقہ کے زیادہ تر شدید پیدا ہوتی ہیں چنانچہ ابتدائی بخار زیادہ تر شدید ہوتا ہے اور دافون کے ظاہر ہونے سے لیکوختہ ہوتے تک بڑھتا جاتا ہے اور سکندری فیور بھی زیادہ تر شدید اور اکثر رومی ہو جاتا ہے اور اس قسم کی چھپ میں بیہوشی اور نڈیان اکثر ہو جایا کرتا ہے بعضہ شدت سے اسہال بھی جاری ہو پڑتا ہے اور اسکے بخارات کے نکلنے کا طور بھی بے قاعدہ ہوتا ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بخارات کے نکلنے سے پہلے جلد سرخ جاتی ہے اور اُس سرخ سرخ دہتے پیدا ہو جاتے ہیں دوسرے دن اُن دھبوں کے بچوں کی جگہ پر چھوٹے چھوٹے سرخ دانے نکلنے لگتے ہیں یہ دانے بہت جلد پختہ ہوتے ہیں مگر شکل انکی گول

ہنین ہوتی بلکہ دلنے چھٹے اور ٹھہرے بیٹنگے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ جوض پپ کے
 اینین سیاہی مال ایک تیر رطوبت ہوتی ہے۔ قرب کی بافت میں اس مرض کا انفلٹنٹز
 اکثر سرایت کر جاتا ہے بعض دفعہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مقام کا گوشت لگتا ہے۔
 اس قسم کے مرض میں چہرہ بیمار کا بہت جلد سوج جاتا ہے اور دہن سے لعاب ہی
 بکثرت جاری ہوتا ہے اور دانوں کے نکلنے سے اگرچہ بخار تھوڑا کم ہو جاتا ہے
 لیکن بالکل مفارقت نہیں کرتا بلکہ قریب نوین دن کے شدت اسکی زیادہ ہو جاتی
 ہے اور علامات ردیہ ظاہر ہو پڑتی ہیں دانوں کی رنگت ادومی سیاہی مال یا بالکل
 کالی ہو جاتی ہے جلد کے مختلف مقاموں پر خون جمع ہو جاتا ہے جس سے سیاہ رنگ
 کے داغ پیدا ہو جاتے ہیں مختلف مقاموں سے خون رسنے لگتا ہے اور یا تو پیشاب
 کے ہمراہ خون آتا ہے یا خون کے دست جاری ہو جاتے ہیں تشنچ اور بیہوشی
 طاری ہوتی ہے۔ لب اور دانوں پر سیاہ رنگ کی رطوبت چمٹ جاتی ہے تب
 اکثر گیارہویں دن کی رات مریض ملک عدم کو کوچ کر جاتا ہے۔ جب اس قسم کی چیچک
 رو بصحت آتی ہے تو دانوں کے داغ زیادہ تر گہرے اور بڑے بڑے ہوتے ہیں ۛ

سوم چیچک متغیرہ لینی ماٹومی - فائٹڈ اسال پاکس - واضح ہو
 کہ چیچک کی شدت اور خاصیت دو طور سے متغیر ہو سکتی ہے ایک تو ٹیکا لگانے سے
 دوسری ایک مرتبہ چیچک کے نکل جانے سے غرض جب چیچک ٹیکا لگانے یا ایک مرتبہ کے
 نکل جانے سے متغیر ہو جاتی ہے تب سینا در اس قسم میں جو اچوتے آدمی کو ہر دتی ہے
 کئی باتوں کا فرق ہے چنانچہ اینین سے چند فرق یہ ہیں کہ اس چیچک متغیر کا
 ابتدائی بخار اکثر ایک ہی دن رہتا ہے۔ مریض اکثر سہ پہر کے وقت بے چین ہو جاتا
 ہے اور ساری رات بے چین رہتا ہے تب صبح کی وقت دانے نادر ہو جاتے ہیں۔
 یہ دانے پہلے قیضہ اور ناک پر پیدا ہوتے ہیں مدت ان دانوں کی بہت تھوڑی

ہوتی ہے اور یہ اکثر متفرق ہوتے ہیں اور انکی نشوونما مثل خاص مرض کے کسی قاعدہ پر نہیں ہوتی اور جب یہ دانے اچھے طور پر پیدا ہو جاتے ہیں تب بیمار کو شفا ہوجاتی ہے اور بشرطہ کہ انے بکثرت پیدا نہ ہوتے ہوں چھپک متغیر میں کنکڑی فیو نہیں ہوتا۔

اسباب چھپک کے - ایک خاص قسم کا زہر جو بیمار کے بدن یا کپڑوں سے یا بذریعہ میکانیکل گٹانے کے پیدا ہوتا ہے (رانا - کیو - لے شن) *

انجام - اگر چھپک متفرق ہو بیمار کی دور باقاعدہ اور مریض طاقتور یا سچے بایون ہو اور اگر بیماری میسر می قسم کی ہو تو انجام بخیر ہے لیکن مرض اگر متصل ہو بخار دی دانے چھٹے اور ادوسے اور اگر سیاہ رنگ کے داغ پڑ گئے ہوں اور بنجارات دفعہ معقود ہو جاویں - تاہم باؤن اور چہرہ کا درم رنج ہو جائے ابھرے ہوئے دانے چھٹے ہو جاویں اور بیمار نہایت نڈال اور متفکر ہو جاوے دم لینے میں تکلیف اور تشنج بیہوشی اور ہدیان ہو جاوے - اگر نبض دفعہ سیرج ہو جاوے اور تکلیف تغیر زیادہ - قبل از نکلنے دانوں کے اگر قے شدت ہو اور دانوں کے نکلنے کے بعد بھی جاری ہے - پیشاب یا کسی اور جریان کے ہمراہ خون جاری ہو اگر ساتھ اس مرض کے مانع گلو شمش یا امعا بھی شامل ہوں اور ان اعضا یا جڑوں کے اندر پیپ پڑ جاوے اور اگر مریض طفل شیرخوارہ یا نہایت ضعیف ہو تو انجام بُرا نکلتا ہے *

نتائج - اس بیماری کے بد جسم پر ڈنبل اور پھوڑے نکل سکتے ہیں گلو کی گلیٹون میں پیپ پڑ جا سکتی ہے - جلد پر زخم یا آری سپلس کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے جو جڑوں میں پیپ پڑ جا سکتی ہے اور بیمار ساری عمر کے لئے لنگڑا چھو سکتا ہے انکین آ جا سکتی ہیں اور انکین سفیدی پڑ جا سکتی ہے جس سے بیمار زندہ ہوتا ہو

یا کانون میں پیپ پیدا ہو کر مریض بہرہ ہو جاسکتا ہے۔ گلو کے پھول جانے سے مریض دم بند ہو کر مر بھی جاسکتا ہے مرض بلو۔ ری سی یا نیو۔ مو۔ نیا کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ بیمار یا تو خون تھوکنے لگتا یا اس کے پیشاب کے ہمراہ خون آسکتا ہے۔ عورتوں کے اندام نہانی سے خون جاری ہو سکتا ہے اور اگر مریضہ حاملہ ہو تو اسقاط بھی ہو جاسکتا ہے *

تشخیص سر فیکیو اگر دفتہ بخار آ جاوے اور ساتھ اس بخار کے سرشیت اور کمر پر شدت کا درد ہو جو مستردے اور اگر اس ایام میں چیچک کی دباہیلی ہو تو چیچک کا لگنا ہو سکتا ہے۔ اور جب دانے نکل آئیں تو ان کے درجہ بدرجہ ظاہر ہونے اور انہیں باقاعدہ تغیر و تبدل پیدا ہونے سے تشخیص آسانی سے ہو سکتی ہے لیکن انوز کے نکلنے سے پہلے تشخیص میں نہایت دقت پڑتی ہے چیچک کے دانوں کی نوکین ابتدا میں دلی ہوئی ہوتی ہیں *

علاج۔ چیچک کے مطالب یہ ہونے چاہئیں -

اول حفظ صحت کے قواعد کی پابندی اور چھ سح کرنی چاہئے اور غذا کے آئینہ پہی احتیاط درگاہ دوم ایسی تدبیر کریں جس سے دانے بہت افراط سے نہ نکلنے پاویں اور جو دانے نکلیں وہ آسانی سے ختم ہو کر پیچ جاویں اور انہیں زیادہ پیپ نہ پڑنے پاوے جس سے جلد کا بہت نقصان ہو۔ سوم شدت کے بخار کو روکیں۔ چہارم جب دانوں میں پیپ پڑ جاوے تب بیمار کی طاقت قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ پنجم اعراسلامتوں کے دفعہ علاج کریں جو تکلیف دہندہ ہوں ششم حتی الوسع عارضات کی طرف سے غافل نہ ہوں اور جو عارضات ظاہر ہوتے جاویں انکے علاج کرتے جاویں۔ ہفتم کوشش کریں کہ بیماری صحت کی طرف رجوع لاوے اور جو نتائج ظاہر ہوں ان پر توجہ کریں *

اول علاج عامہ۔ بیماری چاہے کیسی ہی خفیف ہو مریض کو اپنے بستر پر

لیٹے رہنا چاہئے۔ مریض کا کمرہ وسیع اور اعتدال پر سرد ہو۔ اس کمرہ سے فرش و فرش اور پردے وغیرہ اٹھائے جاویں۔ اور ایسی بات کی خوب احتیاط رکھیں کہ مریض کو باہر کی ہوا نہ لگنی پاوے۔ مکان اور بستر وغیرہ کی صفائی پر زور دیں۔ مریض کے کپڑے اور بستر کی چادر وغیرہ بار بار بدلے یا کر بن اور سیکے کپڑوں کو ادویات وافع عفو ست سے پاک کریں۔ ابتدا مرض میں غنازدہ ہضم اور کم دینی چاہئے اور شربت کا استعمال کریں اور سیوہ جات کھانے کو دیں۔ اسٹی۔ میو۔ لنٹ ادویات کا استعمال ابتدا مرض میں نہ کریں۔ مرض جب دوسرے درجہ میں آجاوے تب البتہ غذا اور دوا مقوی دینی چاہئے۔ لیکن یاد رہے کہ بیماری اگر ردی قسم کی ہو نیوالی ہو تو شروع ہی سے ادویات اسٹی۔ میو۔ لنٹ اور غذا مقوی کا استعمال کریں۔

دوم علاج چھپکے دانوں کا۔ کسی زمانہ میں یہ دستور تھا کہ چھپکے مریض کو خوب گرم رکھتے تھے اور گرم چیزیں پینے اور کھانے کو دیتے تھے اس خیال سے کہ دانے اچھے طور پر نکل آویں لیکن فی زمانہ تجربہ اور مشاہدہ سے یہ بات پائی گئی ہے کہ اس بات میں کوشش کرنی چاہئے جس سے دانے کم لنگھیں۔ ان میں کثرت سے پیپ نہ پڑنے پاوے اور لکے و اعون سے چہرہ بدہیت نہو نا پاوے۔ پس آب گرم میں کار۔ با۔ لکٹ۔ اسٹیاکان۔ ڈینر فلوئیڈ یا کلو۔ رین و اٹریا سل۔ فیو۔ رس اسٹیاکان بدن کو بار بار اچھی طرح پونچھ دیا کریں۔ تاکہ دانوں میں پیپ کم پیدا ہو بعض یہ صلاح دیتے ہیں کہ ظاہر ہوتے ہی دانوں کو چھید کر پیپ خارج کر دیں۔ تاکہ بدن پر دافع نہ پڑنے پاوے دانوں پر لگانے کے لئے بہتری دوائیں تجویز کی گئی ہیں مثلاً ہر ایک دانہ پر نائیٹریٹ اف سلور کی بتی۔ گرہوین یا سارون پز نائیٹریٹ اف سلور کا عرق برش سے بہیر دیں۔ بعض سیاب کا بلاٹر یا مرہم لگانا بتلاتے ہیں۔ بعض کرو۔ سیو۔ سب۔ لی۔ سٹ کا عرق لگاتے ہیں۔

در گرین ۶ اونس پانی میں)۔ بعض طبیب مرہم گوگرد + شکر آف آبیہ - ٹین +
 گلائی - سی - رین اف کار - با - لکٹ اسٹد یا کار - با - لکٹ آئیل لگانا بہتاتے
 ہیں + مکمل دانوں پر ایک ہی دفعہ دوا نہ لگانی چاہئے بلکہ چون چون نکلتے جاویں
 اُن پر دوا لگاتے جاویں - ایک اؤٹر ترکیب یہ بھی ہے کہ دانوں میں شفاف لمف
 کے پیدا ہونے کے پہلے یا دوسرے روز خالص کار - با - لکٹ اسٹد سے ہر ایک دانہ
 کو جلا دیں یا دانے جب اپنے کمال کو پہنچ جاویں تب انکو چید کر کار - با - لکٹ
 لو - شن لگا دیں - بعض طبیب ایسا کرتے ہیں کہ دانوں سے جب پیپ خارج ہو جائے
 ہے تب ان پر یا تو صرف السی کا تیل لگا دیتے ہیں یا اسہین چونہ کا پانی ملا کر لگاتے
 ہیں - اور عرق گلاب میں گلائی - سی - رین ملا کر لگانا بھی مفید ہے - مگر یہ بات یاد
 رہے کہ دانوں پر کا کھرنڈ خشک ہونے یا دسے اور ناک اوچھوہ پر عرصہ کہتے ٹنڈر ہو
 یا دسے - اور اس بات کی بھی احتیاط رکھیں کہ دانوں کو مریض نوچنا نہ پادے
 تاکہ تیز مواد سے فخرش نہ ہونا یا دسے عرقیات دافع عفونت میں کپڑے ترک کر کے
 باد باور پونچھ دیا کریں یا اُن پر میدیا کے - لے - مین چٹک دیا کریں +
 سوم - تاکہ بخار کی تیزی بڑھنے نہ پادے جلد کو آب گرم سے پونچھ دیا کریں اور
 اُس سے - لاین کمپچر کا استعمال کریں جبکہ ذکر پیچے بخاروں کے باب میں کیا گیا ہے
 چہارم - دانوں میں جب پیپ پڑ جائے تب دوا اور غذا مقوی نہی چاہئے
 جیسے کوئین اور معدنی تیزاب ہمراہ کسی نباتی کڑوے جیسا نہہ یا جو شاذہ کے اور -
 جب علامات ردیہ ظاہر ہوں تب اشی - میو - لنٹ دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے
 پنجم علاج تکلیف دہندہ علامتوں کا - مثلاً تے - ہسہال -
 بے چینی - بے خوابی - ہڈیاں - جریان خون - گلو کی خراش + بعض کی - اے
 یہ ہے کہ مرض کے پہلے ایک دو شب - ر - فیا کا استعمال کریں تاکہ مریض کو سونے کی

عادت پڑ جائے۔ لیکن ہوا کی مالیون میں بلغم ہوا منہ سے بھرت رال جاری ہو تو نار-کا-ٹک دو اون کے دینے میں احتیاط چاہئے * چیچک کی بیماری میں اگر نڈیاں ہو جاوے تب گہلے دل سے ادویات اشی-میو-لیٹ کا استعمال کرنا چاہئے * گلو کی خراش کو کسی ہلکے غرغہ سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ جریان خون میں ٹنڈا کر آف اسٹل گبا-لک اسٹیاٹھے۔ نمک اسڈیاٹارمین یا ار-گٹ اف راسی کا استعمال مناسب ہے * پیشاب رُک جاوے تو سلائی سے نکال دین *

ششم عارضات کا علاج۔ اس بیماری میں جن عارضات پر خاص توجہ کرنی چاہئے وہ یہ ہیں کہ ہوا کی مالیان اور شش اور آنکھوں کی تکلیف اور دبیل۔ چنانچہ برانکائی۔ ٹس کی شدت ہو تو مریض کو خوب طرح کہا سنا چاہئے دبیل پیدا ہون تو آنکھ فوراً کھول دین۔ آنکھوں کو تکلیف ہو تو اوپر بار بار آب سر و لگا دین یا کپڑے کی گدی ان کرو۔ سیو سب۔ لی۔ میٹ کے ہلکے عرق میں دایک گرین چہ۔ آونس پانی میں (تر کر کے) آنکھوں پر باندھیں۔ آنکھوں میں بہت سرخی ہو تو کن۔ پٹی پر بلٹر لگا دین یا پٹھری ملا کر پوست کی گرم گرم تمکید کیڑ کار۔ نیامین زخم پیدا ہو تو ناٹریٹ اف سلو خشک یا اسکا عرق لگا دین اور آنکھوں پر سنبر پردہ رکھیں *

سر سینہ یا دماغ یا کسی اور عضو اندرونی میں اغلا میٹھن ہو جاوے تو علاج مناسب سے اسکو رفع کریں۔ تھے شدت سے ہوتی ہو تو چند قطرے لاؤنم ملا کر ایفر۔ وی۔ سنگ ڈرافٹ پلاوین۔ اسپہال جاری ہو تو قابضات سے روکیں * نکلے ہوئے دانے بیٹھ جاوین اور سلامات خوفناک مثلاً لڑہ یا شج یا ہڈیاں ہو جاوے تو کن پٹی پر جو کہن لگا دین اور بیمار کو آب گرم میں بٹھا کر سر پر سرد پانی چھڑکیں۔ گردن پر بلٹر اور پنڈلیوں پر اسی کی پٹی لگا دین *

ہفتم۔ مریض جب رو بصحت لاوے تب مقویات کا استعمال کریں اور اس قابل ہو جائے کہ غسل کر سکے تو کار۔ با۔ لکٹ سوپ سے بدن کو خوب طرح ملکر نہلا کر ہشتم۔ تاکہ یہ بیماری پھیلنے نہ پاوے اُن قواعد کا اچھی طرح پابند ہونا چاہئے جنکا ذکر امراض دہائی کے روکتے کے باب میں پیچھے کیا گیا ہے۔ مریض کو جب شفا ہو جاوے تب اسکو جلد تندرست آدمیوں سے ملنا چلنا نہ چاہئے۔ جس کمرہ میں مریض رہا ہو اور اُسکے کپڑوں کو بھی ترکیب دافع عفونت سے پاک کرنا چاہئے دیکھو پیچھے۔ بیماری کی حالت میں جلد کے صاف کرنے کے لئے جن چیزوں کا استعمال ہوا تھا جیسے سن یا کپڑا یا سفنج انکو فوراً جلا دینا چاہئے۔ حفظاً تا بعد اُمس بیماری کا یہی ہے کہ لوگوں کو اچھی طرح دک۔ سے۔ نہٹ کر دیں۔

فقہ دوم دک۔ سائے۔ نا

یعنی چھپک مادہ گاؤ

بیان دک۔ سی۔ نے۔ شن

دافع ہو کہ جب مادہ گاؤ کی چھپک کے مواد سے ٹیکا لگاتے ہیں تب اسکو دک۔ سی۔ نے۔ شن کہتے ہیں اور جب خاص مرض چھپک کے دانوں کے مواد سے ٹیکا لگایا جاتا ہے تب اس ترکیب کو اصطلاح میں انا۔ کیو۔ لے۔ شن بولتے ہیں مطلب ان دونوں ترکیبوں سے ٹیکا لگانے کا یہ ہے کہ آدمی خاص مرض چھپک کی حیثیت سے محفوظ رہے کہ جو ایک مہلک بیماری ہے۔ سلف سے نیکر آج تک کل اطباء است میں کوشش کرتے آئے ہیں کہ جس سے دہائی اور مہلک بیماریاں دینا سے نیست و نابود ہو جاوے ہیں پہنچنا چاہئے کہ ان دونوں میں سے کونسی ترکیب ایسی ہے کہ جس سے چھپک کی دوا کا استیصال ممکن ہے۔ تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب خاص مرض چھپک کے

مواد سے کیسٹو میکا دیا جاتا ہے تو وہ مخصوص چیچک کی وبا سے تو ضرور محفوظ رہتا ہے۔
لیکن اس سبب سے چیچک کی بیماری کی بنیاد قائم رہتی ہے کیونکہ انما۔ کیوئے شن
کی ترکیب سے جو دانے نکلتے ہیں وہ چیچک کے دانے ہوتے ہیں کہ جنکی جوت مثل
خاص مرض چیچک کے ایک سے دوسرے کو بہت جلد گھجاتی ہے اور ان کے ان
میں پہلے عالمگیر ہو جاتی ہے پس اس سے صاف یہ پایا جاتا ہے کہ خاص چیچک کے
-واد سے میکا لگنا دنیا میں چیچک کی وبا کو تروتازہ رکھتا ہے۔ لیکن یہ بات
رک۔ سی۔ نے۔ شن میں نہیں بائی جاتی کیونکہ جب مادہ گاؤ کی چیچک کے مواد سے
ٹیکا لگایا جاتا ہے اور جب اس سے دانے اچھے پیدا ہوتے ہیں تو اس شخص کو اول
تو چیچک نہیں نکلتی اور جو نکلتی ہی ہے تو نہایت خفیف۔ پس اس سے صاف ظاہر
ہے کہ رک۔ سی۔ نے۔ شن کو انما۔ کیو۔ نے۔ شن پر ہمیشہ ترجیح دینی چاہئے کیونکہ
انما۔ کیوئے شن سے چیچک کی وبا قائم اور زور و شور پر رہتی ہے مگر رک۔ سی۔ نے۔ شن
سے دباے مذکور کا استیصال منظور ہے۔

ترکیب رک۔ سی۔ نے۔ شن کی ٹیکا عہد طفلی میں لگانا چاہئے
لیکن چہ ہفتہ کے سے پیشتر مناسب نہیں لانا اس لئے ضرورت کی وقت مثلاً قرب وجوار
میں اگر چیچک کی وبا پہلی ہو تو اس صورت میں عمر کا لحاظ نہ کرنا چاہئے۔ بچہ کو تندرست
ہونا چاہئے یعنی دانتوں پر نہویا اسکو کوئی بیماری جلد کی نہویا وہ کسی مرض شکم
میں مبتلا نہ ہو۔ اکثر یہ رواج ہے کہ بازو پر جہاں ڈل ٹا میڈ بس ختم ہوتا ہے وہاں
کی جلد پڑیکا لگاتے ہیں عام تو کیب اس عمل کے کرنے کی یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے
بچہ کے بازو کو نیچے کی طرف سے کہنچیکر کچڑیں تاکہ اسکے اوپر کی جلد تنجاوے تب ایک
صاف اور تیز نوک کی نشتر میں چیچک مادہ گاؤ کا مواد لیکر نشتر کی نوک کو ترچھا کر
اسی قدر داخل کرویں کہ جسم میں برائے نام تھوڑا سا خون نکل آوے۔ جبوقت

اس ترکیب سے نشتر کی نوک داخل ہو جاوے تو اسکو ایک یا دو لمحہ تک زخم کے اندر رہنے دین تاکہ مواد اچھے طور پر جذب ہو جاوے تب نشتر کو نکال لین یہ طریقہ اس بازو کے دو تین یا چار مقاموں پر یکا لگاتے ہیں یہ عمل اوہ اس ترکیب کے دو اور بھی ترکیبیں دیکھا گئے کی ہیں مثلاً بعض ایسا کرتے ہیں کہ بازو پر باریک باریک کئی پچھنے لگا دیتے ہیں اور اپنی مواد کو مل دیتے ہیں اور بعض ایسا کیا کرتے ہیں کہ چھری سے بازو کے چمڑے کو تھوڑا سا کٹیج ڈالتے ہیں اور تب اس چیلے ہوئے مقام پر نوڈ ملدیتے ہیں لیکن ہماری سنت میں پہلی ترکیب آسان اور بہتر ہے *

ترکیب مواد کے حاصل کرنے کی - اگر کچھ یکا لگانے کا مواد کئی طور سے حاصل ہو سکتا ہے لیکن یاد رہے کہ سب سے عمدہ طریقہ مواد کے حاصل کرنے کا یہ ہے کہ گائے یا بھینس کے بچیا کے تھنوں کے ارد گرد جو سیٹھا (وک - سائی - نا) کے دانے لٹکے ہوں ان سے مواد لیکر بچوں کو یکا لگنا چاہئے - اسکو اصطلاح میں انے - ریل - وک - سی - نے - شن کہتے ہیں - چنانچہ ہندوستان کے بڑے بڑے شمعروں اور قصبات میں بلکہ چوٹے چوٹے دیہاتوں میں بھی اب انے - ریل - وک - سی - نے - شن کیا جاتا ہے -

انے - ریل - وک - سی - نے - شن - گائے یا بھینس کی بچیا کو یکا لگانے کی ترکیب یہ ہے کہ بچیا کی عمر تین سے چھ مہینے کی ہونی چاہئے - ایک سال تک بھی ہو تو چند ان رضایقہ نہیں - مگر اتنی بات ضرور ہے کہ جب عمر چھوٹی ہوتی ہے تب جانور آسانی سے گرایا جاسکتا ہے اور اسکا چمڑہ بھی علایم ہوتا ہے جس سے یکا آسانی سے لگایا جاسکتا ہے - بچیا کو کسی علیحدہ جگہ جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو لیجا دیں اور اس جگہ کو خوب صاف کر کے اور اسیر پرانی بچیا کر نرم بستر کر کے جانور کی ایک ٹانگہ پھینکی اور ایک اگلی ٹانگہ پکڑ کر دائیں کرپٹ

پھر کر دین۔ اب اگلی دو ٹوٹا لگین اور پچھلی دو مین ٹانگ اب مینون ٹانگوں کو ایک کر کے کسی مضبوط رستی سے باندھ دیں اور اوپر کے بائیں ٹانگ کسی مددگار کے ہاتھ پکڑا دیں کہ وہ مضبوط پکڑا رہے اور اونٹروں بیٹھ کر اپنے کہنوں سے لیٹی ہوئی بچیا کو دوبار کھے۔ اب اسکی ناف کے نیچے کی جگہ گرم پانی اور صابون سے خوب طرح مٹا کر کے تیز آسترے سے اس مقام کے بالوں کو مونڈ دیں اور کار۔ با۔ لکٹ۔ لورٹن (۱۰۰ حصہ مین ایک حصہ) سے اچھی طرح دھو کر خشک کر دیں۔ اب تہنوں پر پٹنی کے ارد گرد آدھ آدھ پنج کے فاصلہ پر نرم جگہ دیکھ کر نشتر سے ۲۰ یا ۲۵ پچھنے لگا دیں۔ اب ایسا کریں کہ کسی بچہ کے بازو سے یا کسی بچیا کے تہنوں کے دانوں سے تیز نشتر کی ٹوک پر مواد لیکر ان شگافوں میں داخل کر دیں۔ چند منٹ تک بچیا کو لیٹے رہنے دیں اور کبھی وغیرہ کی حفاظت کریں تاکہ مواد شگافوں کے اندر خوب طرح جذب ہو جاوے۔ اب بانس کی چند کھپچیاں لیکر انکو رستی میں پر کر کے بچیا کی گردن پر باندھ دیں تاکہ شگافوں پر مہر نہ مار سکے اب اسکو چھوڑ دیں تاکہ کھری ہو جاوے + جب اس ترکیب ٹیکا لگ چکے تب ان باتوں کی احتیاط لین چاہیے اول یہ کہ جہاں پر بچیا ہو اس جگہ کو صاف ستھرا کہیں اور پرانی بچیا کو اس پر نرم بسترہ کر دیں تاکہ جانور آرام سے بیٹھا رہے اور شگافوں کو کسی قسم کا صدمہ نہ پہونچے۔ دوم جانور جب گوبر اور متالی کرے فوراً اٹھا دیں تاکہ بسترہ اسکا مٹا رہے۔ سوم دین میں ایک دو دفعہ شگافوں پر پانی کے چھین ماریں تاکہ ان پر مٹی وغیرہ جم نہ جاسکے۔

ٹیکے کا دور۔ ٹیکا لگانے کے دوسرے سے تیسرے دن شگافوں کی جگہ ابھر کر سرخ ہو جاتے ہیں + چوتھے روز ان شگافوں پر نہایت چوٹے چوٹے دانے جنکی انکیں سفید اور گردا جیسا سرخ ہوتا ہے نمودار ہوتے ہیں۔ پانچویں روز

دانوں کی شکل گول ہو جاتی ہے۔ انکی نوکین دبی ہوئیں اور انہیں قدرے شفاف لمف ہوتا ہے + چھٹے روز دانے بڑے بڑے اور شفاف لمف سے خوب پُر ہو جاتے ہیں۔ ساتویں روز دانے آدرا بھی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ انکے گرد مالے پیدا ہو جاتے ہیں اور رنگت دانوں کی کس قدر زردی مالے جانے لگتا ہے۔ آٹھویں روز دانے مرجھانے لگتے ہیں۔ رنگت انکی ملبی ہو جاتی ہے اور انکے اندر لمف جو پہلے شفاف تھا اب گدلا ہو جاتا ہے اور خشک بھی ہونے لگتا ہے +

اگرچہ پانچویں چھٹے اور ساتویں روز کے دانوں کے مواد سے ٹیکا لگا سکتے ہیں لیکن چھٹے روز کا لمف سب سے افضل ہوتا ہے۔ پانچویں روز کا لمف بھی اگرچہ شفاف اور تیز ہوتا ہے مگر متعدد میں اس قدر کم ہوتا ہے کہ ٹیکا لگانے کے لئے بچے افراد سے آدین تو کافی نہیں ہوتا۔ ساتویں روز کا لمف کس قدر کمزور ہو جاتا ہے + بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ گل شگافوں پر دانے پیدا نہیں ہوتے اور جو ہون بھی تو چھوٹے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں اور انکے اندر کا لمف بھی ایسا موثر نہیں ہوتا جیسا کہ پانچویں اور چھٹے روز کے دانوں کا ہوتا ہے +

لاگ جانے کے لئے گائے یا بھینس کا مالدین و نر ایک جیسا ہے یعنی بچا اور بچیا دونوں کو ٹیکا لگا کر لاگ جا سکتے ہیں + ایک دانہ سے تین چار یا حد پانچ بچوں کو ٹیکا لگا سکتے ہیں +

فرق درمیانے بل اور پیو مین (انس) وگ سی نے شن۔ جب بھینس کی بچیا کے لمف سے ٹیکا لگایا جاتا ہے تب فیصدی پانچ چھ بچوں کو ٹیکا اور بخار شدت سے ظاہر ہوتا ہے مگر انسان کے مواد سے ٹیکا لگانے سے یہ دونو باتیں کم پیدا ہوتی ہیں +

فرق در میان اثر گاہے کی بچہ پیا کے مواد اور بہنیں کی بچہ پیا کے مواد کے۔ بہنیں کی بچہ پیا کا مواد تیز ہوتا ہے اور اس میں انفلیشن اور بخار بھی زیادہ ہوتا ہے مگر گاہے کی بچہ پیا کے لف سے ٹیکا لگانے میں یہ دونو باتیں کم پیدا ہوتی ہیں۔ اگر چھپ مادہ گاؤ کا مواد حاصل نہو سکے تو خاص مرض چھپ کے مواد سے گاہے کو ٹیکا لگاوین اور جو دانے اُسکے ہنوں پر پیدا ہوں اُن سے مواد لیکر ٹیکے کا عمل جاری کریں۔ کیونکہ خاص چھپ کا مواد جب گاہے کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے تب اُسکی خاصیت بدل جاتی ہے اور اُس میں خاصیت مادہ گاؤ کی چھپ کی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ان ترکیبوں سے مواد حاصل نہو سکے تو جس بچہ کے بازو پر چھپ مادہ گاؤ کے دانے خوب کامل طور پر لٹکے ہوں اُس دانے کے مواد سے ٹیکا لگانا چاہئے لیکن جب مواد اس ترکیب سے میسر نہین ہوتا ہے تب ایسا کرتے ہیں کہ ایک چو گوشت شیشہ پر تھوڑا سا مواد لیکر اُسکو دوسرے ٹکے شیشہ سے ڈھانپ کر کاغذ یا پنی سے خوب طرح مڑ دیتے ہیں تاکہ اندر کا مواد ہوا وغیرہ سے محفوظ رہے۔ جب اس مواد سے ٹیکا لگانا منظور ہوتا ہے تب دوزیشیوں کو علیحدہ کر کے جس ٹکے پر مواد لگا ہوا ہے اس پر ایک یا دو قطرے آب سرد کے چھڑ کر نشتر کی نوک سے رگڑ لیتے ہیں اور اُسی نشتر سے ٹیکا لگاتے ہیں بعض دفعہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ہاتھی دانت کی تیلون پر جنکی شکل کنگلی کے دانتوں کی سی ہوتی ہے مواد کو جمع کرتے ہیں چنانچہ جس بچہ کے بازو پر کوئی دانہ اچھا کامل ہوتا ہے نشتر کی نوک سے اُسکو چھید دیتے ہیں اُسکے کرنے سے جو قطرہ مواد کا نکلتا ہے اُسکو تیلی کی نوک پر لے لیتے ہیں اور جب وہ خشک ہو جاتا ہے تب تھوڑا سا مواد اُس نوک پر اور بھی لیکر خشک کرتے ہیں اسطوریہ دو تین مرتبہ کرنے سے جب اُس تیلی کی نوک پر مواد خوب طرح جمع ہو کر خشک ہو جاتا ہے تب اُسکو پنی سے مڑ کر

رکھ چھوڑتے ہیں اور جب اس مواد سے ٹیکا لگانا منظور ہوتا ہے تب بازو کے متھام مذکور پر پہلے نشتر کی نوک سے پھینکا لگاتے ہیں اور تب اس شگاف کے اندر مواد آلودہ میلی گئی نوک کو دھنسل کر کے دو چار لمحوں تک زخم کے اندر رہنے دیتے ہیں بعد ازاں اسکو نکال لیتے ہیں۔ بعض دفعہ کہنڑ سے ہی ٹیکا لگاتے ہیں چنانچہ اسکی ترکیب یہ ہے کہ کہنڑ کو ایک کہل میں دو چار قطرے آب سرد کے ذریعہ پیتے ہیں اور جب وہ پتلا ہو جاتا ہے تب اس مواد کو نشتر کی نوک پر لیکر مثل ترکیب اول کے ٹیکا لگاتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ جہاں تک ہو سکے بچہ یا کے تہن سے مواد لیکر ٹیکا لگانا چاہئے کیونکہ یہی مواد سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔

اسباب ک۔ سی۔ نے۔ شن کے بگڑ جانے اور اسکے مطالب کے فوت ہوجانے کے

چونکہ مطلب ک۔ سی۔ نے۔ شن سے یہ ہے کہ جس شخص پر یہ عمل کیا جائے وہ خاص مضر چیچک سے محفوظ رہے تو اس عمل کے کرنے میں ٹیکا لگانا نوالے کو نہایت محتاط چاہئے لیکن سب بڑی احتیاط یہ ہے کہ وہ شخص ایسا نہ رہو ایسا نہ کرے کہ نقشہ کے خانوں کو پُر کرنے کے لئے جھوٹ سچ بکھکھ مہرکا رکھ خوش اور اطفال کے والدین کو دھوکا دے کیونکہ جہاں تک اپنا تجربہ اس امر میں ہے ہم نے اکثر ایسا دیکھا ہے کہ وک۔ سی۔ نے۔ ٹر لوگ (ٹیکا لگانے والوں کو کہتے ہیں) ایک ہی موسم کے اندر ہزار ہا بچوں کو ٹیکا لگاتے ہیں مگر ہر کدو بارہ نہیں دیکھتے کہ دانے اچھے یا خراب نکلے ہیں اور نہ یہ دریافت کرتے ہیں کہ مطلب وک۔ سی۔ نے۔ شن کا اُس بچہ کو حاصل ہوا ہے یا نہیں یعنی چیچک خاص سے بچ رہا یا باوجود ٹیکا لگانے کے بھی وہ بچہ چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ان وک۔ سی۔ نے۔ ٹرون کا حال ایسا ہے کہ جاتے داتے اچھے نکلیں چاہے خراب اور چاہے نہ ہی نکلیں انکو اپنے فرضی نقشوں کے بہرے سے

مطلب یہ لیکن ہم انصاف سے نہ چوکینگے کہ یہ قصور صرف - دک - سی - نے - ٹرڈن ہی کا نہیں ہے بلکہ جو طریقہ دک - سی - نے - ٹرڈن کا بالفعل جاری ہے اس میں نقص ہے مثلاً اب یہ طریقہ ہے کہ موسم کے ختم ہو جانے کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس دک - سی - نے ٹرڈن کے کتنے بچوں کو ٹیکا لگایا ہے غرض جبکی تعداد بڑھ گئی اسکو انعام و اکرام اور پروانہ خوشنودی مزاج کا ملتا ہے اور خدا نخواستہ جسکا نمبر گھٹ گیا اگرچہ اس نے ایمانداری کا بھی غدر کیا کوئی نہیں سننا اس بچارہ کی شامت آتی ہے مورو عتاب سہوتا ہے نوکری جاتی رہتی ہے ٹکڑو بھجو محتاج ہوتا ہے - پھر تہلے اس قسم کے دک - سی - نے - ٹرڈن سے رعایا کو کیڑا کرنا بدیہ حاصل ہو سکتا ہے اور وہ کیڑوں اپنے بچوں کو ناقص نشتر چھوڑ دین کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ باوجود دک - سی - نے - ٹرڈن کے بھی جب چھپک کی وبا پھیلتی ہے سیکڑوں بچے تلف ہو جاتے ہیں چنانچہ ایسیو اسکو کو اکثر دک - سی - نے - ٹرڈن کو ملک الموت کے طور دیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو ایسا چھپاتے ہیں جیسے کوئی دشمن جانی سے چھپاتا ہے :

ہماری رائے یہ ہے کہ ہر ایک گاؤں اور شہر میں خاص نہیں مقامات کے چند ایسے ایسے لوگوں کو دک - سی - نے - ٹرڈن مقرر کرنا چاہئے جو بار بار اور ذی عزت ہوں جن کی آمد و رفت ہر کیسے ہر دن میں ہو اور جن کو مستورات مثل باپ یا مربی کے ہتھی ہوں :

دوم یہ کہ داخل مہنے کے وقت ان لوگوں سے ضمانت اور پچھلک اس مضمون کا لیا جاوے کہ ان کے علقوں کے اندر اگر چھپک کی وبا پھیلے اور جن بچوں کو انہوں نے ٹیکا لگایا ہے اگر ان میں سبب و باد مذکور کے موت کی کثرت ہو جاوے تو جتنقدر روپیہ انہوں کو سرکار سے بطور تنخواہ کے حاصل کیا ہے اس کو واپس کر دین کسواسلئے کہ الٹا کا اسبابہ پر اتفاق ہے اور سالہا سال کے تجربہ سے جو کہ یورپ اور ہندوستان میں حکمائے حاصل کئے ہیں یہ بات ثابت ہے کہ جس کیسکو ایمانداری سے ٹیکا لگایا جاتا ہے اور دانے اچھے

نکلنے ہیں وہ شخص خاص مرض چھپک کی چھوت سے محفوظ رہتا ہے بر تقدیر چھپک
 نکلی بھی تو وہ قسم خفیف ہوتی ہے مہلک نہیں ہوتی پس جبکہ یہ بات ہے تو چھپک کے
 دینے میں جیسا کہ اوپر لکھا ہے کمی کو عذر نہ ہوگا۔

سوم۔ دک۔ سی۔ نے۔ شن۔ کے کارگر ہو یا نہ ہو نیکی پوٹ گاؤں کے لمبر واون
 یا مبران۔ میو۔ نی۔ سپل کیٹی سے طلب کرنی چاہئے صرف دک۔ سی۔ نے۔ ٹرون
 کی رپوٹ پر اکتفا نہ کرنا چاہئے۔

چہارم۔ ان۔ دک۔ سی۔ نے ٹران ہی یا شہری کی نگرانی کے واسطے متعقل
 اور ذی عزت عہدہ دار مقرر ہونے چاہئیں۔ ان لوگوں کو خلفاء ان باتوں کی رپوٹ
 کرنی چاہئے کہ (اعث) جن بچوں کو بیکار لگایا گیا ہے ان کے والے اچھے اور کامل طور پر نکلے
 ہیں اور ان وائون کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے (ب) جن بچوں کو بیکار لگایا گیا ہے
 کمرڈ ان کے وائون کے جہر گئے ہیں اور بعد جہر جانے کمرڈ کے جو داغ موجود ہیں ہم نے
 انکو پچھم خود دیکھا ہے اور مطابق بیان فیل کے پایا ہے (د) ہم نے اچھے طور پر
 دریافت کیا ہے کہ فلانی جگہ میں چھپک کی وبا پہلی تھی اور جسے بچوں کو دمان کے

دک۔ سی۔ نے ٹرون نے ٹیکا لگایا تھا وہ سب کے سب وبا سے محفوظ رہے یا جبکو چھپک
 نکلی تھی وہ قسم خفیف تھی اور انجام اُس کا بخیر ہو اتھارٹ (دک۔ سی۔ نے ٹرون کی
 تنخواہ جب آمدنی چنگی یا آمدنی مدرفاء عام معقول ہونی چاہئے رج) ان کی ترقی یا
 تتری تعداد بیکار لگانے پر نہ کوہنی چاہئے بلکہ والے دک۔ سی۔ نے۔ شن۔ کے اچھے یا خراب
 اور ان وائون کے داغوں کے اچھے یا خراب ہونے پر اور ایام و بامیں بچکان ٹیکا یافتہ
 کے محفوظ یا مبتلا ہونے پر منحصر رکھنا چاہئے۔

پنجم۔ جب موسم دک۔ سی۔ نے شن کاگز جاوے اور دک۔ سی۔ نے ٹ
 اپنے حارب کتاب سے فارغ ہو جاویں تب ہی ان کی تنخواہ برستو جاری ہے لیکن اس شرط

پر کہ اپنے حلقہ کے ٹیکل کالج میں تاپہر لوٹنے دک سی۔ نے۔ شن کے موسم کے طب
 پڑ کر بن، بڑی خوشی کی بات ہے کہ لاہور میں اب یہ طریقہ جاری ہو گیا ہے کہ کسی سیون
 سے ٹیکہ خراب اور اس کا مطلب فوت ہو جاتا ہے لیکن سب سے بڑا بیمار میں قصور
 دک سی۔ نے۔ ٹیکہ ہے کیونکہ اگر وہ کسی خراب دانے کے مواد سے ٹیکہ لگے یا بھڑکا
 تازہ مواد بازو کے خشک مواد یا کھرنڈ سے ٹیکہ لگا دے تو اس ٹیکے پر غصہ و نہین
 کیا جاسکتا کیونکہ سرجے کے پیدا ہونے کے بعد دانے سے ٹیکہ لگانے کے لئے مواد
 لینا چاہئے جسے چھٹے ساتویں یا آٹھویں دن کے اندر کا مواد لینا چاہئے کیونکہ جب
 دانے کے گرد کا کال کامل طور پر پیدا ہو جاتا ہے تب اس کا مواد شفاف نہیں رہتا بلکہ لگا
 ہو جاتا ہے اور اس سے ٹیکہ لگانے سے جو دانے پیدا ہوتے ہیں ان پر غصہ و نہین کیا جاسکتا
 ایک اور خطا دک سی۔ نے۔ ٹرون کا یہ بھی ہے کہ ایک ہی دانہ سے بہت سا مواد لے لیتے
 ہیں ایسا نہ کرنا چاہئے کیونکہ جب کسی دانہ سے زیادہ مواد لیا جاتا ہے اور وہ دانہ گویا تھک
 جاتا ہے تب اس مواد کی طاقت کم ہو جاتی ہے خشک مواد سے جب ٹیکہ لگایا جاتا ہے
 تب اس سے اکثر خطا کا احتمال ہوتا ہے اور بعض تازہ مواد بازو کے وہ کمزور ہی رہتا
 ہے اور بغیر اشتہور دت کے کھرنڈ سے ہر کو ٹیکہ نہ لگنا چاہئے۔ جب بازو کا دانہ
 چھوٹا اور کامل نہیں ہوتا ہے تو اس کے مواد سے جو دانہ پیدا ہوگا وہ بھی چھوٹا
 اور غیر مکمل ہوگا۔

علامات درست ٹیکہ لگانے کی۔ جب ٹیکہ درست طور پر لگتا ہے تو دوسرے
 دن شگافون کے مقام کی مقدار اونچے ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کامین ایک چھوٹا سا
 دانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر انکو باریک بین سے دیکھا جائے تو مشل و سے سیدیکل
 دو دیکھو تعریف و سے۔ سیدیکل کی امراض جلدی میں ان کے دکھائی دینگے اور انکو کھینچ کر
 ہر مرضی پائل منظر ٹیکہ۔ یہ حالت والون کی تین یا چار روز تک رہتی ہے اور بعد میں سے

یا چونے روز مقامات مذکور زیادہ سرخ اور اونچے محسوس ہوتے ہیں اور پانچویں یا چھٹے دن متفرق دانے نجاتے ہیں رنگ جنگا سفیدی مائل ہوتا ہے شکل اُن کی اور یا سفیدی ہوتی ہے کنارے اُٹھے ہوئے اور نوکین بینی ہوتی ہیں۔ ساتویں دن اور آٹھویں روز کے اخیر میں ہر ایک دانے کے گرد ایک سرخ ڈال پیدا ہونے لگتا ہے بعد ازاں دو دن برابر یہ ڈال اور اس کا دانہ بڑھنے لگتا ہے ڈال مذکور گول اور ایک سرخ پینچ تک چوڑا ہوتا ہے۔ آٹھویں دن دانہ مذکور شفاف ہو اور اسے خوب پُر ہو جاتا ہے چنانچہ یہ آٹھواں دن دانہ کے کمال کا ہوتا ہے اور اُسی روز اُس دانہ سے مواد لے کر ٹیکا لگانا چاہئے۔ اب وہ دانہ گول اور مثل موتی کے جھلکدار ہو جاتا ہے کنارہ اُسکا سرخ مضبوط جھلکدار اور چکر کے طور گول ہوتا ہے۔ نویں یا دسویں دن تک وہ سرخ ڈال اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تب جلد دان کی نہایت متورم ہو جاتی ہے اور اُس کے گرد کی ساخت بھی سخت ہو کر پھول جاتی ہے اور دسویں دن بخار کے آثار بھی نمایاں ہو جاتے ہیں بعض کی نگلیاں سوج جاتی ہیں اور بعض دفو سا مے جسم پر سرخ سرخ دانے پیدا ہو جاتے ہیں گیارہویں دن ڈال مر جہانے لگتا ہے اور تب دانہ کی نوک خشک ہو جاتی ہے اور رنگ اُسکا بھورا ہونے لگتا ہے۔ اُسکے اندر کا مواد گدلا ہو کر رستہ رستہ منجمد ہونے لگتا ہے آخر کار چودھویں یا پندرہویں دن دانہ بالکل خشک ہو جاتا اور اُس کے اوپر گہرے بندہ جاتا ہے تنگ جھکا ہو اور سرخی باقی ہوتا ہے۔ اب گہرے خشک ہو کر سکرٹنے لگتا ہے اور سیاہ ہو جاتا ہے اور ٹیکا لگانے کے ۲۱ سے پچیسویں دن کے اندر جڑ جاتا ہے اور اُسکی جگہ پر ایک داغ ساری عمر کے لئے رہ جاتا ہے جب تک سی۔ نے۔ شن کا دانہ اچھا پیدا ہوتا ہے تب بعد جڑ جانے کہہ دے خوب نمایاں داغ رہ جاتا ہے چنانچہ اچھو داغ کی علامت یہ ہے کہ وہ داغ کمری کے آہستہ نظر آتا ہے اور گہرا دانہ دار یا دندانہ دار اور کنارے اُس کے خوب نمایاں ہوتی ہیں

جن علامتوں کا اوپر مذکور ہوا ہے وہ علامات وکٹ سی۔ نئے نین کی خاص جگہ پر پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کے سبب سے سارے جسم میں علامات عامہ بھی ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ ہیں ❖

علامات عامہ وک سی۔ نئے نشن کی۔ پانچویں سے سائون ون ایک بخار کی علامتیں ایسی خفیف ہوتی ہیں کہ اکثر معلوم نہیں ہوتیں لیکن جب سرخ ہالہ اچھے طور پر پیدا ہو جاتا ہے تب بخار کی علامتوں کو شدت ہوتی ہے اس وقت بیمار بے چین اور جسم اسکا گرم ہو جاتا ہے اور مدہ اور معا بھی کیتندہ بکڑ جاتے ہیں اور انہیں آیام میں خاص کر موسم اگر گرم اور بچہ طاقتور ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں پر تھوڑے بہت جسم پر بھی دانے نکل آتے ہیں اور قریب ایک ہفتہ کے رہتے ہیں ❖

فقرہ سوم وی سی سیلا

(نیچے چکن۔ پاکس)

تعریف۔ یہ ایک شدید مرض ہے جس کے شروع میں خفیف بخار ہوتا ہے اور تب دانے بلور وی سیکیل کے پیدا ہو کر اکثر پانچویں دن رفع ہو جاتے ہیں ❖ علامات۔ پہلے خفیف بخار ہوتا ہے۔ مریض سست ہو جاتا ہے۔ نیند جاتی رہتی ہے۔ بدن درد کرنے لگتا ہے۔ ہوک مر جاتی ہے۔ اور بعد مگنہ کے دانے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دانے پہلے پشت پر نمایاں ہوتے ہیں اور سرخ سرخ پے پیو۔ لے دو کیجیو جلد کی بیماریاں، کسے طور مثل عین ابتدائی دانے جھپک کے ہوتے ہیں بد و سرورن بد سرخ پے پیو ل چوٹے چوٹے وی سیکیل دو کیجیو جلد کی بیماریاں انجالتے ہیں جنہیں یا تو ایک شفاف بے رنگ یا شفاف زردی لیل لوبت ہوتی ہے ❖ دانے مذکور تیسرے

روز سچتہ ہو جاتے ہیں اور تب یا تو از خود ٹوٹ جاتے یا خشک ہو جاتے ہیں اور ان پر
سہو را باز روی مایل باریک گھنڈہ رہ جاتا ہے۔ یا دوسرے شکل چپک کے اس میں پیپ
سہن پڑتی اور اکثر یا بچوں میں دن دانے بالکل مفقود ہو جاتے ہیں۔

تشخیص چپک سر۔ اس مرض میں سباز خفیف ہوتا ہے اور سباز کے تھوڑے ہی
عہد بعد دانے نکل آتے ہیں یہ دانے پہلے پشت پر ہوتے ہیں اور شکل بدن کی نتو
پس ٹھیل دو یکہ جلد امراض کے طور پر ہوتی ہے اور نہ تو کین گن کی ڈلی ہو میں ہوتی
ہیں نہ باریک گھنڈہ دن دانہ کے اکثر یا بچوں میں دن نہ ہر جاتا ہے کہ جب دانے چپک کے
اکثر پوری مقدار کے ہو جاتے ہیں۔

علاج۔ پیارکوساٹ شہار کہیں اور ہلکی غذا دین۔ دوا کی اکثر اس میں ضرورت
نہیں پڑتی۔

فقرہ چہارم رو۔ بیو۔ لایعنے مے۔ زلس

تعریف۔ پنجابی میں اس مرض کو کہسہ کہتے ہیں۔ پہلے اس میں سباز اور زکام کی
علامتیں پیدا ہوتی ہیں اور بعد چوتھے روز کے جسم پر ایک خاص قسم کے دانے نکل آتے ہیں۔
اسام۔ یہ مرض چار قسم ہوتا ہے۔ ایک رو۔ بیولا۔ دل۔ گر۔ رس۔ دھڑل
رو۔ بیو۔ لا۔ سائلین۔ آرپ شتی۔ او۔ نی۔ بھیسار رو۔ بیولا۔ سائلین۔ کے ٹا رو۔
چوتھا۔ رو۔ بی۔ او۔ لا۔ مے۔ لگ۔ نا۔

اول رو۔ بیو۔ لا۔ دل۔ گر۔ رس۔ علامات۔ پہلے اس میں زکام
کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ جاکڑا معلوم ہوتا ہے اور بچہ سست اور کند ہو جاتا ہے
درد سر اور بونگہ آتی ہے۔ کہانی ہوتی ہے۔ آواز مہیٹہ جاتی ہے۔ دم لینے میں تکلیف
چہنکین بار بار چہرہ پر غارش۔ آنکھیں درد کرنے لگتی ہیں۔ پوٹے سوچ جاتے ہیں

ناک بہتی ہے۔ اور آنکھوں سے پانی جاری ہو کر لگتا ہے۔ بھی متناہا ہوتا ہے۔ اور
 تشنگی معلوم ہوتی ہے زبان میلی شہر، سرخ اور کھل علامات بخار کی موجود ہوتی ہیں جسم کی
 حرارت ۱۰۱ یا ۱۰۲ اور گاہے گاہے ۱۰۴ درجہ تک بھی ہو جاتی ہے چوتھے دن کا بعض
 تیسرے دن اور کبھی پانچویں دن بھی سرخ رنگ کے چہرے چہرے گول گول دن
 سپو کے کانے کے طور پر پہلے چہرہ گردن اور ہاتھوں پر بعد ازاں جسم اور تب پاؤں
 پر پیدا ہو جاتے ہیں لیکن ان تینوں مقاموں کے دانوں کے نکلنے میں اکثر ۴۸ گھنٹہ
 کافی ملتا ہوتا ہے اور یہ دانے ہلالی شکل کے کچھوں میں پیدا ہوتے ہیں رنگ
 انکا گہرا سرخ اور اس قدر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ بغیر چھوٹے کے محسوس
 نہیں ہوتے لیکن بعض دفعہ مثل پے۔ پیول اور کامل ہونے سے مثل سی میل
 کے بھی ہو جاتے ہیں۔ اکثر آٹھویں دن مگر کبھی پانچویں یا چھٹے دن رنگت دانوں
 کی مرجہا نے لگتی ہے چنانچہ یہ بات پہلے چہرہ گردن اور بازو کے دانوں میں پائی
 جاتی ہے اور تب بدن کے اور اخیر میں پاؤں کے دانوں کا رنگ مرجہا نے لگتا ہے
 اور ایک یا دو روز بعد دانے بالکل مفقود ہو جاتے ہیں اور انکا گہرا شکل سبب گندم
 جڑ جاتا ہے بعض دفعہ اس وقت اسہال جاری ہو جاتا ہے بخار اور کام کی علامتیں
 بعض دفعہ دانوں کے نکلنے سے رفع ہو جاتی ہیں لیکن اکثر ٹرہ جاتی ہیں یہ مدت
 اس بیماری کی ۹ سے ۱۲ دن تک کی ہے ۛ

دوم رو۔ بیو۔ لا۔ سائین۔ آرپ۔ ششی۔ اولی۔ یہ قسم بیماری کی وہ ہے
 جس میں بعض دفعہ بخار اور کام کی علامتیں موجود ہوتی ہیں مگر دانے نہیں پیدا
 ہوتے ۛ

سوم رو۔ بیو۔ لا۔ سائین۔ کے۔ ٹارو۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ
 کام کی علامتیں نہیں ظاہر ہوتیں اور گاہے گاہے بخار بھی نہیں ہوتا مگر ۛ

کے دانتے نکل آتے ہیں ۞

چہارم۔ رعبہ۔ بی۔ اولہ۔ مے۔ لگ۔ نا۔ رستہ۔ قسم کی بیماری میں علامت
متذکرہ نسبت قسم اول کے زیادہ تر شدید اور بہت جلد حالت ردی کو پہنچ جاتی ہیں۔
وانے جلد ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن بے قاعہ اور کبھی سببہ جاتے اور پہنچا کر سوچتے
ہیں۔ رنگ ان کا سیاہ یا گہرا ہوا ہوتا ہے اور ان کے پیچ پیچ میں سیاہ رنگ
کے داغ بھی پیدا ہو جاتے ہیں حلق بیمار کا گہرا سرخ یا دوا ہو جاتا ہے شکم میں درد
اور نفخہ ہوتا ہے اور دوست بدبودار اور سیاہ رنگ کے آتے ہیں مریض کو نہ بیان ہو جاتا
اور سہاکی نامیون میں جب غرابی برپا ہوتی ہے تب مریض کو روپ یا شدید نوبت
ہو جاتا ہے اس وقت یا تو بیمار دم بند ہو کر یا سبب آنے و سٹون کے کدور
ہو کر یا سبب مبتلا ہونے و داغ کے بیہوش ہو کر راضی ملک بقا کا ہو جاتا
ہے ۞

اسباب۔ یہ مرض شیرخوار دن اور بچوں کو ہو جایا کرتا ہے اور باعث اس کا
ایک خاص قسم کی چھوٹ ہے بعض دفعہ جوان اور بوڑھے بھی اس مرض میں مبتلا
ہو جاتے ہیں ۞

نتیجہ۔ مینو۔ مو۔ نیلہ۔ کروپ۔ پلو۔ ری۔ سی۔ اور سل کی بیماری ۞ بعض دفعہ
بوست لگ جاتے ہیں اور مے۔ سن۔ ٹے۔ رک گلا نڈ پڑھ جاتے ہیں۔ آنکھ میں آجاتی
ہیں۔ کان میں و نبل پیدا ہو جاتا ہے۔ کن پٹری پھول جاتی ہیں۔ یا گلو اور جڑے
کی گلٹیاں پھول جاتی ہیں اور کبھی منہ کے اندر چہا لے پیدا ہو جاتے ہیں اور
سو۔ پنگ۔ کاٹ ہو جاتا ہے ۞

علاج۔ بیمار کو صاف و ستھرا رکھیں اور کٹسٹریل یا جالپ کے جلابے صغائی شکم کریں
اس کے کہانسی کی رعایت رکھ کر معرقاب اور درات کا استعمال کریں مثلاً نسخہ

لائیکوار۔ ایمو۔ نیا۔ اسے۔ ٹے۔ ٹس۔ قطرے۔ مائٹر۔ مگرین۔ مائٹرک۔ ایتھر
 ۵۔ ہود۔ دے۔ غم۔ اپے۔ کے۔ کو۔ نا۔ قطرے۔ پے۔ را۔ گو۔ رک
 ۵ قطرے۔ پانی ایک یا ہڈام۔ سب کو ہا کر ایک خوراک کریں اور ایسے ایک ایک
 خوراک دو دو گنٹہ بعد پلا دیں۔ یہ نسخہ چھ مہینے کے بچہ کے واسطے موزوں ہے۔
 غدا۔ آتش جوار دو دو یا سا گودانہ دین مگر شیر مادر سب سے بہتر ہے۔
 نتائج علاج حسب مناسب کریں۔ قسم چہارم علاج کہانسی کی رعایت رکھ کر
 ٹائی۔ فس فیور کے کریں۔ اگر دانے دب جاویں اور اس وقت تشنج اور نڈیان ہو جا
 تو دانیوں کے پہر پہا کرنے کی تدبیر کریں چنانچہ مریض کو فوراً آب گرم مین بٹھا دیں
 اور سینہ اور پینڈیوں پر راجی کی پٹی یا بستر لگا دیں اور مفرحات مثلاً رم ایمو۔ نیا
 اور ایتھر کا استعمال کریں۔ جب مریض تندرست ہونے لگے تو غذا ہلکی مین اور مری
 اور سرد ہو اسے بجا دیں۔

فقرہ پنجم اسکار۔ لے۔ ٹے۔ نا۔

تعریف۔ یہ بیماری متعدی ہے اور مدت العمر میں اکثر ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے اور
 ابتداء میں بخار اور گلا آجاتا ہے۔ بعد ازاں دوسرے دن جسم پر سرخ رنگ کے بخارات
 نمودار ہوتے ہیں تب چمکا جڑ جاتا ہے۔

اقسام۔ اس بیماری کے پانچ اقسام ہیں اول اسکار۔ لے۔ ٹے۔ نا۔ سم پکس۔
 دوم اسکار۔ لے۔ ٹے۔ نا۔ ان۔ جے۔ نوزا۔ سوم اسکار۔ لے۔ ٹے۔ نا۔
 مے۔ لگ۔ نا۔ چہارم لے۔ ٹنٹ اسکار۔ لے۔ ٹے۔ نا۔ پنجم اسکار۔ لے۔ ٹے۔ نا۔
 سائین۔ آرپ۔ شی۔ او۔ نی۔

اول اسکار۔ لے۔ ٹے۔ نا۔ سم۔ یکس۔

مدت اس بیماری نہ ہر بیکار پڑے رہنے کی۔ اکثر حالتوں میں اس بیماری کا نہ ہر تین سے پانچ دن تک بیکار پڑا رہتا ہے مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک یا دو روز سے زیادہ عرصہ تک بیکار نہ ہی پڑا رہے اور چہ سے آٹھ دن تک بھی بیکار رہ سکتا ہے۔

مرض کا حملہ۔ اس مرض کا حملہ اسطور پر شروع ہوتا ہے کہ پہلے جسم میں پھریری معلوم ہوتی ہے مگر لرزہ نہیں ہوتا تب کم و بیش شدت سے بخار ہو جاتا ہے اور حرارت کا درجہ جلد چڑھ کر ۱۰۰ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جلد گرم اور خشک ہو جاتی ہے۔ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ اور نبض نہایت سریع اور نکلا آجاتا ہے۔ حلق سرخ یا خشک ہو جاتا ہے اور گردن میں سختی محسوس ہوتی ہے اور جھڑون میں درد معلوم ہوتا ہے۔ تھے اکثر ہونے لگتی ہے۔ تشنگی شدت اور بہوگ مر جاتی ہے۔ زبان پر قرحم جاتا ہے۔ اور اسکے کنارے اور نوک سرخ ہو جاتی ہے۔ ماتہ پاؤں میں درد اور سار جسم تھکا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ پیشانی پر درد اور کمال بے چینی ہوتی ہے۔ رات کے وقت کسیتقد رہن یاں بھی ہو جاسکتا ہے۔ اور چہوٹے بچوں میں بعض دفعہ کن۔ دل۔ شش یا کو۔ مادقتہ ہو جاتا ہے اور تب یہ بیماری شروع ہوتی ہے۔

بخارات کے نمودار ہونے کا درجہ۔ اسکار۔ لے۔ ٹے۔ نا کے بخارات حملہ کے دوسرے دن اکثر نکل پڑتے ہیں مگر بعض دفعہ بارسی ہی گنہٹ کے اندر نکل آتے ہیں اور کبھی کبھی تیسرے یا چوتھے دن ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلے پہل بخارات گردن اور سینہ کے اوپر کے حصہ پر نکلتے ہیں اور تب چہرہ اور سارے

جسم اور دماغ ہاؤن پر جلد پہنچاتے ہیں۔ مگر بعد فہم ٹانگوں پر پہلے لگتے ہیں۔ ابتدا میں تو بخارات چھوٹے چھوٹے سرخ داغوں کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں تب آپس میں ملکر انکی بڑی بڑی چٹین بن جاتی ہیں۔ اگرچہ ان چٹوں کی رنگت میں فرق ہے مگر اکثر یہ سرخ رنگ کی ہوتی ہیں۔ مگر چون چون بیماری ترقی پکڑتی جاتی ہے رنگت چٹوں کی میلی ہوتی جاتی ہے۔ دبائے تو رنگت بالکل مفقود ہو جاتی ہے مگر دباؤ کے ہٹتے ہی پھر لوٹ آتی ہے + مرض کے شروع ہونے سے چوتھے یا پانچویں دن بخارات مذکور اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں اور تب اس تاریخ سے چھ دن تک مرجھانے لگتے ہیں اور جسم کے جوئے حصہ پر پہلے ہمار ہوتے ہیں اسی حصہ کی چٹین پہلے مرجھانے لگتی ہیں اور اکثر نوین یا دسویں دن مفقود ہو جاتا ہیں اور تب جب تک جھڑنا شروع ہوتا ہے +

حالت گلو کی۔ حلق تھوڑا بہت سرخ ہو کر درم کرتا ہے اور یا تو خشک ہو جاتا ہے یا اسپر گاڑا لیسڈر بلغم لگا ہوا ہوتا ہے ٹان سل غدودوں پر میلے رنگ کی گاڑی ہی طوبت چٹنی ہتی ہے اور اپنی خفیف زخم بھی پیدا ہو جاسکتے ہیں یا پتہ پڑ جاسکتی ہے۔ جڑے کے نیچے کے غدود بڑھ جاتے اور درد کرنے لگتے ہیں ناک اور دھن کا میو۔ کس پردہ اور آنکھ کا پردہ کن۔ جینٹ۔ ٹامے۔ واسنج ہو جاتا ہے +

حرارت۔ جب تک بخارات اپنے کمال کو پہنچ لیتے ہیں تب تک جسم کی حرارت اکثر بڑھتی چلی جاتی ہے اور تب ٹھہر جاتی ہے بعد ازاں چون چون بخارات مرجھانے لگتے ہیں حرارت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ حرارت اکثر ۱۰۰ سے ۱۰۶ درجہ تک ہتی ہے مگر ۱۰۴ یا ۱۰۸ بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاسکتی ہے۔ مگر صبح کے وقت حرارت کو کس قدر تخفیف ہو جاتی ہے +

نبض نبض سیلچ ہوتی ہے اور ۱۲۰ - ۱۳۰ - ۱۴۰ بکواس سے بھی زیادہ تیز ہو جا سکتی ہے اور چون حرارت کم ہوتی جاتی ہے - نبض کی سرعت بھی گھٹتی جاتی ہے *

بہوک بالکل جاتی رہتی ہے مگر پیاس کی شدت ہوتی ہے - پانچواں اکثر نبض ہٹتا ہے - تھوڑا بہت درد سر بھی رہتا ہے - بے چینی بے خوابی اور رات کے وقت کس قدر زبان بھی ہو جاتا ہے *

پیشاب جیسے بخار دھکا ہوتا ہے - اور اس کے نیچے یورک اسٹڈ لوریو سٹ اور یو - ریا بھی ترشیں ہو جاتا ہے - مگر کلورائیڈ اف سو - ڈیٹم اور مرکبات از قسم فاس - فٹ کے کم ہو جاتے ہیں - پیشاب میں البیو - من اکثر ہوتا ہے اور باریک بین سے دیکھتے تو پیشاب کے دو دین گردون کا آپے - تھے - لے - ام دیکھ لائی دیتا ہے اور بعض دفعہ پیشاب میں خون ہوتا ہے *

بخارات پر سے چمکون کا جھڑ جانا جب علامتوں کو تخفیف ہونے لگتی ہے تب جلد کا آپے - ڈر - میں جسم سے علیحدہ ہونے لگتا ہے - جھڑنے سے پہلے جلد خشک اور سخت معلوم ہوتی ہے - اور چمکے انہیں مقامات سے پہلے جھڑنے لگتے ہیں جہاں جہاں پر بخارات پہلے نمودار ہوئے تھے - جہاں کی جلد باریک ہوتی ہے وہاں پر سے سبوسہ کے طور پر چھوٹے چھوٹے چمکے جھڑتے ہیں - دیگر مقامات سے بڑے بڑے ٹکڑے جھڑنے لگتے ہیں لیکن جہاں کی جلد بہت موٹی ہوتی ہے جیسے ماتھ پاؤن کے تلون کے وہاں سے بڑے بڑے چمکے اترنے لگتے ہیں - بعض دفعہ ماتھون اور انگلیوں کا سا پنچر کا سا پنچا اترتا ہے - چمکون کے جھڑنے کے وقت کئی دن تک نبض اور حرارت دونوں چیز معمولی سے کم ہو جاتے ہیں - پیشاب زیادہ اور پانی کے طور پر تھکا ہو جاتا ہے اور اس میں فاس - مارک اسٹڈ کی کمی ہوتی ہے - اندر سین گردون اور مشانہ کی آپے - تے - لیٹم

بجرت ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ دراز تک کلا چلا ہو معلوم ہوتا ہے اور ٹان - میل غدد
بڑھتے ہوئے رہتے ہیں ۔

عارضیات - اس بیماری میں سب سے ہماری عرض کیوٹ دس کو - میٹو
نفرائی - ٹس ہے کہ جیسر طبیب کی خاص توجہ مبذول ہونی چاہئے - اس مرض میں
کیفہ رالبو - مے - نو - ریاب بھی ہوتا ہے اور گردے بھی شیش مبتلا ہوتے ہیں ۔
ڈراپ - سی بھی لکھ چکا ہے اور مے ہو کرتی ہے - قبض رہتا ہے اور پیشاب کے خرابی
کے سبب - سے بیہوشی بھی جا - ہی ہو سکتی ہے ۔ حلق میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں -
جوڑ پھول جاتے اور درد کرنے لگتے ہیں ۔ برانکائی - ٹس اور نیو - میو - نیا اور تہائی سیر
بھی ہو جاسکتا ہے ۔ بعضہ نڈ - انڈو - کار - ڈوائی - ٹس اور دل کے کیوٹوں کی بیماریاں
پیدا ہو جاتی ہیں ۔ کان میں زخم پیدا ہو کر دماغ کو بھی مبتلا کر لے سکتا ہے ۔

انجام اس قسم کے مرض کا اکثر نیک ہوتا ہے خالصہ اگر گلو کی بیماری خفیف ہو
اور نکسیر جھوٹ جاوے یا اسپہال شروع ہو جاوے ۔

دوم - اسکار - لے - لے - نا - ان - جاوے - نو - نرا ۔

اس قسم کی بیماری میں جملہ اورنگاشت سے آجاتا ہے اور تجارت بہت سرخ
اور نہایت جلد پہل پڑتے ہیں اور تھوک پیدا کر نیو الی گل گلیٹان چھو لکھ کر دے کرنے
لگتی ہیں اندر کی جانب لگا اور سلسلہ سرخ ہو جاتا ہے اور لوزتین نرم اور تانوا اور کو ابرہ
جاتا ہے اور زبان پر ایک سفید رطوبت جم جاتی ہے اور اسکی چوٹی چوٹی گلیٹان
سرخ ہو جاتی ہیں حلق کے پیچھے ایک گاڑھی رطوبت اسقدر جمع ہو جاتی ہے کہ بیمار کو
دم لینے یا نکلنے میں کمال تکلیف ہوتی ہے - بعضہ فہ جسم سے گوشت نکلنے لگتا ہے
اور ناک اور کانوں سے پیپ بہنے لگتی ہے ۔ مریض کمزور اور پست ہمت ہو جاتا ہے -
نبض میرل نیند بالکل نہیں پڑتی - ہوک مر جاتی ہے اور بعضہ فہ ڈے - لے - ریم

یعنی نہیان ہو جاتا ہے۔ پیشاب کم اور اسپین البیو۔ من پایا جاتا ہے۔ مہتہ پاؤں پر آگاس کرتا ہے اور بعضہ فحہ سینہ اور شکم میں پانی بھر جاتا ہے۔
انجام اسکا اکثر بڑا ہوتا ہے۔

سوم۔ اسکار۔ لے۔ ٹے۔ نا۔ مے۔ لگٹ۔ نا

اسکی علامتیں نہایت رومی ہوتی ہیں، خلق اور گناہ سے بھرتا ہے اور نجرات اسکے اچھے طور پر نمودار نہیں ہوتے۔

انجام اس مرض کا نہایت بڑا ہوتا ہے۔

چھام لے ٹنٹ۔ اسکار۔ لے۔ ٹے۔ نا

بعضہ فحہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ مت نہیں پیا۔ اہوتی صرف بخار استہ پر سے باریک جلد کے چھلکے پھرنے لگتے ہیں یا صرف پیشاب میں البیو۔ من پایا جاتا ہے یا صرف استہ کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

پنجم اسکار۔ لے۔ ٹے۔ نا۔ سائین۔ ارپ۔ ششی۔ او۔ نی

بعضہ فحہ ایسا ہوتا ہے کہ بخار ہوتا ہے اور گلا آجاتا ہے۔ مگر نجرات ظاہر نہیں ہوتے مگر یہ باتیں اکثر اسوقت ہوتی ہیں کہ جب کسی کو یہ بیماری دوبارہ ہو جاتی ہے۔
نتائج۔ ناک اور کانوں میں زخم پڑ جاتا ہے جو ٹون میں درد اور ڈرپٹسی یا البیو۔ مے۔ نو۔ ریا کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔

اسباب۔ یہ بیماری ایک خاص زہر سے پیدا ہوتی ہے اور شدہ درجہ کی متعدی ہے۔ اس زہر کی خاصیت اتنیک ٹھیک طور پر دریافت نہیں ہوئی مگر یہ تو اچھے طور پر دریافت ہوا ہے کہ اس مرض کا زہر اس اپے۔ تہے۔ لے۔ ام کے چھلکوں میں بکثرت ہوتا ہے جو جلد پر سے مثل سبوسہ گندم یا بڑے بڑے چھلکوں کی شکل پر چڑھتا ہے اور انہیں سبوسہ کے ذریعہ بہت دور واز تک پھیل پڑتا ہے۔

اس بیماری کا نہر ایسا سیلج الاثر ہے کہ صرف بیمار کے کمرے میں جاتے ہی یا اس محلہ میں جاتے ہی اسکی چھوٹ لگ جاتی ہے۔ اگر مریض کا کمرہ ادویات و نفع عفونت سے اچھے طور پر پاک نہ کیا جاوے تو یہ نہر اس کمرہ کے مختلف حصوں میں عرصہ دراز تک گہات میں چھپا رہ سکتا ہے۔ نہر آلودہ اپنے تہو لیے۔ کم ذرات کیڑوں میں اور خطوں میں اور دیگر اشیاء میں آسانی سے چمٹ کر رہ جاتے ہیں اور انکے وسیلہ سے دوردوز تک پہنچ جاسکتی ہیں۔ ذرات مذکور بعض دفعہ دودھ اور دیگر اشیاء خوردنی کے ذریعہ پہنچ سکتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کو یہ بیماری خاصکر چھاتی ہے یعنی جنگی عسکر ۱۸ مہینے سے چھ سال کی ہوتی ہے لیکن تین اور چار سال کے مابین عمر میں یہ مرض خاصکر ہوجاتا ہے۔ عورت مرد دونوں اس بیماری میں مبتلا ہوسکتے ہیں۔ یہ مرض بڑے شہروں میں اور غربا کو اکثر ہوجاتا ہے۔

علاج۔ اگر یہ بیماری نہایت خفیف ہو تو مریض کو چلنے پہننے سے باز رکھیں

اور غذا ہلکی دین اور اصلاح شکم کریں اور جو کسی دوا کے دینے کی بہت ہی ضرورت ہو تو تھوڑی سی دوائیں ہمراہ پانی کے حسب عمر بیمار کے پاس رکھ سکتے ہیں۔ ایسا قیاس کرتے ہیں کہ عین ابتدا میں اگر کسی ہلکی دوا سے تھکرائی جاوے تو بیماری زیادہ شدت نہیں پکڑتی مثلاً اپنے۔ کے۔ کو انا ہمراہ مار۔ مار۔ امے۔ ٹاک۔ بین یا صرف اپنے۔ لک۔ کھلا کرتے کر اوین اور جب تھک جادے تب ایک ہلکا جلاب مثل کسٹرائیل پلاوین اور چونکہ اس بیماری میں خون بگڑ جاتا ہے اور اکثر قے دہنے خانوں میں نفاہی۔ برین سبج ہو جاتا ہے تو ۳۳ گرین سے ۸ گرین کی مقدار تک گھنٹہ گھنٹہ یا تین تین گھنٹہ بعد حسب شدت دوا علامتوں کے کار۔ بو۔ نٹ۔ اف۔ ایمو۔ نیا۔ کا استعمال کریں یا لائی۔ کوار۔ ایمو۔ نیا۔ اسے۔ ٹے۔ ٹس زیادہ پانی میں ملا کر جلاب بیمار کو پلاتے جاوین۔ بیماری نئی یا وہ تر شدید ہو اور لوزیتن بہت بڑھ جاوین اور تھکے

ہی ہوتی ہوں اسے۔ فر۔ وی۔ سنگ۔ ڈرا۔ فٹ پلاوین اور مضمحلان سی۔ لائی۔ ٹی۔
 کے کم کرنے کے لئے گوا۔ کم۔ گم۔ رنی۔ زن بہت میفدہ ہے چنانچہ
 نسخہ۔ سلفٹ اف مگ۔ نے ریشیاہ ڈرام۔ سفوف گوا کم ڈیڑھ ڈرام۔
 کیا ونڈ پاؤ ڈرا ف ٹراگا کانتھ۔ ہر گرین۔ پانی ۸۔ آونس۔

پہلے سلفٹ اف مگ۔ نے ریشیا کو پانی میں حل کرین بعد ازاں گوا کم اور ٹراگا کانتھ
 کے سفوف کو خوب طرح ملاوین۔ اس عرق کا چٹا حصہ چار چار گنٹھ بعد پلاوین جب تک
 دست ہلکے آوین۔ تیسرے ہی روز میں بہت بڑی اور بھولی ہوئی ہوں تو بشیر طیکہ بیمار
 جوان ہو گئے پر جو کین لگاوین اور بعد چھوٹ جانے جو کون کے اس مقام پر پوٹش
 بازہ دین تاکہ خون اچھے طور پر نکل جاوے۔ بخار کے واسطے اس سے۔ لائن کمپچر کا
 استعمال کرین جسکا ذکر بخار دین کے باب میں پیچھے ہوا ہے۔ اور جب تک بے باقی
 کے معقود نہ ہو جاوین گئے کو تخفیف نہو اور بخار کم نہو جائے اور جب تک بیمار رو بصحت
 نہ لاوے تب تک اسی علاج کو جاری رکھین اور جب دیکھین کہ بیمار اب رو بصحت لائیو الا
 ہے تب اسکا علاج ہلکے مقویات سے کرین۔

شدید قسم کے مرض میں چونکہ بیمار بہت کمزور ہو جاتا ہے اور کمزور میں بعض پھول
 جانے کے زیادہ تر مریخ اور خون سے پُر ہو جاتی ہیں اور چونکہ انکے زخم بہت گہرے اور
 بڑے ہوتے ہیں اور ان زخموں کے چہرے بے نسبت خفیف قسم کے مرض کے زیادہ
 متعفن ہوتے ہیں اور وہ زخم مردہ بھی پڑ جاتے ہیں اس واسطے علاج اس قسم کے مرض کا
 مقویات سے کرنا چاہئے تاکہ بیمار کی طاقت قائم رہے پس بیمار کو پورٹ یا شیری
 وایتن ہمراہ پانی کے اور شوربا پلاوین لیکن اگر بیماری اس سے بھی زیادہ شدید ہو
 تو بعض ایسے کمزور مریخ کا استعمال کرین یا کار۔ بو۔ نٹ اف ایمو۔ نیا ہمراہ
 کیا ونڈ۔ پنچر اف سنکونا یا کلو۔ ری۔ نے۔ ٹڈا سوڈا یا کرلیوزوٹ کے پلاوین۔

اور برائے نکاحی مین پہنچا تا ہے اور بعض دفعہ مقعد و رکتیم اور عورت کے اندام نہاتی اور گلائس - پے - نے - نس اور پری - پیس پر پی و پی لطف پایا جاتا ہے *

اسباب - ڈف - تھے - ریائی بیماری ایک خاص قسم کے نہر سے پیدا ہوتی ہے اور لشد درجہ کی متعدی بیماری ہے - نہر مذکور کی اصل کیا ہے - یہ بات ٹھیک طور پر دریافت نہیں ہوئی ہے لیکن ایسا قیاس کرتے ہیں کہ اس بیماری مین ایک قسم کی نہاتی کائی پیدا ہو جاتی ہے اور بعض کی یہ اسے ہے کہ اس مرض مین جسم کے بافتون مین اور عروق جاذبہ مین ایک قسم کے نہایت مخرد و مخرد کم پیدا ہو جاتے ہیں - اس مرض کے نہر کی چہوت نہایت سیل الاثر ہوتی ہے - اور جس مکان مین مریض ہوتا ہے اس مین اسکا اثر عرصہ دراز تک رہتا ہے اور وہاں سے اور مقامات مین پھیل جاسکتا ہے - نہر مذکور بیماری کی نفخ کی ہوا میز بھی ہوتا ہے *

اقسام - یہ بیماری کئی قسم کی ہوتی ہے چنانچہ
اول خفیف قسم کی - جب یہ بیماری خفیف ہوتی ہے تب گلہ خفیف انفلایشن ہو کر اس مرض کا خاص لطف تھوڑا بہت وہاں پر پیدا ہو جاتا ہے اور جڑے کے نیچے کے غدود قدرے پھول کر ورور کرنے لگتے ہیں - بخار بھی اس مین خفیف ہوتا ہے اور تھوڑے عرصہ تک رہ کر رفع ہو جاتا ہے مگر مٹیا بدین ال - بیو - من نہیں ہوتا - اس قسم کی بیماری سے مریض جلد رو بصحت لاتا ہے اور انجرام اسکا بخیر ہوتا ہے - لیکن یاد رہے کہ بعض دفعہ نہایت خفیف بیماری نہایت شدید ہو جاسکتی ہے *

قسم دوم - انفلام - ٹری فارم - اس مین بخار نہایت شدید ہوتا ہے اور مریض نہایت کمزور ہو جاتا ہے - اس مین گلہ کوئی عتلاتین بھی نہایت شدید

پیدا ہوتی ہیں یعنی گلو کے اندر دیکھا جاوے تو شدید انفلامیشن کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اور دونوں مان سیل نکلاؤ اور یو۔ دیوولا بہت ہی پہول جاتے ہیں اور بارہ گھنٹہ سے لیکر ۴۸ گھنٹہ کے اندر اچھا دبیر اور سخت فرو لمف کا پیدا ہو جاتا ہے اور کہانسی کے ذریعہ ٹھڑے ہو کر خارج بھی ہو جاسکتا ہے۔ گلو کی گلیٹین بہت پھول جاتی ہیں اور پیشاب سُرخ رنگ کا آتا ہے اور اسمین اکثر ال۔ بیو مین اور گرا۔ نیو۔ لمر کاسٹ بھی پائے جاتے ہیں ۔

قسم سوم نے۔ نزل فائرم۔ بیماری کی اس قسم میں ناک سے بیپ کی شکل کی بدبو دار رطوبت بہتی ہے اور رومی قسم کا بخار ہوتا ہے تو یہ ہی عرصہ بعد اسق سنخ اور پہولا ہوا اور پوس۔ ٹے۔ رمی۔ ار۔ نے۔ رش کے ٹولنے سے رطوبت بہنے لگتی ہے اور جیڑے کے آس پاس کے غدود بہت ہی پہول جاتے ہیں۔ بعد ازاں یا تو بیماری لے۔ رنگس یا نہ لے۔ رنگس میں پہلی جاتی ہے یا علامتیں نفع ہو کر شفا ہو جاتی ہے ۔

قسم چہارم۔ لے۔ وٹن۔ رے۔ ال اور ٹرے۔ کے۔ ال فائرم۔ اس قسم کی بیماری میں اس مرض کا خاص لمف پہلے لے۔ رنگس اور ٹرے۔ کیا پر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اس واسطے لے۔ رنگس کے مبتلا ہونے کی علامتیں اس قسم کی بیماری میں شروع ہی سے زور شور پر ہوتی ہیں ۔

قسم پنجم اس تھے۔ نک فائرم۔ اس قسم کی بیماری میں یا تو ابتدا ہی سے یا مرض کے آغاز رو رومین رومی قسم کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں چنانچہ بخار نہایت بڑا ہوتا ہے۔ جسم کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے اور جلد زردی لیل اور کسی قدر گرم ہوتی ہے۔ نبض نہایت کمزور میری اور بے قاعدہ چلتی ہے اور دل کی حرکت بہت ہی پست ہو جاتی ہے۔ زبان پر بھوسے رنگ کا قرحم جاتا ہے اور

لمون اور سوڑوں پر سار۔ ڈیزیم جاتی ہے۔ آخر کار نہایت رومی سلامت میں پیدا ہو جاتی ہیں اور ڈوے۔ لے۔ ری۔ ام کی حالت میں مریض راہی ملک عدم کا ہو جاتا ہے * مرض کے اسی قسم میں بدبودار زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ تنفس کی ہوا نہایت بدبودار ہوتی ہے اور گلو کی گلیٹن بہت ہی سوچ جاتی ہیں *

عارضات - اس مرض کے دور میں ایل۔ بیو۔ مے۔ نو۔ ریا اکثر ہو جاتا ہے اور رومی قسم کی بیماری میں ناک حلق اور ہوا کی نالیوں اور جسم کے اعضاء سے بھی خون اکثر جاری ہو جاتا ہے * جلد پیرس طرح کے بخارات پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً ارسی۔ تھے۔ ماکی ارسی۔ سے۔ پے۔ لس کی رو۔ زمی۔ اولاکم ارٹے۔ کے۔ ریا کی بلکڑے۔ سی۔ کیو۔ لہ قسم کے دانے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ریشش بھی مبتلا ہو سکتے ہیں * اور بعضہ فعد فالج بھی ہو جاتا ہے *

مدت ڈوف - تھے۔ ریا کی۔ دو سے چودہ دن تک کی ہوتی ہے لیکن جب اذہب بیمار یا عارض ہو جاتی ہیں تب بیماری زیادہ عرصہ تک بھی جاری رہ سکتی ہے یہ بیماری دوبارہ اکثر کھل رہتی ہے *

مدت نہ ہر کے بیکار رہنے کی - اس مرض کا نہ ہر اکثر دو سے چار روز تک بیکار پڑا رہتا ہے۔ مگر بعضہ فعد صرف۔ سم گہنٹہ تک یا کبھی آٹھ روز تک یا اس سے بھی زیادہ عرصہ تک نہ ہر بیکار رہ سکتا ہے اور تب بیماری کی علامات مندرہ پیدا ہونے لگتی ہیں وہ سلامت میں یہ ہیں کہ

علامات مندرہ - یہ علامتیں بتدیج اسطور پر شروع ہوتی ہیں کہ بیمار

سست اور تھوڑا بہت کمزور اور اکثر لپٹ ہمت ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی مریضی معلوم ہونے لگتی ہے چوک جاتی رہتی ہے۔ جی متدنا۔ دست آتے ہیں۔ درد مصل اور مریض اور نگہتا رہتا ہے اور خفیف بخار بھی ہو جاتا ہے۔ ساتھ ان علامتوں کے گردن

اچھکرا سخت ہو جاتی ہے۔ جگر کے پیچھے درد معلوم ہوتا ہے یا بعضہ فغہ گلو کے اندر
قد رے قلیل انفلامیشن کے آثار بھی پائے جاتے ہیں +

علامات مرض - جلد یا تو گرم اور خشک یا سرد اور چپنی سے مرطوب ہوتی ہے اور
بنفس کی حرکت بھی مختلف ہوتی ہے اگر منہ کے اندر پیچھے کی طرف دیکھیں تو حلق اور نوز میں
پہلے ہوئے اور ادوئے نظر آتے ہیں اور ۱۲ سے ۱۸ گھنٹہ کے اندر دوبارہ سخت
اور زردی مائل ایک لف کا پردہ اُن مقامات کے کسی حصہ پر پیدا ہو جاتا ہے مگر بعض
مرتبہ ایک سہمی دفعہ کئی مقاموں پر وہ پیدا ہو کر رفتہ رفتہ پھیلنے لگتا ہے اور کبھی تو ایسا
نے گس (مری) کے ذریعہ معدہ تک پھیل جاتا ہے اور کبھی لے رنگس اور مڑے کیا
اور براکیکل - ٹیوب تک پھیل پڑتا ہے اور تین دن کے اندر سارے انفلامیشن کے
مقام پر چھا جاتا ہے اور ایسی مضبوطی سے چمٹا رہتا ہے کہ علیحدہ کرنا چاہیں تو شکل جدا
ہوتا ہے اور جدا ہو بھی جائے تو اُس مقام سے خون نکلتا ہے مگر چند گھنٹہ بعد پھر ویسا
ہی پردہ پیدا ہو جاتا ہے جب لے رنگس اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تب آواز بیٹھ
جاتی ہے - دم لینے میں تکلیف مثل کروب کے ہوتی ہے - اس وقت چہرہ اور اوٹھیں
لنگھی پڑتی ہیں اور سبب تکلیف نفخ کے سینہ اٹھتا اور بیٹھتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور چند
گھنٹہ کے اندر مریض انتقال کر جاتا ہے + جبکہ شدت سے یہ بیماری نے - رنگس میں
ہو جاتی ہے اس وقت لنگھنے میں درد اور تکلیف ہوتی ہے اور جب یہ بیماری ناک
میں ہوتی ہے تب تنہوں سے پتلی سپیکے طور پر اس قدر بدبودار ایک طوبت ہوتی
رہتی ہے کہ مریض کا سارا کمرہ بدبو کرنے لگتا ہے اور نفخ سے بھی مٹری ہوتی ہے
جب مرض اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے تب بیمار نہایت جلد نڈال ہو جاتا ہے اور بیشتر
پیرا تو بیہوش پڑا رہتا ہے یا ترانے لگتا ہے - قلب کی حرکت گھٹ جاتی ہے -
چہرہ پیکا پڑ جاتا ہے - بنف نہایت باریک ہو جاتی ہے اور تب نہایت ضنف

یہ حالت میں بیمار مہرجاتا ہے *

تشخیص - کوئین - زہی کی بیماری میں صرف ٹان - سہل گلاڈ بٹلا ہوتے ہیں * جب صرف گلاڈ کہنے کو آتا ہے تو اسی طرح سہل کے اندر لطف کے پردے ہنہن جھمتے لیکن غم پڑ جاتے ہیں * کرپ کی بیماری صرف ٹرے - کیا ہی پر محدود رہتی ہے اور صرف بچن ہی کو ہوا کرتی ہے * انجام اس مرض کا اکثر بُرا ہوتا ہے *

علاج - جب تک جلد گرم اور نبض پُر ہو تب تک مفرحات از قلم خمر کے نہ دینا چاہئے - اسوقت نمکین مدرات اور معوقات کا استعمال بہتر ہے مثلاً گلیکولائیٹینا اس سے ملے - ٹس اور مٹرٹ اف پوٹاش کیا - سورمل اور جلیپ یا سنا اور سالٹ کا استعمال کر کے صفائی شکم کریں ہنہن تو اُس سے - لائین کسچر کا استعمال کریں جبکا ذکر بخارون کے باب میں پہچے کیا گیا ہے - گلے پر باہر سے تکیہ کریں اور سر کو گرم پانی کا بخار سُنہا دیں مثلاً وٹڑہ پاؤ پانی میں آٹھ اونس سرکہ کافی ہے یا اس نسخہ کا غرغره کریں -

نسخہ - گو - لارٹوس - لویشن (عرق سیسہ) ایک ڈرام * عرق گلاب ۸ اونس * اگر نبض کمزور ہو جاوے اور حلق کی مرضی اودھی اور مریض نہایت کمزور تب خمر کا استعمال زیادہ مقدار میں بار بار کریں - پاخانہ کا لحاظ رکھیں اور دیکھیں کہ اجابت ہر روز آجاتی ہو * اگر شیب میں البیو - مین یا خون آوے تو مدرات کا استعمال نہ کریں اس صورت میں رائج کی پٹی یا السی کی پولٹس کر پر بانڈھیں اور اس نسخہ کا استعمال کریں - نسخہ - کوئین - مگرین * ڈائیلیوٹ ڈیٹڈ رو سکورک اسٹڈ - ابونڈ * ٹینکھرف اسٹیل ۵۰ ابونڈ * انفیوژن اف کلہا ایک اونس * سب کو ملا کر ایک خوراک کریں - اور ایسی ایک ایک خوراک چہ چہ گھنٹہ بعد پلا دیں * حلق کے اندر یا تو نائٹرٹ آف سکورک عرق گلاڈین (۲۰ یا ۳۰ مگرین اونس پانی میں)

یا ٹائیڈ رو۔ کلورک اسٹڈ پانی مین ملا کر حلق کے اندر لگا دیں + ترکیب ان عرقیات کے لگانے کی یہ ہے کہ بالون کے بریش کو عرق مین تر کر کے جس جس مقام پر لطف کے ٹکڑے جم گئے ہوں اُنکے گرد اور اوپر دو تین دفعہ خوب جلد جلد پیروین اور ایک حصہ کار۔ با۔ لک اسٹڈ ۲۰۰ حصہ پانی مین ملا کر غرغہ کر دیں تو بھی بہت فائدہ پہنچتا ہے بعض حکیم شیکھر آن اسٹیل حلق پر لگانا مفید جانتے ہیں اور بعض چونے کے پانی کا غرغہ کرنے یا لگانے کو فائدہ مند سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساتھ اس غرغہ کے جب نامے۔ ٹریٹ اور کار۔ بونیٹ ان سوڈا کہلا یا جاتا ہے تب اس مرض کے خفیف قسم کو شفا اور تسم شدیدہ کو تخفیف ہو جاتی ہے۔ مرض ٹف۔ تھو۔ پیا اور کروپ مین جب منہ کے اندر برف کے ٹکڑے رکھے جاتے ہیں تو بیمار کو بہت آرام آ جاتا ہے +

لطف کے کاذب پردہ کو ہرگز نہ چیلنا چاہئے جب اس مرض کا نتیجہ فالج ہو جاوے تو ادویات مقوی کہلا دیں اور مقام مقلع پر تار بجلی لگا دیں اور صبح و شام اس گولی کو کہلا دیں +

نسخہ۔ اکثر کرکٹ ان ٹکس۔ وائییکا (کچھلے کاست) چوتھائی یا نصف کرین + سلفٹ ان ایرن نصف گرین + کینا وڈٹ رو بر ب۔ پل ۵۔ گرین + سب کو ملا کر ایک گولی بنا دیں +

اگر بیمار ہی شدید ہو اور لے۔ رنگس کی طرف پہلنا شروع کرے تو عمل ٹرے۔ کیا۔ ٹی کا کرنا چاہئے لیکن بیمار اگر جوان ہو تو بوجھن ٹرے۔ کیا۔ ٹی کے لے۔ رنگا۔ ٹی کرنا مناسب ہے +

مقالہ ششم

بیان اُن عام بیماریوں کا جنہیں جسم کے کسی حصہ خاص میں کوئی بیماری نقص پیدا ہو جاتا ہے

فقرہ اول اسکرا - فیو - لا

یعنی خنازیر

تعریف - یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں سارا جسم مبتلا ہو جاتا ہے اور اکثر اعضا کے اندر ایک مادہ پیدا ہو جاتا ہے جسکو اصطلاح میں ٹیو - برکل کہتے ہیں اور مختلف مقامات کے غدود پھول کر زخمی ہو جاتے ہیں +

اقسام - نہایت معروف و مشہور اقسام اس مرض کی تین - گلو کی گلیٹون کاٹرہ کہ پھول جانا اور انجین پیپ کا پڑ جانا + اسٹروئس انف تھال - میا (ایک قسم کا آشوب چشم) جلد پر دبلون کا پیدا ہو جانا اور انکے پھوٹنے کے بعد زخم کا جلد اچھا ہونا + لوزین کا پھول جانا + مولاے - شیر آئیم (یہ بڈیوں کا ایک مرض ہے) امراض منفاصل + سولیس اب سس (یہ ایک قسم کا ڈنبل ہے جو شکم کے اندر پیدا ہوتا ہے) + ٹیے - بس - مے - سن - ٹے - ریکا اور سل کی بیماری +

اس موقع پر صرف اس قسم کے اسکرا - فیو - لا کی بیماری کا ذکر کیا جائیگا جس میں گلو کی گلیٹان مبتلا ہوتی ہیں + دیگر اقسام کا ذکر حسب موقع ہوگا +

علامات - اسکرا - فیو - لا کی بیماری کا مادہ جسم کے ہر رگ وریشہ میں ایسا پہنچتا ہے کہ اس مرض کو مثل اور افرجہ کے اگر ایک مریض خاص یعنی اسکرا - فیو - لا

مزاج کہین تو بجا ہے۔ اس مزاج کی علامتیں یہ ہیں کہ گوشت ڈھبلا۔ جلد باریکہ رنگ گورا۔ چہرہ چمکیا اور صاف۔ بال بھورے اور باریک۔ اوپر کی لب پر شاک کے نہتے پہولے ہوئے۔ جسم لاغر اور نازک۔ پیشانی نکلی ہوئی۔ کاسہ سر بڈول سینہ تنگ اور بڈول۔ انگلیاں ماتھے کی موٹی۔ مفاصل چھوٹے ہوئے۔ دانت بگڑے۔ شکم بڑھا ہوا عموماً ان علامات کے اسکا۔ فیو۔ لس مزاج کے بچوں کا دوران خون سست۔ نبض کمزور اور باریک اور اطراف سرد رہتے ہیں۔ انکا ماضیہ بھی بگڑا ہوا رہتا ہے۔ اشتہا سلون ہوتی ہے۔ پاخانہ کبھی تھیں کبھی سست لگ جاتے ہیں اور ایسے لڑکے اکثر عقیل ذہین اور فہیم ہوتے ہیں اور انکے خیالات بھی ہمیشہ بلند ہوتے ہیں ۴۰

جب گلو کی گلیٹان اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں تب ایک یا دونوں جانب کے جبرے کے نیچے کے ایک یا کئی غدود کی قدر پھول جاتے ہیں۔ اگر انکو ادھر ادھر رکھ لائے تو حرکت کرتے ہیں۔ لیکن تو انہیں درد اور نہ آثار انفلامیشن کے پائے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ گلیٹان صرف اس قدر بڑھتی ہوئی ہفتون یا مہینوں بلکہ برسوں تک ہتی ہیں اور کبھی بتدریج بڑھتی جاتی ہیں اور بعض اوقات آپس میں ملکر مثل سیج کے گرہ دار ہو جاتے ہیں اور کبھی بتدریج رفع بھی ہو جاتی ہیں لیکن اکثر ان میں پیپ پڑ جائا کرتی ہے۔ اسوقت پھوٹ جاتی ہیں اور ان سے ایک گاڑا مواد اور پتلی رطوبت بہنے لگتی ہے۔ پھوٹنے سے جو زخم پیدا ہوتا ہے وہ بد رنگ سخت اور متورم ہوتا ہے۔ کنارہ ٹھیکڑا بینگا اور گاڑھے مواد سے پُر ہوتا ہے۔ یہ زخم نہایت دیر سے خشک ہوتے ہیں اور بعد خشک ہونے کے جو داغ رہ جاتے ہیں وہ بد شکل ہوتے ہیں اور جب ایک زخم ہوتا ہے تب دوسری اور تیسری گلیٹان پھوٹ کر زخمی ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ ایسے طور پر گلو کی ساری گلیٹان یہو لکر زخمی ہو جاتی

ہیں۔ ان زخموں کے باعث علامات جسمی بہت شدید نہیں پیدا ہوتیں لیکن ان جب بہت سی گلیٹیاں اس جسمی مین بہتلا ہو جاتی ہیں تب البتہ بیمار کو دق ہو جاتا ہے اور کمزوری اور لاغری لاحق حال ہو جاتی ہے اور بیماری جب مزمن اور مریض جان تب سہل کی بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہے ۔

ماہیت ٹیو۔ بر۔ کل کی۔ ٹیو۔ بر۔ کل کیا چیز ہے اور کس طرح پیدا ہوتا ہے اس بات میں اطباء کی رائے میں اختلاف ہے۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ ٹیو۔ بر۔ کل کو طبعی سمجھتے تھے کہ یہ ایک خاص قسم کی رطوبت ہے جو خون سے خارج ہو کر فطرت یا کیلون کی شکل بن کر جم جاتی ہے۔ اس رائے کے پیرو اب بھی بہت ہیں۔ مگر اب اس رائے کو بہت غلط سمجھتے ہیں۔ بر۔ کل کا مادہ خود عروق جاذبہ (لم۔ فائیک۔ رسیسیا) میں پیدا ہوتا ہے اور سبب اسکا یہ بتلاتے ہیں کہ کوئی موذی مادہ باہر سے جسم کے اندر کی طرح داخل ہو جاتا ہے اور ٹیو۔ بر۔ کل ان کی شکل اختیار کر کے جسم کی مختلف بافت میں ظاہر ہو جاتا ہے ۔

شکل ٹیو۔ بر۔ کل کی محققین دو قسم کے ٹیو۔ بر۔ کل کا بیان کرتے ہیں ایک گول گولے گولے نیو۔ لے۔ شن یا مے۔ لئے ری ٹیو۔ بر۔ کل کہتے ہیں اور دوسری قسم کو پلو ٹیو۔ بر۔ کل بولتے ہیں ۔ مے۔ لئے۔ ری ٹیو۔ بر۔ کل مریضوں کے دانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے دانے ہو کر رہتے ہیں یہ دانے اکثر گول گول ہوتے ہیں مگر بعض دفعہ پہلے بھی ہو کر رہتے ہیں اور اکثر تو سخت مگر بعض دفعہ ملائم بھی ہوتے ہیں۔ رنگ انکا سفید نیلگون یا چمکدار سرخی ہو کر رہتا ہے اور نہ تو بہت شفاف اور انہیں خون کی رنگین نہیں ہوتیں اور نہ تو در نما کی طاقت رکھتی ہیں ٹیو۔ بر۔ کل کے دانے یا تو الگ الگ چھترے ہوئے پیدا ہوتے ہیں یا بہت سارے ملکر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ عین ابتدا میں ٹیو۔ بر۔ کل کے دانے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے لیکن جب انہیں اور مادہ

جمع ہو جاتا ہے تب خوب نظر آتے ہیں +

قسم دوم جب کو یو ٹیو۔ بر۔ کل کہتے ہیں وہ پینر کی شکل کے مادہ کے ٹپے ہوتے ہیں۔ یہ ڈولے یا تو خاص ٹیو۔ بر۔ کل کے مادہ سے بنتے ہیں یا انفلامیشن کے مادہ یا دیگر موزی مادہ سے بنکر پینر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں +

اسباب۔ اہٹا کی رائے اس بات پر متفق ہے کہ یہ بیماری جب کو عربی میں خنا زیر کہتے ہیں موروثی ہے۔ گاہے گاہے جنین میں اس مرض کا مادہ موجود ہوتا ہے اور اسکے آثار پیدائش سے بچہ میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بیاہ جب بہت ہی کم عمر میں ہوتا ہے یا جب باپ کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے تب اسکے بچہ میں اسکا ایسیو۔ لاکسی عد متین پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ایسین بھی کچھ شک ہنہین ہے کہ آتشک کے زہر سے بھی خنا زیری مادہ پیدا ہو سکتا ہے نسبت زیادہ عمر کے آدمیوں کے یہ بیماری بچوں میں بکثرت پائی جاتی ہے اور جب یہ بیماری بچوں کو ہو جاتی ہے تب ایسین بہتر کے اعضا مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن جوانوں میں یہ مرض اکثر محدود رہتا ہے اور یہ کہ بچوں میں یہ بیماری اکثر غذا و دون میں زیادہ تر پیدا ہوتی ہے اور غراب غذا اور غراب آب و ہوا میں بود و باش کرنا بھی اس مرض کی استعداد پیدا کرتا ہے +

علاج۔ حفظ صحت کے کل قواعد کا پابند ہونا چاہئے۔ غذا بیمار کی سیرج اہضم و رمقوی ہونی چاہئے ماضیہ درست رکھنا چاہئے اور دو کی قسم سے مقویات کا استعمال کرنا چاہئے جیسے فولاد اور کاڈ۔ لیور۔ آئیل اور مرکبات آئیو۔ ڈین وغیرہ +

فقہ دوم رمی۔ کش

تعریف۔ یہ بیماری اطفال شیرخوارہ اور بچوں کو ہو جاتی ہے اور اس مرض

مین چونکہ ٹھہریون کے اندر اجڑا راضی کم ہو جاتی ہیں تو ہڈیاں خم کہا جاتی ہیں ۔
 علامات - بعض دفعہ یہ بیماری پیدائش سے ہوتوڑے ہی دونوں کے
 بعد ظاہر ہو جاتی ہے ۔ لیکن جب بچہ کی عمر پانچ یا چھ مہینے کی ہوتی ہے تب بھی
 اکثر پیدا ہوتی ہے اور زیادہ اس وقت کہ جب بچہ دو سال کا ہو جاتا ہے ۔ چہرہ
 پیلا دانت دیر سے نکلتے ہیں اور جلد ڈھیلی اور جا بجا زخمی ہو جاتی ہے ۔ سر کے
 یا فوج اور دروز اکثر کپلے رہتے ہیں ۔ سر چڑھا کر پیشانی نکلی ہوئی ہوتی ہے سینہ
 دونوں جانب سے دبا ہوا اور سینے کے سامنے کی ہڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے ۔ ہڈیاں
 مستحکم درمفاصل کہہ سکتے ہیں ۔ ہوتے ہیں ۔ جو ان بیماری بڑھتی جاتی ہے ہڈیاں
 خم کہا جاتی ہیں ۔ پشت اور کولہ کی ہڈی جیہنم کہا جاتی ہے ۔

اسباب - جس کیسے خاندان میں یہ مرض ہوتا ہے اسکو یہ بیماری ہی ہوتی ہے اور خاص مزاج کے سبب بھی طبیعت میں اس مرض کے پیدا کرنے کی استعداد ہوتی ہے اور خراب غذا خراب ہوا خراب جگہ میں بود و باش کرنا اس بیماری کے اشتعال کو مینوالے سبب ہیں +

علاج۔ اس بیماری میں عین ابتدا سے غذا کی احتیاط کرنی چاہئے یعنی غذا زود ہضم اور تقوی دین والہ کا دودھ اچھا نہ تو مرض کا دودھ بچہ کو پلاوین، مقویات مثلاً فولاد اس مرض میں بہت مفید پڑتے ہیں اور ہڈیوں کے اندر اجزا از جسم فاس۔ نٹ کے کم ہو جاتے ہیں اسلئے فاس۔ فٹ، اے، یرن، فاس۔ نٹ، اے، اے یا در حالت کمزوری فاس۔ فٹ، اے، یرن، پنا کا استعمال مناسب ہے اور بچہ کے خمیدہ ہاتھ پاؤں کو کسی ایسی ترکیب سے سہارا دین جو انکی حرکت کا مانع

فقہ سوم اس - کمر - ومی
تعریف :- ایک زمین پھاری ہے جس میں ابتدا کے اندر بعض کمزور اور

پست ہمت ہو جاتا ہے۔ منہ سے بدبو آتی ہے۔ سٹوڑے پہو لکڑی اور آخر
کو زخمی ہو جاتے ہیں جسم پر او سے یا نیلے دہتے پڑ جاتے ہیں اور ناک سے
یا پاخانہ کے ہمراہ خون بھی آسکتا ہے ۴

ماہیت تشیریحی - اس بیماری میں خون بگڑ جاتا ہے یعنی یا نو خون کے
اند کوئی شے داخل ہو جاتی ہے یا اس کے آخر کا کوئی جزو کم ہو جاتا ہے اور یہ بات
اُس وقت ہوتی ہے کہ جب اغذیہ معمولی میں کسی جزو خاص کی کمی ہوتی ہے چنانچہ
تجربہ سے ثابت ہے کہ جب وہ جزو بندریدہ غذا کے خون میں شامل کر دی جاتی ہے
تب خون صحیح پیدا ہوتا ہے اور مرض رفع ہو جاتا ہے ۵

علامات - ابتدا میں جلد کی رنگت خاصہ چہرہ اور پوٹون کی رنگت
بدل جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ پاؤں میں ایک درد شروع ہو جاتا ہے
جو ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ طبیعت بیمار کی سیوہ جات کے
کہانے کی طرف مائل رہتی ہے لیکن دروون کے ہمراہ بخار نہیں ہوتا۔ نبض صحیح
مگر جسم کی حرارت غریزی بہ نسبت صحت کے کم۔ چہرہ پلایا زرد یا سو جا ہوا ہوتا ہے۔
کل تو جسم کے کمزور ہو جاتے ہیں۔ سٹوڑے پہو لکڑی اور دانوں پر پڑ جاتے ہیں
کنارے ان کے او سے ہوتے ہیں اور ان کی اسبب ان سے خون جاری ہو جاتا ہے۔
لیکن پڑنے والے میں جب حادثہ کر جاتے ہیں تب سٹوڑوں میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا
جب سٹوڑوں کی یہ حالت ہوتی ہے تب سارا جسم ایسا کسمند ہو جاتا ہے کہ فرات
دباؤ یا چوٹ کے لگنے سے خون جمع ہو جاتا اور اس مقام میں زخم پیدا ہو جاتے
ہیں بعد ازاں پاؤں پر چھوٹے چھوٹے دانے مثل ایتھوگے کاٹنے کے نمودار ہوتے
ہیں تب پاؤں درانوں کے عضلے سخت ہو کر درو کرنے لگتے ہیں اور ایک یا دو
ون کے بعد درد کے مقام پر پہلے زرد بعد ازاں نیلے نیلے دہتے پڑ جاتے ہیں مگر

کیرین اور دیگر کھین کے روزمرہ کی غذا میں نازیسی ترکا رہی ہوتی ہے یا نہیں اور دور دوراز کے بحری سفر میں روانہ ہونے سے پیشتر جہاز میں گوشت اور ترکا۔ سی کا بندوبست کیجئے طوطہ پر کیرین + غرض اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ اس بیماری کو جو حقد ر فائدہ غذا سے ہوتا ہے اس قدر دوا سے نہیں ہوتا پس مریض کو نازیسی ترکا رہی تازہ میوہ جات اور زہلہ لحم کی غذا میں اور نیبو کا آب شورہ ملا دیں اور بطور دوا کے سائٹریٹ آف ایرن اینڈ۔ کونین کا استعمال کیرین سوڑوں اور جنوں پر ٹائٹریٹ آف سلیوٹک دین اور دیگر قوہ جراحی سے ان کا علاج کریں ۔

فقہ چھپا رم پر۔ پیو۔ را

یہ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے ایک سنبل اور دوسری ہے۔ مو۔ را۔ جک *
ماہیت :- اس بیماری کی اچھے طور پر دریافت نہیں ہوئی ہے اس بیماری میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی عضو یا ذرونی میں خون تراش پاکہ جمع ہو جاتا ہے چنانچہ یہ بات اکثر شش و ماغ جگر اور امعاء میں ہوا کرتی ہے *
علامات :- سرخ و دہیوں کے نکلنے سے کئی مہینہ پیشتر ایسا ہوتا ہے کہ

مریض کمزور اور تھکا ہوا معلوم ہوتا ہے اور گاہے گاہے بیہوشی طاری ہوتی ہے اور نم معدہ پر چبانے کے طور کا دہیہا دہیہا درد ہوتا ہے۔ اشتہا اکثر تو کم ہوتی ہے مگر بعضہ فہوگ نہایت شدت سے لگتی ہے لیکن جب بیمار کھانا کھاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ کھانا چھاتی پر دہرا ہے۔ رنگت زبان کی رزدی باطل ہوتی ہے۔ چہرہ بیمار کا پیکا سوجا ہوا اور آنکھوں کے پوٹے منوم ہو جاتے ہیں بعد ازاں پہلے ٹانگیں اور تب رانوں بازو اور سارے جسم پر اوڑے اوڑے درہیتے (رامی۔ کسے۔ مو۔ سس) پیدا ہو جاتے ہیں اس وقت بیمار نہایت

کمزور اور سبب ہمت ہو جاتا ہے۔ وہ بے مذکور پہلے تو سرخ ہوتے ہیں لیکن ایک یا دو دن کے اندر رنگت اُنکی اُدھی ہو جاتی ہے اور تب رنگ اُنکا پورا ہو جاتا ہے اور جب ٹٹنے لگتے ہیں تب رنگت اُنکی زردی مائل ہو جاتی ہے۔ نبض کمزور اور سیرج ہوتی ہے فم معدہ اور سینہ شکم یا کمر میں گہرا درد معلوم ہوتا ہے اور جب بیمار جلتا پرتا یا سیدھا کھڑا ہونا چاہتا ہے تو سر گھومتے لگتا ہے۔ پاخانہ قبض رہتا ہے۔ دل دھڑکنے لگتا ہے اور حرکت اسکی بے قاعدہ ہو جاتی ہے اور بیمار کو اکثر غش بھی آ جاتا ہے۔ *

اسباب۔ سبب اس بیماری کے اچھے طور پر دریافت نہیں ہوتے یہ مرض بہ نسبت مردوں کے اکثر عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے اور خراب غذا اور خراب آب و ہوا اور زیادہ مشقت اور بچ و غنیم بھی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے کبھی ایسا ہی دیکھا گیا ہے کہ باوجود حفظ صحت کے عمدہ پابندی کے بھی یہ مرض پیدا ہو گیا ہے لیکن ایسا اُس وقت ہوتا ہے کہ جب دُخمہ بگڑ جاتا ہے اور کثرت شراب خوری کے باعث مریض کمزور ہو جاتا ہے۔ *

تشخیص۔ اس بیماری کو مرض اسکر۔ وی سے فرق کرنا چاہئے۔ چنانچہ ان دونوں مرضوں میں یہ فرق ہے کہ اسکر۔ وی کی بیماری کی علامتیں بتدریج ظاہر ہوتی ہیں اور بیمار کی صحت میں بتدریج فرق پڑ جاتا ہے۔ جلد کی رنگت پسلی ہو جاتی ہے جلد کے نیچے لطف کے پیدا ہونے سے اُبھار بن جاتے ہیں اور ان دونوں مرضوں کے پیدا ہونے کے سبب میں بھی بڑا فرق ہے برخلاف اسکے پر۔ پیو۔ راکی بیماری دفعتاً ظاہر ہو پڑتی ہے اور یہ مرض ہری ترکاری کے نہ کھانے سے نہیں پیدا ہوتا ہے اور اس مرض کا اثر مسوڑن پر نہیں ہوتا ہے۔ *

علاج۔ نسخہ مفصلہ ذیل یا کٹر امل کا استعمال کرین تاکہ صفائی شکم کی کما حقہ ہو جاوے

نسخہ سلفٹ آف سوڈا ۱۰ ہوم کریں ۱۰ ڈائیکلوٹ - سلیفورک اسڈ ایک ڈرام
ایفوزن آف چریتیا - ۶ آونس ۱۰ سکو ملا کر تین آونس کے ہر روز ایک دفعہ پلا دین
ہنیں تو وہی سی - لائن کیچکر استعمال کریں جسکا ذکر بخار کے باب میں پہچھے کیا گیا ہے
تا کہ اچھے طور پر صفائی شکم کی ہو جاوے ۱۰ اور تب حسب ضرورت اس نسخہ کا استعمال
کریں - نسخہ کوئین ۱۰ اگرین ۱۰ سلفٹ آف ایرن ۱۰ اگرین ۱۰ لائیکو - اسٹرکے
۳۰ بوند ۱۰ ارو - ماک - سلیفورک اسڈ ڈیڑھ ڈرام ۱۰ ایفوزن ایک کو شیا
۱۰ آونس ۱۰ سکو ملا دین اور اسکا چٹا حصہ دین تین دفعہ پلا دین یا ٹیکر آف اسٹیل
کا استعمال کریں ۱۰ اگر کسی عضو اندرونی میں خون کے رسنے کا اندیشہ ہو تو روغن تارین
کا استعمال کریں لیکن خون بند کرنے کے لئے یہ نسخہ نہایت مفید ہے -

نسخہ گبا - لک اسڈ ۱۰ اگرین ۱۰ ڈائیکلوٹ - سلیفورک اسڈ ۱۵ - بوند ۱۰
ڈسٹلڈ واٹر - ۴ - آونس ۱۰ سکو ملا کر ایک خوراک کریں اور چار چار گھنٹہ کے بعد
پلا دین اور ارگٹ اف رائی بھی اچھی دوا ہے ۱۰ بیمار کو غذا ملکی اور مقوی دین اور
کہانے کو ہری ترکاری و تازہ میوہ جات خوب دین ۱۰

فقرہ پنجم رو - ما - ٹے - نرم

اس بیماری کو عربی میں وجع مناسل اور ہندی میں گنٹھیا کہتے ہیں - یہ بیماری
پانچ قسم کی ہوتی ہے -

اول کیوٹ ار - ٹے - کیو - لر - رو - ما - ٹیزم اسکو - رو - ما - ٹک نیو ہی کہتے ہیں ۱۰
دوم کراک ار - ٹے - کو - لر - رو - ما - ٹیزم ۱۰
سوم سکیو لر - رو - ما - ٹے - نرم اسکو - مائی الجیا بھی کہتے ہیں ۱۰
چہارم گو - نو - رمی - ال - رو - ما - ٹے - نرم ۱۰

پنجم روئے ٹائیڈ آرہے۔ رائی ریش

اول اکیوٹ آرہے۔ کیولر رو۔ ما۔ ٹیم
رو۔ ما۔ ٹک فیور

تعریف۔ اس مرض میں جسم کے اندر ایک خاص قسم کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جس
سبب سے بخار ہو جاتا اور جوڑوں میں انفلمیشن جس سے جوڑے ہلکے ہو کر دھرنے لگتے
ہیں۔ اثر اس بیماری کا خاصہ دھائیٹ۔ فاسی۔ بریس۔ ٹی۔ شیمین ہو جاتا ہے
مشکلات کے خلاف اور ریشہ اور ٹن۔ ڈن اور بر۔ سا اور کپ۔ شیو۔ لہ لگ ٹیٹ
اور پے۔ ریاس۔ ٹیم اور پے۔ رمی۔ کار۔ ڈیم

ماہیت۔ درحقیقت یہ بیماری خون کی ہے یعنی زہر اس مرض کا لک۔ ٹک اسٹ
ہے اور علاوہ اس اسٹ کے خون میں فاسی۔ برین کی بھی بہت زیادتی ہوتی ہے
پیشاب بہت ترش اور سرخ رنگ کا آتا ہے اور اس میں کثرت سے یورک اسٹ
پایا جاتا ہے

علامات۔ سردی کے لگنے یا بارش میں بیگنے کے بعد ہی یہ مرض شدید رنگا
کی علامتوں سے شروع ہو جاتا ہے اور ابتدا میں پشت اور ہاتھ پاؤں میں تپ
شدت کا درد ہوتا ہے۔ ساتھ اس درد کے مریض کو سردی محسوس ہوتی ہے اور بدن جھک
جاتا ہے اور بعد ایک یا دو یا تین روز کے بڑے بڑے جوڑوں میں انفلمیشن ہو کر دھرنے
ہو جاتے ہیں اور چوڑے سے گرم محسوس ہوتے ہیں پھول کر تن جاتے اور اس میں اس قدر
شدت اور درد ہوتا ہے کہ چونا محال ہو جاتا ہے۔ مریض نہایت ناچار ہو جاتا ہے تشنگی
بشدت اور بہک مر جاتی ہے نبض ۹۰ سے ۴۰ تک اور پرخند اور زیادہ ٹرپ کی ہوتی
ہے زبان پر ایک سفید رنگ کی دیر اور ملائم فرچٹھی رہتی ہے۔ پانچ دن اکثر شدت سے

اور جسم کی حالت

قبض ہوتا ہے۔ پیشاب اور سرخ رنگ کا اور نہایت ترش آتا ہے لیکن اس میں جہد مرض میں پیشاب کے پیچھے کسی قسم کا درد نہ نشین نہیں ہوتا۔ بیماری پسینہ سے نہا جاتا ہے جو جسکی نہایت تیز ہوتی ہے۔ اکثر رات کے وقت درد اور بخار کو شدت ہوتی ہے۔ جو جوڑ پہلے مرض میں مبتلا ہوئے تھے صرف انہیں میں بیماری محدود نہیں ہتی بلکہ بعد چند گھنٹہ یا دنوں کے اوڑ جوڑوں کو مبتلا کر لیتی ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جوڑ اس بیماری میں پہلے مبتلا ہوئے تھے انہیں یہ مرض بدستور رہتا ہے اور کبھی انکو جوڑ دیتا ہے اور شاید ایسا ہی ہوتا ہے کہ جن جوڑوں میں بیماری شروع ہوئی تھی وہ پہر مبتلا ہو جاتے ہیں آخر کار بیماری جسم کے کھل بڑے بڑے جوڑوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ قریب عشرہ کے مرض کو اکثر تھوڑی بہت تخفیف ہو جاتی ہے چنانچہ خاصکرات کے وقت درد کم ہو جاتا بخار اور عرق کو بھی تخفیف ہو جاتی ہے مقدار پیشاب کی زیادہ ہوتی ہے اور اب اس میں کثرت سے یو۔ رک اسڈ کی قلمیں نہ نشین ہو جاتی ہیں مریض کو اشتہا ہونے لگتی ہے اور پیاس کم۔ نبض کی سرعت کم اور بیماری اب چلنے پھرنے بھی لگتی ہے لیکن جوڑ وغینہ تھوڑی بہت کسر رہ جاتی ہے کہ جس سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اکثر اوقات اس بیماری کا یہ بھی قاعدہ ہے کہ قلب کی غائی۔ برس طے شدہ میں پہنچ جاتی ہے اور بیماری کی عمر حقد زیادہ ہوتی ہے اس قدر یہ بات بھی یاد رہتی ہے کہ جب قلب اسطور پر مبتلا ہوتا ہے تو مریض کو دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور قلب زیادہ دھڑکنے لگتا ہے اور دم کھینچنے وقت اور بائیں کردٹ لیتے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا دم بند ہوا جاتا ہے اور دل کی بعض بعض جگہ پر درد بھی ہونے لگتا ہے جب کبھی یہ بیماری ترکیبی ہو جاتی ہے تب اس میں مرض براکنائی۔ ٹس یا نیو۔ مو۔ نیا یا پلو۔ ری۔ سی ہو جاتا ہے اور آنکھ کے پردہ اسکلر۔ ٹاک میں جب زہر اس مرض کا سرایت کر جاتا ہے تب ٹان بھی انفلامیشن ہو جاتا ہے۔ یہ مرض

اکثر ایک جوڑے دوسرے جوڑے میں انتقال کر جاتا ہے »

اسباب - پیری - و سپو - زنک - یہ مرض موروثی ہے اور جوانی کمزوری
موسم خزان اور بہار میں یہ مرض اکثر ہو جایا کرتا ہے اور جس کسی شخص کو یہ مرض
ایک مرتبہ ہو جاتا ہے طبعیت اسکی دوسری دفعہ اس بیماری میں مبتلا ہونے کے
لئے مایل ہوتی ہے - سردی کا لگنا اور بارش میں بھیگنا اس مرض کے اکساہی ٹنگ
کا زمین »

عارضیات - ایکوٹ - رو - ما - ٹے - زم کے دور میں اندرونی اعضا بھی اکثر
مبتلا ہو جاتے ہیں - چنانچہ قلب اس مرض میں اکثر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس مرض
کی شدت کے وقت دن میں دو تین دفعہ قبض کا شکار ہوتا ہے اور رات کو چاہے شام
ایکوٹ - رو - ما - ٹے زم کے دور میں دل کی یہ بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں
پے - ری - کار - ڈائی - ٹس اور انڈو - کار - ڈائی - ٹس اور ان کے سبب سے
دل کے کیوٹر دن کی بیماریاں پیدا ہو جاسکتی ہیں - جب شش اس مرض میں مبتلا
ہو جاتے ہیں تب پلو - ری - سی اور نیو - مو - نیا اور برانکائیٹس ہو جاتا ہے -
شراب خوار جب اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تب انکو دے - لے - ری - ام ٹری -
ہو جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ اس مرض میں دل کی بیماریاں اکثر پیدا ہوتی ہیں
ایکوٹ - رو - ما ٹیئر میں کو - ریہ کے طور کی حرکتیں جسم میں گاہے گاہے ہونے
لگتی ہیں اور جب سچ کو یہ مرض ہو جاتا ہے تب کو - ریہ کی نکل عبلا متین پیدا ہو جاتا
ہے ایسا قیاس کرتے ہیں کہ رو - ما - ٹے - زم کے دور میں جو دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں
اس سے قاضی - برین کے ذرات علیحدہ ہو کر خون کے ذریعہ دماغ کی رگوں میں داخل
ہو جاتی ہیں اور ان رگوں کے منفذ کو بند کر دیتے ہیں جس سے کو - ریہ کی بیماری
پیدا ہو جاتی ہے »

جنگلو رو۔ ما۔ ٹے۔ زم ہو جاتا ہے انکی آنکھوں میں بھی اس مرض کا اثر سرایت کر جاتا ہے جس سے اف تھل۔ میا اور اسکی۔ رو۔ مائی۔ ٹس یا آئی۔ راجی۔ ٹس ہو جاتا ہے اور رو۔ ما۔ ٹے۔ زم کے سبب سے جلد پر۔ ٹے۔ کے۔ ریا یا پر۔ ہو۔ یا ہی پیدا ہو جاتا ہے اور گا ہنگامے ٹس۔ ٹے۔ کل میں انفلیمیشن ہو کر آر۔ مائی۔ ٹس ہو جاتا ہے انہی علامات کے ضمن میں ایک اذبات بتلانی نہایت ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ جن بچوں یا لڑکوں کو رو۔ ما۔ ٹیزم اور کو۔ یا ہو جاتا ہے انکی جلد کے نیچے ان فی۔ شیا اور ٹن۔ ٹن کے متعلق جونا جکب جڑوں کے قریب میں ہوتے ہیں ممرسوں کے دانوں یا چوٹ بادام کی گری کے برابر۔ نا۔ ٹیز۔ ٹس پیدا ہو پاتے ہیں۔ یہ نا۔ ڈیو۔ ٹس یعنی گھٹیا آنکھنی کے جوڑ کے پیچھے کی طرف سے ٹخنوں کے اندر اور باہر کے دونوں اجزاء میں

رے۔ لے۔ اور ٹس) پر اور پے۔ ٹے۔ لاکے کناروں پر اکثر پائے جاتے ہیں اور گرد مر ملائے تو قدرے حرکت کرتے ہیں ان میں تھوڑا گرمی اور نہ سرخی ہوتی ہے اور اکثر بخار بھی نہیں ہوتا اور کبھی تو صرف ایک ہی غلہ پیدا ہو کر نفع ہو جاتے ہیں یا ان گھٹائیوں کے کئی نئے متواتر پیدا ہوتے جاتے ہیں اور بعض دفعہ بالکل نفع ہو جاتے اور پھر پیدا ہوتے ہیں۔

تشخیص۔ رو۔ ما۔ ٹے۔ زم اور گاؤٹ میں جو فرق ہے اسکا ذکر گاؤٹ کی بیماری کی ضمن میں کیا جائیگا اس موقع پر صرف دو تین باتیں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کسی خاص جوڑ کے انفلیمیشن کو رو۔ ما۔ ٹیزم نہ سمجھنا چاہئے اور یہ کہ اس مرض کے دور میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی جوڑ اس میں مبتلا نہ ہوں اور یہ کہ جب دل کے نیچے نا۔ ڈیول مذکورہ بالا کو۔ ریا اور دل کی بیماری کے ہمراہ پائے جائیں تو ایسا لگنا کرنا چاہئے کہ بیمار کی طبیعت میں رو۔ ما۔ ٹیزم کا مادہ موجود ہے گو بیمار نہ بتا سکے کہ مجھ کو رو۔ ما۔ ٹیزم کہی ہوا تھا۔

سب ایکوٹ رو۔ ما۔ ٹیفرم۔ رو۔ ما۔ ٹیفرم کی یہ قسم ہی اکثر دیکھنے میں آتی ہے خاصکر شفا خانہ نین میں۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ قدرے قلیل بخار ہوتا ہے اور ایک دو جوڑوں میں عرصہ تک درد ہوتا رہتا ہے مگر ان میں کسی قسم کا ٹیفر نہیں پایا جاتا بجز اسکے کہ ان کے سبب یا بلا کسی ظاہری سبب کے ہی گاہے گاہے ان جوڑوں میں درد وغیرہ علامتوں کو شدت ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کی شکل میں چند دن فرق ہنتر پڑتا اور نہ ان کی ساخت میں کوئی بہاری ٹیفر واقع ہوتا ہے ان بیمار کی حالت پست رہتی ہے ۔

علاج۔ بیمار کو سردی سے بچاؤں گرم کپڑے پہناؤں اور غذا میں لطفہ میں۔
دوا کے باب میں بعض طبیب کہار دواؤں سے اس مرض کا علاج کرتے ہیں اور بعض اس مرض میں سا۔ لی۔ سی۔ لٹ۔ اف۔ سو۔ ڈاکو مثل اکسیر کے مانتے ہیں چنانچہ کہار دواؤں میں سے بائی۔ کار۔ بو۔ نٹ۔ آف۔ پوٹاش اچھا ہے مثلاً
لنٹھ بائی۔ کار۔ بو۔ نٹ۔ آف۔ پوٹاش ۱۰ گریں ۱۰ ٹائے ۱۰ ٹرہ اگرین ۱۰
دائے۔ نم۔ کال۔ جی۔ ساتھی ۱۰ قطرے ۱۰ پانی ۳۔ آؤنس ۱۰ سبکو ملا کر ایک خوراک کریں اور ایسی ہی ایک ایک خوراک دو دو یا تین تین گنٹہ بعد پلاؤں ۱۰ تخفیف دوا کے لئے انسین کا استعمال بھی کرنا چاہئے۔

۱۔ لی۔ سی۔ لٹ۔ اف۔ سو۔ ڈاکو اپنی نہایت عمدہ دوا ہے اسکو لنٹھ ذیل کے طور پر دینا چاہئے۔
لنٹھ سی۔ لی۔ سی۔ لٹ۔ اف۔ سو۔ ڈاکو ۱۰ گریں ۱۰ کار۔ بو۔ نٹ۔ آف۔ ایمو۔ نیا ۱۰ گریں
سرپ۔ آف۔ جنجر ۱۰ ڈرام ۱۰ پانی ایک آؤنس ۱۰ سبکو ملا کر دو دو گنٹہ بعد پلانا
چاہئے۔ تین چار خوراکوں کے پیتے ہی کثرت سے پسینہ آ جاتا ہے اور جوڑوں کا درد اور ورم اور سرخی کم ہوتی جاتی ہے اور دوسرے دن بیمار چلنے پرنے لگتا ہے ۱۰
علاج خارجی۔ آگ پر گرم کر کے جوڑوں کو روئی سے سیکیں اور اسی

روحی کو ہر ایک جوڑ پر لپیٹ دین ہنیں تو پوست کی گرم گرم تھمید کریں یا پولش مین
 ایفون یا بلا۔ ڈونا ملا کر جوڑوں پر بانہ مین۔ بعض طبیب جوڑوں کو کھار دواؤن کے
 عرق سے تر کر کہنا بتلاتے ہیں مثلاً بانی۔ کار۔ پلو۔ نٹ۔ ان پٹاش دو ڈرام لیکر اٹھم
 آؤنس پانی مین حل کر کے اور اس مین کپڑا تر کر کے جوڑوں پر لگا دیں۔ بعض طبیب جوڑوں
 پر دو چار جو کین لگانا بتلاتے ہیں۔ جوڑا اگر بہت پھول کر سرخ ہو گئے ہوں اور درد
 کرتے ہوں تو جو کین لگا سکتے ہیں بعض دفعہ ماؤف جوڑوں پر لایکوا۔ اپس۔ پائس۔ کٹر
 لگا کر چھانے پیدا کرنے سے بھی درد کو بہت جلد تخفیف ہو جاتی ہے۔ جب ایسا ہو کہ
 کوئی جوڑا درد کرنے لگتا ہے اور باقی کے جوڑوں کو آرام آ جاتا ہے تب ایسا کریز
 کہ دردناک جوڑا پر نیکچر آف آیمو۔ ڈین لگا دیں اور بستر کے لگاتے سے ہنی فائدہ ہوتا
 ہے۔ کسی جوڑے مین بہر جاوے تو ٹپ کر کے اُسکو خارج کر دینا چاہئے *
 بیمار جب رو بھرت لاوے تب سردی اور بارش سے اُسکو بچانا چاہئے اور غذا اور
 دوا مٹھوی دینی چاہئے جیسے کوئین اور فولا وادر کا ڈیو۔ لیور۔ آئیل *
 دوم کریٹک آر۔ ٹے کیو۔ لر۔ رو۔ ما۔ ٹیزم

علامات۔ یہ بیماری بڑھوں کو اکثر ہو جاتی ہے لیکن گاہے گاہے
 یہ مرض کیوٹ بیماری کا نتیجہ ہوتا ہے جوڑوں کے خائی۔ برس۔ ٹے شیو اور انکے
 ارد گرد کی خائی۔ برس۔ ٹے شیو بھی اس مرض مین موٹے ہو کر سخت ہو جاتے
 ہیں جس سبب سے وہ جوڑے ٹکے طور پر حرکت نہیں کر سکتے اور ان مین دھیا دھیا
 درد بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہ درورات کے وقت اور بارش اور سردی کے موسم مین
 بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اکثر تو یہی قاعدہ ہے کہ اس بیماری مین جوڑوں کی ہیت
 بہت ہنیں بدل جاتی لیکن خاص کر بڑے مین ایک قسم کا کرائمک آر۔ ٹے۔ رائی۔ ٹس

ہو جایا کرتا ہے جسین ایک صرف چند جوڑ مبتلا ہوتے ہیں اور اسین رفتہ رفتہ اس قسم کا تغیر پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ جوڑ سخت ہو کر انہیں جاتے ہیں۔ اس حالت کو سے۔ نائیل آر۔ تے۔ رانی۔ ٹس یا رور ما۔ پکٹ گگاؤٹ بھی کہتے ہیں۔

علاج۔ جو لوگ کرانک رور ما۔ ٹیزم کی بیماری میں مبتلا ہوں انکو سردی

اور بارش سے بچنا چاہئے ہمیشہ گرم کپڑے پہنتے چھین۔ اور مختلف قسم کے ہاتھ (غسل) سے انکو فائدہ ہوتا ہے جیسے سلفر ہاتھ + یاوے۔ بر ہاتھ یا ٹاٹ۔ بار تہہ وغیرہ۔ اور جوڑوں پر مختلف قسم کے لے۔ نی۔ منٹ یا کمضر لے۔ لے۔ منٹ یا اکو۔ نائیٹ لے۔ نی۔ منٹ یا بلا۔ ٹونا لے۔ نی۔ منٹ اور بعض دفعہ پچر آف ایوٹ اور بلٹر کے لگانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور مو۔ رانی۔ کم پلاسٹریا مرکزی پلاسٹریا یا پچ پلاسٹری کی دھچوں سے جوڑوں کو اسٹراپ کرنے سے بھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے اور کرانک رور ما۔ ٹے۔ زم میں تار بجلی کے لگانے سے بھی کثرت فائدہ ہو جاتا ہے۔

دوا کے طور پر مقویات کا استعمال کرنا چاہئے جیسے کوئین اور فو و اور کاڈ۔ لیویر آئسل ہینین تو آئیو۔ ڈائیڈ اف پوٹاسیم ہمراہ ڈیٹاک۔ رشن آف بارک کے پلاوین یا آر دوا کو کوئین کے ہمراہ ویوین۔ گندہک۔ سار۔ سا اور گوا۔ کم بھی اس بیماری میں نافع ہیں۔ رات کو دروڑیا وہ ہو تو آئیوین یا کلو۔ رل کا استعمال کرنا چاہئے۔

غذا بیمار کی مقوی اور میریج الہضم ہونی چاہئے۔

سوم مسکیو۔ لر رور ما۔ ٹے۔ زم
مائی۔ ال۔ جیا

گوشت میں (سلس) سبب رور ما۔ ٹے۔ زم کے مادہ کے اکثر دروڑیا
کرتا ہے۔

اسباب۔ کسٹیکس کاز۔ سردی کا گھٹنا یا بارش میں بھیگنا یا زور کی
 ٹھنڈ ہی ہوا کا لگ جانا۔ کثرت محنت۔ عرصہ تک چمکے یا کھڑے رہنا یا زیادہ
 بوجھ اٹھانے کے سبب سے یا کسی اور باعث سے جسم کے کسی گوشے کا کچ جانا۔
 علامات۔ مائی۔ ال۔ جی کا حمل اکثر اکیوٹ ہوتا ہے اور اکثر دفعہ پیدا ہو جاتا
 ہے اور بعض دفعہ رات کی وقت ہو جاتا ہے۔ جو سلسلے میں مبتلا ہوتے ہیں وہ درد
 کرنے لگتے ہیں کچ جاتے اور حرکت سے درد زیادہ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ درد
 نہایت شدت کا ہوتا ہے اور بعض اوقات صرف حرکت کرنے سے ان سلسلے
 میں درد ہوتا ہے۔ جب یہ مرض شدید ہوتا ہے تب گرمی کے لگانے سے اسکو کثیر
 زیادتی ہوتی ہے اور رات کی وقت جو وقت بیمار سونے لگتا ہے اسکو شدت ہوتی
 ہے۔ بہت مرتبہ زور سے دبا سے اس درد کو تخفیف ہو جاتی ہے۔ اگرچہ بخار نہیں
 ہوتا پہر بھی درد اور بے خوابی کے سبب سے بیمار کسٹیکس اور بے چین رہتا ہے
 یہ قاعدہ ہے کہ اکیوٹ قسم کا مائی۔ ال۔ جی صرف چند روز رہتا ہے لیکن اکثر
 کرائیک ہو جاتا ہے اور ابتدا ہی سے کرائیک ہو جاسکتا ہے اور جب ایک مرتبہ
 ہو جاتا ہے تب بار بار لوٹتا ہے۔

اقسام۔ مائی۔ ال۔ جی اپنے میکرو۔ لریو۔ ما۔ ٹے۔ نرم جسم کے کسی
 ۱۔ لن۔ ٹری سل میں ہو جاسکتا ہے اور بعض کے نزدیک ان۔ لن۔ ٹری سلسلے
 ہی میں مبتلا ہو جاسکتے ہیں بڑے بڑے اقسام اسکے یہ ہیں کہ
 اول۔ سے۔ فا۔ لو۔ ڈی۔ نیائینے سر کی جلد کا رد۔ ما۔ ٹے۔ نرم۔ اسپین درد
 سر ہوتا ہے اور سر کی جلد کو حرکت میں لانے سے اس درد کو زیادتی ہوتی ہے۔
 دوم۔ ٹار۔ ٹے۔ کو۔ ریش یا ریشی۔ نکٹ یعنی گردن کا کچھکڑا ہونا۔ یہ قسم مرض
 کی اکثر ہو یا کبھی ہے اور اسپین خاصکہ اس۔ ٹر۔ نو۔ میش۔ ٹائٹڈ سلسلے میں

ہوتے ہیں۔ یہ درد اکثر گردن کی ایک ہی طرف ہوتا ہے جس سے اسی طرف گردن
مڑی جاتی ہے۔ بیمار گردن کو دوسری طرف گھمانا چاہیے تو نہایت شدت کا درد ہوتا
ہے۔ گردن کے پیچھے کے عضلے بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جس کسی شخص کی طبیعت
میں گاؤٹ کا مادہ ہوتا ہے بعضہ فقہ اسکو بھی یہ درد ہو جاتا ہے +

سوم۔ پلو۔ روٹھی۔ نیا۔ سینہ کے عضلات خاص کر بائیں جانب کے امراض میں اکثر
مبتلا ہو جاتی ہیں جیسے رائ۔ ٹر کاس۔ ٹل اور پکٹ۔ ٹو۔ برل اور سے۔ رمی۔ ٹن۔ بگٹ
ٹن عضلات۔ بعضہ فقہ نہایت شدت کا درد ہوتا ہے اور خاص کر جب عضلات تھکے
کو حرکت دیجاتی ہے تب زیادہ ہو جاتا ہے۔ درد کی جانب دم نہیں لیا جاتا۔
اور چمکنے اور کہانے سے نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ بعضہ فقہ درد مذکورین کے
ایک خاص مقام پر محدود رہتا ہے اور دم لینے سے اس خاص مقام میں تکلیف مسلم
ہوتی ہے۔ اور بعضہ فقہ اس مقام سے ہٹ کر کسی اور جگہ درد قائم ہو جاتا ہے + اس میں
کاسینہ کا درد اکثر شدت سے کہانے کے بعد ہو جایا کرتا ہے اور رسول کو اکثر
ہو جایا کرتا ہے +

شکم کے عضلے بھی بعضہ فقہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں خاص کر جب کہانسی کی نوبت
زور زور سے ہوتی ہے +

چہارم۔ لم۔ بے۔ گوینے درد کر۔ کر پر جو عضلات ہوتے ہیں ان میں بھی رو۔ ما۔ ٹے۔ زم کا
درد اکثر ہو جایا کرتا ہے۔ یہ درد دھیم دھیم برابر ہوتا رہتا ہے اور حرکت سے زیادہ
ہو جاتا ہے۔ بیمار اپنی پیٹھ اور کمر کو کچا ہوا اور اکثر سامنے کو جھکائے ہوا رکھتا ہے۔
سیدھا کھڑا ہونا چاہیے یا بیٹھے ہوئے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے تو نہایت شدت کا درد ہونے
لگتا ہے۔ بعضہ فقہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیمار بستر پر لیٹ نہیں سکتا۔ دبانے سے درد
زیادہ ہوتا ہے اور بہت ساری صورتوں میں گرمی کے لگانے سے اس درد کو زیادتی

ہوتی ہے *

علاج۔ مس۔ کیو۔ لہر۔ رو۔ ما۔ ٹے۔ نرم اگر شدہ پیدا اور تھوڑے عرصہ کا تو عضلات مآوف کو آرام دینا چاہئے۔ اور پوست کی تکیید اور راتی کی پٹی پار وغن تارپین کی مالش سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے خشک تکیید سے درد کو کھشہ زیادتی ہوتی ہے لیکن عرصہ تک اگر برا بر کجاوے کو افادہ ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ مالش سے بھی بھندہ فائدہ ہوتا ہے *

لم۔ بے۔ گو کے درد کو مار۔ فیا کی بچکاری سے اکثر فائدہ ہو جاتا ہے * سہل دیکر بائی۔ کار۔ بورنٹ اف پوٹاش صرف تنہا یا ہمراہ آیو۔ ڈائیڈ اف پوٹاشیم کے کھلاتا چاہئے۔ مینوں کے استعمال کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے * گرم پانی کے پیارے سے جب پسینہ کھل کر آ جاتا ہو تب کترس درد کو افادہ ہو جاتا ہے اور نگاہے شاید جو کین یا کیننگ لگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور ڈرائی۔ کیننگ سے بھی اکثر فائدہ ہوتا ہے * جب عضلات کا درد مزمن ہو جاتا ہے تب ان ادویات کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے جیسے آیو۔ ڈائیڈ اف پوٹاشیم اور کوہین اور کلو۔ رائیڈ اف ایو۔ نی۔ ام * درد کے مقام پر مختلف قسم کے لے۔ فی مینٹ کی مالش کرتے ہیں * تار بجلی لگاتے ہیں اور بعض دفعہ کئی دن ٹو اتر جلد کے اندر مار۔ فیا کی بچکاری ہی کرتے ہیں *

چہارم گو۔ نو۔ رمی۔ ال۔ رو۔ ما۔ ٹے۔ نرم

اسباب۔ جوان اور دوسری نوجوان کے آدیوں کو مرض گو۔ نو۔ ریا یا گلیٹ کے دور میں سردی کے سبب سے جوڑوں میں درد ہو جاسکتا ہے *

علامات۔ اس بیماری میں گتھنوں کے جوڑا اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں مگر دیگر

مفصل میں بھی یہ مرض ہو جاسکتا ہے۔ جوڑ میں شدت کا درد ہوتا ہے اور آبِ خون یا لطفِ نرادرش پاکر جوڑ بہت سوج کر تن جاتا ہے لیکن پیپ ہینن پرتی مایہیت شاذ بڑا کرتی ہے کہ سیدھا ہینن ہو سکتا۔ اس مرض میں بیمار بہت کمزور ہو جاتا ہے۔
علاج۔ بیمار کو آرام چین سے رہنے دین اور خوب سیکین گھسنے کا جوڑ مبتلا ہو تو اسکو کسی اسپنٹ پریسید ٹاکر کین ہینن تو ختم کیا جانے کا اندیشہ ہے جو جو دوا نیز رو۔ ما۔ ٹے۔ نرم میں فائدہ کرتی ہیں وہ اس میں بھی مفید ہیں اور ساتھ ہی سوزاک کا بھی علاج کرنا چاہئے۔

پینجم رو۔ مے۔ ٹائیڈ آر۔ تھرائی ٹس

اس بیماری کی صلیت کی نسبت اطباء کی رائے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص قسم کی بیماری ہے۔ اور رو۔ ما۔ ٹے۔ نرم اور گاؤٹ سے بالکل علیحدہ ہے اور بعض کے نزدیک یہ ایک قسم کرانک رو۔ ما۔ ٹیزم کی ہے اور بعض کی یہ رائے ہے کہ گاؤٹ اور رو۔ ما۔ ٹے۔ نرم دونو بیماریوں کا اثر اس میں موجود ہے یعنی یہ ایک قسم کا رو۔ ما۔ ٹیک گاؤٹ ہے۔ اور بعض طبیب یہ کہتے ہیں کہ جسم کے بیرونی حصہ پر جب کسی قسم کی خراش ہوتی ہے تو اس خراش کا اثر جلد کے عصاب کی شاخوں کے ذریعہ نفع تک پہنچ جاتا ہے اور نفع کو مرض میں مبتلا کر لیتا ہے اسوقت یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یہ مرض اکثر ان لوگوں کو ہو جاتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں اور یہ مرض ۲۰ سے ۴۰ سال کی عمر کے اندر اور عورتوں میں اکثر پایا جاتا ہے اور یہ کہ اس مرض میں غریبا اکثر مبتلا ہوتے ہیں اور بعض دفعہ تو یہ مرض سردی کے سبب سے پیدا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اسکے پیدا ہونے کا کوئی بھی ظاہر سبب معلوم نہیں ہوتا۔

علامات۔ یہ بیماری یا تو ایکوٹ یا کرانک ہو سکتی ہے۔ ایکوٹ بیماری

یہ مرض اپنے ہونے پر کسی بار بار ہو جاسکتا ہے اور جوڑ میں کراسا کچ جاسکتا ہے۔

میں کئی جوڑا ایک ہی دفعہ مبتلا ہو سکتے ہیں لیکن مثل رو-ماٹک فیور کے یہ بیماری
ایک جوڑے سے دوسرے میں انتقال نہیں کر جاتے اس میں بخار ہوتا ہے مگر پسینہ کثرت
سے نہیں آتا اور نہ دل اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب یہ مرض شروع ہی سے کرائمک
ہوتا ہے تب پہلے پہل اس میں ایک ہی جوڑہ مبتلا ہوتا ہے اور اس میں قدرے قلیل
درد اور درم ہوتا ہے لیکن یہ بائیں جلد رنج ہو جاتی ہیں مگر تھوڑے عرصہ بعد ہی
جوڑے پر مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس میں ایسے تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیشہ
کے لئے ماؤف رہتا ہے۔ بعد ازاں یہ مرض اور جوڑوں میں سرایت کر جاتا ہے یہاں تک
کہ جڑے کے جوڑ اور فقہرات کے جوڑ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں مفاصل مذکور
سخت ہو کر بالواسطہ رہ جاتے ہیں یا ہمیشہ کے لئے انیٹل رہتے ہیں اور اس مقام
کے عضلات لاغر ہو جاتے ہیں۔ اکثر تو جوڑوں میں درد کم ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ خاص کر
شب کی وقت نہایت شدت کا درد ہوتا ہے۔ اس مرض کے بیمار اکثر کمزور اور
پست ہمت اور روز بروز لاغر ہوتے جاتے ہیں۔

علاج اس مرض میں چونکہ بیمار کمزور اور لاغر بھی ہو جاتا ہے تو اس کا علاج
ادویہ اور غذائی تقویٰ سے کرنا چاہئے جیسے فولاد اور کاڈ-لیور-آئیل-گوا-کم اور
کال-چی-کم اور سنہکیسا اور اسٹرکینا بھی مفید ہیں۔ ابتدا میں میں بلش کے ٹکڑے
سے فائدہ ہوتا ہے اور مالش کی دو این ہی آزمائی چاہیے۔

مقالہ ہفتم

گاؤٹ

اسکو پو-ڈا-مگر ابھی کہتے ہیں۔

اسباب - پری ڈسپوزنگ - کاز - اسپین کچھ شک نہیں کہ یہ بیماری موروثی ہے کیونکہ نہایت چھوٹی عمر میں بھی ہو جایا کرتی ہے اور اگرچہ بچے ہی اسپین مبتلا ہو سکتے ہیں لیکن جب یہ بیماری موروثی نہیں ہوتی ہے تب ۳۰ سال کی عمر سے کم میں شاذ و نادر پیدا ہوتی ہے ۴ اس مرض میں بہ نسبت عورتوں کے مرد ہی زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اور انکو بھی یہ بیماری اکثر ہو جایا کرتی ہے جنکا مزاج دموی اور جو بہت لطیف اور شہیم ہوتے ہیں اگرچہ ڈیٹے اور پتلے آدمیوں کو بھی یہ مرض بعض اوقات ہوتا ہے - زیادہ روحانی محنت اور فکر و تردد سے چونکہ نظام عصبی کو صدمہ پہنچتا ہے اسلئے یہ ہی سبب اس مرض کا ہے - سیسہ کے کارخانوں میں جو کام کرتے ہیں انکی بھی طبیعت اس مرض میں مبتلا ہونے کو بہت مائل رہتی ہے ۵ سرد ملکوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت گرم ممالک کے ۶ جو لوگ شراب پیتے ہیں اور گوشت بہت کھاتے اور ریاضت کم کرتے ہیں انہیں یہ بیماری از خود پیدا ہو جاتی ہے ۷

اکساچی - ٹنگ - کاز - اگرچہ بعض دفعہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس سبب اس بیماری کو اشتعال ہوئی ہے لیکن سردی کا لگنا اور بارش میں بہیگنا کسی جوڑ کو تھوڑا ہی صدمہ پہنچنا - زیادہ محنت کے سبب تھک جانا - کسی طرف طبیعت کا زور زیادہ لگنا - غصہ اور غضب اور فکر اور غم کھانا - زیادہ کھانا - اور شراب بہت پینا اور کسی روز بغفلت غذا کا استعمال کرنا - یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن سے اشتعال ہوتی ہے اور یہ بیماری ظاہر ہو جاتی ہے - ثبوت اس بیماری کی جبکوٹ اف گاؤٹ کہتے ہیں اظہار کے نزدیک وہ سبب سے ظاہر ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ کسی سبب سے جب خون کے اندر یو - رک اسٹکی زیادتی ہو جاتی ہے تب اسٹڈ کو جوڑ میں خراش پیدا کر کے انھل میٹن ظاہر کر دیتا ہے اور دوسری راے یہ ہے کہ خون میں جب یو - رک اسٹڈ کی زیادتی ہوتی ہو تب

جوڑ دھکی ساخت اسل سڈ کو جسم سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہے جس سے نوبت اس مرض کی شروع ہو جاتی ہے *

ماہیت - اس مرض کی ماہیت کے باب میں اگرچہ اطباء کی رائے میں بہت ہی اختلاف ہے لیکن سب پر غلبہ اس رائے کو ہے کہ اس بیماری میں خون کے اندر یو۔رک اسڈیشنل پورٹ اف سوڈا کثرت سے پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض محققین یہ فرماتے ہیں کہ جب جگر کے فعل میں خرابی واقع ہوتی ہے تب مرکبات ازتسم پورٹ خون میں بکثرت پیدا ہو جاتے ہیں جس سے یہ بیماری ظاہر ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات گردن کی ساخت کی بعض بیماری کے سبب بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے *

ماہیت تشریحی - اس بیماری میں جسم کی مختلف بافتوں میں مگر خاصکر جوڑن کی ساخت اور ایسی بافتوں میں جنہیں خون کم پہنچتا ہے خون سے پورٹ اف سوڈا خارج ہو کر جمع ہو جاتا ہے اور جہاں جمع ہونے لگتا ہے وہاں انفلامیشن پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ ایکوٹ بیماری میں جس جوڑ کے اندر پورٹ اف سوڈا جمع ہوتا ہے وہاں پر خون کا غلبہ ہوتا ہے اور خون سے پانی تراوش پاکر وہ جوڑ پھول جاتا ہے۔ اس طرح نوبت بنو تب جوڑ میں مرکب مذکور جمع ہوتا جاتا ہے۔ ابتدا کے اندر یہ مرض باؤن کے انگوٹھے کے اونچے جوڑ میں ظاہر ہوتا ہے لیکن جون جون بیماری مزین ہوتی جاتی ہے جسم کے اور جوڑ بھی سین مبتلا ہوتے جاتے ہیں آخر کار سارے جوڑ و مین یہ بیماری پہنچ جاتی ہے *

پہلے پہل جوڑ کی کیتوں کی بالائی سطح پر پورٹ اف سوڈا کی باریک باریک تعلین جال کی شکل پر جمع ہو جاتی ہیں مگر آخر کار جوڑ کی کل ساخت میں پورٹ اف سوڈا کی ڈلیان مثل کبڑ یا میٹی کے جمع ہو جاتی ہیں جس سے جوڑ ایسا سخت ہو جاتا ہے

کہ حرکت ہین کر سکتا۔ جب یہ مرض بہت ہی عرصہ کا ہو جاتا ہے تب جوڑون پر سخت سخت اُبھار نمودار ہو جاتے ہین اور انکے اوپر کا چھڑا اُدھڑ جاتا ہے جسکے اندر سے کھڑا مٹی کی شکل کی ڈلیان نکلی ہوئی نظر آتی ہین اور وہ ان پر زخم پیدا ہو جاتے ہین۔ عسلادہ جوڑون کے یورٹ آف سوڈا کی ڈلیان کا لون کے باہر کے سوانج آنکھوں کے پوٹون ناک اورے۔ رنگس مین ہی اکثر اذات پائی جاتی ہین۔

اس بیماری مین گردون کا بھی بُرا حال ہو جاتا ہے چنانچہ پہلے پہل پشیاہ کی باریک باریک نالیوں مین یورٹ آف سوڈا جمع ہو جاتا ہے اخیر مین گروے مسکڑ کر نہایت چوٹے ہو جاتے ہین اور اپنی چوٹے چوٹے اُبھار پیدا ہو جاتے ہین جن سے شکل گروہ کی دلدہ دار ہو جاتی ہے۔

علامات۔ جب ہم گاؤٹ کے بیمارون کا ملاحظہ کرتے ہین تو اپنے مطب مین دو قسم کے بیمار پاتے ہین ایک تو وہ جنکے جوڑو اس مرض مین مبتلا ہوتے ہین اور دوسرے وہ جنکے اندرونی اعضا مین سے کوئی عضو اس بیماری مین مبتلا ہو جاتا ہے۔

پہلی قسم کے مرض کو رے۔ گیو۔ لریا۔ ار۔ ٹے۔ کیو۔ لریگاؤٹ کہتے ہین اور دوسری کو ار۔ رے۔ گیو۔ لریا۔ رے۔ ٹرو۔ رے۔ ڈنٹ۔ نکاؤٹ بولتے ہین۔

اول رمی۔ گیو۔ لری

ار۔ ٹے۔ کیو۔ لریگاؤٹ

یہ بیماری ابتدا مین ایکوٹ ہونی ہے لیکن بعد کچھ عرصہ کے کہ انکے ہو جاتی ہے۔ پس

الف ایکوٹ گائوٹ - پہلے نوبت اس بیماری کی اکثر باکسی علامات
 مندرہ کے ظاہر ہو جاتی ہے لیکن بعضہ فوجہ مفضلہ علامات مندرہ کے ظاہر
 ہونے کے بعد نوبت شروع ہو جاتی ہے چنانچہ ماضیہ میں فرق پڑ جاتا ہے کھجہ جلتا
 ہے اور جگر پر سبب اجتماع خون کے بوجہ معلوم ہوتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے یا دل کج حرکت
 بے قاعدہ ہو جاتی ہے بعضہ فوجہ عصبی خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں چنانچہ دروسر
 دوران سر نصبات میں فرق پڑ جاتا۔ سر کا بہاری معلوم ہونا۔ ادنگھہ آنا۔ مزاج
 کا چڑچڑا ہونا۔ طبیعت کا پست ہو جانا۔ نیند کا اچھی طرح نہ آنا۔ خوابات متوحش
 کا دیکھنا۔ ہاتھ پاؤں کا چونک پڑنا۔ ٹانگوں مگر خاصکر پنڈلیوں میں تشنج کا ہونا۔
 تنگی نفس کا ہونا۔ لے۔ رنگس میں سبب اجتماع خون کے کن جش۔ جن کا ہونا اور
 اس سبب سے دم لینے میں تکلیف کا ہونا۔ کثرت سے پسینہ کا آنا۔ پیشاب کا
 یا تو بہت کم آنا اور اس میں درد کا بیٹھ جانا۔ یا بکثرت اور پانی کی طرح پیشاب کا آنا
 نوبت سے پہلے بعضہ فوجہ جوڑون میں بے چینی کا ہونا۔ نوبت سے پہلے بعض
 بیماروں کی طبیعت میں ایک طرح کی فرحت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ خوش و خرم
 ہوتے ہیں۔

نوبت اس بیماری کی خاصکرات کیوقت اکثر دہجے سے پانچ بجے صبح کو شروع
 ہوتی ہے۔ اکثر اوقات اس مرض کی نوبت پاؤں کے انگوٹھے کے بڑے جوڑ پر شروع
 ہوتی ہے۔ اکثر تو ایک ہی انگوٹھا خاصکر دہنا مگر بعضہ فوجہ دونوں اور گاہے پہلے ایک
 اور تب دوسرا انگوٹھا مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ بعضہ فوجہ صرف انگوٹھے ہی کے جوڑ
 میں پے درپے کئی نوبتیں ہوتی رہتی ہیں مگر اکثر اوقات دیگر مفاصل بھی مرض میں
 شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عرصہ دراز تک یہ بیماری صرف
 ہاتھ پاؤں کے چوٹے چوٹے جوڑون ہی میں محدود ہوتی ہے۔ شاذ و نادر گھٹنے

یا سٹخے کے جوڑ سے یہی یہ بیماری شروع ہوتی ہے اور کبھی ٹیڑھی اور پاؤں کے اندر
یکجانب سے یہی شروع ہو جاتی ہے ۔

علامات خاصہ - جوڑ کا درد آن کے آن میں بڑھ کر اس قدر شدید ہو جاتا
ہے کہ بیمار باہی بے آب کے طور پر بے چین ہو جاتا ہے اور درد کا مقام ایسا نازک
ہو جاتا ہے کہ ذرا سا چھونا قیامت دکھلا دیتا ہے۔ رات کو درد کی شدت بہت زیادہ
ہوتی ہے صبح ہوتے کم ہو جاتی ہے۔ جوڑ کو ملاحظہ کریں تو آب خون کے جمع ہو جانے
سے پہلا ہوا نظر آتا ہے اور وہ ان کی جلد سُرخ تنی ہوئی گرم اور چمکیلی نظر آتی ہے۔ کبھی
عرصہ بعد جوڑ بہت سوج جاتا ہے۔ وہ ان سے انگلی کے دماغ پڑ جاتے ہیں بالائی ویدیز
خون سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں ۔ جون جون ان غلامین کم ہوتا جاتا ہے جلد پر سے فرد
اُترتے جاتے ہیں اور اکثر شدت سے خارش ہونے لگتی ہے لیکن سوجن عرصہ تک
 قائم رہتی ہے ۔ اور جن مسلمانوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ابتدا مرض میں ایسے بیماروں
میں پائی جاتی ہیں جو طاقتور اور دوسوی مزاج ہوتے ہیں۔ کمزور بیماروں اور خاصہ کمزور
میں مسلمانوں کو بہت شدت نہیں ہوتی ۔

علامات عامہ - مرض کی نوبت کی موت علامات عامہ کا کم یا زیادہ شدید
ہونا علامات خاصہ کے کم یا زیادہ شدت پر اور مستلا شدہ جوڑوں کی تعداد منحصر ہے ۔
نوبت کے عین شروع میں لرزہ ہو کر بخار ہو جاتا ہے اور کم کم پسینہ بھی آتا ہے۔ صبح کی موت
بخار کی شدت اکثر کم ہو جاتی ہے۔ پیشاب بہت کم اور گہرا آتا ہے۔ اور مختلف رنگ کے
مرکبات یورٹ کا درد اس پیشاب میں بیٹھ جاتا ہے۔ نیند نہیں آتی اور بیمار نہایت
بے چین رہتا ہے اور اکثر ہاتھ پاؤں میں تشنج ہوتا ہے۔ ماضیہ بگڑا رہتا ہے اور بھر پور
اپنا کام اچھی طرح نہیں کرتا جب نوبت ختم ہونے لگتی ہے تب یا تو کثرت سے پسینہ
آ جاتا ہے یا درست آتے ہیں یا پیشاب میں نہایت کثرت سے یورٹ کا درد بیٹھ جاتا ہے ۔

مدت مرض کی۔ گھاؤٹ کی نوبت چار یا پانچ روز سے کئی ہفتہ تک سکتی ہے لیکن اس صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ نوبت میں رمی۔ مے۔ شن (تحیف) یا ان۔ ٹر۔ مے۔ شن (دفعہ) پایا جاتا ہے۔ جون جون بیماری نرمن ہوتی جاتی ہے نوبت بھی عرصہ دراز تک رہتی ہے پیرض اکثر پھر عود کرتا ہے چنانچہ ابتدائے مرض میں تو ایسا ہوتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ نوبت ہوتی ہے اور تب دو دن بعد از ان سال کے اندر کئی نوبتیں ہوا کرتی ہیں +

بعض بیماروں میں ایسا ہوتا ہے کہ نوبت کے بعد عرصہ دراز تک طبیعت ٹکی گجڑی رہتی ہے اور بعض نوبت کے بعد جلد تندرست ہو جاتے ہیں + لیکن چند نوبتوں کے بعد جوڑوں میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں +

دوم کرانک گھاؤٹ

کرانک گھاؤٹ مرض کی اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب جوڑوں کی ساخت اور شکل سبز نہایت درجہ کا تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور جب نوبتیں پے در پے ہوتی رہتی ہیں اور عرصہ دراز تک نہایت شدت سے قائم رہتی ہیں اور بعض صورتوں میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مریض کو درد سے ایک دم بھی فاقہ نہیں ہوتا اور سلاوہ جوڑوں کے جسم کی اوڑبافت میں بھی اس مرض کا اثر سراپ کر جاتا ہے +

مرکبات از قلم یوڈ کے جمع ہو جانے سے جوڑ بچکر اینٹہ جاتے ہیں کہ حرکت نہیں کر سکتے اور سوج کر بد شکل اور پیر جوڑے چوڑے اور ہار بن جاتے ہیں۔ جوڑوں پر کئی جگہ کا رنگ میلنا اور وہ مقام خون سے پُر ہوتا ہے اور درمیان ومان کی خوب نمایاں ہوتی ہیں۔ آخر کار ایسا ہوتا ہے کہ وہ جلد ہیٹ جاتی ہے اور اسکے اندر سے یوڈ کے ٹکڑے پھوٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جنکو اصطلاح میں ٹو۔ فنی کہتے ہیں + ٹو۔ فنی

مذکور یا تو خارج ہو جاسکتے ہیں یا اس مقام میں سپ پڑ کر زخم پیدا ہو جاسکتے ہیں
 جو نہ بیاری کرانک ہوتی جاتی ہے جسم کی دیگر ساخت میں مبتلا ہوتی

جاتی ہیں جیسے ٹن۔ ٹون اور بر۔ سا اور بلبی ٹیون کی شافٹ پر کا پر وہ

پے۔ رمی۔ اس۔ ٹے۔ ام اور سلس کے غلاف * اور جہاں جہاں اس مرض کا
 مادہ جمع ہوتا ہے وہاں دہل ہی پیدا ہو جاسکتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا اس مادہ کا کار
 کے اور پوٹوئی کریون اور ناک کی کریون اور آنکھ کے پڑہ اسکے۔ رائٹک میں جمع ہو جاتا ہے۔
 یورٹ کا مادہ پہلے پہل تو پتلا ہوتا ہے چنانچہ نشتر کی نوک سے پانچھ دینے سے وہ
 پتلا مواد خارج ہو جاتا ہے ملاحظہ کریں تو اس میں پتلا یورٹ کی باریک ٹھیکیں پائی جائیں گی
 آخر کار وہ مادہ منجمد ہو کر چوٹی چوٹی گولیوں کا سا بن کر حوڈروین جمع ہو جاتا ہے *

جو لوگ کرانک گاؤٹ کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کمزور اور سست
 رہتے ہیں۔ چہرہ پیلا اور خشک ہوتا ہے اور جو دموی مزاج کے ہوں تو جلد اٹکی ڈھیلی
 اور بدن ہاتھ بھی ڈھیلیا رہتا ہے *

ایسے لوگوں کا ہضم ہمیشہ خراب رہتا ہے اور دل میں کسی نہ کسی قسم کی بے چینی
 ہمیشہ رہتی ہے مثلاً یا تو دل دھڑکتا رہتا ہے یا حرکتیں دل کی بے قاعدہ ہوتی رہتی ہیں
 ایسے لوگوں کا مزاج ہمیشہ چڑچڑا رہتا ہے اور بے چین اور پست ہمت رہتے ہیں۔ ہاتھ
 پاؤں میں تشنج یا جسم کا کوئی مقام پٹکتا رہتا ہے ٹھک۔ ڈو۔ لو۔ رو کا درد اور
 دیگر عصبی خرابیوں میں ایسے لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ گاؤٹ کے بیمار گاہے گاہے ایک
 عجیب طرح سے دانت پسپا کرتے ہیں۔ گاہے گاہے کیس قدر بخار بھی ہو جایا کرتا ہے
 ایسے لوگوں کے پیشاب کارنگ ہلکا ہوتا ہے اور وزن مناسب بھی کم اور اس میں
 میں منجمد شیا بھی تھوڑی اور اکثر قدر سے ال۔ بیو۔ من ہو کرتا ہے اور بعض دفعہ پیشاب
 میں کاسٹ بھی ہوتے ہیں * گاؤٹ کے بعض بیماروں کی ناک ہر روز کسی کسی وقت

گرم اور سرخ ہو جا کر تپتی ہے *

دوم ار۔ رمی۔ گیو۔ لر

یا

رمی۔ ٹرو۔ سی۔ ڈنٹ۔ گاوٹ

گاوٹ کی جو عسلاستین اور پر بیان ہوئی ہیں اور یہ کہ یورٹ کے قسم کے مرکبات جو عسلادہ جوڑوں میں پیدا ہونے کے دیگر اعضا میں بھی جمع ہو جاتے ہیں وہ کل یا تیز رمی۔ ٹرو۔ سی۔ ڈنٹ۔ گاوٹ میں بھی پائے جاتے ہیں حقیقت میں سی۔ ٹرو۔ سی۔ ڈنٹ۔ گاوٹ کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب یہ بیماری جوڑوں کو دھنستہ چھوڑ کر کسی نازدنی عضو میں انتقال کر جاتی ہے اور بے قاعدہ عسلاستین پیدا کرتی ہے چنانچہ جن اعضا میں یہ مرض اکثر انتقال کر جاتا ہے انکا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے *

اول عصبی نربیان۔ متکاشدت کا دروسر ہونا یا سرکا ہونا۔ ہشون
 حواس میں سرتق پڑ جانا یا نڈیان کا ہونا۔ اور عضفہ فدوی۔ ٹرو۔ سی۔ ڈنٹ۔ گاوٹ کے
 سبب سے مریض یوازی بھی ہو جاتا ہے۔ گاہے گاہے مرگی کے قسم کی نوبتیں بھی پیدا
 ہو جاتی ہیں گاہے نیو۔ رجمیا کے قسم کے دروسر ہونے لگتے ہیں اور کبھی جسم کا کوئی خاص
 حصہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ گاوٹ کا مادہ سا یا۔ ٹاکٹ نڈر کے خلاف میں
 پیدا ہو کر مرض سا۔ یا۔ ٹے۔ کا پیدا کر دیتا ہے *

دوم آلات انہضام میں نربیان پیدا ہونی۔ جنگلی طبیعت میں
 گاوٹ کا مادہ ہوتا ہے انکا معرہ اس بیماری میں اکثر مبتلا ہو جاتا ہے سسٹا
 سگس۔ ٹرائی۔ ٹس ہو کر شدت سے صغراہی تے ہونے لگتی ہے۔ یا بعض دفعہ معرہ میں

اس شدت سے تشنجی درد ہونے لگتا ہے کہ بیمار ڈھال ہو جاتا ہے اور گاہے گاہے لگنے میں تکلیف ہوتی ہے اور گاہے ردود میں انفلامیشن ہو جاتا ہے اور ست آنے لگتے ہیں۔ بعض دفعہ بگڑ کا فعل بگڑ جاتا ہے اور جنکو گاؤٹ کی بیماری ہوتی ہے انکا جگر اکثر چربی میں بدل جاتا ہے +

سوم نظام دمومی کا دستور۔ مثل رومہ۔ ٹے۔ نرم کے اگرچہ اس مرض میں دل میں انفلامیشن کی جیسا ہی نہیں ہوتی ہے پھر یہی دل کے اندر مفصل ذیل تغیرات ضرور پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً پردہ پے۔ رمی۔ کار۔ ڈی۔ ام میں سفید سفید دہستے پیدا ہو جاتے ہیں۔ دل کے کیوٹرون (والوس) کا حال ابتر ہو جاتا ہے اور دل موٹا کمر (ہائی۔ پر۔ ٹرو۔ فی) چربی میں بدل جاتا ہے رنے۔ ٹے۔ ڈی۔ جے۔ نے۔ (رےشن) رگون میں چونہ یا مٹی کا مادہ جمع ہو جاسکتا ہے۔ ان ساری خرابیوں کی علامات عامہ اور خاصہ بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور دل کی حرکتوں میں بھی گاہے گاہے خرابی پڑ جاتی ہے مثلاً بعض دفعہ دل شدت سے دھڑکنے لگتا ہے اور حرکات دل کی کبھی تو نہایت کمزور کبھی بہت ہی سیرج کبھی بہت بلی اور کبھی نہایت بے قاعدہ ہو جاتی ہیں اور نبض بھی کمزور ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ غشی طاری ہو کر بیمار تلف ہو جاتا ہے + دل کے مقام پر درد یا کسی اور قسم کی بے چینی معلوم ہوتی ہے اور دل گہٹا ہو سکتا ہو تا ہے۔ بیمار کو دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور مریض نہایت فکر مند ہو جاتا ہے علاوہ ازیں وٹ۔ جاے۔ نا پکٹ۔ ٹو۔ ریش کا درد بھی اکثر ہو جاتا ہے +

چہارم آلات تنفس کی حسی بیان۔ جنکو گاؤٹ کی بیماری ہوتی ہے اکثر کمزور دم بھی ہو جاتا ہے اور بہت کھانسی اور ام۔ فائی۔ سے۔ ماکھی بیماری بھی ہو جاتی ہے +

پنجم آلات بول کی حسی بیان۔ پیشاب میں جو جو خرابیاں پیدا ہوتی

مین اُنکا ذکر اوپر ہو گیا ہے جب اس بیماری مین گردن کی ساخت بگڑ جاتی ہے تب اُسکے آثار پیشاب مین ہی پائے جاتے ہیں خاصکر جب بیمار کی عمر زیادہ ہوئی ہے تب سسٹ-ٹائیٹس اور یو-ری-تھرائیڈ-ٹیس (نائیزہ کا انفلامیشن) ہی اکثر ہوجاتا ہے گاؤٹ کے بیمار مین پیشاب مین اکثر ریت آتی ہے اور ان کو بہتری کا مرض بھی ہو جاتا ہے +

ششم امراض جلدیہ - گاؤٹ کے بیمار مین کو اکوٹ یا کرائمک - اگ - زمی - ما اور الی - تے - ما اور ار - ٹے - کے - ریا اور سو - رائی - سسٹس اور پرو - رائی - گو اور اکٹ - نے کی بیماریاں ہی اکثر ہوجاتی ہیں +
ہفتم دیگر امراض - لم - بے - گو اور رائی - ٹیکٹ اور آؤر قسم کے سلس کا درد - ایک خاص قسم کا آئی - رائی - ٹیس جو پوشیدہ طور پر اور بلا درد کے ہوتا ہے آخر کار اس سبب آنکھ جاتی رہتی ہے -

ڈا - یاگ - نو - سسٹس یعنی تشخیص درمیان گاؤٹ اور رو - ما - ٹے - زم اور رو - ما - ٹائیٹڈ آر - تھرائیڈ - ٹیس کے نقشہ ذیل سے معلوم ہو سکتی ہے +

نقشہ تشخیص

	گاؤٹ	رو - ما - ٹے - زم	رو - ما - ٹائیٹڈ آر - تھرائیڈ - ٹیس
موروثی	ہے	کم ہے	شک ہے
مسم بیمار	اعلیٰ درجہ کے لوگوں کو یہ	خاصکر آنکھ ہو جاتا ہے	غرابا اور ایسے مبتلا ہوتے
	مرض ہو جاتا ہے یا آنکھ جو	جو غفلت ہوتے ہیں اور	ہیں جبکی غذا شیف
	گوشت اور مرغین غذا خوب	سخت محنت کرتے ہیں	ہوتی ہے -

	کہا تے اور شراب خوب پیتے ہیں۔		
عمر	ابتداء میں بہت کم اکثر نوبت ۳۰ سے ۵۰ سال کی عمر میں شروع ہوا کرتی ہیں۔	ابتداء میں اکثر ہو جاتا اکثر ۲۰ سے ۴۰ سال کی عمر میں ہے خاصکر ۱۰ سے ۲۰ سال کی عمر میں	اکثر ۲۰ سے ۴۰ سال کی عمر میں
جنسیت	مردوں کو یہ بیماری اکثر ہو جاتی ہے	اگرچہ یہ مرض بھی مردوں کو ہی زیادہ ہوتا ہے تاہم بہ نسبت گاؤٹ کے کم ہے۔	خاصکر عورتوں کو یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔
جوڑوں کا مبتلا ہونا	چھوٹے جوڑے خاصکر پاؤں کا انگوٹھا اکثر مبتلا ہوتا ہے درو ایک سے دوسرے جوڑے میں نہیں انتقال کرتا۔ علامات خاصہ نہایت درد کے مرض کا مقام بہت سوچ جاتا۔ جلد مجھتا ہو جاتی۔ ریدین پر آتین بعد نوبت کے جلد پر سے ہو سہی چڑ جاتی ہے عرصہ جوڑے ہمیشہ کے لئے سوچ رہتے ہیں اور ہڈی بے گے	اس میں متوسط مقدار کے جوڑے اکثر مبتلا ہوتے ہیں۔ اسکا درد ایک سے دوسرے جوڑے میں انتقال کر جاتا ہے پے در پے اس میں کمی جوڑے میں شدید ہوتا ہے۔ اگرچہ متاثر مبتلا ہو جاتے ہیں علامتوں کی شدت بہ نسبت گاؤٹ کے کم ہوتی ہے اور درم بھی کم اس میں ریدین پر آتین اور نہ جوڑوں پر سے ہو سہی چڑ جاتی ہے۔	ہر قسم کے جوڑے میں ایکس ہو تے ہیں۔ اسکا بھی درد ایک سے دوسرے جوڑے میں انتقال کر جاتا ہے۔ اگرچہ متاثر بہت شدید نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ متاثر مگر عرصہ دراز تک قائم رہتے ہیں آخر کار جوڑے بڑا بول ہو جاتا ہے لیکن جوڑوں میں یورٹ کے قسم کے کتب جمع نہیں ہوتے۔

	<p>ہو جاتے ہیں اور اینین مرکبات از قسم یورٹ کے جمع ہو جاتے ہیں ۔ بجائے جسکی شدت کبھی زیادہ کبھی کم جسمانی تکلیفیں بہت صبح کیوقت بہت تخفیف ہو جاتی ہے ۔</p>	<p>اگرچہ اس مرض میں بخار کبھی کم کبھی زیادہ شدید ہوتا ہے پر بھی اکثر بہت شدت کا بخار ہو جاتا ہے اور بہ نسبت گاؤٹ کے اسکا بخار زیادہ عرصہ تک رہتا ہے ۔</p>	<p>اس میں بخار نسبت کم ہوتا ہے اور اس میں مرض بہت گہرا اور پست ہوتا ہو جاتا ہے ۔</p>
<p>پسینہ دور اور مدت</p>	<p>پسینہ کی نسبت کوئی خاص بات نہیں پائی جاتی ابتدائی نوبت تھوڑے عرصہ تک ہتی ہے مگر نوبت متواتر ہوتی ہے ۔ اور بعض دفعہ وقت مقررہ پر پسینہ نکلتا ہے ۔</p>	<p>پسینہ بہت کثرت سے اور ترش آتا ہے اسکی نوبت عرصہ تک رہتی ہے ۔ متواتر کم ہوتی ہے ۔ اسکے ظاہر ہونے کا کوئی مقرر وقت نہیں ہوتا ۔</p>	<p>ترش پسینہ نہیں آتا ہے ۔ اسکا حملہ اکیوٹ نہیں ہوتا مگر تدریج بڑھتا جاتا ہے ۔ حملوں کے درمیان اکثر کامل وقفہ نہیں ملتا اسکے ظاہر ہونے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا ۔</p>

<p>عارضات</p> <p>اس مرض میں خاصہ کمزور اور دماغ اور گردہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور دل میں عصبی بے چینیان محسوس ہوتی ہیں لیکن دل میں افعلامیشن کی بیماریاں ہنیں پیدا ہوتی ہیں *</p>	<p>دل کے افعلامیشن کی بیماریاں اس میں اکثر ہو جاتی ہیں اور شش بھی افعلامیشن کی بیماریوں میں اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں -</p>	<p>نہ تو دل اور نہ کوئی اکثر عضو اس میں مبتلا ہوتا ہے</p>	<p>خون میں یورک اسڈ کا ہونا پشیا ب</p>	<p>اس میں ہوتا ہے نوبت سے پہلے اور نوبت کے وقت پورٹ کم لیکن بعد نوبت کے بکثرت ہوتا ہے - پیہیز الیمو - مے - نو - ریا اکثر ہو جاتا ہے - پشیا ب میں کا سٹ بھی ہو سکتے ہیں جن سے گردن کی ساخت کی خرابی ثابت ہوتی ہے -</p>	<p>اس میں ہنیں ہوتا ہے بجاری میں جیسا آتا ہے اور بعض دفعہ کی قدر اس میں ایو - مین بھی ہوتا ہے -</p>	<p>اس میں ہنیں ہوتا ہے اس کے پشیا ب میں کوئی خاص بات ہنیز پاشی جاتی ہے</p>
<p>اوپر کے نقشہ کے ملاحظہ سے اگرچہ ان بیماریوں کی تشخیص اکثر ہو سکتی ہے پھر بھی</p>						

انجام۔ ایکوٹ سکاؤٹ اکثر تو چھلک نہیں ہوتا مگر ان جاعضائے اندرونی
 بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تب البتہ مقام اندیشہ کا ہے۔ یہ بیماری بار بار عود کرنے
 کی طرف مائل ہوتی ہے لیکن یہ بات بیمار کے کھانے پینے اور طریقہ گزاران پر منحصر ہے
 جب یہ مرض جوانی میں ہو جاتا ہے تب اس کا آئندہ انجام بُرا ہوتا ہے اور اس وقت
 یا تو موروثی ہوتا ہے یا نوبتین اس کی بار بار ہوتی ہیں تب آئندہ انجام اس کا زیادہ تر
 خراب ہوتا ہے اور جب یہ مرض فرسٹ ہو جاتا ہے تب عمر بیماری کی ضرورت گھٹ جاتی
 ہے۔ اور جب گروڈن کی ساخت بہت بگڑ جاتی ہے اور یو۔رک اسٹڈ خارج نہیں
 ہونے پاتا ہے تب بیمار کی جان کا نہایت اندیشہ ہوتا ہے * اس مرض کے آثار
 میں جب کوئی ایکوٹ بیماری ہو جاتی ہے یا کسی قسم کی چوٹ یا ضرب لگ جاتی ہے
 تب بیمار کو ان سے جان بڑھانا مشکل ہوتا ہے *

علاجِ نوبت کیوقت کا۔ اول علاجِ داخلی۔ نوبت کے شروع ہوتے ہی اس نسخہ کا استعمال کریں۔ نسخہ۔ سلفٹ اف ٹکٹن۔ شیا۔ ۶ ڈرام + سلفٹ اف سورڈا ۴ ڈرام + وینیم کال۔ جی۔ سائی ڈیڑھ ڈرام + کونین ۲۰۔ گرین۔ ۱۰ پانی۔ ۶۔ آونس + سبکو ملا کر مقدار ڈیڑھ آونس کے دو دو باتیں تین گھنٹہ بعد شیشی کو ہلکا کر دین۔ دوا نسخہ تاج ذیل میں سے کسی نسخہ کا استعمال کریں چنانچہ ساتھ اس بیماری کے جگر میں کن جش۔ پن ہو تو یہ نسخہ اچھا ہے +

نسخہ کیا تو مل اسے ٹیم اکسٹرکٹ اف کال۔ سچی۔ کم + اکسٹرکٹ اف بار۔ مے۔ ڈوز۔ ایلوز + سفوف اپنے۔ لگ۔ ہر ایک کا ایک ایک گرین ٹیکر ایک گولی

بنیادین اور جتنگ دست اچھی طرح نہ آئیں چار چار گنٹہ بعد کھلا دین *
جب اس مرض میں ایسا ہو کہ بے چینی بہت ہو مگر کمروری بہت نہ ہو تو یہ نسخہ مفید
پڑتا ہے *

نسخہ - سائے - ٹریٹ آف پوٹاش ۲۰ اگرین - وادی - نم کال - چمی - سائی
ایک ڈرام * سوڈیویشن آف ٹائیڈرو کلورٹ آف مار - فیا ایکٹوٹرام *
عرق کافور ۸ - آونس * سبکوٹا کرچٹا حصہ چہ چہ گنٹہ بعد پلا دین *
نوبت بیماری کی خفیف ہو تو یہ نسخہ کام میں لا دین *

نسخہ - وائی - نم کال - چمی - سائی ڈیڑھ ڈرام * کار - بوٹ آف گنے - شیما
۲۰ اگرین * ارو - ماکٹ اسپرٹ آف ایمو - نیا ۳ ڈرام * پنکچراف ٹائیڈروٹ
۴ ڈرام * عرق کافور ۸ آونس * سبکوٹا کرچٹا حصہ صبح اور شام پلا دین *
نوبت کی وقت جسم گرم اور خشک ہو تو یہ نسخہ دین -

نسخہ - وادی - نم کال - چمی - سائی ۲ ڈرام * کلورٹ آف پوٹاش ۲۰ اگرین *
ٹائیڈروٹ - ایمو - نیا سائے - ٹریٹ - ٹس ۳ ڈرام * عرق کافور ۸ آونس *
سبکوٹا کرچٹا حصہ تین دفعہ دن کو پلا دین * اور اس نسخہ کو مین نے بار بار آزمایا
ہے اور مفید پایا ہے -

نسخہ - وائی - نم کال - چمی - سائی ۲ قطرے * سلفٹ آف گنے - شیما
ایک یا دو ڈرام * باقی - کار - بوٹ آف پوٹاش - ۵ اگرین * پانی - دو آونس
سبکوٹا کرچٹا حصہ ایک ایک خوراک چہ چہ گنٹہ بعد پلا دین -
اس سے جون جون دست آتے ہیں درد کو افاقہ ہوتا جاتا ہے - البتہ بیماری کی
طاقت کا خیال رکھنا چاہئے * بعض دفعہ میں ایسا بھی کرتا ہوں کہ جب درد کی بہت
شدت ہوتی ہے تب ایک اگرین ٹائیڈروٹ - کلورٹ آف مار - فیا کھلا دیتا

ہوں اس سے دور کو آرام آجاتا ہے۔ بعض بیماروں نے میسے سے کہا ہے کہ ڈاکٹر نے ویٹل کے گاؤٹ کے عرق اور گولیوں سے انکو بہت فائدہ ہوا ہے اور واقعی میں نے بھی فائدہ ہوتے دیکھا ہے۔ لیکن اس عرق سے اکثر اس شدت سے دست آتے ہیں کہ بیمار قریب ہلاکت کے پہنچ جاتا ہے کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرق کے اندر وہی مادہ یا ہوتا ہے جو ایک مریض الاثر نہ ہر سے پس انداز کے استعمال میں احتیاط درکار ہے۔

دوم نوبت کی وقت کا خارجی علاج۔ بیمار کو آرام چین سے رکھیں اور مرض کے مقام کو سیفدر اپنچا اور این عرقیات میں سے کسی کو مرض کے مقام پر لگادیں۔

لنٹخہ۔ ٹیکہ آف۔ اکو۔ نایٹ۔ ڈرام۔ بانی۔ آؤنس۔

لنٹخہ۔ خالص سے ایک اسٹڈ ڈیڑھ ڈرام۔ اسے۔ ٹٹ آف۔ مار۔ نیا۔ اگرین۔ دوائی۔ نم۔ کال۔ چھا۔ ساٹھی۔ آؤنس۔ اس عرق میں ایک ٹکڑا لنٹخہ کا تر کر کے دردناک جوڑ پر لگادیں اور اسپر کیلے کا پتہ یا گٹا پارچہ رکھ کر باندھ دیں۔

روی۔ بڑو۔ سی۔ ٹونٹ یا۔ روی۔ گیو۔ لہر گاؤٹ کا علاج۔ جب دیکھیں کہ کوئی اندرونی عضو گاؤٹ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو رومی کی پٹی لگا کر یا زور زور سے مالش کر کے یا گرم گرم نمکد کر کے جوڑ دن پر انفلامیشن پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ مرض اندر سے باہر چلا آوے۔ بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی دوا کے لگانے سے کچھ ہی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس وقت ایک گرین مار۔ فیا کلدا دینا چاہئے جیسا کہ اوپر بتلایا گیا ہے۔

علاج دفعہ کی وقت کا۔ اگر چاہو کہ دفعہ کا عرصہ دراز ہو جائے یا نوبتوں کی شدت نہ ہونے پائے یا مرض تھوڑے عرصہ کا ہے تو جانا ہے تب دوا سے زیادہ

دردناک جوڑ پر لگانے سے کچھ ہی فائدہ نہیں ہوتا۔ رنگا یا چاہئے۔

امید نہ رہو بلکہ غذا وغیرہ کی پرہیز پر بہرہ رسہ رکھنا چاہئے کیونکہ یہ بیماری اکثر لمبی
لوگوں کو ہو جاتی ہے جو گوشت بہت کھاتے ہیں اور شراب میں پیتے ہیں مگر ریاضت
بہت کم یا بالکل نہیں کرتے۔ پس بیمار کو اس بات کی تاکید کرنی چاہئے کہ گوشت کھانا
ترک کر دے یا جی بہت چاہے تو تھوڑا کھائے اور ٹھیک کیا کھانے کے مرے پر شراب کو
سنبھ نہ لگائے۔ پرہیز نہ کر سکے بلکہ یہ کہے کہ چاہے جیا جائے۔ جسے کئی کیسی چھوٹے
تو ایسے مریض کو خدا کے حوالہ کر دیں کیونکہ جب تک پرہیز نہیں کر لیتا تمہارے علاج
سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا بغیر دماغی کچھ نہ آئیگا۔ اگر مان گیا اور پرہیز کا پابند ہوا
تو وقفہ کا علاج اس طور سے شروع کریں کہ غذا کا بند دہشت پہلے کریں چنانچہ مریض
کو کم روغن اور کم مصالحہ دار غذا کھانی چاہئے۔ قدرے قلیل گوشت کھانے کا مصلحت
ہے مگر اس میں ہمیشہ تازہ ترکاری ہی ہوا کرے۔ ترشی سے بالکل پرہیز کرنا
چاہئے اور شیرینی ہی کم کھانی چاہئے۔ ایک جگہ بیٹھے رہنا نہ چاہئے بلکہ ہمیشہ
چلنا پھرنا یا گھوڑے کی سواری کرنی یا امیر مہون تو سیر و شکار میں مصروف رہنا
یا کسی آؤرٹم کی ریاضت کا کرنا شد ضرورت سمجھیں۔ دوا کے طور پر ان نسخوں
میں سے کسی نسخہ کا استعمال کریں۔

نسخہ - کلورائیڈ آف ایمو - نیم ہڈرام، کلورٹ آف پوٹاش ۲ ڈرام،
ٹینکچر آف آیو - ڈین - ۲ ڈرام، گلابی - سی - ریٹن ڈیڑھ آؤنس، پانی سارے
جوہ آؤنس، سبکوٹا کر مقدار ایک ایک آؤنس کے چار چار گنٹہ بعد پلا دیں۔
نسخہ - بائی - کار - بونٹ آف پوٹاش ۵ اگرین، دای - نم - کال - جی - ساتھی
۵ قطرے، ٹینکچر آف کلینا ۵ قطرے، الفوژن آف چریتا - ڈیڑھ آؤنس
سبکوٹا کر دین تین دفعہ پلا دیں۔

اگر انے - میا کے سبب سے فوہ دکا استعمال کرنا ہو تو کسی ایسے مرکب استعمال

گرین جو بہت ہلکا ہوشگ

فشنجہ سائپرٹ اف ایرن انڈ۔ ایمو۔ نیا۔ ۱۰ گرین + اور۔ ما۔ ٹمک اسپرٹ
اف ایمو۔ نیا ۴ ڈرام + بائی۔ سکار۔ بوٹ اف پٹاش۔ ۱۰ گرین + الفیوٹرن
اف کلینا ۸ آونس + سبکو ٹاکر بمقدار چٹا حصہ ہمراہ چار ڈرام لائٹ جو بس کے
دینین دو دفعہ بلا دین + علاوہ فلا د کے سنکھیا اور ریٹو۔ ڈائٹڈ اور ہرو۔ مائیڈ
اف پو۔ ٹارسیم ہی کرائنگ گاؤٹ مین فائدہ مند ہیں اور بعض طبیب

کار۔ بوٹ اف لے۔ تہیا (۵ سے۔ اگرین) اور سائپرٹ اف لے۔ تہیا
(۵ سے۔ اگرین) کی بہت تعریف کرتے ہیں *

علاج خارجی وقفہ کی وقت کا۔ درد کے موقوف کرنے کے لئے مقام

مرض پر یا تو ایفون یا بلا۔ ڈو۔ نا کا عرق لگا دین بعد ازاں روئی سینک کر باندھ دین
یورٹ آف سوڈا کے جمع ہو جانے سے درد ہو تو گرم گرم پولش باندھیں اور
جوڑ کے اوپر یا نیچے اسٹی۔ کنگ کی دھجیوں کے باندھنے سے بھی درد کو خاتمہ ہو جاتا
ہے۔ دھان زخم پیدا ہو جاوین تو پوٹاش یا لے۔ تہیے۔ ام کا عرق لگا دین +



توجہ اس طرف مبذول نہیں کرتا تب تک اس کو کسی چیز کا بوجہ یا فراحت محسوس نہیں ہوتی یا عضلات کو بعض بعض جانب حرکت نہیں دے سکتا۔ بعض بعض بیمار کو ایسا بات کی خبر نہیں ہوتی کہ مختلف عضلوں کو حرکت ہوتی ہے یا نہیں یا کوئی شخص اس کے جوڑوں کو ہار رہا ہے یا نہیں۔

ہفتم حرکت میں سترق سڑ جانا۔ ان باتوں کا جاننا نہایت اہم ہے مثلاً بے چینی اور ماتہ پاؤں یا جسم کے کسی اذ حصہ کا جھٹکا کہنا۔ لیٹنے بیٹھنے کھڑے ہونے اور چلنے پر نئے کی وقت بے نکا حرکت کرنا یا بدن کو کسی نوکھی حالت میں رکھنا جیسے بل پیچ کہا کہ کھڑی سا بننا۔ سر کو کیک کے اندر گھسیڑ دینا۔ ہاٹ کھڑا۔ یا گرنے کی طرف مائل ہونا۔ بے نگاہ چلنا یا دوڑ پڑنا۔ ایک ہی محور پر چکر کھانا یا چلتے وقت گھوم گھوم کے چلنا۔

بعض دفعہ ایسی حرکتیں پیدا ہو جاتی ہیں جسے عضلوں کی کمزوری پائی جاتی ہے مثلاً سارا بدن کا پٹنے لگتا ہے یا کوئی خاص حصہ بدن کا کپتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ مریض جب کوئی ماتہ پاپاؤں اٹھاتا ہے تب وہ قائم نہیں رہ سکتا۔

بعض دفعہ عضلوں میں غر اش پائی جاتی ہے مثلاً وہ پڑکتے ہیں اور انہیں سب۔ سل۔ ٹس۔ ٹن۔ ڈمی۔ نم ہوتا ہے یا کچکرتا جاتے ہیں یا انہیں تشنج ہو لگتا ہے۔ سارا بدن اینٹھ جاتا ہے۔ یا بعض بعض عضلے دفعہ کچکرو کر کے لگتے ہیں۔ عصبی بیماری کے آثار انکھوان میں بھی پائے جاتے ہیں مثلاً بعض دفعہ بیمار ایسا دیکھتا ہے کہ بے حول دیکھا کرتے ہیں یا مریض اپنی آنکھیں چاروں طرف گھماتا رہتا ہے یا ڈھیلوں کو دائیں بائیں برابر حرکت دیتا رہتا ہے۔ چہاٹنے کے عضلات ایسے کچ جاتے ہیں کہ جبرے میٹھ جاتے ہیں یا مریض دانت بیتا رہتا ہے۔ اپنی عصبی بیماریوں میں شش قسم کے پے۔ ر۔ لے۔ سس بھی ہو جاتا

ریشون کے جو اعصاب کی جڑوں کے سامنے کی طرح ہوتے ہیں نیچے کی جانب کو لیجاتے ہیں۔ علاوہ ازیں نخاع کا ایک اڈر خصل ہے جسکو ری۔نکلس ایک ریشن کہتے ہیں جس سے جسم کے عضلات آپس میں مل جمل کر باقاعدہ اس شخص کے ارادہ کے بموجب حرکت میں آتے ہیں +

مے۔ ڈیو۔ لا۔ اب۔ لانگ۔ گے۔ ٹانخاع کا بڑا دھبہ جسکے ذریعہ نخاع اور دل کی حرکتیں انجام پاتی ہیں اور پائٹش وے۔ رو۔ لیائی عصبی مرکز کا وہ حصہ ہے جو نخاع اور سے۔ ری۔ بے۔ لم کو جوڑتا ہے دماغ کا فعل مختلف ہے چنانچہ عقل و ہوش جو اس اور تفریق اور جو اس خمسہ وغیرہ وغیرہ دماغ ہی کے تعلق ہے۔ ان ساروں کا محصل علم حاصل کرنا چاہو تو فر۔ یو۔ لو۔ جی کی کتاب دیکھو +

جو ان آدمی کے دماغ کا اوسط وزن ۱۵ سین سے ری۔ بروم اور سو۔ ری۔ بے۔ لم اور پائٹش وے۔ رو۔ لیائی اور مے۔ ڈیو۔ لا۔ اب۔ لانگ۔ گے۔ ٹان بھی شامل ہے +
۸۴ یا ۹۴ آؤنس ہوتا ہے + عورت کا دماغ چار یا پانچ آؤنس کم +
دیوانگی کے سبب سے دماغ کا وزن کہی بڑھ جاتا کہی گھٹ جاتا ہے + شاید سے ایسا پایا جاتا ہے کہ مرد کا دماغ ۱۴۰ آؤنس سے اور عورت کا دماغ ۱۲۰ آؤنس سے جب کم ہوتا ہے تو وہ شخص ساری عمر سادہ لوح رہ جاتا ہے +

مقالہ دوم

عصبی بیاریون کی تحقیقات

عصبی بیاریون کی تحقیقات ایک امر نہایت مشکل ہے یعنی جب تک طبیب نظام عصبی کے ہر ایک حصہ کی تشریح سے اچھے طور پر واقف نہیں رہتا تب تک ان

اسپائی - نل کارڈ یعنی نخاع کے ساتھ ملجاتے ہیں اور سینہ اور شکم اور پل کے
 کے کل اعضا اور خون کی رگوں کی دیواروں پر شاخیں دیتے ہیں + نظام عصبی کے
 دو فوج حصے دو قسم کے عصبی مادہ سے بنے ہیں - ایک کو گرے - مے - ٹرڈ یعنی سر میں
 رنگ کا مادہ اور دوسرے کو وائیٹ مے - ٹرڈ یعنی سفید رنگ کا مادہ۔ پو
 میں گرے - مے - ٹرڈے حساب عصبی کلیون سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اسی حصہ
 میں احساس (یعنی سن - سے - شن) جمع رہتا ہے اور اسی حصہ سے عصبی طاقت
 پیدا ہوتی ہے + جو وائیٹ مے - ٹرڈے وہ مثل ہر کاروں کے احساس کی
 خبریں جسم کی بیرونی حصوں سے گنگ - لی - ان دینے عصبی دانے کی طرف اور
 گنگ - لی - ان سے ان اعضا یا بافت میں لیجاتے ہیں جنہوں کی شاخیں پہلی
 ہوتی ہیں + یہ دو قسم کے عصبی مادے کے ریشہ (یعنی سن - سری اور مو - ٹرڈ) بن
 چند ان اعصاب کے جو دماغ سے نکلتے ہیں ایک ہی عصبی تہ میں عناق کے اندر ملے
 جھلے ہوتے ہیں مگر ان نخاع سے نکلتے وقت یہ دونو الگ الگ ہو جاتے ہیں
 چنانچہ جو سن - سری ریشے ہیں وہ اعصاب کی جڑوں کے پیچھے اور جو مو - ٹرڈ ریشے
 ہیں وہ ان جڑوں کے سامنے کی طرف ہوتے ہیں اور تب گنگ - لی - ان یعنی
 عصبی دالون میں مل جل کر ایک تہ بن کر جا بجا پھیل جاتے ہیں مختصر فعل نظام عصبی
 کے دونو حصوں کا یہ ہے چنانچہ سم - پے - تہے شک حصہ تو مختلف اعضا کے
 اور جسم کے مختلف حصوں کی پرورش کے لئے جس قدر خون کی ضرورت ہوتی ہے
 اسکا بندوبست کرتا ہے اور اعضا کے حرکتوں کے باگ بھی سیکے ہاتھ میں ہستی
 ہے +

اسپائی - نل کارڈ یعنی نخاع کا کام یہ ہے کہ بندوبست سن - سری اعصاب کے
 احساس کو اور کی طرف لے جاتا ہے اور مو - ٹرڈ یعنی حرکتوں کے فعل کو بندوبست اور مو - ٹرڈ

کرتا ہے یا تو سارا بدن مضطرب ہو جاتا ہے یا بعضہ فہم ریض پائے یا ہتھوں یا ٹانگوں کے دونوں جانب کے عضلات کی حرکت پر تھکا دہین رہتا تاکہ ماہتہ باؤن بشمولیت ایک دوسرے کے مل جل کر حرکت کریں + بعضہ فہم عضلات از خود حرکت کرنے لگتے ہیں جیسے رعشہ لینے کو۔ ریا کی بیماری میں +

ہشتم عصبی بیماریوں کے سبب جسم کے ماؤف حصوں میں خون کے پہنچنے میں بھی فرق پڑ جاسکتا ہے یا ان حصص کی پرورش اور رطوبات کے پیدا ہونے میں بھی خلل واقع ہو سکتا ہے مثلاً حرارت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اعضائے ماؤف لاغر ہو جاسکتے ہیں اور انہیں بڑے سو رہا پیدا ہو جاسکتا ہے اور نیو۔ رلیجیا کی بیماری میں بھی مقام ماؤف کی پرورش میں خلل واقع ہوا کرتا ہے اور عصبی بیماریوں کا اثر آنسو کے پیدا کرنے میں آہٹوک اور پشیا پر تو مشہور ہے +

نہم عصبی بیماریوں کا اثر مجددہ مثلاً روده اعضائے قوالہ و ناسل پر بھی بہت ہوتا ہے مثلاً غشیان متے شدت کا قبض باخا نہ کا بے معلوم خطا ہو جانا پشیا کا قطرہ قطرہ آنا یا مثلاً نہ میں رک جانا یا متواتر جاری رہنا یا بے معلوم خطا ہو جانا۔ قوت باہ کا کم یا بالکل مفقود ہو جانا یا باہ کا حد سے زیادہ بڑھ جانا اور قضیب کا برابر استادہ رہنا +

مقالہ سوم

عصبی ریون کی تشخیص میں طبیب کو ان باتوں پر توجہ کرنی چاہئے
اول۔ سر کے امتحان میں اسکی مقدار اور شکل کو دیکھنا چاہئے اور سر کے تالو لینے
فان۔ شے۔ نل اور کوئی رسولی محسوس ہوتی ہے یا نہیں اسکو بھی دیکھنا چاہئے +

یا کوئی۔ ع۔ طبعی یا تے۔ را۔ طبعی یا کوئی خاص حصہ جسم کا مضطرب ہو جاتا ہے

ووم نخاع کے امتحان میں ان باتوں کو دیکھنا چاہئے اُسکی شکل اور اُسپر
رسولی کے آثار پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ نخاع کو چھو کر ٹھونک کر یا اُسپر گرمی
یا سردی لگا کر دیکھیں کہ کیسا معلوم ہوتا ہے اور حق کا کیا حال ہے۔

سوم حس کی آزمائش۔ حق کوئی قسم کا ہوتا ہے مثلاً لاسہ یعنی جلد کا
حس۔ درود کا حس۔ دبانے سے معلوم ہونا یا نہ ہونا۔ گرمی کا حس۔ جگہ حس کی
اور عضلات کا حس۔ ان مختلف قسم کے احساس کی تیز ترین نہایت تجربہ دار بہت
احتمالاً جانتے ہیں مثلاً جلد میں حس ہے یا نہیں یہ بات اس طرح دریافت ہو سکتی ہے

کہ ریفلیکس کے بدن کو بہت آہستہ سے چھو کر دیکھیں یا دبا کر یا گدگدی پیدا کر کے یا
چٹکیاں لیکر یا سوئیں چسپا کر یا نار بجلی لگا کر دیکھنا کہ محسوس ہوتا ہے یا نہیں۔ بوج
کا دباؤ معلوم ہوتا ہے یا نہیں یہ بات اس طور سے دریافت ہو سکتی ہے کہ جسم کے

جس حصہ کو آزمانا چاہیں اُسپر مختلف مقدار کی وزنی چیزوں کو رکھ کر دیکھنا چاہئے
حرارت پہچانی ہو تو ایسا کریں کہ دوشیشہ کی ٹسٹ۔ میٹوب لیکر ایک مین
سرد اور دوسرے مین گرم پانی بہ کر بیمار کے بدن پر لگا دیں۔ کسی خاص مقام

کا حس دریافت کرنا ہو تو بیمار کی آنکھیں بند کر دیا کر اُس جگہ پر چٹکیاں لین یا
سوئیں کی نوک سے چھو دیں اور تب بیمار سے پوچھیں کہ کس جگہ تکلیف محسوس
ہوتی ہے۔ عضلات کی حس کو دریافت کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ مختلف مقدار

کی وزنی چیزوں کو کسی رومال میں باندھ کر بیمار کو اٹھانا کہیں اور پوچھیں کہ
بہنیں سے کونسی دو چیزوں میں بہت ہی تھوڑا فرق ہے۔ بہنیں تو ایک اور
کام کریں کہ بیمار کو کہیں کہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اپنی ناک یا کان یا پاؤں

کے انگوٹھے کو چھوئے یا اپنی ٹانگوں کو مختلف کروٹوں پر رکھے یا ماتہ پاؤں کو
کہی سیدھا کر دیا یا ٹھیرا کہی آگے کہی پیچھے الگ الگ حالتوں میں رکھنا کہیں

ہم سے کم از کم بہت ہی کم وزنی چیز اس سے اٹھائی ہے یا نہ اٹھائی ہے

سی نظر آتی ہیں یا مختلف رنگ یا شعلے دکھلاتی دیتے ہیں یا کہیں انڈی سی نظر آتی ہیں بصارت میں تھوڑا بہت فرق ہے یا بیمار بالکل اندھے یا ایک چیز کو دو دیکھتا ہے + قوت سمع کا کیا حال ہے۔ کانوں کو آواز زبردستی معلوم ہوتی ہے یا مریض بالکل بہرا ہے یا کانوں کو باجے بجتے سے سنائی دیتے ہیں۔ قوت شمار اور ذائقہ کا حال ہی دریافت کرنا چاہئے کہ انہیں کسی طرح کا فرق تو نہیں پڑ گیا ہے۔

پنج قوت لامسہ کا حال دریافت کرنا چاہئے۔ یہ قوت نہایت تیز ہو جاسکتی ہے جسکو اصطلاح میں ٹائی۔ پے۔ رس۔ تھے۔ شیا بولتے ہیں یا درد کا حس بہت ہی تیز ہو جاسکتا ہے جسکو ٹائی۔ پے۔ رل۔ جے۔ شیا کہتے ہیں + یا ان دونوں باتوں کا خلاف ہی ہو سکتا ہے یعنی قوت لامسہ کم یا بالکل جاتی رہتی ہے۔ ٹیگوانس۔ تھے۔ شیا کہتے ہیں اور چٹکی لینے یا کسی شے سے چھبانے سے درد کم معلوم ہو سکتا ہے یا بالکل محسوس نہیں ہو سکتا ہے جسکو اصطلاح میں انال جی شیا کہتے ہیں۔ لہذا دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیمار کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسکی جلد اور چھونے والی چیز کے مابین اتنی شے آگئی ہے اور بعض اوقات بیمار یہ نہیں معلوم کر سکتا کہ جو بیمار اسکو چھوتی ہے وہ کس شکل کی ہے۔ بعض اوقات جسم کے مختلف حصوں میں قسم قسم کے محسوس ہوتے ہیں اور کبھی کوئی حصہ جسم کا سن محسوس ہوتا ہے کسی میں گدگدی معلوم ہوتی ہے کسی میں خارش ہوتی ہو کسی میں چٹیاں نیگتی سی محسوس ہوتی ہیں اور کوئی مقام جسم کا گرم کوئی سرد اور کہیں چھون اور کہیں جلانے والا کہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک سرد ہوا پیچے سے اوپر کو بہتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جسکو اصطلاح میں آرا۔ اے۔ پے۔ لپ۔ ٹے۔ کا کہتے ہیں +

شش عضلات کی حس میں بھی فرق پڑ جاسکتا ہے۔ چنانچہ بعض بیماریوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب تک بیمار اپنی انگلیوں سے دیکھہ نہیں لیتا یا اپنی

بیاریون کی ماہیت سے بخوبی واقف نہیں ہو سکتا۔ عصبی بیاریون کی ماہیت
 تاکہ اچھے طور پر سمجھ میں آجائے مجموعی طور پر پہلے ان علامتوں کا ذکر کرنا چاہئے جو
 نظام عصبی کی خرابیوں میں اکثر پیدا ہوتی ہیں۔ پس
 اول سر میں غیر معمولی کیفیتوں کا پیدا ہونا۔ مثلاً دوسرے سر میں
 سنگینی، ضربان، درگرمی محسوس ہونی۔ سر میں چکر آنا۔

دوم نخاع میں غیر معمولی کیفیتوں کا پیدا ہونا۔ مثلاً خاص کردہ
 جلن اور ایسا معلوم ہونا کہ جسم کو کسی نے جکڑ کر سخت باندھ دیا ہے۔ درد کی نسبتاً
 دریافت کرنا چاہئے کہ سارے نخاع میں ہے یا اسکے کسی خاص حصہ میں محدود ہے یا
 برابر ہوتا رہتا ہے یا وقفہ سے ہوا کرتا ہے یا کسی خاص جانب کو اسکی ٹین پسو بخوبی
 ہیں اور بعض صورتوں میں یہ بھی دریافت کرنا چاہئے کہ چلنے پر نئے سے یا نخاع کو
 حرکت دینے سے یا نخاع کو دبائے سے یا ایڑیوں کو ٹھونکنے سے یا نخاع پر برف یا گرم
 اسفنج کے پھیرنے سے اس درد کو زیادتی یا کمی ہوتی ہے۔

سوم ہوش و حواس میں فرق پڑنا۔ دیکھنا چاہئے کہ بیمار کے
 ہوش و حواس سمجھ بوجھ اور حافظہ کا کیا حال ہے۔ بیمار کو ندیان ہوتا ہے۔ بہکی
 ہکی باتیں کرتا ہے اسکے دل میں خیالات فاسد اٹھتے ہیں۔ حرکتیں شایستہ یا ناشایستہ
 ہیں۔ مزاج خوش یا چڑچڑا ہے۔ مغموم اور شغل کسی سوچ میں مست بیٹھا رہتا ہے
 بازندہ دل رہتا ہے غصہ ورتو نہیں ہے تکلم کا کیا حال ہے باتیں سلسلہ دار کر سکتا
 ہے یا کوٹی پھوٹی۔ نیند بچی آتی ہے یا بے خوابی ستاتی ہے یا متوحش خوابات سے
 نیند ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہے یا خواب کی حالت میں چلتا پھرتا یا باتیں کرتا ہے۔

چہارم بنیادی کا کیا حال ہے۔ روشنی کی برداشت ہے یا روشنی
 بظرف دیکھنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے یا آنکھوں کے سامنے چمکنا یا ان اڑتی

اور تب پوچھیں کہ بغیر دیکھے بتلا سکتا ہے یا نہیں کہ وہ کون کونسی حالتوں میں ہیں ؟

چہارم۔ عضلات اگر مغلوج ہو گئے ہوں تو بیمار کو حرکت کرنا کہیں اس سے معلوم ہو جائیگا کہ حقیقت میں عضلات مذکور مغلوج ہو گئے ہیں یا نہیں اور جو ہو گئے ہوں تو کس قدر مثلاً دیکھنا چاہیے کہ ان عضلوں کے ذریعہ بیمار حرکت کر سکتا ہے یا نہیں اور یہ کہ ابھی طرح حرکت کر سکتا ہے یا کم ؟ دونوں جانب کے عضلات مل جل کے حرکت کر سکتے ہیں یا نہیں یہ بات بطور سے دریافت ہو سکتی ہے کو بیمار کو سیدھا کھڑا ہونا کہیں اور تب دیکھیں کہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں یا ایسا کریں کہ آنکھ بند کر کے چلنا کہیں اور دیکھیں کہ دونوں پاؤں کے قدم برابر رکھ سکتا ہے یا نہیں ؟

پنجم۔ ری۔ فلکس یعنی منعکس حرکتوں کی آزمائش۔ تھوڑے ہی عرصہ میں عصبی بیماریوں کے متعلق چند اہم علاماتین دریافت ہوئی ہیں جنکو اسبابی۔ نل۔ ری۔ فلکس کہتے ہیں یعنی خناعی منعکس حرکتیں جنہیں ان علامتوں کی نسبت یہ دیکھا جاتا ہے کہ موجود ہیں یا نہیں یا زیادتی پر ہیں یا کمزور ہو گئی ہیں ؟

ان ری۔ فلکس علامتوں کو دو جماعتوں پر تقسیم کیا ہے۔

اول۔ سو۔ پر۔ نی۔ شنی۔ ال۔ (دبلائی) یا ایش۔ کن۔ (جلد)۔ ری۔ فلکس ۔

دوم۔ ڈیپ۔ دگھرا۔ یاٹن۔ ٹون۔ ری۔ فلکس ۔ سو۔ پر۔ نی۔ شنی۔ ال۔

ری۔ فلکس حرکتیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب کسی مقام کی جلد پر عضلات

(سن۔ سو۔ ری۔ نرو) کے ذریعہ خلع کو پہنچے اور ٹن۔ ڈن۔ ری۔ فلکس حرکت

اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب کسی مصل کے ٹن۔ ڈن کو ٹھونکتے ہیں ۔

لغشحات فعل سے معلوم ہوتا ہے کہ ری۔ فلکس حرکتیں کیوں کر پیدا کی جاتی ہیں اور

ان کے معنی کیا ہیں ؟

اول سو پر فی شی۔ ال رمی۔ فلکس حرکتین

نام رمی فلکس حرکت کے	یہ حرکت کیونکر پیدا کیجا سکتی ہے	اس حرکت سے کس قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے	وہ موقع خلع کا جہاں سے اُس رمی فلکس حرکت کا تعلق ہے
پہاں۔ ٹر رمی فلکس	پاؤن کے تلو سے کو گدگدی کرنے سے	پاؤن کی انگلیاں حرکت کرنے لگتی ہیں یہاں انگلیاں اور پاؤن یا انگلیاں اور ٹانگہ حرکت میں آتی ہے	پہلا۔ دوسرا اور تیسرا۔ سب نرموس
گلو۔ ٹی۔ ال رمی فلکس حرکت	جو تڑکی جلد پر خراش پیدا کرنے سے	گلو۔ ٹی۔ ال مسلسل شکر ط جاتی ہیں۔	چوتھا اور پانچواں لم۔ بر۔ نرموس
کریبی ہاٹن۔ ٹر۔ رمی فلکس	راکج اوپر اور اندر کی جلد پر خراش پیدا کرنے سے	انشین سکڑا کر اوپر کو چڑھ جاتی ہیں	پہلا اور دوسرا لم۔ بر۔ نرموس
اب۔ ڈا۔ مے۔ بل رمی فلکس	شکم کی جلد پر پسیلیوں کے کناروں اور پلو۔ بار۔ بٹن لے۔ گے۔ منٹ کے	شکم کے عضلات کے اوپر یا نیچے کے حصے سکڑ جاتے ہیں	آٹھویں سے بارہویں ڈا۔ مے۔ بل نرموس
پے۔ کس۔ ٹرک رمی فلکس	پانچویں اور چھٹی پسیلیوں کے باہین کی جگہ پر سینہ کو ہٹو رکھنے سے	نرمندہ کے اُسی جانب قدرے دب جاتی ہے کیونکہ شکم کے کٹس مل کے سبب اوپر کے رہنے	چوتھے سے چھٹے یا ساتویں ڈا۔ مے۔ بل نرموس

<p>ایسکا - پوپر - لر ری - فلکس</p>	<p>دونو ایسکا - پوپر - لا ہڈیوں کے باہین خراش پہونچانے سے</p>	<p>اُس حرکت سے ٹسکر جاتے ہین - بغل کی پچھلی لپیٹ مسکڑ جاتی ہے یا ایسکا - پوپر - لا کے چند مسل کچ جاتے ہین -</p>	<p>چپٹے یا ساتوہین سر - دوجی - کل - نرو سے لیکر دوسرے یا تیسرے ڈار - سل نرو تھک -</p>
<p>نام ری - فلکس حرکت کے نی - جڑک</p>	<p>ویپ یہ حرکت کیونکر پیدا کیجا سکتی ہے ایک ٹانگ دوسری پر یا عادل کی کلائی پر پٹکتی ہو اور عادل پے - ٹے - لا کے ٹن - ڈن کو اپنے کمرے باتہ سے ٹونکے اور یہ حرکت پے - ٹے - لا کے اور پر جو عضلہ کو اوڑ - ری چیا کامن - ڈن ہے اسپر بھی ٹونکے سے پیدا</p>	<p>ری - فلکس اس حرکت سے کس قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ہٹونکے سے ٹانگ وفتہ اور پر کو کچ جاتی ہے</p>	<p>وہ موقع نچا کا جہاں سے اُس ری - فلکس حرکت یکساں تھکتی ہے - دوسری اور تیسری لم - بر - نرو -</p>

انگل سکونیس	ہو سکتی ہے		
<p>یہ حرکت اسطور سے پیدا ہو سکتی ہے کہ بیمار کے نے۔ جانیٹ کو یا تو پہلین یا قدر سے خم کر دین تب پاؤں کے تلوے کے سامنے کے حصہ پر جلد اور زور سے دبانے سے تاکہ نیڈ لی کے عضلے کچ جاوین یہ حرکت پیدا ہو سکتی ہے مگر اُس دباؤ کو کچھ عرصہ تک جاری رکھنا چاہئے</p>	<p>جبتک تلوے پر ماتہ کا دباؤ جاری رہتا ہے جبتک ٹخنے کا جوڑ تک کانپنے لگتی ہے اور دباؤ کے ہٹاتے ہی فوراً کانپنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر حرکت بہت تیز ہو تو ساری ٹانگ کانپنے لگتی ہے بلکہ دوسری ٹانگ بھی کانپنے لگتی ہے</p>		<p>پہلے سک۔ رل نرو سے لیکر تیسرے تک</p>

ماہیت سو۔ پر۔ فی شیشیل

اور

ٹریپ۔ رمی نیگلش حرکتوں کی

دافع ہو کہ سو۔ پر۔ فی شیشیل رمی نیگلش حرکتیں نخاع کے خاص خاص حصوں سے تعلق رکھتی ہیں چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ تحریک پہلے حص کے قزو یعنی پھلی جڑ کے ذریعہ نخاع کے گرے۔ نے۔ ٹرین ویشل ہوتی ہے۔ اب دماغ سے حرکت نکلے عصب اپنے سامنے کی جڑ کے ذریعہ گزر کر جس عضلے پر وہ عصب پہنچا ہے

اس میں تشنج پیدا کرتی ہے۔ پس اس ترکیب سے ایسے رسی - فلکس حرکتیں پیدا کی جی سکتی ہیں جنکے مرکز نخاع کے قریب ہر ایک حصہ میں موجود ہیں تو ان حرکتوں کے ہونے یا نہ ہونے یا شدید ہو جانے سے نخاع کے خاص خاص حصہ کی حالت اور نیز ان اعصاب کی حالتوں سے بھی عمدہ واقفیت پیدا ہو سکتی ہے جن کا تعلق نخاع کے ان حصوں سے ہے *

ٹوپ - رسی - فلکس حرکتوں میں صرف دو ہی حرکتوں کا بیان اس موقع پر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے ایک تو پے - ٹے - لہ - رسی - فلکس اور دوسری انفل کلوئٹر یا درپے کر پے - ٹے - لہ - رسی - فلکس حرکت صحت کی حالت میں قریب ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ سو میں صرف ایک آدہ میں شاید موجود نہ ہو + اس حرکت کے موجود ہونے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس حصہ نخاع میں جس سے لم - بر پکٹ سسٹم کے اعصاب نکلنے میں عصبی کیفیت کا سلسلہ جاری ہے اور جب وہ حرکت جاتی رہتی ہے تب یا تو خاص خاص عضلہ میں کس قسم کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے یا اس عصب کے اگلی جڑ میں کوئی بیماری ہوتی ہے یا نخاع کے اگلے ہارن کے ٹرے آہوار کے کیسے لاغر ہو جاتے ہیں جیسے بچوں کے پے - را - لی سسٹم یا جو انون کے نخاعی پے - را - لی سسٹم میں ہوا کرتا ہے یا نخاع کے حق بخشے والے حصہ میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے جیسے لو - کو - مو - ٹر - اٹاک - سی کی بیماری میں ہو کرتی ہے اور یہ ضرور یاد رہے کہ اسی - لو - کو - مو - ٹر - اٹاک - سی کی بیماری میں پے - ٹے - لہ - رسی - فلکس کی حرکت جاتی رہتی ہے اور یہی سبب اس مرض کی دیگر اہم علامتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی پیدا ہوتی ہے مگر ان شاذ و نادر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لو - کو - مو - ٹر - اٹاک - سی کی بیماری میں کہ جب لے - ٹے - رل اسکے - رو - سسٹم ہی اسکے ساتھ شامل ہوتی ہے

پے۔ لے۔ لر۔ رمی۔ فلکس کی حرکت جاری رہتی ہے بلکہ بہت شاذ و نادر
 اس مرض میں یہ حرکت بہت بڑھ بھی جاتی ہے۔ عطا وہ لو۔ کو۔ مو۔ ٹو
 اٹاک۔ سی کے پے۔ ٹے۔ لر۔ رمی۔ فلکس کی حرکت اس صورت میں بھی
 جاتی رہتی ہے کہ جب نخاع کی کمر کا حصہ بہت ہی گھبٹا ہے جیسے مٹی۔ لاتی۔ ٹر
 مین ہوا کرتا ہے۔

اب اس بات کا بیان کیا جاتا ہے کہ کن بیماریوں میں ٹیپ۔ رمی۔ فلکس
 حرکت بڑھ جاتی ہے۔ پس واضح ہو کہ انفل۔ کلو۔ لنس کی حرکت تندرستی کچال
 میں پیدا نہیں کیجاسکتی پس اسکا پیدا ہونا نشان بیماری کا ہے۔ جب نخاع کے
 آگے۔ رو۔ لے۔ لے۔ رل۔ کا۔ لم (اگلا اور بنی کا۔ لم) میں بہت ہی خرابی
 اسکے۔ رو۔ سس کی پیدا ہو جاتی ہے تب انفل۔ کلو۔ لنس کی حرکت ہی خست
 سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ بات ہوتی ہے تب اس سے یہ ثابت ہوتا
 ہے کہ نخاع کے لے۔ لے۔ رل۔ کا۔ لم میں بہت ہی سکے۔ رو۔ سس ہو گیا
 ہے مگر جب دماغی خرابی سے ہے۔ لے۔ پلی۔ جیا ہو جاتا ہے تب بھی بعض دفعہ
 انفل۔ کلو۔ لنس کی حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ لے۔ رل۔ پلی۔ جیا
 کی بیماری میں بھی حرکت مذکور پیدا ہو جاتی ہے بعض دفعہ مرگی کی نوبت کے
 گزر جانے کے بعد چند منٹ تک ٹیپ۔ رمی۔ فلکس اور انفل۔ کلو۔ لنس
 دونوں حرکتیں پیدا کیجاسکتی ہیں۔



مقالہ چہارم

امراض دماغی

اول سے - فی - ل - جیا

اگرچہ دماغ کی ہر ایک جادہ اور فرسین بیماریوں میں درود ہوا کرتا ہے پہر ہی سر کا دروازہ دہی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ درود و قسم کا ہوتا ہے یا تو بیرونی یا اندرونی۔ اول بیرونی جب سر کے عضلوں میں درد ہوتا ہے تب اکثر آگ - سی - پے - لو - فران - ٹے - ریش اور ٹم - پو - ریل - سلس - سیں مبتلا ہوتے ہیں + پیمانہ کی یہ ہے کہ یہ درود سارے سر میں ہوتا ہے اور دبانے یا ابرو یا جڑوں کو حرکت دینے سے اسکو زیادتی ہوتی ہے۔ سبب اسکا سردی ہے +

علاج نگہیں۔ مگر اس سے کہ اسکو زکام کا علاج کریں اور جو فرسین ہو تو کرناک رو - مار - ٹے - زم کے علاج سے اسکو فائدہ ہوتا ہے + جو چہلی کہو پڑی کی ہڈی پر چپان ہے دپے - ری - کرے - نیم (بعض دفعہ اس میں درد ہوتا ہے + پیمانہ اس قسم کے درد کی یہ ہے کہ یہ درد اکثر ایک ہی جگہ پر محدود رہتا ہے اور اگر زور سے دبائے تو اسکو زیادتی ہوتی ہے لیکن عضلوں کو حرکت دینے سے اس پر کچھ بھی اثر پیدا نہیں ہوتا +

سبب اس درد کا آتشک ہے اور علاج اسکا مثل آتشک کرنا چاہئے + بعض دفعہ چشمخانہ کے اندر کے گوشہ انداز کے اسی جانب کے عصاب میں درد ہوتا ہے اور ایک ہی مقام پر قائم رہتا ہے جس سے بیمار کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سر کی اس جگہ پر گویا کسی نے منہ ٹھونک دی ہے - اصطلاح میں اس سرد درد کو ککے - دمنہ - ہٹے - سی کہیں

بولتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سر اور چہرہ کے ایک ہی جانب (اکثر دہنی) پر یہ درد ہوتا ہے۔ اصطلاح میں اس سر درد کو کہتے ہیں۔ کبریٰ۔ نیا بولتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ درد مثل انتر۔ ہے۔ ٹنٹ فیور کے اکثر بار ہی سے ہوا کرتا ہے چنانچہ اس کی نوبت سوچ کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور چون چون آفتاب بلند ہوتا جاتا ہے درد کو شدت پاتی جاتی ہے اور چون چون سورج ڈھلتا جاتا ہے اسکو تخفیف ہوتی جاتی ہے اور بعد غروب آفتاب درد موقوف ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ درد فوجی ہوتا ہے اور تب برابر یکساں رہتا ہے۔ اور یہ بیماری عورتوں کو بہ نسبت مردوں کے زیادہ ہوتی ہے اور چون ان کو بہ نسبت بوڑھوں کے اور بعض دفعہ یہ درد نہایت شدید ہوتا ہے اور بوقت اکل و شرب یا گفتار کے اور ہوا لگ جانے سے بھی شروع ہو جاتا ہے۔

سبب اسکے۔ لے۔ ریا اور علاج بھی اسکا مثل تب لرزہ کے کو میں اور سبکیا سے کرتے ہیں۔

دوم اندرونی۔ یہ درد تین قسم کا ہوتا ہے۔ اول سے۔ فے۔ بلجیا کن۔ جس۔ لے۔ واجسم کی تین حالت میں اس قسم کا درد پیدا ہوتا ہے ایک تو جب مزاج دھوی ہوتا ہے۔ دوسرے مزاج نازک اور چڑچڑا اور تیسرے بلغمی اور کمزور۔ چنانچہ جب اس قسم کا درد دھوی مزاج کو ہوتا ہے تب ایک ہیسا سا درد سارے سر اور خاص کر پیشانی اور سر کے پیچھے ہوتا ہے۔ چہرہ بہرہ ریا ہوا اور آنکھیں سرخ ہوتی ہیں۔ دوسرے میں خون سے پُر اور بنفص منسلی ہوتی ہے۔ جب اس قسم کا درد نازک مزاج آدمیوں کو ہوتا ہے تو آنکھوں کے سامنے چمکنا ریاں اور ہکیان اڑتی سی نظر آتی ہیں۔ کافون میں طرح طرح کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اطراف سرد ہوتے ہیں۔ بنفص میں کمرزد اور خون سے پُر نہیں ہوتی۔ اور جب یہ درد کمزور ایسے آدمیوں کو ہوتا ہے کہ چمکنا

خون تپتا بڑ گیا ہو۔ تب جسم زرد لہین زبان اور صوڑے پھیکے پڑ جاتے ہیں ہاتھ پاؤں سرد ہوتے ہیں۔ دل دھڑکنے لگتا ہے دونوں جانب کے۔ راڈ آرٹری شدت سے تڑپنے لگتی ہیں۔ نبض کمزور اور میربح ۛ

علاج۔ دموی مزاج کا علاج اسطور پر کرنا چاہئے جس طور پر پہلے۔ تھوڑا لہنے زیادتی خون کا علاج پیچھے بتلایا گیا ہے ۛ اور نازک مزاج کے علاج کے باب میں نیز کو یہ صلاح دین کہ رنج و غم دل سے دور کر دے ۛ انغمہ کو درست رکھے اور زخم قبضہ کے لئے ہلکے مسہلات سے اصلاح شکم کریں اور ہم میں خون کی کمی ہو تو انے میا لینے کمی خون کا علاج کریں جیسا کہ پیچھے بتلایا گیا ہے ۛ

دوسری قسم کا اندرونی درد سردہ ہے جو معدہ یا امحاک کی خرابی سے پیدا ہوتا ہے علامات اسکی یہ ہیں کہ اکثر یہ درد ایک ہی جگہ پر قائم رہتا ہے مثلاً دائیں کینٹی دہنی آنکھ یا پیشانی پر اور اکثر صبح کی وقت جو وقت بیمار بستر سے اٹھتا ہے شروع ہوتا ہے اور کمزور و خفیف ہوتا ہے ۛ جسے صبح تک رہتا ہے اور جو زیادہ تر شدید ہو

تو پہلے سارے سر میں ایک بھاری درد معلوم ہونے لگتا ہے اور زخم حریف ایک ہی مقام پر قائم ہو جاتا ہے ساتھ ہی اسکے بیمار کا جی متلاتا۔ آروغ ٹرش آتے اور تپتے ہوتے ہیں۔ مریض کے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں۔ بصارت دہند لی ہو جاتی ہے اور کاذن کو باجے بختے سے سٹٹائی دیتے ہیں۔ جب بیمار کو کھلکھرتے ہو جاتی ہے تب بعض دفعہ یہ درد رنج ہو جاتا ہے۔ یہ درد کئی گھنٹے سے یہاں رہتا ہے

تک رہ سکتا ہے اور جب پیمانہ ہو جاتا ہے تب نوبت نوبت ظاہر ہوتا رہتا ہے اور مریض کو نہایت تکلیف دیتا ہے ۛ بعض دفعہ شکم میں کثرت سے یوج ہوتی ہے اور جب کھلکھڑکا رہا جاتے ہیں تب درد کو افادہ ہو جاتا ہے ۛ

اسباب۔ معدہ یا امحاک کی خرابی بار بار تیز حلاب کا لینا جس سے دوسرے

کمزور ہو جاتے ہیں ۱۰ اس قسم کا درد سر ایام حیض سے پہلے اور پیچھے ہوا کرتا ہے ۱۱
علاج - سوڈا ہمارا ۲۰ - بر بیل گنے - شیا کے دیوین - غذا کا معقول
 بندوبست کریں صبح و شام پی ہوا خوری کی تاکید کریں - اگر سبب قوی ہو تو بیجا
 کوئی کر دیں ۱۲ اور جب یہ درد بٹھا ہو تو ہر روز صبح کی وقت اپنے - کے - کو انا
 کھنا کرتے کر دینے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور تھکے ذریعہ بہت سا صفا خارج
 ہو تو زان گولیوں کو رات کی وقت کھلا دیں ۱۳

لنسنہ کیا - لو - مل ایک گرین ۱۴ پیل انڈ کا - دس سنتھ اینڈ ٹائیو - ٹے - ریش
 ۱۵ گلیں سنسٹیل اف کے - ری - وی ایک قطرہ ۱۶ سکوٹا کر دو گولیاں بنا دیں ۱۷
 شکم میں نفخ بہت ہو تو کریو - زوٹ یا روغن تارپین کا استعمال کریں - بعض دفعہ
 جب درد کے ابتدائیں ۱۸ سے ۱۹ اگرین تک کار - بوٹ اف امو - نیا ہمارا
 پانی کے پلایا جاتا ہے تو درد روک جاتا ہے ۲۰

تیسری قسم کا درد یا تو سارے دماغ میں ہوتا ہے یا دماغ کے اندر کسی خاص
 حصہ میں قائم ہوتا ہے اور اس میں شاید مضمہ بھی بگڑ جاوے مگر تھکے ہونے کو
 اس کو فائدہ نہیں ہوتا اور کبھی تو زیادہ اور کبھی کم ہو جاتا ہے لیکن ایسا اکثر شاذ
 ہوتا ہے کہ بالکل جاتا رہے - اس قسم کا درد سر اکثر دماغ کی بیماری میں ہوتا ہے ۲۱
علاج - اس درد سر کا خاص بیماری پر منحصر ہے -

دماغ جو بالکل درد سر کا علاج کامل ہو سکتا ہے کیونکہ بعض دفعہ
 ایسا ہوتا ہے کہ بیمار کو صرف درد ہوتا ہے لیکن متھساں کچھ تھوڑا سا
 پایا جاتا ہے ۲۲

دوم دور۔ ٹے۔ گو

یعنی

دوران سر

یہ وہ حالت ہے جس میں تھوڑے عرصہ کے لئے چکر سا آجاتا ہے اور مریض گرنے پر ہو جاتا ہے۔ ارد گرد کی اشیاء گومتی ہوتی معلوم ہوتی ہیں مریض ایک دوجہ کے لئے اپنے کو قائم نہیں رکھ سکتا اور جب کسی شے کا سہارا پاتا ہے تو گرنے سے بچ جاتا ہے اور فوراً بیٹھ جاتا ہے دوران سر کی شدت اور تقاسم میں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ بعض دفعہ صرف بیمار کو نغمش آجاتی ہے اور سر بہت تھوڑا گومتا ہے اور بعض وقت دوران سر بہت اور نغمش تھوڑی اور کبھی آنکھوں کے بند کرنے سے تخفیف ہو جاتی ہے اور کبھی اس کا خلاف ہوتا ہے۔ دوران سر کی نسبت اکثر درد سر کے بعد ہوا کرتی ہے۔ یہ مرض بڑے بچوں کو اکثر ستاتا ہے اور دماغ کے کسی مرض کی ابتدائی علامتوں میں سے یہ ایک نہایت بیماری سلامت ہوتی ہے اور جب سر بار بار گومتا ہے تب ایک شدید شاک سلامت ہوتی ہے کیونکہ اس سے اکثر ہوش و حواس کا خلل اور عصبی ادہ کا نقصان ثابت ہوتا ہے۔

اسباب۔ جب دونوں آنکھوں کی بینائی خط متوازی پر نہیں ہوتی یا جب کانوں میں بیماری ہوتی ہے اور ایک کان جدا ہو جاتا ہے جب یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے مگر اکثر اوقات حالت کمزوری میں سر گھومنے لگتا ہے چنانچہ جب کسی شدید بیماری سے مریض رو بصحت لانے لگتا ہے تب اس حالت کمزوری میں کھڑے ہونے کے وقت بیمار کا سر گھومنے لگتا ہے۔ اور اس وقت ہی سر گھومنے لگتا ہے کہ جب خون میں کسی قسم کا زہر سرایت کھاتا ہے مثلاً زیادہ

مشراب کا پینا یا افیون کا کھانا یا جب کوئی ایسا شخص بنا کو پیتا ہے کہ بڑا رہا ہے
 پہلے کہی نہ پایا ہو۔ بعض دفعہ جب مضمہ بگڑ جاتا ہے یا معامین کسی طرح کی نراکسٹر
 ہوتی ہے تب بھی سرگرمی سے لگتا ہے اور جگر کی خرابی اور گردہ کی نرسن بیماری
 خاص کردہ کہ جسمین پیشاب کے اندر البیو۔ من ہوتا ہے اور دل کی بیماری کے
 سبب بھی دوران سر ہو جاتا ہے اور جب دل کے دھنہ بطن کی دیو این کمرہ
 ہو جاتی ہیں یا اسین کسی قسم کی بیماری ہوتی ہے تب بھی یہ مرض لاحق ہوتا ہے
 کیونکہ ذن کی ان حالتوں میں دماغ کا خون ٹوک کر آتا ہے۔ کثرت مجامعت سے
 بھی دمی کا سرگرمی ہے اور عورتوں کو جب کثرت سے خون خفیض آتا ہے
 تب دوران سر ہو جاتا ہے اور عرصہ دراز تک بچہ کو دودھ پلانے سے بھی
 یہ بیماری ہو جاتی ہے خاص کر جب ایام رضاعت میں ماہ بجا حیض بھی آتا۔
 ہے جب دماغ کے دوران خون میں کسی طرح کی خرابی پیدا ہوتی ہے تب اکثر
 دوران سر ہو جاتا ہے چاہے اس خرابی کے باعث دماغ کا دوران خون نہ ہو جائے
 یا ہے سست مری کے قسم خفیف میں جبکہ اصطلاح میں پے سے۔ مال کہتے ہیں
 ہی دوسرا مین بیماری ہوتی ہے ایک تو دوران سر اور دوسرے غشی اور دوران
 سر کے اور فالج کے اکثر ایک علامت مندرہ ہوتا ہے اور بوڑھوں کو بلا کسی
 در علامت کے اکثر ذہن ثبوت دوران سر ہو کر آتا ہے اور بوڑھے پے میں
 بہ دماغ کی شریانیں کے پیرہ میں بیماری ہو جاتی ہے تو اس سبب سے بھی
 سر اکثر گھومنے لگتا ہے اور جسم میں جب فقرہ کی بیماری کا نہ ہو جاتا ہے تب بھی
 اے گا ہے سرگرمی سے لگتا ہے ۛ

علاج۔ چونکہ دوران سر کا بیاد اکثر کمزور ہوتا ہے اس واسطے ادویات متوی
 روائع تشنج کو کام میں لانا چاہئے۔ لیکن بیماری کا علاج اگر دمی ہو اور سر گرم

اور سر کی رگیں تڑپتی رہتیں اور مریض کے کالون میں بہن بہن کی آواز دینا ہوتی
 ہو تو غذا کم کر دیں۔ حمرستہ اجتراز کر دیں سہلات کا استعمال کر دیں کالون کے
 پیچھے پلستر لگا دیں یا گردن پر سی۔ ٹن لگا کر مواد جاری رکھیں۔ برعکس اسکے لئے میا
 کی سلامت موجود ہو اور سبب کثرت کار یا کمی غذا کے باعث عصبی ضعف پایا
 جادے کا ڈ۔ لیور۔ آئیل اور کوئین اور مرکبات فولاد کا استعمال کریں اور غذا
 مقوی دیں بڑے بچے میں جو تھوڑے عرصہ کے لئے کما ہے گما ہے دوران میں کما
 ہے اسکو کرو۔ سیو۔ سب۔ لی۔ مرٹ اور نیچر آف بارک سے برفائدہ پہلو ہے
 چنانچہ نسخہ۔ ٹائیڈرار۔ بے۔ رائی۔ پر۔ کلو۔ راجی۔ ڈم ایک گرمین۔
 گلائی۔ سی۔ یٹن ایک آونس۔ کیناؤنڈ۔ ٹیکچر آف سن۔ کونام۔ آونس۔
 پے۔ پر۔ مینٹ آئیل۔ ۵۴ بوند۔ سبکو ملا کر بمقدار ایک ڈرام کے ہمراہ دواؤں
 پانی کے دن میں تین دفعہ ملا دیں۔

سوم ان کف۔ لای۔ ٹیس
 یعنی

دماغ اور اسکے پروں کا انفلمیشن

اس بیماری کو فری۔ نائے۔ ٹس بھی کہتے ہیں
 علامات۔ یہ مرض کئی طور سے شروع ہوتا ہے چنانچہ بعض دفعہ سر میں
 کا درد اور ہڈیاں ہوتا ہے اور تب یہ مرض شروع ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا
 ہے کہ بیاہر کا جی متلاتا ہے صغراوی تھے ہوتی ہے اور شدت سے قبض ہوتا ہے
 اور قیصر اور اس بیماری کے شروع ہونے کا یہ ہے کہ پہلے سارے جسم میں تشنج ہوتا

اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اس مرض کے شروع ہونے سے پہلے بیمار کی زبان بند ہو جاتی ہے + اس مرض کی علامتیں دو درجہ میں تقسیم ہو سکتی ہیں - ایک اس - ٹچ آف آرک - سائیٹ - مینٹ دوسرا اس - ٹچ آف کولپس - چنانچہ اس - ٹچ آف آرک - سائیٹ - مینٹ یعنی درجہ جوش و جذبہ کی علامتیں یہ ہیں -

جب یہ بیماری کامل طور پر ظاہر ہوتی ہے تو سر میں نہایت شدت کا درد ہوتا ہے کپٹھی اور گلو کی شرائین تڑپتی ہیں - چہرہ سُرخ آنکھیں سُرخ پتلیاں سکڑی ہوئیں اور چہرہ خوفناک ہوتا ہے - بیمار کو روشنی اور آواز کی برداشت نہیں ہوتی نیند جاتی رہتی ہے بے خوابی مستاتی ہے - نہایت شدت کا ہڈیاں اور تشنج ہوتا ہے جسم گرم اور خشک مگر حرارت جسم کی ۱۰۲ درجہ سے زیادہ نہیں بڑھتی نبض سخت اور سریع بعض دفعہ پُر اور بعض دفعہ باریک - زبان یا لوسج اور خشک یا اسپر سفید فر لگا ہوا ہوتا ہے - تشنگی لشدت اور عثمان اور صفراوی تھے ہوتی ہے اور پانچا نہ شدت سے قبض ہوتا ہے - یہ علامتیں جوش اور جذبہ کی ایک سے تین روز تک رہ کر شدت اس بیماری کی رفتہ رفتہ کم ہونے لگتی ہے اسوقت اس - ٹچ آف کولپس میں درجہ ردی کی علامتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جسم میں بیمار کمزور ہونے لگتا ہے اور ہڈیاں کے عوض اب آہستہ آہستہ برانے لگتا ہے - سماعت اور بصارت کم ہو جاتی ہے پتلیاں بے حرکت رہتی ہیں - عضلہ پٹرکنے لگتے ہیں - ہاتھوں کی انگلیاں کھپتی ہیں - پانچا بے معلوم کھجاتا ہے اور کبھی کبھی پشیا ب بند ہو جاتا ہے - بیمار سر پینے سے مرق ہو جاتا ہے آخر کار بیہوش ہو کر مر جاتا ہے +

دافع ہو کہ اس بیماری کے ابتدا میں اکثر تھے ہو اگر تھی ہے اور یہ ایک ایسی بیماری علامت اس مرض کی ہے کہ ہم ذیل میں ایک نقشہ درج کرنے ہیں جس سے فرق

درمیان اس تھے کہ جو دماغ کی بیماریوں میں ہوتی ہے اور اس کے جو معدہ اور جگر کے مرضوں میں ہوا کرتی ہے معلوم ہو جاوے ۔

تھے معدہ یا جگر کی بیماری کے سبب	تھے دماغ کی بیماری کے سبب
۱۔ تھے سے پہلے تھوڑا بہت جی متلا تھا ہے جو بعد استفران کے تھوڑے عرصہ کے لئے رنج ہو جاتا ہے لیکن کہا نا کہ تھے ہی پر لڑتا ہے	۱۔ اس تھے سے پہلے تھوڑا یا بالکل نہیں جی متلا ہے اور تھے بے معنی ہوتی رہتی ہے اور معدہ میں بھی جاری رہتی ہے اور حرکت سے کھسکنا شروع ہوتی ہے ۔
۲۔ اس میں جگر اور معدہ کا مقام دکھتا ہے اور دبانے سے تھے کرنے کو طبیعت چاہتی ہے ۔	۲۔ اس میں جگر یا معدہ کا مقام نہیں دکھتا ہے۔ دبانے سے تکلیف نہیں ہوتی ہے ۔
۳۔ اس میں نبض سیرج اور کمر در ہوتی ہے ۔	۳۔ اس میں نبض سخت ہوتی ہے اور جلد نہیں چلتی ۔
۴۔ زبان میلنی نفس سے بد بو آتی ہے ۔	۴۔ زبان صاف اور نفس میں بد بو نہیں ہوتی آنکھیں اکثر زردی مایل ہوتی ہیں اور جب اس میں درد نہ ہوتا ہے تو پیچھے ہوتا ہے اور تھے سے پہلے نہیں ۔
۵۔ شکم میں بچسپ ہوتی ہے دست آتے ہیں اور پاخانہ سفید رنگ کا آتا ہے ۔	۵۔ اس میں اکثر شدت سے قبض ہوتا ہے ۔
۶۔ آنکھیاں آتی ہیں اور منہ سے پانی	۶۔ اس میں ہلکا کوشش کے خود بخود

ہوتی رہتی ہے اور منہ سے پانی بہنیں آتا ہے -	آتا رہتا ہے +
۷۔ اس میں گردن پر بلستر کے لگانے سے غشیان کم ہو جاتا ہے +	۷۔ نم معدہ پر رائی کی پٹی یا بلستر کے لگانے سے غشیان کم ہو جاتا ہے +
۸۔ اس میں غذا کی طرف سے طبیعت کو نفرت ہنیں ہوتی بلکہ رنجت ہوتی ہے -	۸۔ غذا کی طرف سے طبیعت کو بالکل نفرت ہو جاتی ہے -

تشخیص - جب تیجہ اس مرض کا موت ہوتا ہے تب بیمار بیہوش ہو کر جاتا
 ہے یا نہایت ضعف کی حالت میں تلف ہو جاتا ہے + اور جب مرض رو بصحت
 لاتا ہے تب یا تو بیمار بالکل تندرست ہو جاتا ہے یا دیوانہ یا مغلوب ہو جاتا ہے +
تشخیص - اس بیماری کو دو حالتوں سے فرق کرنا مشکل ہوتا ہے ایک
 تو اس ہذیان سے (ڈمی - لے - رمی - ام) جو بخار میں بعض دفعہ ہوتا ہے اور
 دوسری ڈمی - لے - رمی - ام طری - منس سے + اس بیماری میں ہذیان
 کی علامت عین ابتداء ہی سے پیدا ہوتی ہے مگر بخار کچھ عرصہ بعد شروع ہوتا ہے
 پس نسبت بخار کے ہذیان کے اس مرض کا ہذیان شدید ہوتا ہے اور اس
 مرض میں نبض تیر سخت اور بے قاعدہ ہوتی ہے بیمار کبھی اکثر مبتلا ہے +
 ڈمی - لے - رمی - ام طری - منس میں نبض کاظم اور میرج ہوتی ہے بیمار
 ایک جگہ قائم نہیں رہتا اور جلد جلد بکتا رہتا ہے ہاتھ کانٹے رہتے ہیں
 کچھ پوچھے تو جواب اکثر دیتا ہے - عسلادہ اذین و داغ کے ایکوٹ انفلمایشن
 میں پیشاب کے اندر رنمی اور کھاری فاس - فٹ کے قسم کے مرکبات کی زیادتی
 ہوتی ہے گردے - لے - رمی - ام طری - منس میں کمی + داغ کے انفلمایشن

میں مرکبات از قسم کلو۔ رائیڈ کے پیشاب میں بہت ہی کم ہو جاتے ہیں لیکن شہابی کے ہڈیاں میں انہیں فرق نہیں پڑتا +

صورت حال تشریحی یعنی وفات۔ لاش کے امتحان سے دماغ اور اُسکے پردے خون سے پُر نظر آتے ہیں + ارک۔ نائیڈ اور پایا۔ مے۔ ٹرکی باریک رگیں خون سے پُر ہوتی ہیں اور ان دونوں پر دھنکار رنگ خوب سرخ ہوتا ہے۔ دماغ کو تراشے تو اُس پر بے شمار خون کے نقوط پائے جائینگے گویا کسی نے اپنے خون جھڑک دیا ہے۔ دماغ کے خُص (کن۔ مونیوشن) پیویدہ مکے مابین پیب ہی ای جکتی ہے اور کسی حصہ دماغ میں ایک یا کئی دہل بھی پائے جاسکتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی حصہ دماغ کا ملائم ہی پایا جاتا ہے پایا۔ مے۔ ٹر کے نیچے یا دماغ کے بطنوں میں سیرم یعنی آب خون پایا جاتا ہے + ڈیلو۔ را۔ مے۔ ٹر اس مرض میں بہت کم ہوتا ہوتا ہے + بعض دفعہ دماغ کے گل پردے موٹے ہو جاتے ہیں +

مدت اس بیماری کی ایک یا دو دن تک یا ستر تین یا اس سے بھی زیادہ عرصہ تک ہوتی ہے +

اسباب۔ تھمازت آفتاب شدت گرمی اور گرمی کا کہی کم اور کبھی زیادہ ہو جانا۔ شدت ریاضت و غصہ و غضب کثرت مطالعہ معہ میں مواد فاسدہ کا ہونا۔ کثرت شراب خواری + باہر سے اندر کو انتقال کر جانا امراض کا وٹ (نقرس) رورما۔ مے۔ نرم (وجع معامصل) ادھی۔ سے۔ پے۔ ریش (دھڑلہ) امراض جلدی مثلاً چیچک وغیرہ اور دانتوں کا نکلنا۔ اور یہ بیماری نوجوانوں میں ابد گردن کے امراض کے سبب سے بھی پیدا ہو سکتی ہے +

علاج اس۔ ٹیج آف آرک۔ سائیٹ۔ مینٹ کا۔ بریفک سکٹان میں رکھیں کہ جو نور و غل اور روشنی سے محفوظ ہو بعد از ان سر منڈو

سر دیا برف سے ترک کہیں۔ مریض جو ان امور مزاج اسکا و موی ہو تو شاید مقصد ہی لے سکتے ہیں۔ ہنہین تو سر کے چاروں طرف جو ٹیکن لگا دیں۔ اور گیا۔ لو۔ مل اور جلب کا جلاب دیوں ہنہین تو ایک یا دو قطرے کر۔ ٹن۔ ٹیل ہمراہ شکر کے مریض کی زبان پر گر گڑوین اور گسٹراٹیل اور ڈریپن۔ ٹائین کا خفقہ ہی گزر سکتے ہیں۔ بعد ازاں نصف گرین کیا۔ لو۔ مل دو یا تین یا چار چار گنٹھ بعد کھلا دیں تاکہ منہ نہ باد اور ٹارٹار۔ امینک کا استعمال ہی اس مقدار میں کر سکتے ہیں جس سے قے نہوشکلا۔ ٹا۔ امینک ایک گرین کے چھ حصے یا چوتھے حصہ کی مقدار میں جب تک نبض کی تیزی کم نہ ہو گنٹھ گنٹھ بعد کھلاتے جا دیں اور واسطے امالہ دماغ کے (کافٹر۔ اری۔ لٹ۔ شن) رائون کے اندر کیجا نب یا تو مسٹر ڈپولس یا بلستر لگا دیں یا پاؤن پر گرم پانی کی بوتلین رکھیں۔ لبطور غذا بیمار کو بخیر آتش جو یا سا گودانہ اور کچھ نہ دیں +

علاج اس۔ ٹچ۔ اف۔ کو۔ لپس کا۔ جب علامتوں کی شدت کم

ہو جاوے اور مناسب بھی سمجھیں تو جلاب دیں اور سارے سر پر ایک بلستر لگا دیں + جب بیمار کی حالت نہایت ردی ہو جاوے تو ایمو۔ نیا ایٹر اور برانڈی کا استعمال کریں اور کہانے کو اغذیہ مقوی مثلاً شوربہ پلا دیں اور نکلے کی طاقت نہ ہو تو غذا کی پچکاری کریں مثلاً نہ میں پیشاب جمع ہو تو بذریعہ سلامتی کے نکال دیں + جب مریض رو بصحت لانے لگے غذا کی احتیاط رکھیں اور بذریعہ ملکہ ملکینات کے قبض رفع کریں + اور جب تک صحت کامل نہ ہو لے جب تک بیمار کو اپنے کاروبار میں مصروف نہ ہونے دیں۔ مرض پہر عود کر آئے تو سر پر آب سرد لگا دیں اور دماغ کا آمالہ گرین اور تیز جلاب دیں +

چہارم مے - نن - جاسٹس

یہ مرض دماغ کے پردوں کا انفلا میشن ہے۔

علامات - جب پردہ ایرک - نائٹڈ اور پایا - میٹرمین انفلا میشن ہوتا

ہے تو کئی طور پر شروع ہوتا ہے چنانچہ کبھی تو سر میں دھنکا ایک شدت کا درد ہوتا ہے اور بیا - زور سے چیختا ہے اور تب تشنج ہو جاتا ہے بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے

کہ عرصہ تک بیمار کے سارے بدن میں تشنج ہوتا رہتا ہے اور تب یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے - اور تیسرے طور پر اسکے شروع ہونے کا یہ ہے کہ تشنج کے شروع ہونے سے

ایک یا دو روز پہلے بیماری کی طبیعت بدتر ہو جاتی ہے توڑا بہت درد سر رہتا ہے اور غٹیان اورتے * اور نبض اکثر تو میری لیکن بعض دفعہ حالت صحت سے بھی

سست ہو جاتی ہے - جب یہ بیماری اچھے طور پر پیدا ہو جاتی ہے تب سر میں ایک

نہایت شدت کا تیز درد ہوتا ہے جس سے مریض چیخ اٹھتا ہے اور ہاتھ پاؤں مارنے

لگتا ہے - روشنی اور آواز بری سلوم ہوتی ہے نیند جاتی رہتی ہے اور بیمار

دانت پٹتا ہے شدت سے ہڈیاں ہوتا ہے - چہرہ سرخ اور آنکھیں پُر آب

ہاتھ پاؤں میں تشنج ہوتا ہے اور بعض دفعہ بیمار احوال ہی ہو جاتا ہے - اس مرض

میں نئے اکثر ہوتی ہے - اور پاخانہ قبض - اور جب یہ بیماری جھلک ہوتی ہے

تب بیمار حالت بیہوشی میں مر جاتا ہے *

جب انفلا میشن پردہ ٹیولوائے ٹرمین ہوتا ہے تب دروسلر درخار ہوتا ہے در زیر

کو مثل تپ لرزہ کے نوبت بنوبت لرزہ ہوتا ہے - ابتدا مرض میں بیمار کے

ہوش دھواس میں چنداں فرق نہیں پڑتا مگر جب بیماری بڑھ جاتی ہے تب بیمار

بیہوش ہو کر اس در زمانہ سے در جادوانی کو رحلت کر جاتا ہے *

یہ بیماری از خود کم پیدا ہوتی ہے بلکہ کاسہ سہر کے ضربہ و زخم کے باعث اور کان کے انفیکشن کے سبب اکثر پیدا ہوا کرتی ہے ۔

اسباب - مے - نن - جائیش کی بیماری اکثر تھری بخار دن کی ایک مدت ہوتی ہے یا یہ مرض تھارت آفتاب سے پیدا ہوتا ہے اور عین طلعی میں جب غلغلہ کے بعد دن کے اوپر مادہ ٹیو - بریکل کا پیدا ہوتا ہے تب یہ بیماری ہو جاتی ہے اسوقت اسکو ٹیو - بریکو - لر مے - نن - جائیش کہتے ہیں ۔

علاج - اس مرض کا سبب پر موتوف ہے اور علاج مرض فری - نامی ٹیو - بریکو - لر مے - نن - جائیش کا اس بیماری میں بھی است آتا ہے لیکن ٹیو - بریکو - لر مے - نن - جائیش کا علاج مثل اکیوٹ ہائیڈرو کفلس کے کرنا چاہیے جبکو دیکھو -

پنجم مرض ہائیڈرو کفلس

یہ بیماری تین قسم کی ہوتی ہے ایک اکیوٹ (حاد) دوسری سب پیوچی اور اور تیسری کرائمک کرائمک (مزمن) ۔

اول اکیوٹ ہائیڈرو کفلس

علامات - یہ بیماری خاصہ بچوں ہی کو ہوا کرتی ہے اور اس مرض کی علامتیں تین درجن میں منقسم ہیں ۔

اول درجہ میں بہتری علامات دماغ کی کن - جش - چین کی پائی جاتی ہیں اور بچہ روتا کرتا ہے نیکی آمد و رفت کا کچھ ٹھکانا نہیں - بچہ مغوم رہتا ہے اور اسکا مزاج چڑھا ہوا جاتا ہے - حرکت کرنے کے وقت سست معلوم ہوتا ہے اور روزمرہ کامیں کو دوسکو نہیں بہاتا - بعض دفعہ بچہ کی طبیعت میں استعدائیت

بڑھ جاتا ہے کہ کھیلنے کھیلنے دفتہ رک جاتا ہے اور دوڑ کر اپنے سر کو والدہ کی آغوش
 میں چسپا لیتا ہے اور ڈاٹہ سے سر کو پکڑ کر دوسر کی شکایت کرتا ہے یا صرف
 یہی کہتا ہے کہ میں اب تھک گیا ہوں اور سونا چاہتا ہوں اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے
 کہ سر گھوم جاتا ہے تب بچک سا بکڑا ہو کر اوپر اُدھر تکتا رہتا ہے جب یہ علامت
 رون ہو جاتی ہے تب یا تو رو دیتا ہے یا ہوش میں آکر ہر پہل میں مشغول ہو جاتا ہے
 بچہ اگر نہ ہا تو اپنی دائمی کو خوف کہا کر لپٹ جاتا ہے۔ جو بچے چل پھر سکتے ہیں وہ
 چلتے وقت اپنے ایک پاؤں کو گھسیٹ لیتے ہیں اور رک رک کر چلتے ہیں۔ استہا
 اکثر خراب رہتی ہے اور بعض دفعہ ایسے تسکون کہ کھیلنے کھیلنے دفتہ غذا مانگ بیٹھا
 ہے اور کبھی جب غذا دی جاتی ہے تب انکار کرتا ہے اور بعض اوقات کھاتے وقت
 اُبکائی آنی میں تے کرنا چاہتا ہے تشکی اکثر کم ہوتی ہے اور بعض دفعہ اکل و شرب
 دونوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ صرف کھانے کے بعد ہی بچہ تے کر دیتا
 ہے اور کبھی خلوص مدہ میں بھی تے ہو جاتی ہے کہ جس سے ایک سبز رنگ کی برط
 خارج ہوتی ہے لیکن اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا دینین دیا تین دفعہ سے زیادہ
 تے نہیں ہوتی لیکن کئی روز تک متواتر ہوتی رہتی ہے اور سر گر ان اور دوسر
 زیادہ ہوتا جاتا ہے شکم اس حالت میں بگڑا رہتا ہے کیونکہ مریض کو ابتدا ہی سے
 قبض رہتا ہے اور پاخانہ اکثر کم اور مختلف رنگ کا اور بدبودار آتا ہے جبین صغرا
 ہمیشہ کم ہوتا ہے زبان خشک ہنن ہوتی اور کنارے اور نوک اسکی اکثر سرخ
 ہوتی ہے اور درمیانہ حصہ سفید جسم خشک لیکن بہت گرم ہنن ہوتا۔ ہتھین
 خشک آنکھیں مکہ رنیز تیر اور بے قاعدہ۔ بچہ حالت غنودگی میں رہتا ہے اور
 بعض دفعہ دینین دیا تین مرتبہ سونا چاہتا ہے لیکن بے چین رہتا ہے اور اچھے
 طور پر سو نہیں سکتا دانت پٹتا ہے۔ سوتے وقت آنکھیں نیم دار ہتی ہیں اور

ذرا سی واز یا کسی قسم کا ہلکا ہوا ہینن کہ خوف کہا کر چونک پڑتا ہے اور سبب
 کے بھی بعض دفعہ چونک پڑتا ہے رات کے وقت بٹی کی روشنی کی برداشت
 ہینن ہوتی ایسا ہرگز قیاس نہ کرنا چاہئے کہ یہ ساری علامتیں ایک ہی بچہ میں
 پائی جاتی ہیں اور موجود ہوں ہی تو برابر ایسا ہینن رہتی ہیں اور بچہ کھالت
 ہر لحظہ بدلتی رہتی ہے کیونکہ کبھی تو خوش اور کبھی مغموم رہتا ہے۔ یہ درجہ اکثر چار یا
 پانچ روز تک رہتا ہے اس وقت مرض کی تشخیص نہوسکے یا علاج سے کچھ فائدہ
 نہ ہو تو دوسرے درجہ کی علامتیں پیدا ہونے لگتی ہیں کہ جو وقت یہ مرض لا علاج
 ہو جاتا ہے اس دوسرے درجہ میں بچہ بالکل مغموم اور متفکر رہتا ہے طاقت بیٹھنے
 کی ہینن رہتی اور ہمیشہ سونا چاہتا ہے آنکھیں اکثر بند اور پیشانی پر شکن چڑھ رہتا
 ہے۔ روشنی کی برداشت ہینن ہوتی جسم خشک۔ چہرہ سُرخ اور سر اکثر گرم رہتا
 ہے حرکت کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اور جب تک بلایا نہ جاوے خوابناک پڑا رہتا
 ہے گفتگو باہوش لیکن بہت کم کرتا ہے۔ مزاج چڑچڑا اور ہمیشہ آہ سرد بہر تار رہتا ہے
 یا زور زور سے چیغیں مار کر دوسرے کی شکایت کرتا ہے۔ جب رات آتی ہے علامتوں
 کو زیادہ شدت ہوتی ہے اور بچہ کبھی تو زور زور سے روتا ہے اور کبھی حالت ہزیان
 میں بکتا رہتا ہے۔ نبض کم زور اور آہستہ چلتی ہے۔ اس درجہ کے ابتدائی میں تے
 اکثر موقوف ہو جاتی ہے لیکن اسکے موقوف ہونے سے کہانے پینے کی اشتہا
 ہینن بڑھتی۔ پاخانہ بہ نسبت درجہ اول کے زیادہ قیض ہو جاتا ہے اور اجابت غیر
 معمولی آتی ہے۔ رو دون سے ریح بالکل دور ہو جاتی ہے اور شکم دب جاتا ہے
 جب درجہ سوم اس مرض کا آتا ہے تب بچہ پر اس قدر غفلت طاری ہوتی
 ہے کہ اس حالت سے اُسکو اٹھانا دشوار ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ کنول۔ شن ہو کر بالکل
 بیہوش ہو جاتا ہے۔ کنول۔ شن جسم کے ایک جانب پر بہ نسبت دوسری کے

تشنج زیادہ ہوتا ہے اور بعد رفع ہو جانے نوبت کے ایک جانب یا تو کسی قدر یا بالکل مفلج ہو جاتی ہے اور دوسری جانب خود بخود حرکت کرتی رہتی ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ کنولشن کی وقت جس جانب میں تشنج زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ ہنہین پر اکثر یہی جانب تشنج کی نوبت کے بعد مفلج ہو جاتی ہے۔ جب یہ تیسرا درجہ بخوبی پیدا ہوتا ہے تب بچہ ایک پاؤں پہلا کر اور دوسرا شکم پر سیٹھ کر میویشن چت پڑا رہتا ہے۔ ہاتھ اس کے تہر تہرانے لگتے ہیں اور ان سے اپنی لب اور ناک کو نوچتا رہتا ہے حتیٰ کہ خون نکل پڑتا ہے یا ایک ہاتھ شرمگاہ پر رکھتا ہے اور دوسرے کو اپنے چہرہ اور سر پر پھیرتا رہتا ہے کہیں تو سر سرد اور کہیں گرم اور کہیں چہرہ سوج اور کہیں پھیکا رہتا ہے نبض سریع اور پُر اور نہایت کمزور چلتی ہے آخر کار صرف قلب پر ہاتھ رکھنے سے نبض کی حرکت محسوس ہوتی ہے اب بتلیان بے حس اور پھیل جاتی ہیں اور روشنی بُری معلوم ہنہین ہوتی۔ حالت میویشن میں بچہ کا منہ خود بخود حرکت کرتا رہتا ہے گویا کوئی چیز چبا رہا یا نگل رہا ہے۔ بعض دفعہ ایک ہی مرتبہ کنولشن ہو کر بیمار راہی ملک عدم کا ہو جاتا ہے یا چند روز تک زندہ یہی رہ سکتا ہے اور تب علامات ردیہ ظاہر ہو کر بچہ کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ اکیوٹ مائیکڈرو-کنفلکس جب طور سے بیان کیا گیا ہے ہمیشہ اسی طور سے ظاہر ہنہین ہوتا بلکہ ہر مریض میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پایا جاتا ہے مثلاً کسی کو نسبت دوسرے کے کنولشن ابتدا ہی میں ہو جاتا ہے اور کسی کو سارے جسم میں اور کسی کو صرف ایک ہی طرف ہوتا ہے اور کسی کو بعد کنولشن کے فالج ہو جاتا ہے اور کسی کے ہاتھ پاؤں کچھ کانٹے ہی رہتے ہیں غلامہ برین کہیں تو پیشی رفتہ رفتہ طاری ہوتی ہے اور کہیں دفعۃً ہو جاتی ہے اور کوئی بیمار عرصہ تک بیہوش رہتا ہے اور کوئی جلد مر جاتا۔ لیکن سلامتون کے ایسے اختلافات سے اس مرض کی تشخیص میں غلطی ہنہین ہوتی۔

علامات مندرہ۔ مثل ان ظاہر ہونے اس مرض کے ہفتون یا مہینوں سے بچے کی طاقت گھٹتی جاتی ہے اور وہ لاغر ہوتا جاتا ہے اور گاہے گاہے اس کو بخار بھی آ جاتا ہے۔ کیس قدر کہاں لشی ہوتی ہے بہوک مر جاتی ہے۔ پاخانہ اکثر قبض رہتا ہے اور گاہے گاہے ادھر ادھر ہر ماہہ پاؤں میں درد بتلاتا ہے اور کبھی دوسر کی شکایت کرتا ہے آخر کار بچہ کچھ کچھ حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے اور بخار زیادہ ہوتا جاتا ہے اور طبیعت بیمار کی عست ہو جاتی ہے۔ لیکن اب سر کی شکایت ہین کرنا اگر دماغ کسی مالت کو بے چین ہو جاتا ہے اور تب کنولشن ہونے لگتا ہے اور تھوڑے ہی عرصہ بعد یہ مرض خود ظاہر ہو پڑتا ہے ۔

صورت حال تشیخ بعد وفات۔ بعد وفات کے دماغ کو کھولنے سے اس کے پردے سفید یا مکدر نظر آتے ہیں اور زرد رنگ کا ملف اور دماغ کے پردوں اور دیگر اعضا سے اندرونی مین ٹیو۔ بر۔ کل کے چھوٹے چھوٹے دانے پائے جاتے ہیں اور بطون دماغ میں آب خون پایا جاتا ہے ۔

تشخیص۔ کوئی بچہ خاص کر اگر وہ مسلول الوالدین کے نطفہ سے ہو یا کنکلی سبب ہفتون یا مہینوں سے بیمار ہو اور جب کبھی خوابناک یا عست معلوم ہو اور کہاں لشی کی شدت ہو تو اس صورت میں ایکوٹ ہائڈرو سیکفلس ہو جانے کا دل میں شک پڑنا چاہیے کیونکہ تھوڑی تھوڑی اور متواتر خشک کہاں لشی اس مرض کے ابتدائیں اکثر ہوا کرتی ہے اور اس بات میں شک ہو تو یہ دریافت کریں کہ بچہ کو کبھی تمے ہوتی ہے یا نہیں اور یہ معلوم کریں کہ پاخانہ کا کیا حال ہے اور قبض کی ضربان کی طاقت یا تواتر اگر کم و بیش ہو تو اس سے اس مرض کے پید ہونے میں کچھ شک نہ کرنا چاہیے ۔

اس مرض کو ابتدا میں بچوں کے رمی۔ مے۔ ٹنٹ فیور سے فرق کرنا مشکل ہوتا ہے

چنانچہ اس بیماری کے شروع میں ہمیشہ قے ہوا کرتی ہے لیکن ری۔ مے ٹینٹ فیور
میں اکثر قے نہیں ہوتی اور جو ہوتی ہے تو جلد موقوف ہو جاتی ہے اور بعد اُس کے
اُبکاسیان نہیں آتی ہیں جیسے رائیڈرو۔ کُفلس میں قے موقوف ہونے کے بعد
آیا کرتی ہے۔ ری۔ مے۔ ٹینٹ فیور میں ابتدا ہی سے پتلے دست آتے ہیں لیکن
رائیڈرو۔ کُفلس میں پاخانہ تھوڑا اور میلے رنگ کا آتا ہے ری۔ مے۔ ٹینٹ فیور
میں شکم کے اندر ہمیشہ درد نہا کرتا ہے۔ مرض رائیڈرو۔ کُفلس میں اکل و شرب کی
طرف سے بچہ کو نہایت نفرت ہو جاتی ہے لیکن ری۔ مے۔ ٹینٹ فیور میں تشنگی
نہایت شدت سے ہوتی ہے۔ ری۔ مے۔ ٹینٹ فیور میں جسم بہت گرم رہتا ہے لیکن
اس مرض میں کم۔ ری۔ مے۔ ٹینٹ فیور کی علامتوں میں اختلاف پائے جاتے ہیں تاہم
کسی خاص وقت پر ان کو تخفیف نہیں ہوتی۔ ری۔ مے۔ ٹینٹ فیور پانچویں سال سے
پشتر بہت کم ہوتا ہے اور تین سال کے عمر کے بچوں میں بہت ہی کم پایا جاتا ہے
لیکن یہ مرض اکثر پانچویں سال سے پشتر ہی پیدا ہوتا ہے۔

اسباب۔ عہد طفلی اور سکڑا۔ فینو۔ لس نراج اس مرض کے
پری۔ ڈسپوز۔ رنگ کا زمین اور خشک ہو جانا کسی مدت کے بعد کی بیماری کا۔
تکلیف سے دانت نکالنا۔ سر پر صدمہ پہنچنا۔ دنتہ خوف کھا جانا۔ یا زیادہ غصہ
ہونا۔ یہ سارے بوجھت اکساٹی۔ تنگ کا زمین۔ یہ بیماری تین طور سے شروع
ہو سکتی ہے۔

اول۔ سر کی علامتیں تدریج پیدا ہوتی ہیں۔
دوم۔ بلاغا ہر ہونے علامات پشتر کے شدت سے دوسرے بخار ہونا اور کنو لشن
ہو کر یہ مرض دنتہ شروع ہو جاتا ہے۔
سوم۔ یہ مرض پوشیدہ طور پر اس طرح شروع ہوتا ہے کہ بعد رنج ہو جانے چھپک

یا کسی اور مرض جلدی کے اس مرض کی خفیف علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔

نتیجہ۔ انجام اس مرض کا اکثر خراب ہے لیکن جب یہ بیماری کسی تندرست بچہ کو شدت سے ہو جاتی ہے تب اسکا انجام سیکندریک نکل سکتا ہے پر جب یہ مرض تدریج یا پوشیدہ طور پر کمزور اسکا۔ فیو۔ لس مزاج کے بچوں کو ہو جاتا ہے تب انجام ہمیشہ بد ہوتا ہے۔

علاج۔ اس مرض کے علاج میں اس بات کو یاد رکھنا چاہئے کہ بغور شروع ہونے والی علامات پیشہ کے اگر اسکا علاج کیا جاوے تو یہ بیماری ترک سکتی ہے لیکن جب اچھے طور پر ظاہر ہو جاتی ہے تب علاج سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اسکے روکنے کا علاج بعینہ اسی طور پر کرنا چاہئے جس طور پر سئل کے روکنے کی تدبیریں کرتے ہیں کیونکہ اس مرض میں بھی سئل کے مختلف اعضائے میں مادہ ٹیو۔ بر۔ کل پیدا ہو جاتا ہے۔ پس جس خاندان میں کئی بچے اسی مرض میں مر گئے ہوں یا ان کی طبیعت اس بیماری کی طرف مائل ہو تو والدہ کو دودھ نہ پلانا چاہئے بلکہ کسی تندرست اما کے دودھ سے اس بچہ کی پرورش کرنی چاہئے۔ ایسے بچہ کو کھلی ہوا میں رہنا اور سردی سے بچنا چاہئے۔ خدا سادھی اور سیریل الہفم ہو اس میں بڑا ناگہنا سوج سمجھ کے کرنا چاہئے بلکہ عرصہ تک صرف دودھ ہی کی غذا پر اکتفا کرنی چاہئے۔ اور جینک چارو ڈھین اور اوپر اور نیچے کے سامنے کے دانت نہ نکل آوین تب تک دودھ بڑھائی نہ کرنی چاہئے۔ ایسے بچوں کو مکتب میں جلد بٹھانا نہ چاہئے اور ریاضت کے باب میں ایسی کیل کو دسے روکنا چاہئے جس میں تھکان اور محنت زیادہ ہو۔ کھلی ہوا میں ہو اور سی کامضائقہ نہیں۔ اور دانت نکالنے کے ایام میں ان باتوں سے شکو بچنا چاہئے کہ مرض ہو۔ پٹنگ کاف یا میٹلس کی چھوٹ نہ لگ جائے۔ شکم کا خیال رکھنا چاہئے اور پاخانہ ہرگز قہض نہ ہونے دینا چاہئے اور شکم کی ادنی شکایت

کو ایک بیماری مرض تصور کرنا چاہئے اور فوراً کسٹریٹل سلفٹ اف گلنے شیا
 کہلا کر قبض اور شکم کی شکایت رفع کرنی چاہئے۔ اور جب کبھی سرگرم اور بچہ
 بے چین معلوم ہو فوراً ایک یا دو گرین کیا۔ لو۔ مل کہلا کر تھوڑی تھوڑی مقدار
 میں جب تک کہلا کر دست نہ آدین سلفٹ اف گلئے۔ شیا اس طور پر کہلا دین
 کہ سلفٹ اف گلئے۔ شیا ۴ ڈرام ۴ سرب آف آہنج - ۲ - ڈرام ۴
 کے - ری - وی - واٹر ۴ ڈرام ۴ سبکو ملا دین اور تین سال کے بچہ کو بمقدار
 دو دو ڈرام کے جب تک دست نہ آدین پلاتے جا دین اور بعد اسکے دو یا تین ایتز
 برابر تھوڑی تھوڑی مقدار میں کیا۔ لو۔ مل کہلا دین اور کچھ کیتھد بخار اور قبض کی
 شکایت ہو تو دو مین دو یا تین مرتبہ اوپر کے نسخہ کا استعمال کریں۔ بلا اشتہ ضرورت
 سر پر جو کین نہ لگا دین اور جو ایسی ہی ضرورت ہو تو بہت نہ لگا دین کیونکہ اسکا فیولہ
 مزاج کے بچوں کو غنہ نکلنے کی برداشت بہت ہی کم ہوتی ہے۔ جب یہ شکایتیں
 رفع ہو جا دین اور کچھ کمزور ہو تو مقویات کا استعمال کریں مثلاً انیفوژن اف کلینا
 ۴ - آؤنس اور دو ڈرام ۴ انیفوژن اف رو بر ب ساڑھے چار ڈرام ۴
 ٹینکچر ارن۔ شیا ٹی ڈیڑھ ڈرام ۴ سبکو ملا کر تین سال کے بچہ کو بمقدار تین ڈرام
 کے دین دو دفعہ چادین یا سائٹریٹ اف ایرن اور کونین کا استعمال کریں اور
 آدھا یا ایک گرین کیا۔ لو۔ مل ہمراہ ۵ یا ۶ گرین رو بر ب کے ہر رات یا دوسری
 رات کہلا کر تلین رکھیں ۴

سر کی شکایت باظاہر ہوتی ہو تو گردن کے پیچھے سٹن لگا دین کیونکہ سر کے قرب سے
 جب مواد ہمیشہ جاری رہتا ہے تب ٹائڈ رو۔ کنٹکس کا حمد اکثر رک جاتا ہے
 متوقع اس مرض کے روکنے کا نہ ملے اور یہ بیماری ظاہر ہو پڑے تب ان تین کیوں
 سے اسکا علاج کرنا چاہئے۔ اول خون نکالنا۔ دوم سہلات کا استعمال کرنا۔

سوم مرکبات سیاب کا کھلانا *

اول خون نکالنا۔ ورنہ جو کہ ایسے کچھ نکال خون جنگا نرے ہسکرا۔ فیوئس ہے نہایت اعتیاد سے نکالنا چاہئے اور حقیقت کے اندر فائدہ کا سارا مطلب صرف جو کون کے لگانے سے حاصل ہو سکتا ہے اور ابتدا ہی سے اس مرض کے دوسرے درجہ کا علاج کرنا پڑے تو ہرگز خون نہ نکالنا چاہئے *

دوم شہلات۔ اس مرض میں شہلات سے بڑا فائدہ ہوتا ہے لیکن صرف ہلکے دست آنے پر اتنا کرنا چاہئے بلکہ چند روز تک دستوں کو جاری رکھنا چاہئے چنانچہ جب قبض رفع ہو جائے تب بھی تھوڑی تھوڑی مقدار میں کسی جلاب کو جاری کرنا چاہئے گھنٹہ بعد کھلانا چاہئے لیکن ہر دو مرتبہ جلاب دینا اچھا نہیں کیونکہ اس میں تھوڑا سا اندیشہ ہے اور یہ کہ جس مقدار سے پہلے دست آتے ہیں وہ ہر روز کے استعمال سے کافی نہیں ہوتی ہے۔ پس قبض کے رفع کرنے کے لئے ہر روز ایک نئی وقت پڑتی ہے۔ اس مرض کے ابتدا میں ہمیشہ جی متلی اور تھوڑے ہوا کرتی ہے لیکن یہ علامتیں خون کے نکالنے سے استعد کم ہو جاتی ہیں کہ معدہ ایک خوراک کیا۔ لو۔ مل اور جلب یا کیا۔ لو۔ مل اور اشکا۔ مونی کی فوراً قبول کر لیتا ہے لیکن جب تک دست نہ آوین تب تک ان دو کو تین تین گھنٹہ بعد کھلانا چاہئے بلکہ حقہ بھی کر دیں تاکہ ان کا عمل جلد ہو جاوے لیکن تھوڑے تھوڑے تو این دوا کا استعمال نہ کرنا ہی بہتر ہے اس صورت میں زیادہ مقدار کیا۔ لو۔ مل میں شکر ملا کر پوچھ گواہ کیا ہی دفعہ کھلا کر تھوڑے تھوڑے عرصہ بعد سلفٹ اف گئے۔ شیا کے عرق کا استعمال کریں اور جب دست ایک مرتبہ کھلا کر آ جاوے تو ایسی نمک کو ہمراہ مانے۔ ٹریٹ اف پو۔ ٹامش کے کھلا دین تاکہ اجابت کھلا آتی رہے اور اور بار بھی ہوتا رہے *

سوم مرکبات۔ سیلاب کو کسی سیلاب کے ہمراہ بجز دست لانے کے کسی
 آؤز فائدہ کے لئے نہ دینا چاہئے سر پر آب سرد کے لگانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے
 لیکن اس ترکیب کو اس حالت میں کرنا چاہئے کہ جب دماغ میں اجتماع خون کا
 ثابت ہو اور بیماری کے درجہ دوم اور سوم میں بھی نہ لگانا چاہئے ۔

غدا۔ ابتدا مرض میں کہ جب علامتوں کو شدت ہوتی ہے پانچاں
 قبض ہوتا ہے اور جی متلی شدت سے ہوتی ہے اس وقت بیمار کو بہت ہی کم غذا
 دینی چاہئے لیکن بعد از ان ہلکی اور قوی غذا مثلاً ساگو دانہ یا آب سخی ضرور پلانا
 چاہئے ۔

انیون۔ اس مرض میں انیون کے استعمال کرنے میں نہایت احتیاط درکار
 ہے اور ان دو حالتوں کے سوا اس کو کسی اور حالت میں ہرگز نہ استعمال کرنا چاہئے ۔
 اول۔ ان صورتوں میں کہ جب یہ مرض نہایت شدت سے ظاہر ہوا اور بچہ کو دیوانے
 کے طور پر جوش آجاوے اور بے نیقہ تام کے اگرچہ سر کی گرمی اور چہرہ کی سرخی رفع
 ہو گئی ہو اور نبض بھی جلد اور کمزور چلتی ہو یہ بھی اگر جو شش رفع نہ ہو تو انیون کے
 پہلانے سے چین آجاتا ہے اور بچہ سو جاتا ہے اور بعد جاگنے کے اس کو نہایت
 آرام آجاتا ہے ۔

دوم۔ ان حالتوں میں کہ جب یہ بیماری شدت سے ظاہر نہیں ہوتی لیکن جون
 جون بڑھتی جاتی ہے مریض کو نہ دیاں بے چینی اور درد سر کی شکایت زیادہ ہوتی
 جاتی ہے اور خاصکر راتیں اس کی نہایت تکلیف سے کٹتی ہیں اور تیز سیلاب کی بالکل
 برداشت نہیں ہوتی اور جب بجز انیون پہلانے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا تب
 پوری مقدار مار۔ فیہا کے پینے سے ان سلامتوں کو نہایت افادہ ہو جاتا ہے ۔
 بلستر۔ ابتدا مرض میں کہ جب اس بیماری کا بڑا زور و شور ہوتا ہے بلستر

لگانا جائز نہیں لیکن جب یہ مرض طرہ جاوے اور بیمار سست اور بیہوش ہونے لگے تب سر کی چند یا پر بلشر لگانا چاہئے اور اس بلشر کو حنلاف اُس قاعدہ کے جو ہم نے قرا بادین صیان میں بتلایا ہے (دیکھو امراض الصبیان) ۱۰ یا ۱۲ اگنڈہ تک برابر رکھنا چاہئے کیونکہ یہ بات قابل یاد رکھنے کے ہے کہ ٹائیڈ رو۔ کفلس کے بیماری میں جلد پر چھالادیر سے نکلتا ہے +

ووم اسپتوریتس ٹائیڈ رو۔ کفلس

اسپتوریتس کے معنی میں کاذب کے۔

علامات۔ اس بیماری کی یہ ہیں کہ بچہ کا سر بہاری اور وہ خوابناک

ہوتا ہے اپنی دائمی کی آغوش میں نیم خواب نڈھال ہو کر پڑا رہتا ہے اور نتو سر اٹھانے کی طاقت ہوتی ہے اور نہ سر اٹھانا چاہتا ہے انہیں کہی تو کہہ لیتا ہے اور کہی ب باعث کمال ضعف کے بند کر لیتا ہے زبان کسیتقد ر سفید ہوتی ہے اور کبھی جسم سرد۔ یہ بیماری کئی جینے کی عمر سے دو یا تین برس کی عمر کے بچوں کو ہو جایا کرتی ہے اور ایسے بچوں کو بھی ہوتی ہے جو نازک مزاج اور نہایت کمزور ہوتے ہیں +

تشخیص۔ اس بیماری کو دماغ کے انفلامیشن یا کن۔ جش۔ چن سے فرق کرنا چاہئے چنانچہ اس مرض کی پہچان یہ ہے کہ رخسارے بچہ کے پیکے اور سر ہوتے ہیں۔ انہیں نیم دا اور پتیکوں میں حس نہیں ہوتا بچہ دم سرد اور آہستہ آہستہ لیتا ہے بہت چوٹا ہو تو اس مرض اور کن جش۔ چن میں فرق کرنے کی نہایت آسان سی کیب یہ ہے کہ اُسکے یا فنج یعنی نالو کا ملاحظہ کریں چنانچہ یا فنج یعنی نالو اگر ادنیٰ ہے تو جائز کہ دماغ میں خون زیادہ ہے اور جو دبا ہوا ہے تو اس سے کمی خون کی ثابت ہوتی ہے

علاج۔ اس بیماری میں تنقیہ بالکل منع ہے بچہ کو دودھ یا شوربا پلا دیں اور بطور دوا کے ارو۔ مائٹک اسپرٹ اف ایمو۔ نیا دیا۔ قطرہ کی مقدار میں چار چار گنٹھ بعد دیوں یا بھوسل سکے دیا۔ ابونہ برانڈی ہمراہ اروٹ کے پلا دیں۔ اگر اسپہال موجود ہو تو روکیں۔ دوائی یا دالہ کو کہہ دیں کہ بچہ کو کھڑا نہ کرے اور سکے ماتہ یا پاؤن کو پارچہ پٹہ سینہ سے ڈھانک رکھیں۔

سوم کرانک مائٹروکیٹلس

علامات۔ اس مرض میں دماغ کے اندر پانی بہہ جاتا ہے اور سر بڑھ کر مانند سبوح کے ہو جاتا ہے۔ ٹیڈیوں کے جو کھل جاتے ہیں۔ اور پیشانی کی ٹیڈی اونچی ہو جاتی ہے اور دونوں جانب کے پہیلیا تے ہیں اور پیچھے کی ٹیڈی بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے اور بچہ کا چہرہ بد ڈول مانند شکٹ کے ہو جاتا ہے۔ نتیجہ دماغ کے پہیلیا تے اور کاسہ سر کے اندر پانی بہہ جانے کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ سے اپنے سر کا بوجھ سنبھل نہیں سکتا اور آہستہ آہستہ اور بعض دفعہ اپنے سر کو ماتھوں سے تھام کر چلتا ہے بچہ یا کو اندھا یا بہرہ ہو جاتا ہے اور کسی جانب کا ماتہ یا پاؤن مغلج ہو جاتا ہے اور بیوقوف سا ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی کنولشن بھی ہو جاتا ہے۔

اسباب۔ سبب اس مرض کے ہنوز دریافت نہیں ہوئے لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ بیماری دماغ کے انفلامیشن کے باعث پیدا ہوتی ہے اور آتشک اور تولد کے وقت عمل جراحی کے سبب اور کسی بیماری کی چھوت لگ جانے سے بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔

علاج۔ دوا سے کچھ بھی فائدہ حاصل کرنا منظور ہو تو علاج اس بیماری کا عین ابتدا سے کرنا چاہئے چنانچہ بچہ کا سر منڈوا کر اسپر ہر روز ایک یا دو ڈرام ملکا

مر-کیلو-ریمل آئینٹ۔ منٹ کی مالش کریں اور سر کو شپینہ کے کن ٹوپ سے رمانک
 رکھیں تاکہ ہوا لگ کر شپینہ نہ ٹرک جاوے۔ لیکن بچہ کا سر گرم ہو جاوے تو ٹوٹی آتا
 لین اور چوتھائی یا آدھا کریں کیا۔ لو۔ مل ہمراہ دو یا تین اردو۔ مائیکٹ پاؤڈر اف چاک
 کے تاکہ سیاب دستوں کے راہ نفل نہ جاوے وغینہ دو دفعہ کہلاوین۔ اسپہال
 شروع ہو جاوے تو صرف مرہم مذکورہ بالا کی مالش کریں۔ اس علاج کو ۳۰ یا ۴۰ روز
 تک برابر جاری رکھیں۔ اس سے کچھ فائدہ ہو تو دوا کی مقدار بتدریج کم کر دیں۔
 لیکن مالش کے بعد بھی کن۔ ٹوپ پہناوین۔ چہرہ یا آٹھ منقہ کے بعد چندان فائدہ معلوم
 نہ ہو تو کیا۔ لو۔ مل کے ہمراہ کوئی ہلکی ڈالو۔ رنگ دوا ملا کر استعمال کریں اور گردن کے
 پیچے سٹن یا بلٹر لگا دیں۔ سر بہت گرم اور بچہ بہت بے چین ہو تو سر پر گاہے گاہے
 جو نمکین لگا دیں۔ سر کو اٹھی۔ کنگ پلاسٹر سے باندھنا بھی ایک علاج اس مرض کا ہے
 جسکی ترکیب یہ ہے کہ پلاسٹر مذکور کی دھجیان ایک پنچ کی تہائی چوڑی کتر کے پہلے
 دو دھجیان ڈوفیش ٹائیڈ۔ پراسس سے لیکر تینچی کے طور پر اسکی خلاف جانب
 کے آرہٹ کے باہر کے حصہ پر لگا دیں + دوم ایک آؤر دھجی سر کے پیچے بالون کے
 اگنے کی جگہ سے لیکر ناک کی جڑ پر لگا دیں + سوم کئی دھجیان سر کے آرہٹ پر اس
 ترکیب سے لگا دیں کہ چند یا پر مانند تینچی کے ایک دوسری سے ملجا دیں + چہارم ایک
 آؤر دھجی اسقدر لمبی لیوین کہ جسکے تین پنچ سر کے چاروں طرف آجا دیں اسکا پہلا
 پنچ ہودن اور کانوں کے اوپر اور آکسے۔ پے۔ ٹل۔ پرو۔ ٹیو۔ پرنش کے کیتھ
 پنچ آجاوے تاکہ ساری دھجیوں کے سرے اُس پنچ سے قریب چوتھائی پنچ
 نیچے لھکتے رہیں تب اُن دھجیوں کے سروں کو اُس پنچ پر موڑ کر باقی دو دھجیوں
 کو اسی طور پر لاوین کہ جسطور پہلے پنچ کو ہودن اور کانوں پر بٹھایا تھا۔ اس
 ترکیب سے سر پر ایک مسادھی اور مضبوط دباؤ پڑ جاتا ہے لیکن اسکے نتائج کو باحتیاط

تمام دیکھنا چاہئے کسٹے کہ اس ترکیب سے بعضہ فوہ کم۔ پرسی۔ شن۔ آندھی۔ برین
یعنے دماغ کے دب جانے کی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ حقیقت پٹیوں کو ڈھسلا
کر دینا چاہئے +

سر سے پانی نکالنا بھی ایک اور علاج اس مرض کا ہے ترکیب جسکی یہ ہے
کہ ایک بار ایک کے۔ نیو۔ لا اور ٹرو۔ کارلیک سامنے کے یا فنج کے ڈیڑھ انچ تعداد
سر کے کو۔ رو۔ نل سو۔ چو پر سوراج کر کے پانی نکال لین اور حقیقت پانی نکلتا رہے
اور بعد بھی سر پر کسی قسم کا دباؤ رکھنا چاہئے +

ششم سن۔ اسٹروک

اس بیماری کے کئی نام ہیں چنانچہ ہیٹ۔ ایچ۔ پلکسی + کو۔ وی۔ سو۔ لائسل +
ان۔ سو۔ لے۔ شیو +

ماہیت۔ اکثر حکما کی یہ رائے ہے کہ جب دماغ حرام مغز اور سمیلے تھوڑے
نرو کے افعال سست ہو جاتے ہیں تب علامات اس بیماری کی پیدا ہوتی ہیں اور
یہ کہ اس بیماری میں جب تک صرف دماغی علامتیں موجود ہوتی ہیں تب تک اثر
اسکا دماغ کے حصہ سے رمی۔ برم میں محدود رہتا ہے اور جب حرکات تنفس میں
خلل واقع ہوتا ہے تب اس میں مے۔ ڈا۔ ابلانگے۔ ٹاہی مبتلا ہو جاتا ہے +
علامات۔ پہلے ایسا ہوتا ہے کہ بیمار کے سر میں تھوڑا بہت درد ہوتا
ہے۔ ہڈیاں ہوتا ہے بیمار کو ادنگہ آتی ہے۔ چہرہ اور آنکھیں سرخ جسم خشک اور
گرم۔ نبض پُر اور سیرج ہو جاتی ہے۔ تشنگی شدت۔ پیشاب کم اور سرخ۔ اور
بعضہ فوہ بیمار کو بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ یہ علامتیں چند گنٹھ تک
رہ کر اگر تیرہ میں تو علاج مناسب سے تدریج رفع ہو جاتی ہیں ورنہ علامات مفصلہ ذیل

پیدا ہونے لگتی ہیں۔ غم و غی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ پتلیاں مسکڑتی جاتی
 ہیں۔ مختلف عضلات میں اختلاج ہونے لگتا ہے۔ دم جلد جلد اور تکلیف سے
 لیا جاتا ہے۔ سول شدت سے دہرکنے لگتا ہے۔ نبض میرے لیکن کمزور ہو جاتی ہے
 اور حرارت بدن کی تیز ہو جاتی ہے۔ اب بیمار بیہوش ہونے لگتا ہے۔ پتلیاں
 پہلی جاتی ہیں اور بعض دفعہ تشنج ہوتا ہے۔ اب دم آہستہ آہستہ اور زیادہ تکلیف
 سے لیا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ اس سے خراٹے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ چہرہ
 پیوکر نیلگون ہو جاتا ہے۔ دل خوب شدت سے دھڑکتا ہے۔ لیکن حرکات
 اُسکی کمزور ہو جاتی ہیں اور نبض جلد ڈوب جاتی ہے اور مرض کے شروع ہونے
 سے ۲ سے ۹ گھنٹہ کے اندر بیمار مر جاتا ہے لیکن جلد کی حرارت مرتے دم
 تک بدستور تیز رہتی ہے یہاں تک کہ موت کے بعد بھی نعش عرصہ تک گرم رہتی
 ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی سلامت مندرہ ہنہیں پیدا ہوتی۔
 اور بیمار بیہوش ہو جاتا ہے اور چند گہرے انگری سانسین بہر کر جان بحق تسلیم
 ہو جاتا ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیمار کو غش آ جاتا ہے اور ڈبڈبائی ہو جاتا
 ہے۔ سر گھومنے لگتا ہے۔ بصارت دھندلی ہو جاتی ہے۔ پتلیاں آنکھوں کی
 پہلی جاتی ہیں۔ اونگھ آتی ہے۔ سینہ میں ایک بندہن سا معلوم ہوتا ہے
 بیمار ٹھنڈی سانسین لیتا ہے۔ فم محدہ پربو جبہ یا دہ متعام ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ گویا بیٹھا جاتا ہے اور بیمار کا جی متکاتا۔ تھے ہوتی ہے۔ چہرہ اور لبین پہلی
 جسم سرد اور پسینہ سے معرق ہو جاتا ہے مگر کمر کی قدر گرم رہتا ہے۔ نبض کمزور
 اور بطی ہوتی ہے۔ یہ سلامتین علاج مناسب یا تو رفع ہو جاتی ہیں یا بڑھ کر بیمار کو
 ہلاک کر ڈالتی ہیں۔ بعض اوقات یہ مرض اسطور پر شروع ہوتا ہے کہ درد سر اور ہڈیاں
 ہوتا ہے اور مرض کو اونگھ آتی ہے۔ سر گھومتا ہے۔ کچھ پوچھ تو کبھی رونے اور کبھی

ہنسنے لگتا ہے۔ سینہ پر بندہ ہنسا معلوم ہوتا ہے۔ جی تھکتا مٹے ہوتی ہے۔
 دل دھڑکتا ہے۔ نبض کمزور مگر سریع۔ چہرہ ہیکا جسم کبھی گرم اور کبھی سرد۔ یہ علامتیں
 منع ہو کر شفا ہو سکتی ہے یا بڑھ کر حالت بیہوشی اور تنگی نفس کے باعث بیمار سافر
 راہ عدم کا ہو جاتا ہے +

اسباب۔ تپش آفتاب اور خاص کر آن و نوحین یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے
 کہ جب سخت گرمی درہو ابند ہوتی ہے اور یہ مرض اپریل مئی اور جون کے مہینے میں
 زیادہ ہوتا ہے +

حفظ۔ تاقدام۔ بلا ضرورت دھوپ میں نہ پہنچا جائے۔ گرمی کے دنوں میں
 اس قدر مشقت کہ جس میں نکان ہونہ کرنی چاہئے۔ کثرت شراب خواری سے احتراز
 کرنا چاہئے +

علاج۔ خون لینا بذریعہ فصد کے اس بیماری میں منع ہے اس سے
 نقصان عظیم متصور ہے۔ لیکن سرد پانی کا ٹراٹرا بیمار کے سر گردن اور سینہ پر کا
 اکیسر کا کرتا ہے۔ اس سے بدن کی گرمی کم ہو جاتی ہے اور نظام عصبی کو تحریک ہوتی
 ہے جب تک جسم گرم اور خشک رہے اور نبض میں طاقت تپ تک بیمار کے سر سینہ
 اور پشت پر خوب کہلے دل سے پانی کا ٹراٹرا چھوڑتے جا دیں لیکن جسم بیمار کا ٹراٹرا
 پسینہ سے مرق ہو۔ نبض کمزور اور بیمار گہری سانسین لیتا ہو تب سر اور سینہ
 پر گاہے گاہے سرد پانی کے چھینٹے دیویں + نفع تکلیف تھن کی واسطے بیمار کے سینہ
 راجی کی ٹی لگا دیں اور کٹر سیٹل اور ٹر۔ پن۔ ٹائین کا حقنہ کریں۔ اور پیٹ لیون پر
 پہن راجی کی ٹی لگا دیں جب بیمار کو نکلنے کی طاقت آ جاوے تو نبض کا لحاظ کر کے
 ادویات اسٹی۔ سو۔ لنٹ اور اعذیہ تقوی دیویں +

ہفتم مرض ا۔ پو۔ پلکسی

تعریف - وقتہ موقوف ہو جانا حرکت کا اور جس میں فرق پر جانا سبب
دب جانے دماغ کے +

اقسام - یہ بیماری تین قسم کی ہوتی ہے - قسم اول میں دماغ کی رگیں خون
سے صرف پُر ہو جاتی ہیں اسکو سپنل یا کن - جس - ٹیو - ا۔ پو - پلکسی کہتے ہیں +
دوم سیرس اسمین علامہ رگوں کے پُر ہو جانے کے ان سے سیرم یعنی آب خون
تراوش پاکر دماغ کے پیندے اور بطون میں جمع ہو جاتا ہے + سوم ہے - مو - را - جک
اسمین علامہ رگوں کے پُر ہو جانے کے وہ پھٹ پہی جاتی ہیں +

علامات - یہ بیماری تین طور سے شروع ہوتی ہے - اول بیمار وقتہ
بیہوش ہو کر گر پڑتا ہے - دوم تھوڑے عرصہ تک شدت کا درد سر غشیان اور
بیہوشی طاری ہو کر بیمار اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے - سوم وقتہ نصف جسم معلوم
ہو جاتا ہے اور تب یہ بیماری رفع ہو جاتی ہے +

پہلے طور سے یہ مرض شروع ہوا در خون ہی زیادہ بہ جادے تو بیمار بیہوش ہو کر زمین پر
گر پڑتا ہے - بتلیان پہنچاتی ہیں اور منہ بیمار کا ایک جانب کو کھینچا جاتا
ہے - بول و براز بے معلوم نکلتا ہے - ناک تہ پاؤں سرد اور نیلے ہو جاتے ہیں جسم
سر دینہ سے سقر ہو جاتا ہے اور چند گھنٹہ کے بعد بیمار تلف ہو جاتا ہے +

بے ہوئے خون کی مقدار جب اوسط ہوتی ہے تب اس مرض میں تھوڑی بہت
بیہوشی ہوتی ہے اور دہم تکلیف اور خواتے سے لیا جاتا ہے - گھٹنا دشوار ہو جاتا ہے
چہرہ نیلگون ہو جاتا ہے - آنکھیں دا اور بے حرکت رہتی ہیں اور دونو بتلیوں میں
فرق پڑ جاتا ہے - دست دپایا تو بے حرکت یا کچھ ہوئے ہوتے ہیں یا انہیں تشنج

ہونے لگتا ہے لیکن یہ مسلماتیں ایک جانب کے ہاتھ و پاؤں میں نسبتاً دوسری جانب کے زیادہ تر پائی جاتی ہیں۔ پانخانہ یا تو قبض یا ازخو و نکل جاتا ہے اور پیشاب بھی یا تو خطا ہو جاتا ہے یا مثلاً جب پیشاب سے پُر ہو جاتا ہے تب قطرہ قطرہ ٹپکنے لگتا ہے۔ نبض میں سختی اور میں ہوتی ہے لیکن نسبت حالت صحت کے نبض کی سرعت اکثر کم ہوتی ہے *

جب یہ بیمار نمی قسم خفیف سے ہوتی ہے تب بیمار بالکل بیہوش نہیں ہوتا اور تکلم میں بھی تھوڑا ہی فرق پڑتا ہے اور وہ فرق تھوڑے ہی عرصہ تک رہتا ہے اور بعض صورتوں میں صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ طاقت گھٹا رہے یا تو بالکل جاتی رہتی ہے یا آسین فرق پڑ جاتا ہے *

علامات مندرہ۔ خاص مرض کے شروع ہونے سے پہلے عرصہ راز تک یا تو بیمار کا سر گھومتا یا سر رو کرنے لگتا ہے یا سر میں بوجہ معلوم ہوتا ہے۔ خیالات میں متور پڑ جاتا ہے۔ بیمار کے منہ سے کچھ کچھ نکل جاتا ہے۔ حافظہ بگڑ جاتا ہے زبان میں ٹکنت آ جاتی ہے۔ چہرہ سُرخِ نحیر جاری رہتی ہے۔ آنکھوں کے ساخو چٹکار یاں سیڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بیمار کبھی ایک چیز کو دو دیکھتا ہے یا بعض دفعہ تھوڑے عرصہ کے لئے بہرایا کانا ہو جاتا ہے اور کبھی تو اونگھتا رہتا ہے اور بعض دفعہ اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے ہیں اور کبھی چہرہ پیچکا فشان قے اور غشی طاری ہو جاتی ہے *

نتائج۔ یا تو مریض دفعہ مرجاتا ہے یا مختلف عرصوں کے اندر موت آتی ہے اور جب مریض کو شفا ملتی ہو نیز الی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اکثر قے ہوتی ہے اور کثرت سے پسینہ آتا ہے اور جب شفا کامل نہیں ہوتی تب یا تو مریض کے ہوش و حواس میں تھوڑا بہت فرق رہ جاتا ہے یا تھوڑا بہت فالج ہی باقی رہ جاتا ہے *

علامات کثیر کجی بعد وفات۔ اگر مریض سنپل ۱۔ پو۔ پکسی میں
مر جاوے تو دماغ کی ریگن خون سے پُر اور پھیلی ہوئی ہوگی اور دماغ کے بطون اور پینڈ
میں تھوڑا بہت سیرم یعنی آب خون ہوگا۔ اور قسم دوم یعنی سیرس ۱۔ پو۔ پکسی سے
مر گیا ہو تو دماغ کے بطون اور پردون کے درمیان سیرم یعنی آب خون پایا جائیگا اور جب
مریض ہے۔ مو۔ را۔ جک ۱۔ پو۔ پکسی سے مرتا ہے تب دماغ کی ساخت یا بطون
یا پینڈ سے مین یا دماغ کے اوپر خون پایا جاتا ہے *

تشخیص۔ بیہوشی شراب کے نشہ کے سبب ہوئی ہو تو مہنہ سے شراب کی بو
آئیگی اور کسی منوم نہ ہر کے کہانے سے ہوتی ہو تو مریض کے حالات دریافت سے
وہ بات ثابت ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں ۱۔ پو۔ پکسی کی بیماری میں جب تشنج ہوتا
ہے تو ایک جانب مین بہ نسبت دوسری جانب کے زیادہ ہوتا ہے مثلاً ایک
پتلی تو سکڑی ہوئی ہوگی اور روشنی کا اثر آپسرخایان ہوگا اور دوسری پھیلی
ہوئی اور روشنی کا اثر آپسرخ بھی ہوگا مین بے حس و حرکت ہوگی اور ایک جانب
کے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھیسے کو اٹھا کر چوڑے بنے تو ایسے گر پڑتے ہیں گویا ان میں
بالکل جان ہی نہ تھی۔ برعکس اس کے دوسری طرف کے ہاتھ پاؤں تھوڑے
بہت کچھے ہوئے ہونگے۔ ہاتھ اور پاؤں میں تشنج ہوتا ہو تو ایک جانب کے ہاتھ
پاؤں بہ نسبت دوسری جانب کے زیادہ تر حرکت کرتے ہیں +

اسباب۔ پری۔ ڈسپو۔ زنگ ایک خاص عمر چنانچہ ۵۰ سے ۶۰ سال
کی عمر میں یہ مرض اکثر ہو جاتا ہے اور جو بوجھ سہ زیادہ ہوتی جاتی ہے طبیعت اس پر
مرض میں مبتلا ہونے کے لئے زیادہ تر یا بل رہتی ہے اور ۲۰ سال سے کم عمر میں
یہ مرض کم ہوتا ہے اور عہد طفلی میں بہت ہی کم۔ قد و قامت خداداد۔ مثلاً کوتاہ
گردن۔ فراخ سینہ۔ سرخ رنگ۔ تیار بدن اس بیماری کے میلان طبع ہیں

لیکن یاد رہے کہ اکثر یہ بیماری لاغر آدمیوں کو بھی ہو جاتی ہے۔ یہ مرض موروثی بھی ہے۔ ۴۔ اچھی غذا کا کھانا اور ریاضت کا نہ کرنا۔ معمولی فضول کا خارج نہ ہونا۔ دوسری نراج۔ وہ بیماریان قلب کے کیواڑوں کی جنکے باعث دماغ کا خون اچھے طور پر لوٹ نہیں سکتا۔ اور نہایت قریب سبب اس مرض کا یہ ہے کہ جب دماغ کی رگیں چربی میں بدل جاتی ہیں یا انکی دیواروں میں کوئی مادہ سخت جمع ہو جاتا ہے تب وہ اچھے طور پر تو مسکرسکتیں اور نہ پھیل سکتی ہیں بلکہ ڈھیلی اور پتلی پڑ جاتی ہیں نتیجہ اسکا یہ ہوتا ہے کہ جب خون ذرہ بھی تیزی سے دور کرتا ہے تب وہ رگیں خون سے استعد پر ہو جاتی ہیں کہ انکے پہٹ جانیکا اندیشہ ہوتا ہے چنانچہ ایسا واسطے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مسن آدمی زینہ سے اترتا یا چڑھتا ہے یا زور سے کھانتا یا چہکتا ہے یا کسی آذر طور سے اسکے دوران خون کو تحریک ہوتی ہے تب دماغ کی رگوں کے پھر ہو جانے کے سبب یا پہٹ جانے کے باعث یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔

اکساٹنگ کاز۔ کثرت ریاضت زور سے گانا۔ یا ہوائی باجا بجانا۔ بوقت اجابت زور لگانا۔ زور سے کھانا سنا۔ غصہ و غضب۔ شدت کی سردی یا گرمی کا لگنا۔ بدیر سر جھکا کر بیٹھنا۔ اور اسحالت سے دفعہ اٹھ کھڑا ہونا۔ گلو میں دباؤ کا ہونا۔ جیسے گلوبند وغیرہ کا۔ شہوت کا غلبہ۔ کثرت شراب خواری۔ ۵۔ علاج۔ جب بیماریاں فوٹ کی حالت میں ہو تو اسکے سر کو ادھیخا رکھیں تاکہ دماغ کی طرف خون رجوع نہ کرے اور کمرے کی کھڑکیوں کو کھول دیں تاکہ ہوا اچھے طور پر آتی جاتی رہے۔ ۶۔ چہرہ خون سے پُر اور آنکھیں سرخ ہوں یا چہرہ پیکا گرغض و کینہ اور خوب تڑپتی ہو تو گلاب یا زردکی رنگ سے نصہ لین۔ لیکن چہرہ پیکا اور غصہ زور ہو تو گرغض لین اور بعد دفع ہو جانے لوٹ کے ایسا علاج کریں جس سے قلب کی حرکت

دہیمی اور دوران خون کی تیزی کم ہو جاوے۔ پس گاہے گاہے تھوڑا سا خون
 بذریعہ فصد کے لین یا سر اور گردن پر جو ٹکین لگا دیں اور ایسے مسہلات کا
 استعمال کریں جن سے خوب ہلکے دست آجا دیں مثلاً کروٹن۔ آئیل ایک
 یا دو بوند شکر کے ہمراہ ملا کر مریض کی زبان پر مل دیں یا حقنہ جات کا استعمال کریں
 چنانچہ نسخہ حقنہ کا۔ کسٹرائیل ۱۲ ڈرام + روغن تارپین ۱۵ ڈرام + آب گرم
 دو پائینٹ + سب کو ملا کر حقنہ کریں + سر گرم ہو تو سر پر آب سرد لگا دیں۔ پہلے
 گردن پر اور بعد کچھ عرصہ کے سر پر پلستر لگا دیں۔ بطور غذا پہلے بیمار کو آتش جو یا
 سا گو دانہ کھلا دیں اور رفتہ رفتہ غذا بڑھاتے جا دیں + اگر نوبت اس بیماری کی
 غذا سے تھوڑے ہی عرصہ بعد ہو جاوے تو ضرورت سے کرا دیں۔ نوبت کی موت
 خون حیض یا بواسیر کا خون بند ہو تو عورت کے اندام نہانی یا مقعد کے گرد
 جو کین لگا دیں + بیمار بالکل بہوش یا جالت رومی میں ہو تو گردن پر
 اسٹراٹک لائیکوار ایو۔ نیاک کی مالش کریں اور مریض کو ایو۔ نیاسنگھا دیں +
 گاؤٹ یا رو۔ ما۔ ٹیزم کی بیماری دماغ کی طرف منتقل ہو جاوے اور اس
 سبب اپو۔ پلکسی کی بیماری پیدا ہو تو فوراً کوئی سخت جلاؤین + نگلنے میز
 تکلیف ہو تو دوا اور غذا کے دینے میں نہایت احتیاط کریں کہ مبادا مریض کا
 کلا گھٹ نہ جاوے۔ جب بیمار رو بصحت لانے لگے تو گردن پر ایک سیٹن لگا دیں
 اور نوبت اس بیماری کی پہر ہو جاوے تو ویسا ہی علاج کریں جیسا پہلی دفعہ
 کی نوبت کے لئے بتلایا گیا ہے مگر اس دوسری دفعہ کی نوبت کا علاج زیادہ
 سخت ہونا چاہئے +

علاج حفظ ماقدم۔ چونکہ اپو۔ پلکسی کی بیماری میں دماغ کے اندر
 خون زیادہ ہوتا ہے اور اکثر یہ مرض دمووی مزاج کو ہو جاتا ہے تو جن آدمیوں کے

طبیعت اس مرض میں مبتلا ہونے کے لئے مایل ہو، مگر کھجور کا استعمال بالکل ترک کر دینا چاہئے اور گوشت اور ثقیل غذا سے پرہیز کرنا چاہئے بلکہ بقولات اور دودھ پر گزار کرنا چاہئے اور جب کوئی بھی سلامت مندرہ ظاہر ہو تو فوراً غذا کم کر دین اور گاہے گاہے جلاب دیدیا کریں۔ اس ترکیب سے علامات مندرہ رفع ہوں گے۔ گردن پر جو نکین لگا دیں یا بندریہ گلاس کے خون لین۔ ایسے آدمیوں کو گرم مکان میں نہ رہنا چاہئے اور نہ بڑی رات گئی کہنا کہنا چاہئے، صبح و شام ہوا خوری کرنی چاہئے اور کھانے پینے میں محتاط، پانخانہ قبض ہونا چاہئے اور رنگ لوشاک نہ پہننی چاہئے۔ جب یہ بیماری کمزور آدمیوں کو ہونیوالی ہو تو اسکا علاج اغذیہ اور ادویہ مقوی سے کرنا چاہئے۔

ٹیو۔ مرس آفدی۔ برین

یعنی دماغ کی رسولیان

اقسام۔ بڑی بڑی قسمیں رسولیوں کی جو دماغ میں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں۔ کنسر، ٹیو، بریکل، آتشک کے مادہ کا ہنجرہ ہو جانا، سار، کو، ما، ریمو، ما، گلائی، ادما، کو، لیس، ٹیا، ٹو، ما، لاجی، پو، ما، ایو، ریزم، استخوانی یا چونکے مادہ کا جمع ہو جانا۔

اولی کنسر۔ اگرچہ ہر قسم کی خبیث رسولیان دماغ میں پیدا ہو سکتی ہیں مگر خاصہ کن۔ کے۔ نی۔ لائیڈ قسم کی رسولی اکثر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی رسولی سے صرف ایک یا کئی قسم کی پیدا ہو جاتی ہیں اور اگرچہ سی۔ سی۔ برم میں اس قسم کی رسولی اکثر پیدا ہوتی ہے پر ہر ہی دیگر حصہ میں پیدا ہو سکتی ہے۔

دوم ٹیو۔ بر۔ کل۔ ٹیو۔ بر۔ کل کے ٹولے زرد یا سرسئی رنگ کے خشک ہوتے ہیں اور انہیں خون کی رنگین ہنین ہتھین۔ اکثر تو ایک ہی ڈولا ہوتا ہے مگر گاہے دو بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ مقدار انہی السی کے بیج سے لیکر بیر کی گھسی تک کی ہوتی ہے اور بعض نو چوٹے انڈے کے برابر بھی ہوتی ہے *

سوم آتشک کا مادہ۔ بہ نسبت دماغ کی ساخت کے اسکے پردوں ہی پر زیادہ اکثر جمع ہو جاتا ہے *

چہارم سار۔ کو۔ ما۔ اس قسم کی رسولی بھی گاہے گاہے پائی جاتی ہے اور دماغ کے پردوں یا خود ساخت میں پیدا ہو سکتی ہے۔ شکل اسکی یا تو گول یا خوشہ دار ہوتی ہے اور مقدار ایک چھالیسا سے لیکر سیب تک کی ہوتی ہے *

پنجم۔ مکسو۔ ما۔ یہ رسولی بہت ہی نرم مثل خالودہ کے ہوتی ہے اور اکثر سی۔ سی۔ نرم میں پیدا ہوتی ہے۔ رنگت اسکی زردی یا سرخی میں ہوتی ہے *

ششم گلاسی۔ او۔ ما۔ اس رسولی کی کوئی خاص شکل ہنین ہوتی بلکہ دماغ کی ساخت میں پہلی ہوئی ہوتی ہے *

ہفتم کو۔ لیس۔ ٹیا۔ ٹو۔ ما۔ اس قسم کی رسولی بہت کم پائی جاتی ہے اور اپنے۔ تے۔ کی۔ الکیوں کے تہ جمع ہونے سے بن جاتی ہے *

ہشتم۔ اینو۔ ریزم۔ دماغ کے پندے کی کسی شریان میں اینو۔ ریزم کی رسولی گاہے گاہے بن جاتی ہے *

دیگر اقسام رسولیوں کے ایسے ہنین ہیں جو بیان کے قابل ہوں *

علامات۔ دماغ کی کسی بیماری کی علامتوں میں اختلاف ہنین پایا جاتا ہے جیسے کہ اس۔ ٹیو مرکب یا رسی میں ہے، جو اسکی یہ ہے کہ ٹیو۔ مرکب

بیماری کی علامتوں کا پیدا ہونا کئی باتوں پر محصور رکھتا ہے چنانچہ ٹیو۔ مرکلی مقدار پر اسکے پیدا ہونے کی جگہ پر۔ اسکے قسم پر۔ اسکی تعداد پر اور اسکے جلد یا دیر سے بڑھنے پر علامتوں میں علامات مذکور صرف اس سبب سے بکثرت نہیں پیدا ہوتیں کہ وہ رسولی دماغ کو دباتی ہے یا اسکی ساخت کو بگاڑ دیتی ہے بلکہ جب دماغ میں کوئی رسولی پیدا ہوتی ہے تب کچھ عرصہ بعد ایسی بیماریاں بھی دماغ کی پیدا ہو جاتی ہیں جیسے نرم پڑ جانا دماغ کی ساخت کا اور مائیڈرو۔ کلفکس اور کرانکائیٹس۔ من۔ جانمی۔ ٹیس وغرض اس سبب سے ہی رسولی کی علامتوں میں اختلاف پڑ جاتا ہے ۔

لگائے گئے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ رسولی بڑی ہوتی ہے پہلے ہی کوئی علامت اسکے ہونے کی نہیں پیدا ہوتی یا ایسا ہوتا ہے کہ دفعۃً۔ پو۔ پلکسی کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں مگر علامات ذیل جسے رسولی کا دماغ میں ہونا ثابت ہو سکتا ہے یہ ہیں۔

دردِ سر۔ ابتدائیں خفیف مگر رفتہ رفتہ شدید ہو جاتا ہے۔ کبھی تو یہ درد کسی خاص جگہ پر محدود رہتا ہے مگر یہ کچھ ضرور نہیں کہ اسی جگہ پر درد محدود ہو کہ جہاں رسولی ہے۔ یہ درد دھیمادھیمابرابر ہوتا رہتا ہے مگر کسی خاص وقت نہایت شدید ہو جاتا ہے اور ساتھ اسکے شدت سے تے ہونے لگتی ہے۔ اور ذرہ سی تحریک سے بڑھ جاتا ہے جیسے کہانے چپکنے۔ بگڑی سانس لینے یا تیز روشنی کے دیکھنے سے ۔
دوم حرکت کرنے سے سر چکر ا جاتا ہے ۔ سوم عقل ہوش و حواس میں فرق نہیں پڑتا بشرطیکہ رسولی بہت بڑی نہ ہو یا دماغ کے کار۔ ٹی۔ کل حصہ میں کئی رسولیاں نہ ہوں
چہارم دماغ سے جو اعصاب نکلے ہیں جب ان پر رسولی کا رباؤ پہنچتا ہے تب پہلے تو ذہن خراش ہوتی ہے اور تب رفتہ رفتہ اعصاب مذکور مفلج ہو جاتے ہیں۔ مگر اکثر ایک ہی جانب کے اعصاب اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بنیادی میں اکثر فرق

پڑ جاتا ہے اور گاہے گاہے بیمار بالکل اندھا بھی ہو جاتا ہے علیٰ ہذا القیاس قوت
 شامہ اور سامعہ میں بھی فرق پڑ جاتا ہے ۔ گاہے گاہے نو۔ بلجیا کا درد مبتلا
 ہوتا ہے چنانچہ خاصکے پانچواں جوڑا مبتلا ہو جاتا ہے لیکن نے شیشل نروین اکثر
 خرابی آ جاتی ہے اور بعضہ دفعہ تیسرا اور چہارواں جوڑا اور گیارہواں جوڑا عصب کا
 بھی مبتلا ہو جاتا ہے چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ جن جن تقاضوں پر وہ اعصاب پہنچتے
 ہیں پہلے وہ جگہ پھر کئے لگتی ہے اور تب دماغ کے سلسلے مغلج ہو جاتے ہیں
 اور دماغ میں جب رسولی پیدا ہو جاتی ہے تب اٹھویں اور نویں جوڑوں عصب
 میں بھی خرابی آ جاتی ہے جس سے بیمار اچھی طرح بات چیت نہیں کر سکتا اور نہ
 نکل سکتا ہے اور بعض اوقات دم لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور دل بھی بے
 قاعدہ حرکت کرتا ہے ۔ پیچہ ہاتھ پاؤں کی حس و حرکت میں بھی فرق آ جاتا ہے
 اور یہ بات جب ہوتی ہے تب اکثر ایک ہی جانب کے ہاتھ و پاؤں مبتلا ہوتے
 ہیں اور یاد رہے کہ دماغ کے جس جانب کے نرو مبتلا ہوتے ہیں اسکے خلاف جانب کے
 ہاتھ پاؤں کی حس و حرکت میں فرق پڑ جاتا مثلاً پہلے تو ایسا ہوتا ہے کہ اینٹین خواہر
 شروع ہوتی ہے اور تب رفتہ رفتہ فالج ہونے لگتا ہے اور وہ ماؤں دست و
 پامین یا توشیح ہوتا ہے یا دہ اینٹین رہتے ہیں ۔ جب سے ۔ رہی ۔ برم کی کسی نصف
 ساخت کے اندر کوئی رسولی پیدا ہوتی ہے تب اکثر بے ۔ مے ۔ پلجیا ہو جاتا ہے
 بعضہ دفعہ دماغ کی رسولی میں سرگی کی طرح تشبیہ کی فوٹین ہی ہونے لگتی ہیں اور جب
 رسولی دماغ کے کسی خاص حصہ میں پیدا ہوتی ہے تب بعضہ دفعہ بیمار چلتے وقت گہوم
 گہوم کے چلنے لگتا ہے یا کسی اور قسم کی بے قاعدہ حرکت کرتا ہے اور سر ۔ رہی ۔ بے لم
 (جو دماغ) میں جب رسولیان پیدا ہوتی ہیں گو خاصکے اسکے درمیان گوشہ میں تب
 کہتے ہیں کہ گردن کے پیچھے کے عضلات کچھ سخت ہو جاتے ہیں اور سر پیچھے کو مٹ

جاتا ہے۔ کلاسیکی تخم کہا جاتی ہے وہ نوٹا گلیں کچھ سیدھی رہ جاتی ہیں اور ان کی انگلیاں بھی کچھ کڑبھاتی ہیں +

اس بیماری میں مریض کی صحت میں بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے چنانچہ نیند میں جب خلل واقع ہوتا ہے تب مریض کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ نتیجہ اس مرض کا اکثر یہی ہوتا ہے اور یہ بات تو اکثر دیکھی گئی ہے کہ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں دفعہ شدید علامتیں ظاہر ہو کر یہ مرض مہلک ہو جاتا ہے +

علاج۔ اس بیماری کے علاج کے باب میں مریض کی طاقت کا بڑا لحاظ رکھنا چاہئے پس غذا اور دوا دونوں ایسے ہوں جن سے بیمار کی طاقت قائم رہے اور سولی کے حل کرنے کے خیال سے آیو۔ ڈائیٹ اور برود۔ مائیڈ اف پو۔ ٹا۔ سیم کا استعمال کریں۔ نیند آتی ہو تو ادویات منوم کو کام میں لادیں +

ساف۔ ننگ۔ آفدی۔ برین

یعنی

نرم پڑ جانا دماغ کی ساخت کا

ماہیت۔ اس بیماری کی ماہیت کے باب میں اطباء کی رائے میں بہت اختلاف ہے لیکن فی زمانہ اس بات پر سب کا صواب ہے کہ یہ مرض دماغ کی رگوں میں سد و ز کے پھنس جانے سے پیدا ہوتا ہے +

وضوح ہو کہ دل کے کیوٹرڈن کی بیماری کے سبب دماغ کی رگوں میں ام۔ بوش۔ یعنی سٹاپڑ جاسکتا ہے اگرچہ بعض دفعہ سٹاند کو کسی انیو۔ ریزم یا شکر کی بیماری میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب دماغ کی رگوں میں سٹے داخل ہو جاتے ہیں جن سے خون کا دوران ٹوک جاتا یا کھلے طور پر جاری نہیں رہ سکتا ہے تب ان رگوں کی

ساخت چربی یا کسی اور چیز میں بدل جاتی ہے لیکن جن حالتوں میں دماغ کی ساخت
علامہ پڑ جاتی ہے وہ یہ ہیں چنانچہ دماغ کی ساخت میں انفلامیشن کا ہو جانا۔
رگوں میں سستہ دن کا جمع ہو جانا۔ دماغ کی کسی بڑی رگ کا کسی سولی سے
دب جانا۔ چوٹی مٹرائین اور عروق شعیہ کی بیماری کے سبب جب انکی منفذ
تنگ ہو جاتی ہے اور اس سبب سے جب خون ان کے اندر سے بخوبی دور
ہٹ کر سکتا ہے تب دماغ کی ساخت کی پرورش میں خلل واقع ہوتا ہے اور وہ
علامہ پڑ جاتی ہے جیسے کہ آتشک کی بیماری میں ہوا کرتا ہے اور اس بیماری
کے پری۔ ڈسپوز۔ تنگ کا زید میں کہ بڑا پے میں دماغ کی ساخت اکثر علامہ
پڑ جاتی ہے کیونکہ اس وقت رگوں کی دیواروں میں ابتری آ جاتی ہے لیکن سست
کے پڑ جانے سے جب دماغ کی ساخت علامہ ہو جاتی ہے تب یہ بات چاہے کسی
عمر میں ہو جا سکتی ہے۔ دماغی سخت جب شدت اور عرصہ دماز تک کی جاتی ہے
تب دماغ کی ساخت کی پرورش میں اس قدر خلل واقع ہو جا سکتا ہے کہ
وہ علامہ ہو جاتی ہے +

ساف۔ تنگ آندی برین تین شکل کی ہوتی ہے ایک سنج دوسری زرد
اور تیسری سفید۔ ملائیت کے توام میں بھی فرق ہے چنانچہ یا تو دماغ کی ساخت
بہت تھوڑی یا اس قدر علامہ ہو جاتی ہے کہ جیسے آٹے کی پتلی لٹی ہوتی ہے اور
اس بیماری میں کار۔ پس اس۔ ٹرائی۔ ٹم اور آپ۔ ٹمک تھے۔ نے۔ مٹس
اور دماغ کے خلل اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ یا دیر سے کہ جو حصہ دماغ کا علامہ پڑ جاتا
ہے اسکی آپس۔ سی۔ ٹمک گرڈولی بہت تندرست حصہ کے بہت ہی کم ہوتی
ہے +

علامات کہ ایک سے دوسری چلے۔ رل ساف۔ تنگ کی۔ درو

سر ہوتا ہے جو برابر ہوتا رہتا ہے مگر بہت شدید ہنہین ہوتا بلکہ بعض دفعہ سر میں صرف
 بوجہ معلوم ہوتا ہے اور یہ درد اکثر پیشانی میں ہوتا ہے اور اگرچہ سارے سر میں بھی
 بعض اوقات ہو سکتا ہے مگر تھوہر کے ایک جانب اور نہ کسی خاص مقام پر محدود
 رہتا ہے۔ عقل ہوش و اس میں فرق پڑ جاتا ہے مثلاً کل دماغی قوتیں رفتہ رفتہ
 کم ہوتی جاتی ہیں یہاں تک کہ مریض یا تو بالکل بے وقوف یا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ بیمار
 کے حادثات و اطوار و فرج میں بھی سرق پڑ جاتا ہے ۱۷- فی۔ شیا کے مختلف
 درجے پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً ایک ہی لفظوں کو بار بار بار بار بولتا رہتا ہے۔ لرض
 پست ہمت اور نادم رہتا ہے اور بعض دفعہ خواہ مخواہ ہنسنے یا رونے لگتا ہے اور گناہ
 بے چین اور جوش میں آ جاتا ہے۔ گاہے گاہے ہوش و اس میں فرق ہنہین بھی
 پڑتا۔ دست و پا کے مختلف حصوں میں درد ہوتا ہے اور دست و پا کی قوت کاسہ
 میں اس طرح کے فرق پڑ جاتے ہیں کہ گاہے چندین رینگتی ہی محسوس ہوتی ہیں
 اور گاہے وہ مقام سُن ہو جاتا ہے۔ سماعت اور بصارت میں بھی گونہ فرق پڑ
 جاتا ہے مگر تھوہر بالکل اندھا اور نہ بہرا ہو جاتا ہے۔ گاہے گاہے ہاتھ پاؤں
 کی قدر مفلج ہو جاتے ہیں مگر وہ فالج کامل ہنہین ہوتا۔ گاہے گاہے ہاتھ
 پاؤں نیٹھ کر سخت ہو جاتے ہیں اور اس بیمار کی صمن میں رگون کی ساخت
 میں اتاری آ جاتی ہے دل کمزور ہو جاتا ہے اور گردن کی ساخت دانہ دار ہوتی
 ہے۔ پاخانہ اکثر قبض رہتا ہے۔ مدت اس بیماری کی مختلف عرصہ کی ہوتی ہے
 آخر کار کو۔ مایہ بیہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ عضلات مفلج ہو کر ٹھیلے ہو جاتے
 ہیں۔ بول و براز خفا ہو جاتا ہے اور رگون کے پھٹ جانے سے دماغ میں خون کرایا
 دماغ کی رگون میں بکثرت سُدے پڑ کر بیمار اس وار فانی سے دار جا و فانی کو
 رحلت کر جاتا ہے +

علاج۔ یہ مرض لاعلاج ہے۔ بیمار کی طاقت کا خیال رکھنا چاہئے اور ادویہ اور اغذیہ مقوی نینی چاہئیں۔ غنیم مکر اور ترددات سے باز رہنا چاہئے *

تھرام۔ بو۔ سس اور ام۔ بو۔ لے۔ زم

زندگی کیمالت کے اندر جب دل میں یا کسی رگ میں خون منجمد ہو جاتا ہے تب اسکو اصطلاح میں تھرام۔ بو۔ سس کہتے ہیں اور اس منجمد خون کے ٹولے کو تھرام۔ بو۔ لے کہتے ہیں *

جب اس منجمد خون کا کوئی ٹولا دوران خون کے ساتھ بہتا ہو کسی خون کی رگ میں بطور سد کے پہنچ جاتا ہے اور اس رگ کے منفذ یا نالی کو بالکل یا کس قدر بند کر دیتا ہے تب اسکو اصطلاح میں ام۔ بو۔ لے۔ زم کہتے ہیں اور اس منجمد ٹولے کو ام۔ بو۔ لے۔ زم کہتے ہیں *

اول تھرام۔ بو۔ سس

اسباب جب کسی سبب سے خون رگ ترک کر دوں کرتا ہے تب جم جاتا ہے اور تھرام۔ بو۔ سس (شکادول کے کیواڑوں یا دل کی کسی اور ساخت کی بیماریوں کے سبب یا دل کے افن یا بلین پر جب وباؤ پہنچتا ہے یا جب دل کی حرکت صرف کمزور ہی ہو جاتی ہے جیسے بخاروں میں ہو اگر تا ہے یا پُرانی بیماریوں میں جنہیں مریض روز بروز لاغر ہوتا جاتا ہے اور شش کی آن بیماریوں میں بھی خون منجمد ہو جاسکتا ہے جنہیں شش کے دوران میں رگ کا وٹ پڑ جاتی ہے اور جب سبب مسکڑ جانے یا دب جانے یا کسی ام۔ بو۔ لے کے پہنچ جانے سے رگ کا منفذ مسدود ہو جاتا ہے * اور جسم کے کسی حصہ کے عروق شریہ پر وباؤ

پہونچنے سے یا کسی رگ کے ٹوٹ جانے سے اور خاص کر اینو - ریزم یا وی - سری کو زوین کے سببے جب گین پہنچاتی ہیں تب بھی انکے اندر خون جم جاتا ہے اور جب دل کے اندر ذنی سطح یا رگوں کی دیواروں میں انفلامیشن ہو جاتا ہے اور خون جب رقیق ہو جاتا ہے تب بھی جم جاسکتا ہے جسم کے جن جن حصوں میں زکھرام - بو - لٹس کی حالت پیدا ہوتی ہے اب انکا الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے چنانچہ

اول زکھرام - بو - لٹس آف ذی ہارٹ - بد موت کے دل کے اندر خون جم جاسکتا ہے یا حالت نزع میں یا اس سے پہلے + موت سے تھوڑے عرصہ بعد پہلے جب دل کے اندر خون جم جاتا ہے تب نتیجہ اسکا ہلکا ہو جاتا ہے پس اس امر کا ذکر خاص کر کرنا چاہئے +

دفع ہو کر جب دل کی ساخت میں کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جس سے خون اچھے طور پر دور نہ ہین کر سکتا ہے یا جس سے دل کے اندر کی سطح گہری ہو جاتی ہے تب خون جم جاتا ہے اور بعض اکیوٹ بیماریوں میں بھی دل کے اندر خون جم جاتا ہے - وجہ اسکی یہ ہے کہ ان بیماریوں میں خون کی حالت ایسی بگڑ جاتی ہے جس سے وہ آسانی سے جم جاتا ہے اور اس سببے دل کی رگوں سے وہ خون اچھی طرح خارج نہین ہو سکتا وہیں گہو متا رہتا ہے تب مہجہ ہو جاتا ہے - علاوہ ازیں شش میں جب خون کا دورا رک جاتا ہے تب بھی خون آسانی سے جم جاتا ہے شش ان بیماریوں میں شش کے دوران خون میں مزاحمت پڑ جاتی ہے اور خون جم جاسکتا ہے - میسے کر دپ - ٹوف - تے - ریا + انڈو - کار - ڈوائی - ٹس + نیو نیوٹا پے - سری - ٹو - نائی - ٹس + حالت زچہ کی + اوی - سے - پے - ٹس + رو - مائیک - فیور اور پائی - میا اور یہ بات یاد رہے کہ دل کے دہنے قانون میں

جب تہرام - بو - سس ہو جاتا ہے تب بہ نسبت بائین خاتون کے تہرام - سس کے وہ زیادہ تر اندیشناک ہوتا ہے تہرام - بو - سس کی حالت دل کی دونوں جانب پیدا ہو سکتی ہے + اکثر اوقات منجھرخون کی رنگت پھسکی پڑ جاتی ہے یا ہلکی نرمی پائل ہو جاتی ہے ۔

علامات - کار - دیاک تہرام - بو - سس کا اثر کئی باتوں پر منحصر ہے چنانچہ خون کے جلد جم جانے پر + خون کے جم جانے کی مقدار اور موقع پر + دل کے اندر خون جب جم جاتا ہے تب اس میں ان باتوں کا اندیشہ ہوتا ہے چنانچہ دوران خون میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے + دل چھے طور پر حرکت نہیں کر سکتا کوئی بڑا سا دلا منجھوٹکا علیحدہ ہو کر دل کے کسی دماغ نے میں کسی بڑی شریان میں پھنس جا سکتا ہے + یا ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ اس منجھوٹا خون سے چوٹے چوٹے ذرات علیحدہ ہو کر چوٹی چوٹی شریان میں بطور ام - بو - لائی کے گزر کر سکتے ہیں اور شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خون کا ڈلا جب گلنے لگتا ہے تب اس کی عفونت سے کل خون زہریلا ہو جا سکتا ہے + جب دفعہ بہت سا خون جم جاتا ہے تب دل کی حرکتوں میں نہایت خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں یعنی دل نہایت جلد جلد اور بے قاعدہ حرکت کرنے لگتا ہے - نبض نہایت کمزور اور بہت آہستہ آہستہ چلتی ہے - بیمار پر غشی طاری ہو جاتی ہے (سن - کو - پے) + دم نہایت تکلیف سے لیا جاتا ہے بیمار نہایت بے چین اور نگر مند ہو جاتا ہے + جب خون تدریج جمتا جاتا ہے تب بھی وہی علاماتیں پیدا ہوتی ہیں مگر کتنا قہر خفیف اور جب دل کا کوئی ٹنڈ یا کوئی بڑی رگ خون کے ڈلے سے مسدود ہو جاتی ہے تب بیمار فوراً مرجاتا ہے دل کے مقام پر کان لگا کر سنیں تو دل بے تماشا دھڑکتا ہوا سنائی دیتا ہے اور اس کی حرکتیں بے قاعدہ سمیع ہوتی ہیں + پر - کشن کریں تو دل کا مقام خاص کر

اسکی دہنی جانب زیادہ تہڑھوس محسوس ہوتی ہے دونوں آوازین دل کی بقاعدہ اور صاف ہین سنائی دیتیں *

علاج۔ بیمار کو آرام سے لٹا رکھیں اور حرکت نہ کرنے دیں۔ ادویات
ٹی۔ بیو۔ لنٹ (مفرحات) خاصکر بیمار کی طبیعت اگر غشی کی طرف مائل ہو استعمال
کریں اور بیمار کو شور بہ چلا دیں۔ ماتہ پاؤں میں گرمی پہنچا دیں۔ اور سینہ پر
خشک چکنگ کریں دوا کے طور پر باجی۔ کار۔ پو۔ نٹ اف سو۔ ڈیا پو۔ ٹاش
ہمراہ کار۔ پو۔ نٹ اف ایو۔ نیا کے پلا دیں۔ اور آبیہ پرف ایچن دس مس قطرہ
لائیکوار۔ ایو۔ نیا ملا کر گھنٹہ گھنٹہ بعد چلا سکتے ہیں۔ اور دوسرے گھنٹہ میں سے پانچ
گرین آئیو ڈائیڈ اف پوٹاش کا استعمال کریں اور نصف فف ڈی۔ جی۔ ٹے۔ ٹش
سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اسکے استعمال سے دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے
اور رقیف طاقت کی بجلی ہی فائدہ کر سکتی ہے۔ ایسا علاج ہرگز نہ کریں جس سے
ضعف پیدا ہو۔ اور ایسے خون اس بیمار میں قلعی منع ہے *

دوم تہرام۔ بوسس پلمو۔ نری ارٹری

اور اسکی شاخون میں

جب ان رگون میں خون جم جاتا ہے تب تنگی نفس کی پیدا ہوتی ہے اور
بیمار کوتاہی ہو اکی نہایت خواہش ہوتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چھاتی بلی
جاتی ہو اور بلی گھٹا جاتا ہے۔ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ بیمار بہت بے چین اور نکلنے
ہو جاتا ہے۔ اور دس کے رہنے خانے خون سے پُر ہو جاتے ہیں تب جسم کی کل مدین
میں اجتماع خون کا ہو جاتا ہے *

عسلیج - شل کار ٹوٹا کر تہلرم - بو - سس کے +

سوم بڑی گون میں غن کا جم جانا

اس حالت میں وہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے جسکو اصطلاح میں فلک - مریخ شجا
ڈائنس کہتے ہیں اور جسکا بیان میری کتاب امراض النساء میں دیکھو -

دوم - ام - بو - لے - زم

ام - بو - لے کی تعریف اوپر کی گئی ہے + منجھ خون کے ڈلے اسطور سے پیدا

ہو سکتے ہیں کہ جب کسی درید میں یا دل کے اندر یا کسی شریان میں خون جم جاتا ہے

(تھرام - لیس) تب وہ ڈلا خون کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دوران خون کے ساتھ بہتا ہوتا

ہے جب دل کے کیواڑوں یا ڈائون میں خون کا فائی - برین جم جاتا ہے تب اس

منجھ ڈلے سے فائی - برین کے خرد خرد ذرات علیحدہ ہو کر دوران خون میں شامل

ہو جاسکتے ہیں + یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب مٹی یا چونہ کا مادہ دل کے کیواڑوں

میں یا شریان میں پیدا ہو جاتا ہے تب اسکے ذرات علیحدہ ہو کر دوران خون میں

جاملتے ہیں + ام - بو - لے کے ڈلے یا تو اسقدر بڑے بڑے ہو جاسکتے ہیں کہ

جن سے بڑی شریان کا منفذ بند ہو جائے یا اسقدر چھوٹے کہ نہایت باریک

کے - پے - ریز کے اندر سے بھی گزر جائیں + جب دے - لیس - سر - کیو - لے - شن

میں آتے - بو - لائی جمع ہے - ام - بولس کے یعنی منجھ خون کے ذرات کا

گزر ہو جاتا ہے تب وہ ذرہ پل - مو - نری کے - پے - لے - ریوین اگر ہمیشہ

پہن جاتے ہیں لیکن جو ام - بو - لائی پل - مو - نری دریدوں میں یا دل کے

دہنی طرف یا شریان میں پیدا ہوتے ہیں وہ یا تو چوٹی شریانوں میں یا پے - لے - ریوین

میں مگر خاص کر دماغ، قلی اور رودون کی رگوں میں گزر کر جاتے ہیں اور جو پورے جسم
 وید کی مشاخون میں پیدا ہوتی ہیں وہ اکثر جگر کے کے - پے - لے - رینہ
 میں آکر بیٹھ جاتے ہیں + یہ قاعدہ ہے کہ ام - بو - لیں اکثر خون کے بہاؤ کی
 طرف بہتے پھرتے ہیں اور یہ کہ ان سے رگوں کا منفذ یا تو بالکل یا کسی قدر بند
 ہو جاتا ہے +

مقالہ پنجم

امراض نخس

اول مائی - لائی ٹش

لغنی
 حرام شرکی ساخت کا انفلشن

علامات - حرام مغزیے اس - پائی - نل - کازڈ کے جس حصہ میں انفلشن
 ہوتا ہے وہ ان پر وہیما وہیما ہونے لگتا ہے اور اس جگہ کی حس و حرکت جاتی
 رہتی ہے یا وہ مقام شل ہو جاتا اور اس کی حس میں منسرق پڑ جاتا ہے اور ہاتھ
 یا پاؤں یا دونوں یا صرف ایک ہی کمرہ ہو جاتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف
 کے ہاتھ یا پاؤں کی حرکت منعقد ہو جاتی ہے + مفلوج ہاتھ یا پاؤں لاغر ہونے
 لگتے ہیں اور عضو ماؤف کا گوشت یا ٹوڈھیلا ہو جاتا ہے یا کچ جاتا یا اس میں تشنج
 ہونے لگتا ہے - پیشاب قطع ہو جاتا ہے اور پاخانہ بھی بے معلوم نکل جاتا ہے
 پشت اور چوڑوں پر سبب لیٹے رہنے کے بعد - سور پیدا ہو جاتے ہیں آخر کار
 بیمار نہایت نڈھال ہو جاتا ہے - اور جب یہ مرض دماغ تک پہنچتا ہے تب بیمار

بیمار ان کا حس بے اعتبار ہوتا ہے اور سر کے طرف سے

حالت بیہوشی میں مر جاتا ہے لیکن حرام مغز کے ہر ایک حصہ کے انفجیشن کی علامات علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں چنانچہ جب گردن کا حصہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے تب دونوں ہاتھ مفلج ہو جاتے ہیں اور لگنے اور دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور سینہ اور شکم جکڑا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ بعضہ دفعہ نبض نہایت آہستہ چلتی ہے اور قصبہ کو اکثر نہایت خیرش ہوتی ہے۔ جب پشت کے حصہ حرام مغز میں بیماری ہوتی ہے تب بعض دفعہ سارے جسم کا پیٹ لگتا ہے دل دھڑکنے لگتا دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور شکم جکڑا ہوا معلوم ہوتا ہے جب کمر کے حصہ میں بیماری ہوتی ہے تب اطراف اسفل مفلج ہو جاتے ہیں اور پہلے تو پیشاب بند ہو جاتا بعد ازاں زخوہ خطا ہو جاتا ہے علیٰ ہذا القیاس پہلے قبض رہتا ہے بعد ازاں پاخانہ بے معلوم نکل پڑتا ہے اور بعضہ دفعہ قیوت جاتی رہتی ہے۔ مکر اور چوڑوں پر زخم پڑ جاتے ہیں *

اسباب۔ پیری۔ ڈسپو۔ زنگ۔ جوانی اور مرد کا ہونا۔ اکسائٹک۔ کاز۔ کمر پر ضرب لگنا یا چوڑوں کے بل گر پڑنا۔ سہری کا لگنا۔ یا بارش میں سہگنا۔ استخوان پشت میں کریر یعنی زخم کا ہو جانا۔ اسکریسیو۔ لاکھی بیماری اور کثرت مجامعت *

علاج۔ ابتدا مرض میں مقام ماؤف پر جو نکیں یا گلاس لگا دین بعد ازاں سکے گرد یا تو بلشر یا عیٹن لگا دین۔ بیجا کو آرام سے رکھیں۔ پیشاب بند ہو تو سلمائی سے نکال دین اور مر فیض کو خوب صاف شہر آب کہیں * بطور دوا کے مسہلات کا استعمال کریں اور اس بیماری میں اسٹرنیٹ مع مد آیوڈائیڈ اف پوٹاشیم اور اگر حرام مغز کی ساخت محل نہ گئی ہو تو اور گٹ اف رابی کا استعمال کریں *

دوم مے - نن - جاتی ٹپس

یعنی
حرام منفر کے پڑون کا انفکاشین

یہ مرض تین قسم کا ہوتا ہے - اول اکیوٹ اسپائی - نل مے - نن - جاتی ٹپس +
دوم اسپائی - نل - اری - ٹپس - شین + سوم رو - ماٹک اسپائی - نل
مے - نن - جاتی - ٹپس +

اول اکیوٹ اسپائی - نل

مے - نن - جاتی - ٹپس

علامات - متھام ماؤف مین درو ہوتا ہے جو حرکت کرنے دبانے یا ہٹنے
سے یا گرمی کے باعث زیادہ ہو جاتا ہے اور رو - ما - ٹپس - زم کے دروسے نہایت
مشابہت رکھتا ہے اور پشت اور ماتھ پاؤن تک چھا جاتا ہے یا ٹیپسین اسکی سینہ
اور شکم کے چارون طرف پھیلا جاتی ہیں - ماتھ پاؤن پشت اور گردن کچ جاتی ہے جسم
مین بعضہ تشنج مثل مرض ٹپس - ٹپس - نس کے ہوتا ہے (کران) گردن یا شکم بکڑا
ہوا معلوم ہوتا ہے اور بیمار کو تنگی نفس کے ہو جاتی ہے + یہ بیماری ۱۰ سے
۱۴ دن کے اندر اکثر جھلک ہو جاتی ہے اسوقت یا تو نہ دیاں ہوتا ہے یا علامات
روتیہ ظاہر ہو جاتی ہیں یا ریض حالت بیہوشی مین راہی ملک عدم کا ہو جاتا ہے +
اسباب - اس مرض کے وہی مین جن سے نخل کی ساخت کا انفکاشین

پیدا ہوتا ہے +

تشخیص - کچ جانا عضلون کا یا اینین تشنج کا ہونا اس مرض کی علامات

شخصی ہیں *

علاج - حصہ داؤف پر جو کین لگا دیں یا بذریعہ گلاس کے خون لین
بعد از ان سہلات تیز کا استعمال کریں - غذا ہلکی دیں اور مریض کو آرام سے لٹا
رکھیں - پشیاب کا خیال رکھیں - مثلاً پیر ہو تو بذریعہ سلامتی کے خالی کریں -
بعد خون لینے کے مقام مرض پر برف لگا دیں اور اسکے گرد کی جگہ پر بستر -
تھوڑی تھوڑی مقدار میں پارہ کا استعمال بھی مفید ہے مثلاً دو یا تین گرین کیا ہو
ہمراہ ایک گرین مینون کے تین تین یا چار چار گنٹھ بعد کھلا دیں تاکہ اثر یہاں تک
جسم میں پہنچتی ہو جاوے اور جب حالات مدویہ طاری ہوں اسوقت اسے - ہتر
ایمو سیٹیا اور برانڈی سے مریض کی طاقت کو قائم رکھیں *

دوم اسپائی نل - ار می - ٹے - شن

علامات - نفع کے جس حصہ میں یہ بیماری ہوتی ہے وہاں درد ہوتا
ہے جو بانے یا ٹھونکنے سے زیادہ ہو جاتا ہے اور بائیں پسلی یا سینہ اور شکم کے
کل عضلوں میں ہی درد ہوتا ہے - بیمار کو تنگی نفس کی ہوتی ہے اور دل دھڑکتا ہے
نوبت مرض پیشتر (اضناق الرحم) کی ہو جاتی ہے - مریض پست بہت اور مزاج
اسکا چڑچڑا ہوا ہوتا ہے - پانخانہ اکثر قبض رہتا ہے اور شکم میں نفخ - بعض دفعہ
یہ علامتیں عرصہ دراز تک جاری رہتی ہیں اور بعد بیاہ ہونے کے شدت
بکھرتی ہیں لیکن خاصہ کہ ایام رضاعت اور حمل میں بھی ان کی شدت زیادہ
ہوتی ہے *

تشخیص - گردن سے کمر تک تجھے فقرات بین انگلیوں سے اچھے طور پر
دبانے سے یا ایک ایک کو ٹھونکنے سے چند مقاموں پر درد معلوم ہوگا اور

پسلی سینہ اور شکم کا درد فوراً زیادہ ہو جائیگا اور بعض دفعہ ساتھ ہی دل اور
کے سینہ کے عضلات میں بھی درد ہونے لگتا ہے *

اسباب - جوان عورتوں کو یہ بیماری اکثر ہو جایا کرتی ہے *
اکسٹیننگ کانر - اس مرض کے یہ من - ورزش کا نہ کرنا - قبض تکلیف
سے جنس کا آنا اور لیو - کو - ریا کی بیماری *

علاج خارجی - مقارم درد پر جو کیننگا دین یا بندریہ گلاس کے خون لیز
بعد از ان بلشرنگا دین یا کسی اسٹی - میو - لٹ لے - نی - منٹ کی مالش کریں
اور عضلوں کے درد کو رنج کرنے کے لئے یا تو بلا - ڈو - نایا او - پیچم بلا شرنگا دین *
علاج داخلی - داخلی علاج اس بیماری کا اسطور پر کریں کہ تکلیف حیفز
کو علاج مناسب سے رنج کریں - ہلکے طبیات سے رنج قبض کریں اور ادویات متوی
اور سے ڈوبی - ٹیوشنگا من - بن کا استعمال کریں *

سوم رو - مانگ اسپائی نل مے بن - جٹس

علامات - حرام منر کے گرد ایک پہیلا ہو اور محسوس ہوتا ہے اور کسی ہاتھ
یا کسی پاؤں میں شدت کا عصبی درد ہوتا ہے - بعد کچھ عرصہ کے درد مذکور حرام منر
کے کسی خاص حصہ کی ایک جانب کے قریب محدود ہو جاتا ہے - حصہ مذکور کا
رنگ سرخ ہوتا ہے - اور بعد تھوڑے عرصہ کے اسپر دانہ ٹاٹے مرض ہر - پیز
پیدا ہو جاتے ہیں * ہاتھ پاؤں کا درد جاری رہتا ہے اور انگلیاں شل
ہو جاتی ہیں اور انہیں جھٹا محسوس ہوتی ہے اور طاقت ان کی جاتی رہتی
ہے یا وہ مفلوج ہو جاتی ہیں *

اسباب - بری - ڈسپو - رنگ اس مرض کے وہی ہیں بدامیظرم

اور گاؤں کے مین + اور سردی یا بارش میں ہیگینا اور تھک جانا اور بیماری
 کے اکسائی - ٹنگ کار مین +
 علاج - مقام مرض پر جو کین لگا دین اور تھک کرین اور باقی علاج
 رو - ما - ٹے - زم کے طور پر کرین +

چھارم ان - فے - ٹائل پے - را - لی - سس

یعنی

پچون کا علاج

ماہیت - اس بیماری کی ماہیت کی نسبت سابق سے بہت بحث چلی
 آتی ہے لیکن اب بڑے بڑے محققین نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ
 مرض نرالا ہے اور اکثر بچوں ہی کو چھ مہینے کی عمر سے لیکر تین یا چار سال کی
 عمر تک ہو کر رہتا ہے اور خاص کر دوسرے سال کی عمر میں اکثر ہو جاتا ہے مگر بعض
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو مہینے کی عمر سے لیکر آٹھ یا دس سال کی عمر کے بچے ہی اس پر
 مبتلا ہو جاتے ہیں - بعض مدہ یہ بیماری چھپ یا دیگر اگر زن - تے - مشافہہ کے
 بیماریوں کے بعد اور دانت نکلنے کی تکلیف سے یا پشت پر چوٹ لگھوڑ - ہیگی جگہ
 پر سونے سے یا سردی کے لگ جانے یا بارش میں ہیگینے سے بھی ہو جاتی ہے
 اور کبھی کبھی باضمہ کی غرابی سے بھی پیدا ہو جاتی ہے + یہ بیماری سپائی - نل کار
 کے انٹے - رزی - ار - کار - نیو کے انفلمیشن کے سبب سے پیدا ہوتی ہے - انفلمیشن
 اگرچہ نخاع کے مختلف حصوں میں ہو جا سکتا ہے پہلے ہی گرون اور کمر کے حصوں
 پر ہی اکثر ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ صرف ایک اور کبھی دونوں انٹے - رزی - ار - کار - نیو
 میں انفلمیشن ہو جاتا ہے +

علامات - اس بیماری میں چند علامات مندرہ پیدا ہوتی ہیں اور تب یہ مرض ظاہر ہو جاتا ہے مثلاً خاصکے خفیف بخار ہو جاتا ہے بعض دفعہ کنوٹشن کے جسمین متوجہ رہتا ہوتا ہے اور نہ کوئی دماغی علامت پیدا ہوتی ہے لیکن گاہے گاہے طبیعت میں جوش اور ہڈیاں اور بیہوشی بھی ہو جاتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلا ظاہر ہونے کے کسی علامت مندرہ کے یہ مرض دفعہ پیدا ہو جاتا ہے اور تبدیلہ اکثر دونوں جانب مفلوج ہو جاتی ہیں مگر علی اللہوم بہ نسبت ماتہون کے دونوں ٹانگیں اس مرض میں زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے بچہ بالکل بے بس پڑا رہتا ہے اور بہتیری دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف دونوں ٹانگیں ہی مفلوج ہو جاتی ہیں اور کبھی صرف ایک ٹانگ اور بعض دفعہ ہے - مے - پلیجیا ہو جاتا ہے - اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ مرض یکبارگی درجہ آتم کو پہنچ جاتا ہے اور تب رفع ہونے لگتا ہے - شاید ناواریسا ہوتا ہے کہ عضواؤں کے کل سلسلہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور عضلات متاثر ڈھیلے پڑے رہتے ہیں اور انہیں سے چند لاغر بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے بعض ریشے کانپنے لگتے ہیں اور رسی - فلکس کی حرکتیں یا تو بالکل نہیں ہوتیں یا کم ہو جاتی ہیں - اس مرض کے اندر جس میں چند ان فرق نہیں پڑتا مگر جو بچے بات چیت کر سکتے ہیں ماتہ پاؤں اور ریشہ میں درد کی شکایت کرتے ہیں - اس بیماری میں اس - فٹ - ٹر مسلس نہیں مبتلا ہوتے یا صرف تھوڑے ہی عرصہ کے لئے بیکار ہو جاتے ہیں - گاہے گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند روز کے اندر پے - را - لی - سس بالکل دور ہو جاتی ہے اور بیمار بالکل تندرست ہو جاتا ہے - لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مفلوج اعضا میں سے چند تو دو یا تین دن سے لیکر دو ہفتہ کے اندر حالت اصلی پر آ جاتے ہیں مگر باقی کے اعضا ہمیشہ کے لئے مفلوج رہ جاتے ہیں مثلاً پے - را - پلیجیا ہمیشہ کے لئے رہ جاتا ہے لیکن

شاذ و نادر ہے۔ مے۔ پلجیا ہمیشہ کے لئے رہ جاتا ہے یا ایک مارف کا ہاتھ
 اور دوسری جانب کی ٹانگ مفلوج رہ جاتی ہے یا صرف ایک ہتھ ہتھ یا ایک
 ہی پاؤں ٹانگہ کوئی خاص حصہ ہی مفلوج رہ جاتا ہے۔ آخر کار ایسا ہوتا ہے
 کہ عضلے متاثرہ لاغر ہو جاتے ہیں اور انکا نشو و نما نہیں ہونے پاتا۔ اور نوٹان پر
 بجلی کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ انکی ساخت میں ابتری آ جاتی ہے۔ نبض اس جگہ کی کمزور
 ہو جاتی ہے اور خون کا دورہ سست۔ اس حصہ کی حرارت ہمیشہ کے لئے کم رہتی
 ہے اور سبب اسکے کہ ماؤف ہاتھ یا پاؤں کے جوڑوں کے لے۔ گی۔ منٹ ڈبیل
 ہو جاتے ہیں اور وہ جوڑ ڈبیل ہو کر لٹک پڑتے ہیں اور مفلوج مقام کے سلس کی جھٹکا
 میں ابتری آ جاتی ہے تو ہاتھ یا پاؤں لٹکے رہتے ہیں یا کسی جانب کو گھوم جاتے ہیں
 جنکو بچہ بین بین ان۔ فن۔ ٹائل پے۔ را۔ لی۔ بس کی بیماری ہو جاتی ہے
 انکی عمر اکثر دراز ہوتی ہے اور عرصہ تک جیتے رہتے ہیں۔ جو لنگڑے لوگ یہیں لگتے
 ہیں انکو بچہ بین میں ایسی قسم کے پے۔ را۔ لی۔ بس ہوئی تھی +

علاج مثل دیگر فالج کے مقویات اور تار بجلی سے کرنا چاہئے جیسے نولاو
 اسکرک۔ نیا۔ فاس۔ فورس ارکٹ آئیوڈائیڈ اف پوٹاسیم وغیرہ +

مقالہ ششم

امراض اعصاب

اول نیو۔ رل۔ جیا یعنی وجع اعصاب

کل امراض عا اور بہت سی نرسن بیماریوں میں دروہوا کرتا ہے لیکن جب پھون ہی
 میں خامکدو رہتا ہے تب اسکو نیو۔ رل جیا کہتے ہیں + عصبی درد بہت سببوں سے

پیدا ہو سکتا ہے چنانچہ جب زیادہ دن تک دودھ پلانے سے یا عرصہ دراز تک
 کسی طبیعت کے کثرت سے جاری رہنے سے یا خون کے نکل جانے سے کمزوری ہو
 جاتی ہے تب اکثر عصبی درد پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ درد چہرہ اور سر کے ایک ہی
 جانب پر اور نوبت بنوبت ہوتا رہتا ہے تب باعث اس کا مہی ہے۔ لہذا
 ہے جس سبب سے تپ لرزہ پیدا ہوتی ہے۔ بعضہ فقہ یہ درد کسی عضو کی بیماری
 کی شرکت سے پیدا ہوتا ہے تب اس کو سم۔ پے۔ تہے۔ ٹک بھی کہتے ہیں مثلاً
 جگر کی بیماری میں دہنے کندہ ہے پر درد ہوتا ہے اور بائیں کندہ میں قلب کی
 بیماری کے باعث ان دونوں فیرون میں تو صاف ظاہر ہے کہ ہر عضو کے اعضا
 مقام درد پر بھی پہنچتے ہیں لیکن بعض حالات درد کے ایسے ہیں جن میں درد کا مقام
 اور بیماریاں عضو کے مابین عصبی تعلق کچھ بھی نہیں پایا جاتا چنانچہ معدہ میں ترشی کے
 باعث یا سبب قبض کے یا گردن کے بیماری کے باعث درد ٹک۔ دو۔ لو۔ روکا
 ہو جانا بعض دفعہ جب کسی عضو کی جڑ دب جاتی ہے یا اسی میں خراش ہوتی ہے تب اس
 عضو میں درد ہوتا ہے مثلاً جب کسی ہڈی کی کچ یا کوئی شے غیر مناسب کسی عصب کی جڑ
 کو دباتی ہے تب ایک شدت کا درد ہوتا ہے چنانچہ اس قسم کے درد یہ ہیں کہ
 جب شانہ میں پتھری ہوتی ہے تب قبض کے سر پر درد ہوتا ہے اور جب گردوز
 میں خراش ہوتی ہے تب رانوں اور انٹین میں درد ہوتا ہے اور سبب قبض کے
 یا جب رودونین بچ بہر جاتی ہے تب رانوں اور پاؤں کے پیچھے اور متعہ کے
 کنارہ پر درد ہوتا ہے۔ اعضاے اندرونی میں جب بلا انفلا میشن کے درد ہوتا
 ہے تو وہ ہی عصبی درد ہوتا ہے اور جب مرض ہر۔ پیر۔ زاس۔ ٹر کے دانے نکلتے
 ہوتے ہیں تو انکے نکلنے سے پہلے یا بعد کسی سبب کی ایک شدت کا
 درد ہوتا ہے۔ چاہے جسم کے کسی عصب میں درد ہو اگرچہ اس کو اصطلاح میں

یو۔ رجبیا کیلئے لیکن جب چند خاص مقام کے اعصاب میں درد ہوتا ہے تب انکو خاص ناموں سے نامزد کرتے ہیں چنانچہ

مگ۔ ین

یہ ایک قسم کا درد سر ہے جسکو انگریزی میں سیٹ۔ ہڈ۔ ایک کہتے ہیں اگرچہ خاص علاقہ میں بیمار کی دوسری ہیں۔ ایک تو درد سر اور دوسری غشیان۔ پر اکثر دونوں علاقوں کے پیدا ہونے سے پہلے اور اوج امتین بھی ظاہر ہوتی ہیں چنانچہ درد سر کے پیدا ہونے سے پہلے مریض کی بصارت دُہندلی ہو جاتی ہے۔ بعد ازاں ایک یا دونوں جانب کا جسم ٹن ہو جاتا ہے اور تب دماغ سویٹان چہتی ہی محسوس ہوتی ہیں اور تقاریر میں فرق پڑ جاتا ہے یعنی بیمار کہنا کچھ چاہتا ہے اُسکے منہ سے نکل کچھ۔ اور ہی جاتا ہے حافظہ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ خیال منتشر ہو جاتا ہے بعد نصف ساعت کے درد سر شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے تو خفیف بعد ازاں تھ رفتہ رفتہ شدید ہو جاتا ہے کہ بیمار سے برداشت نہیں ہو سکتا پہلے ایک یا دونوں اوروں سے شروع ہوتا ہے اور تب بہت سارے مکرر مبتلا کر لیتا ہے۔ چون چون درد کو تخفیف ہوتی جاتی ہے جانب دماغ کی آنکھ پر ایک دیکھا یا تیز درد معلوم ہوتا ہے اور جب تک یہ درد ہوتا رہتا ہے بیمار کا جی مستحضر رہتا ہے اور درد کے عین شدت کی وقت تھے ہو کر چند گھنٹہ کبھی سارا دماغ اور بعض دفعہ دین دن تک درد جاری رہتا ہے بعد رفع ہو جانے کے بیمار کو نیند آ جاتی ہے یا عرق آ جاتا ہے یا کثرت سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں تب یہ درد رفع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس مرض کا تعلق دماغ سے ہے پھر بھی مردہ اما جگر بھم وغیرہ اعضا سے کی خواہی سے اکثر ہو جاتا ہے۔

علاج۔ مگ۔ ین کے علاج کے تین مطالب ہیں۔

بعض وقت دماغ کی شدت رفتہ رفتہ کم ہوتی جاتی ہے بعض وقت جب تھ آ جاتی ہے

اول دماغ کی خرابی کا علاج - دوم روکنا یا رفع کرنا کاسائی ٹینک کا زکا
سوم نوبت کے وقت کا علاج

جب یہ بیماری رحم کی کسی خرابی کے سبب پیدا ہوتی ہے تب برو-مائڈ انفوٹامیکسم
سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ جب اسکے استعمال سے نیند آ جاتی ہے تب نوبت اس
بیماری کی ٹرک جاتی ہے اور نوبت کی وقت جب یہ دو اکلہائی جاتی ہے تب بھی
بیمار کو نیند آ جاتی ہے جس سے نوبت جلد رفع ہو جاتی ہے *

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مگ - رین کا درد پانچویں چوڑے عصب میں ہوتا ہے بس
ٹائیڈرٹ اف بیوٹائل کلورل جو چہرہ کے نیو - رلیجیا کو نہایت مفید پڑتا ہے
اس مرض میں بھی فائدہ مند ہے چنانچہ گرین ٹائیڈرٹ اف بیوٹائل کلورل
دو یا تین تین گھنٹہ بعد اکثر نہایت فائدہ بخشا ہے لیکن یہ جتنا ضرور ہے کہ اس دوا
کے استعمال سے بیمار مرض کی نوبتوں سے بالکل محفوظ نہین رہتا بلکہ دو یا تین دن
کے بعد درد کی نوبتیں جو پہلے جلد جلد ہوتی تھیں ہفتہ میں ایک یا دو دفعہ ہونے لگتی ہیں
اور رفتہ رفتہ مدت تخفیف کی دراز ہو جاتی ہے یعنی ہفتہ میں ایک دفعہ اور دو ہفتہ
میں ایک دفعہ حتیٰ کہ بیماری اپنے اگلے طور پر تیسرے یا چوتھے ہفتہ ظاہر ہوتا ہے تب
اسکا علاج مقویات سے کرنا چاہئے۔ مثلاً فولاد کوئین اور کاڈلیور - آئیل اور جس سبب سے
پیدا ہوا ہے اسکو دور کرنا چاہئے لیکن یاد رہے کہ جب اس بیماری میں شدت کی ہے
اور آبکائی آتی ہیں تب یہ دوا بیکار ہو جاتی ہے یعنی اس صورت میں اسکو کہاتے
ہی مریض تے کر دیتا ہے * یہ نسخہ بھی مگ - رین کے درد کو مفید ہے *

نسخہ - سائے - ٹریٹ اف کیفین - ڈویڑہ گرین - فے - نایسی - جین - مگرین *
شوگر اف ہلک مگرین * اسکی ایک پڑیہ بنا کر کھلا دیں * دو گھنٹہ بعد اگر ضرورت
ہو تو پھر ایک ایسی پڑیہ کھلا دیں *

پہلے جاننے سے لینے ہفتہ کے علاج میں اضافہ کرنے کا طریقہ

ایک اور طریقہ اس مرض کے علاج کا یہ بھی ہے کہ پندرہ یا بائیس قطرے
سک - کس - پلا - ڈونا اور دس گرین کلورل بائٹڈرٹ ایک آؤنس پانی میں
حاکم ہر روز رات کو سوتے وقت پلا دین - اور جو نو بتین مرد کی بار بار نہوتی ہوں
یا کسی معمولی دقت برہو یا کرتی ہوں تو نو بت کے شروع ہونے سے پہلے کئی راتیں
برابر پلا دین - زیادہ مقدار میں انٹے - باقی - رین بھی اس مرض کو فائدہ کرتا ہے
اور جب بیماری خفیف ہوتی ہے تب گیوا - رانا اور کے - فین کے استعمال
سے بھی رفع ہو جاتی ہے - بعض اوقات اس مرض کو انکسٹل - جین سے بھی
فائدہ پہنچاتا ہے مثلاً

نسٹو انکسٹل - جین - ۱۰ گریں - ٹینکچر آف آرنج - ڈرام - سرب آف آرنج - حاکم
۶ ڈرام - پانی استقدر کہ جتنے میں کل کسچر دو آؤنس پورا ہو جاوے - مقدار
نصف سے ایک آؤنس تک ایک یا دو دفعہ بائین دفعہ دن کو -

ٹاک - دو - لو - رو

تعریف - پانچویں جڑے عصب کی چند یا ساری شاخوں میں درد ہوتا ہے
اور گاہے گاہے کم ہو جاتا ہے -

علامات - یہ بیماری اکثر متحرک آدمیوں کو ہو جاتی ہے - درد ایسین نہایت
شدت کا اور عرصہ عرصہ بد ہوتا ہے اور کبھی تو بہت کم ہو جاتا اور گاہے ہلکی سی جکے
دنوں ہفتوں مہینوں بلکہ برسوں تک نہیں ہوتا - ابتدائیں یہ درد کسی خاص
مقام پر محدود رہتا ہے مثلاً ٹیسر - آر - بے - ٹیل یا انفرا - آر - بے - ٹیل -
یا من - ٹیل - نو - رمی - من پر لیکن ہنسی طرف کے انفرا - آر - بے - ٹیل نزدیک
زیادہ ہوتا ہے اور بعد دفعہ چرنے یا پاٹھنے کے طور پر شدید ہوتا ہے اور کبھی

مقام مرض پستحت جلن سی معلوم ہوتی ہے اور بعض دفعہ صرف درد ہی محسوس ہوتا ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مقام شرج گرم اور پھول جاتا ہے۔ جب یہ درد آنکھوں تک پہنچتا ہے تب کثرت سے آنسو بہنے لگتا ہے اور جب دہن اور جثرون میں سرایت کر جاتا ہے تب کثرت سے رال بہتی ہے اور جب عرصہ تک قائم رہتا ہے تو نو دماؤن کی آذر شاخون میں بھی پھیل جاتا ہے چنانچہ اگر چٹھیا نہ کے پیچے شروع ہو تو اوپر کی لب تک پہنچ جاتا ہے اور دماغ سے اوپر اور پیچھے کے جثرون پر یا چٹھیا نہ کے اوپر کو مارے مہر پر چھا جاتا ہے بلکہ تھوڑا بہت درد پشت تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ جب درد کی شدت شروع ہوتی ہے تب مرض کی جانب کے چہرہ کے عضلات میں درد اور شرج اس شدت سے ہوتا ہے کہ بیمار اس جانب کے چہرہ کو زرد زرد سے ملتا رہتا ہے۔ بیمار آڈر باقون میں ندرت رہتا ہے۔

اسباب - پری - ٹیپو - ننگ - عورت کا ہونا - حمل - نروس نراج -

کمی خون - کمزوری - فکر - بخ و غم - خوف - سو و مضہمی +

اکسائٹنگ - کاز - نرو دماؤن کی جثروں میں جو دماغ میں ہوتی ہے خواش کا ہونا یا زرد کے کسی شلج کا ہڈی یا کسی آذر ماوہ سے دب جانا - یا کسی دانت کا زخمی ہو جانا + نرو دماؤن میں رو - ما - ٹیترم کا مادہ سما جاتا ہے +

علاج - اس بات کو دریافت کریں کہ پہا کہیں سے دب نہ گیا ہو یا کسی دانت میں زخم ہو - کوئی دانت زخمی ہو تو اسکو اکھاڑ ڈالیں اور جو باعث ارض کا رو مائیم ہو کو ادویات مناسب سے علاج کریں + اگر یہ درد ب باعث خرابی معدہ یا امعا یا گردون کے ہو تو مضہمی یا قبض کو رفع کریں اور خرابی گردون کا علاج کریں + اگر باعث کمی خون ہو تو کوئین اور فولاد میفید ہے - چنانچہ کوئین پر سی مقدار میں گاہے گاہے کھلا دیں اور رجب اچھا مرکب فولاد کا اس مرض کے لئے

یا تو سے۔ سے۔ سے۔ ٹیڈ کار۔ بورنٹ اف ایرن یا پے۔ راک سائیڈ اف ایرن ہے۔ خوراک انکی ۳۰ سے ۴۰ گرین تک وغینہ دو یا تین دفعہ ہے *
 کلورائیڈ اف ایمو۔ نیم (نو شادر) بمقدار ۳۰ گرین کے دن میں تین دفعہ بعض اوقات خاص کر جب درد جیڑ وغینہ محدود ہوتا ہے فائدہ کرتا ہے *

علاج خارجی۔ قدرے کلوراء۔ فارم سنگھارین یا کلوراء۔ فارم یا پے۔ ڈونا لے۔ نے۔ منٹ کی مالش کرین یا ہموزن کلوراء۔ فارم اور لاڈ۔ نم ملا کر مسوڑوں پر یا دردناک نرو پریٹین * اور وی۔ راء۔ ٹر۔ یا یا اکو۔ ٹائیٹ کی مرہون کی مالش سے بھی اکثر فائدہ ہوتا ہے *

ٹائیڈرٹ اف کلوراء۔ رل اور کا فور جب ہموزن کھل میں لگا جاتا ہے تب شیرہ کے طور کا ایک گاڑا عرق بنجاتا ہے اسکالپ تیو۔ رلجیا کے درد کے مقام پر کرنے سے یا اسپر آہستہ آہستہ مالش کرنے سے درد کو اکثر فائدہ ہوتا ہے یا پھر جیڑی عصب کے ان۔ نے۔ ری۔ ار۔ ڈن۔ ٹل شاخ میں جب درد ہوتا ہے یا عصبی درد جب کن۔ پٹی پر ہوتا ہے تب اس مرکب کے لگانے سے فوراً آرام آجاتا ہے کھینچنے کی بیماری جب دانت میں ہوتی ہے تب بعض دفعہ نہایت شدت کا درد اس دانت میں ہوتا ہے غرض اس مرکب کو باہر ملنے سے فائدہ ہوتا ہے لیکن جب اس دانت کے خول میں لگا جاتا ہے تب درد کو جلد آرام آجاتا ہے *
 ٹائیڈرٹ اف بیو۔ ٹائل کلوراء۔ رل ہی اس درد کو مفید پڑتا ہے *
 خوراک ۴ گرین دو دو یا تین تین گھنٹہ بعد * اور یہ نسخہ بھی الش کا بہت مفید ہے چنانچہ

نسخہ من۔ تہال۔ ایک ڈرام * الکحل۔ ایک اونس * روغن لونگ ۲۰ قطرے *
 روغن دال بینی ۲۰ قطرے * سبکو ملا کر اور اسمین ایسی انگلی تر کر کے چند مرتبہ

درد کے تمام پرہیزنا چاہئے *

نیو-رجیا، ٹیسری-کا

اکثر عورت کو جو ٹیسری کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ نیو-رجیا کا درد شدت سے ہوتا ہے اور یہ درد جسم کے چارے کسی حصہ پر ہو سکتا ہے۔ پرگاہے گاہے کسی خاص جگہ یا ٹیڈھی پر محدود رہتا ہے۔ لیکن یاور ہے کہ اکثر حالات میں صرف یہ خیالی درد ہوتا ہے *

علاج: رستہ کے درد کا مقویات سے کرتے ہیں اور اس میں بھی مائیڈرٹ اف بیو-ٹائسل کلو-رل بہت مفید ہے چنانچہ ہر گرین دود گنڈہ بعد پلانا چاہئے *

سامی-ٹیکا

عربی میں اس درد کو عرق النساء اور پنجابی میں ریگڑا کہتے ہیں *

یہ بیماری سامے-ٹیکٹ نرو کے ہے اور یہ نہایت تکلیف دہندہ مرض ہے۔ سابق میں اس مرض کو ایسا ہی سمجھتے تھے کہ مثل اور بعضی دردوں کے یہ ہی صرف سامے-ٹیکٹ نرو کا درد ہے اور اس کا علاج بھی رسمی طور پر کرتے تھے جس سے اکثر اوقات غائدہ نہیں ہوتا تھا۔ مگر اب حال کے مشاہدات سے یہ دریافت ہوا ہے کہ یہ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جسمین سامے ٹیکٹ نرو میں انفلامیشن ہو جاتا ہے اور دوسرے میں مثل دیگر بعضی دردوں کے صرف درد ہوتا ہے۔ قسم اول کو جسمین انفلامیشن ہوتا ہے سامے ٹیکٹ نیو-رامی ٹیشن کہتے ہیں۔ اور دوسرے کو جسمین نرو مذکور میں صرف درد ہوتا ہے سامے ٹیکٹ نیو-رجیا بولتے ہیں۔ ٹیس علاج سے پہلے اس بات کی تشخیص کرنی چاہئے کہ جس درد

سے مرنے کو تکلیف چوبہ ہی ہوتی وہ سارے ٹکٹ نرو کے انفلا میشن کے سبب سے ہے یا وہ دروازہ مستم عام نیو۔ رلجیا کے ہے کیونکہ ان دونوں قسموں کا علاج ایک جیسا بنین۔ پس شخص کی سہولیت کے لئے ہم ان دونوں قسموں کا فرق بالمقابلہ ایک دوسرے کی ذیل میں درج کرتے ہیں چند نچے۔

سارے ٹکٹ نیو۔ رلجیا	سارے ٹکٹ نیو۔ راتھی۔ ٹن
<p>۱۔ اس میں درد دیر ہوتا ہے اور برابر رہتا ہے چھوٹی اور ٹیسین بہت کم اور خفاہ کر وہ جگہ سن بنین معلوم ہوتی ہے۔</p> <p>۲۔ سبب ضرب و زخم لیکن مریض کو اگر انے۔ میا ہو یا مے۔ لے۔ ریا کا اثر پایا جاوے تو اس کو نیو۔ رلجیا سمجھنا چاہیے۔</p>	<p>۱۔ اس میں درد دیر ہوتا ہے اور وہ کہہ دے ہوتا ہے۔ درد کے مقام پر جھپٹا کر ٹیسین اور وہ جگہ سن معلوم ہوتی ہے۔</p> <p>۲۔ سبب ضرب و زخم۔</p>
<p>۳۔ حرکت سے درد زیادہ بنین ہوتا ہے اور بعض دفعہ ہوتا ہی نہیں۔</p> <p>۴۔ بالکل سن ہو جانا شاذ و نادر ساری ٹانگ کا حس گنہ ہو جاسکتا ہے۔</p>	<p>۳۔ ٹانگ کے ہٹنے جھٹنے سے خفاہ کر جب زور سے سیدھی کیجاتی ہے۔</p> <p>۴۔ مرض کے شروع میں وقتاً فوقتاً ٹانگ کی بعض بعض جگہ سن ہو جاتی ہے۔</p>
<p>۵۔ ورم بنین ہوتا۔ کسی کسی مقام پر دبائے سے درد ہوتا ہے وکن بنین۔</p> <p>۶۔ کسی ساحت میں خرابی بنین پیدا ہوتی۔ ٹانگ کے حرکت نہ کرنے کے</p>	<p>۵۔ کل نو پر ورم ہو جاسکتا ہے اور دبائے سے وکن ہوتی ہے۔</p> <p>۶۔ جلد بال اور بانٹوں کی ساخت بدل کر بگڑ جاتی ہے اور عضلات کی سخت</p>

بہی بگڑ جاتی ہے اور وہ لاغر ہو جاتے	سبب سے قدرے لاغر ہو جاسکتے
ہیں۔	ہے۔
۷۔ ٹانگ مفلج ہو جاسکتی ہے۔	۸۔ ٹانگ مفلج نہیں ہوتی۔

علاج - سابق میں جن ادویات اور ترکیبوں سے سارے ٹیکاکا علاج کرتے تھے انہیں سے پتیری دوا اُس قسم کے مرض میں اب بھی استعمال کر سکتے ہیں جسکو سامی ٹیکہ نیو۔ رلجیا کہتے ہیں۔ مگر ان ادویات اور ان ترکیبوں سے ساتی ٹیکہ نیو۔ سامی ٹش کو فائدہ نہیں ہوتا چنانچہ علامہ ان معمولی دواؤں کے یہ چند نئی دوائیں سامی ٹیکہ نیو۔ رلجیا میں فائدہ مند ہیں جیسے فے۔ نا۔ سی۔ مین۔ اٹھے۔ پائی۔ مین۔ کو۔ کین اور اسٹیک اسٹ پچھلی دواؤں کی جلد کے اندر پچکار ہی کرتے ہیں اور فے۔ نا۔ سی۔ مین اور اٹھے۔ پائی۔ مین کہلانے میں آتے ہیں مگر فے۔ نا۔ سی۔ مین زیادہ فائدہ مند ہے۔ کیونکہ جب سات یا آٹھ گرین کی تعداد میں چار چار یا چھ چھ گنہٹہ کے بعد کہلاتی جاتی ہے تب درد کو افادہ ہو جاتا ہے اور آسٹیک اسٹ کے فیصدی ایک حصہ کی طاقت کے عرق کے ۱۰ قطرے کی پچکاری سے درد جلد رفع ہو جاتا ہے + بیمار اگر کمزور ہو یا اسکے جسم میں مے۔ لے۔ ریکا اثر پڑا ہو تو ایسا نسخہ تجویز کریں جس میں کوئین اور فولاد اور سہکیا موجود ہو + اور جس علاج کا ذکر ہوا وہ تو معمولی علاج نیو۔ رلجیا کے قسم کے ساتی ٹیکہ علاج ہے۔ اب اس بیماری کے اُس قسم کا بیان کیا جاتا ہے جس میں ٹش کے نزدیک انفلامیشن ہو جاتا ہے اور جسکو سارے ٹیکہ نیو۔ سامی ٹش کہتے ہیں۔ پس

علاج سائے۔ ٹیکہ مینو۔ رامنٹی۔ رٹن کانہ پہلے سبب
 کو دریافت کریں اور ممکن ہو تو اسکے رنج کرنے کی کوشش کریں۔ مثلاً دیکھیں
 کہ بیماری زخم کے سبب یا کوہلے کے جوڑ کی بیماری سے یا بل۔ دس میں کسی
 رسولی کے باعث یا سڈون کے بہنے بہنے کے سبب سے یا رحم کے کسی طرف
 ٹل جانے سے یا وحی۔ ری۔ کوز۔ ویتن کے یا انیو۔ ویزم کے سبب سے پیدا
 ہوئی ہے۔ بعض دفعہ یہ بیماری سردی کے باعث اور خون میں کسی زہر کے
 سرایت کر جانے سے اور ڈا۔ یا۔ بے۔ ٹیکر کی بیماری کے باعث اور شراب
 خوری اور آشک کے سبب سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ سقل
 اور ٹامی۔ فائڈ فیور کے سبب سے بھی سائے۔ ٹیکٹ، نرڈ میں انفلا میشن
 ہو جاتا ہے۔ غرض ان سببوں میں سے جب کسی سے یہ بیماری پیدا ہو۔
 اسکے رنج کرنے کی کوشش کریں۔ جب کوئی بھی سبب دریافت نہیں ہو سکتا
 ہے تب علاج کے تین مطالب ہوتے ہیں۔ اول رنج کرنا درد کا۔ دوم انفلا میشن
 کا روکنا۔ سوم مریض کو آرام دینے سے رکنا سب سے بڑا پہاڑی مطلب ہے
 مریض کو صرف یہی کہنا کافی نہیں کہ بستر پر لیٹا رہے بلکہ اس بات کی بھی تاکید کرنی
 چاہئے کہ کوئی بات ایسی نہ کرے جس سے بیمار نرو کو صدمہ پہونچے۔ اور تاکہ ایسا
 نہ کرنا پادے۔ لایم اسپلٹ فعل سے یکہ پادرن تک لگا کر اسکی ٹانگ کو
 قابو کریں۔ مگر اسپلٹ اس ترکیب سے باندھیں جس میں ساری نرو پر دالگ
 سکے۔ اس اسپلٹ کو تنگ لگا رہنا چاہئے جب تک مرض کی علامتیں غم
 نہ ہو جائیں یا بیماری کرانٹ نہ ہو جائے، انفلا میشن کے مدکنے کے لئے بیمار نرو
 پر برف لگائیں۔ اگر سردی سے نقصان پہونچے تو گرم کمید کریں۔ درد کے رنج کرنے
 کے لئے مار۔ فیا کی پچکاری کریں، ایکوٹ درجہ کے رنج کرنے کے لئے صرف

اگر تین میں سے رنج کرنا آرام دینا مطلب ہے

اسی قدر علاج کافی ہے + اس ترکیب سے جب انفلامیشن کی شدت رفع ہو جاوے تب اس بات میں کوشش کرنی چاہئے جس سے وہ مادی اصل ہو جاوے جو انفلامیشن کے سبب نرو پر پیدا ہوا ہے اور جس سے نرو کو دوبار کہا ہے۔ ہر بات کے حاصل کرنے کے لئے نرو کو ہر روز ایک یا دو دفعہ ۱۰ یا ۱۰ سمینٹ کے لئے آہستہ آہستہ دبانا چاہئے اور ساری نرو پر تار بھلی لگا دیں۔ کہلانے یا پلانے کی دوا سے اکثر فائدہ نہیں ہوتا۔ مان آئشک کا اگر گان ہو تو آئینو۔ جوائیڈ اف پوٹاسیم کا استعمال کریں + بعض دفعہ بلٹر کے لگانے سے ہی فائدہ ہو جاتا ہے +

جب اس بیماری کی دونو قسمیں کرائک ہو جاویں تب انکا خارجی علاج مشکل ٹریک۔ ڈو۔ لو۔۔۔ روکے کریں۔ دیکھو اوپر +

ڈاکٹر پر ڈھ صاحب فرماتے ہیں کہ روغن تارپین میں پیٹسک کی مقدار میں دن میں تین دفعہ پلانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے +

پے۔ را۔ لے۔ سس

جب جسم کے ایک یا کئی حصوں کا حص یا حرکت یا دونو جاتی رہتی ہے تب اسکو پے۔ را۔ لے۔ سس کہتے ہیں پے۔ را۔ لے۔ سس درحقیقت ایک علامت ہے اور مستقل مرض نہیں ہے کیونکہ دماغ یا نخاع یا اُنکے پروون کی مختلف بیماریوں کے باعث یہ پیدا ہو سکتا ہے اور گاہے گاہے جب اعصاب میں کسی قسم کی جاری ہوتی ہے تب ہی پے۔ را۔ لے۔ سس پیدا ہو سکتا ہے اور گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرض ڈف۔ تے۔ ریا اور رو۔ ما۔ ٹے۔ زم اور ہس۔ ٹے۔ ریا کے سبب سے بھی فالج ہو جاتا ہے اور جب اعصاب یا عضلات میں سیہ یا سیاب کا زہر سرایت کر جاتا ہے تب ہی پے۔ را۔ لے۔ سس ہو سکتا ہے

پے۔ را۔ لے۔ سس کی بیماریاں دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں حصہ اول میں وہ پے۔ را۔ لے۔ سس کی بیماریاں ہیں کہ جن میں جس حرکت دو نو میں خلل واقع ہوتا ہے اور دوسرے حصہ میں وہ ہیں کہ جن میں یا تو صرف جس یا صرف حرکت ہی جاتی رہتی ہے یا کم ہو جاتی ہے + اور جب صرف حرکت ہی جاتی رہتی ہے تب اُس پے۔ را۔ لے۔ سس کو ا۔ سے۔ نے۔ شیا کہتے ہیں اور جب صرف جس جاتا رہتا ہے تب اُس کو ا۔ نش۔ تے۔ شیا بولتے ہیں + اور جب سارا جسم مفلوج ہو جاتا ہے تب اُس کو جنرل پے۔ را۔ لے۔ سس بولتے ہیں اور جسم کا جب کوئی خاص حصہ مفلوج ہو جاتا ہے تب اُس کو پارشل کہتے ہیں + پار۔ شل پے۔ را۔ لے۔ سس کے اقسام یہ ہیں +

اول ہے۔ نے۔ پلیجیا کہ جس میں جسم کی صرف ایک ہی جانب مفلوج ہو جاتی ہے دوم پے۔ را۔ پلیجیا کہ جس میں جسم سفل مفلوج ہو جاتا ہے اور لوکل پے۔ را۔ کے سٹر اسوقت کہتے ہیں کہ جب صرف چہرہ یا ایک ٹانگ یا ایک بازو یا صرف ایک پاؤں وغیرہ مفلوج ہو جاتا ہے اور جب آنکھ کے پردہ رے۔ ٹے۔ نا کا جس جاتا رہتا ہے تب اُس پے۔ را۔ لے۔ سس کو ا۔ مو۔ رو۔ سس بولتے ہیں اور جب آنکھ کے اوپر کے پوٹے کالے۔ دے۔ ٹر۔ پل پے۔ بری عضلہ تیسری جوڑی عصب کے بیماری کے سبب سے مفلوج ہو جاتا ہے کہ جس سبب سے پوٹا آنکھ پر گر پڑتا ہے تب اُس کو ا۔ سس کہتے ہیں۔ اور جب کان کی آواز کا حس جاتا رہتا ہے لیکن ہیراں کو اصطلاح میں کو۔ نو۔ سس بولتے ہیں۔ اور جب سونگھنے کی قوت جاتی رہتی ہے تب ا۔ ناس۔ میا کہتے ہیں اور قوت ذائقہ کے زایل ہو جانے کو اے۔ جی۔ رس۔ ٹیا بولتے ہیں +

اول ہے۔ مے۔ پلیجیا

تعریف۔ اس مرض میں جسم کی ایک جانب کی یا تو حرکت جاتی رہتی ہے یا حسن و حرکت دونوں مفقود ہو جاتے ہیں + یا دور ہے کہ یہ بیماری ہمیشہ نہیں لیکن اکثر نتیجہ ۱۔ پو۔ پگنی کا ہوتا ہے +

اقسام یہ مرض کئی قسم کا ہوتا ہے چنانچہ جب نتیجہ مرض ۱۔ پو۔ پگنی کی ہوگا ہے تب اسکو سے۔ رمی۔ برل یعنی دماغی کہتے ہیں + ایسا ہی۔ کل جب علم مغز سے تعلق رکھتا ہے + ۱۔ پے۔ لپ۔ اسکو یعنی متعلق مرگی کے ہوگا کہ رجحان یعنی جب تعلق اسکا مرض کو۔ ریاسے ہو + ہٹے۔ ریکل یعنی جب یہ علائقہ مرض ہٹے + ریاسے رکھتا ہو +

علامات۔ سے۔ رمی۔ برل ہے۔ مے۔ پلیجیا کی علامتیں یہ ہیں کہ جانب ماؤف کے ماتھ و پاؤں کو اگر اٹھا کر چوڑو دیکھئے تو اپنے بوجہ سے خود گر پڑتے ہیں + چہرہ اس جانب کا جانب تندرست کی طرف مڑ جاتا ہے۔ لیکن زبان بیمار جانب کی طرف کیقد رگھوم جاتی ہے۔ طاقت گھٹا رہتی جاتی رہتی ہے یا بجا رکھی گفتگو سمجھ میں نہیں آتی لیکن شاد و نا در ایسا ہی ہوتا ہے کہ چہرہ جانب ماؤف کی طرف مڑ جاتا ہے اور زبان بھی تندرست جانب کو گھوم جاتی ہے + ہضم کم و بیش بگڑ جاتا ہے اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ حرکت کے مفقود رہ جانے سے حس بھی جاتا رہتا ہے لیکن بعض دفعہ حس کی زیادتی ہو جاتی ہے جانب مفلج کی حرارت اکثر کم پر بعض دفعہ زیادہ بھی ہو جاتی ہے اور ہوش و حواس اور حافظہ بعض دفعہ قائم رہتا ہے مگر اکثر بگڑ جاتا ہے + نبض اکثر آہستہ چلتی ہے لیکن بعض دفعہ سریع ہو جاتی ہے اور نفس کی حرکت دہیمی + رو و دن کی کم طاقتی کے سبب پانخانہ

اکثر قبض رہتا ہے۔ جب یہ مرض جلد رنج نہیں ہوتا تو مفلج ہاتھ اور پاؤں غر اور سرد ہو جاتے ہیں اور جب یہ بیا۔ می عام نہیں ہوتی تو اکثر بہ نسبت پاؤں کے اس میں ہاتھ زیادہ تر متاثر ہو جاتا ہے۔ جب اس بیماری میں ہاتھ پاؤں کی طاقت صرف کم ہی ہو جاتی اور بالکل جاتی نہیں رہتی ہے تب مریض اپنے ہاتھ کو مشکل اٹھاتا ہے۔ پر اکثر ہاکی سپہار سے کئے اٹھا نہیں سکتا۔ اور نہ مفلج ہاتھ سے کسی چیز کو تھام سکتا ہے۔ اپنے مفلج پاؤں کو گیسٹیکر چلتا ہے یا چلتے وقت اندیشہ اُسکو ٹھوکر کھانے کا ہوتا ہے۔ جب یہ مرض رو بصحت لانے لگتا ہے تو طاقت پہلے پاؤں کو آنے لگتی ہے جس سے بیمار چل پھر سکتا ہے لیکن ہاتھ پیر بھی مفلج رہتا ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ بیماری اکثر بائیں طرف زیادہ ہو کر فی ہے اور اکثر اٹاٹاٹا ہوا جاتی ہے۔

اسپائی رنل ہے۔ مے۔ پلیجیا یہ قسم اس مرض کی بہت کم دیکھنے میں آتی ہے اور اس میں چہرہ اور ہوش اس میں فرق نہیں پڑتا۔

اے۔ ایٹ۔ ٹائٹ ہے۔ مے۔ پلیجیا مرگی کی نوبت رنج ہو جانے کے بعد ہے گا ہلکیا سپہا کہ ایک جانب کے ہاتھ پاؤں چند منٹ سے لیکر چند گنٹھ یا مین یا چار روز یا اسے بھی زیادہ عرصہ تک مفلج رہتے ہیں لیکن دوسری نوبت سے پہلے آرام آ جاتا ہے۔ کو۔ ری۔ ایک ہے۔ مے۔ پلیجیا جسم کی جس جانب کو۔ ریہ کی بیماری میں زیادہ حرکت ہوتی ہے بعض دفعہ وہی جانب مفلج ہو جاتی ہے۔

میسٹرکل ہے۔ مے۔ پلیجیا میں اکثر یا تو ہاتھ یا پاؤں مفلج ہو جاتے ہیں۔

اسباب۔ جب یہ بیماری دفعہ اور کامل طور پر پیدا ہوتی ہے تو ہمیشہ مرض ا۔ پو۔ پلکسی کے سبب ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ مرض تدریج شروع ہوتا ہے تب یا تو کسی رسولی کے پیدا ہونے سے یا دماغ کی ساخت کے ملائم

پڑ جانے سے پیدا ہوتا ہے اور جب اسپائی - نل کارٹو کی ایک جانب پر دباؤ پڑتا ہے یا کوئی بیماری ہو جاتی ہے تب ہے۔ مے - پیلجیا کی بیماری کامل طور پر ظاہر نہیں ہوتی۔ اس حالت میں ایسا ہوتا ہے کہ اسپائی - نل کارٹو کی جس جانب میں بیماری ہوتی ہے جسم کی اُس جانب کی حرکت جاتی رہتی ہے اور اُس کے برخلاف جانب کا حس ۔

تشخیص - سے - رمی - برل ہے۔ مے - پیلجیا میں ہمیشہ کچھ فرق ضرور پڑ جاتا ہے اور جب اس قسم کا مرض شدید ہوتا ہے تو عقل و ہوش و حواس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ تکلم مشکل سے کیا جاتا ہے اور نکلنے میں تو بڑی ہی بہت تکلیف ہوتی ہو اسپائی - نل ہے۔ مے - پیلجیا میں سرچہ اور زبان مندرست رہتی ہے اور جس جانب کی حرکت جاتی رہتی ہے اُس کے خلاف جانب کی حس میں فرق پڑ جاتا ہو ۔
۱۔ پے - اپٹ - مٹ ہے۔ مے - پیلجیا بیمار کی سرگزشت دریافت کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے ۔

کو - رمی - راکٹ ہے۔ مے - پیلجیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مفلوج اعضا میں کسی قدر جھٹکے کی حرکت ہوتی رہتی ہے۔ اس میں چہرہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اور نہ زبان میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہوتی ہے ۔

علاج ہے۔ مے - پیلجیا کے عین ابتداء کے علاج کا مطلب ایسا ہونا چاہئے جس سے قلب کی طاقت بپت رہے اور بڑھنے نہ دیاوے چنانچہ اس مطلب کے حصول کے لئے بیمار کو برابر ٹا رکھیں اور اٹھنے یا بیٹھنے کی اجازت نہ دیں اگر مریض کے ہوش و اس فاعم ہوں تو ایسا بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کسی طرح بیمار کی طبیعت رنج و غم یا فکر و تردد سے گہرا نہ جاوے۔ اگر کوئی شے از تنم پوشاک وغیرہ مانع کے خن کے اچھے طور پر دورہ کرنے کا مانع ہو تو اُسکو فوراً رنج کرین قبض ہو تو

اسکا دینیہ سہلات سے کریں۔ ایام مرض میں یہ ثابت ہو کہ اسپاتی - نل کارڈ
 میں اجتماع خون کا ہو گیا ہے تو اسکا تذکرہ کر کے چنانچہ بیمار کو چت نہ لینا چاہئے
 بلکہ ممکن ہو تو اونڈا لیٹا رہے اسپاتی - نل کارڈ کے چند جگہ پر ڈرائی - کیننگ
 کریں یا بلستر لگا دیں * اور سرجاء داخل کے لئے ایسی ادویات تجویز کریں جن سے حرام
 مغز کا کین - جش - جن (اجتماع خون) کم ہو جاوے۔ چنانچہ اس مطلب کے حاصل کرنے
 کے لئے بلا - ڈونا اور ار - گٹ اف رائی سفید ہیں ار - گٹ اف رائی پہلے
 پہل بمقدار ۳۰ کریں کے دینیں تین دفعہ دینا چاہئے اور رفتہ رفتہ اسقدر بڑھا دیں
 کہ جب تک چہرہ چہرہ کریں دینیں دو دفعہ دے سکیں *۔

پشت پر بلا - ڈونا یا بلا سٹر لگا دیں اور چند ہفتہ عین سلامتوں کو تخفیف نہ ہو تو
 اکثر گٹ اف بلا - ڈونا بمقدار چوتھائی یا تیسرے حصہ کریں کے دینیں دو دفعہ
 کہلا دیں بعد چہرہ آٹھ ہفتہ کے بیماری کو تخفیف ہو تو آئیوڈائیڈ اف پوٹاسیم
 بمقدار ۵ یا ۶ کریں کے دینیں دو دفعہ کہلا دیں اور بلا - ڈونا بھی بستر جاری
 رکھیں * اسلئے تاکہ مغلیہ عضلے لاغر نہ ہو جاویں اعضا سے مغلیہ رت یا بجلی لگا پڑے
 جسکے لگانے کی ترکیب ذیل میں بیان کی گئی ہے۔ اور مغلیہ مائتہ پاؤں پر درم
 ہو جاوے تو ہر روز رات کی وقت آب گرم سے تمکید کریں * قبض ہرگز نہ ہونے
 دیں اور معدرات (انو - وٹرین) کے استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو ایفون
 کا استعمال نہ کریں بلکہ مائیو - سے رمن یا کو - نایم اور ہیمپ کا استعمال مناسب ہے *
 حرام مغزین خواہش کی علامات موجود نہ ہوں تو بلا - ڈونا کے استعمال کرنے کی
 ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب حرام مغزین اجتماع خون کا ہوتا ہے تب ہی بلا - ڈونا
 سے فالج کو فائدہ ہوتا ہے اور یہی قاعدہ ار - گٹ اف رائی کے استعمال کرنے
 کا بھی ہے اور اسٹرکٹائن (کچلے کا جوہر) کے اثر کا حال یہ ہے کہ اسکے کہلانے سے

نخاع میں زیادتی خون کی ہوتی ہے۔ پس یاد رہے کہ فالج کی بیماری (پلے۔ پائے۔ سٹرک) کو اسٹرکنا میں استعمال سے تب ہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب نخاع میں خراش کی علامت نہیں ہوتی ہے اور جب اسکی رگیں خون سے زیادہ پُر ہوں یا انہیں خراش کے آثار موجود ہوں تب اسٹرکنا میں استعمال منع ہے ❖

استعمال الیکٹریسیٹی کے لیے گاہ پلے۔ رائے۔ لی۔ سٹریٹنگ فالج کے علاج میں

پلے۔ رائے۔ لی۔ سٹریٹنگ کے علاج میں تار بجلی کے لگانے میں بڑی احتیاط چاہئے کیونکہ اس میں فائدہ اور نقصان دونوں ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر بے احتیاطی سے لگایا جائے تو بے انتہا نقصان ہو سکتا ہے اور جو دانا مٹی سے لگایا جاوے تو بہت فائدہ ہوتا ہے ❖ پلے۔ رائے۔ لی۔ سٹریٹنگ کی بیماری میں تار بجلی کے لگانے سے اتنے فائدے متصور ہیں جتنا نیچے

اول جب کسی نزدیک یا مسل کی حرکت میں خلل واقع ہو تب لگانے سے انکا خلل لوٹ آتا ہے اور وہ مسل یا ٹرٹرو اپنی معمولی حرکت کرنے لگتا ہے ❖
دوم۔ اس کے لگانے سے مسلسل لاغر ہونے والے ہین پاتے جس سے خاص بیماری رُک جاسکتی ہے ❖

سوم۔ جگے ماؤف میں خون کا دورہ نہ ہو جاسکتا ہے جس سے مقام مفلج رہ رہے ہونے والے ہین پاتا اور زودا ہو جاتا ہے جیسا کہ فالج کی بیماری میں سبب کمی خون کے ہو جاتا ہے۔ چہارم۔ تار بجلی کے لگانے سے جلے ماؤف کے مسلسل اور تڑوس اور دیگر ساخت کی پرورش بخوبی ہو سکتی ہے اور وہ لاغر ہین ہونے پاتے ❖

پہلے جسم کے مقام پر پہنچ رہا ہو یا نہ پہنچ کر ایسا نہ لگتی ہو تب تاہجلی کے لگانے سے وہ بائین یا توڑک جا سکتی ہیں یا جلد نہایت ہو۔ نئے پائین یا دفع ہو جاتی ہیں۔
ششم۔ عرصہ تک تاہجلی کے لگانے سے یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ دماغ یا نخاع کے اُس حصہ کی بھی پرورش ہو سکتی ہے جہاں سے مقام ماؤف کے نزو کا خروج ہوتا ہے +

مختلف حالتوں میں مختلف قسم کی بجلی کا استعمال کرنا چاہئے چنانچہ عضلات کی حرکتوں کے تیز کرنے کے لئے کل۔ وائٹک بٹری کی بجلی فائدہ مند ہے اور جاسے ماؤف کے دوران خون کے تیز کرنے کے لئے اور اُسکی پرورش کی واسطے سلسلہ دار بجلی کا اثر پہنچنا چاہئے + اور تشنج کی حرکتوں کو کم کرنے اور اینٹی ہوئی سلس کو ڈھیلا کرنے کے واسطے کل۔ وائٹک بٹری کا ہلکا اثر عرصہ تک پہنچانا چاہئے +

پے۔ ر۔ لے۔ سس کی بیماری میں تاہجلی لگانے کے چند قواعد بتلانے چاہئیں وہ یہ ہیں کہ اس علاج کے شروع میں مریض کو ڈرانا نہ چاہئے + زور بجلی کا استعد رہنا چاہئے جس سے مریض کو درد ہو اور نہ بجلی استعد رکھ کر ہر جس سے کچھ بھی فائدہ نہ ہو اور بجلی استعد رویر تک نہ لگانی چاہئے جس سے بیمار یا مسلسل کے تھک جائیں ہو جب موقع اور ضرورت کے ہر روز یا دو دن دو دفعہ یا دوسرے روز لگانی چاہئے۔ اگر کل۔ وائٹک لگانی ہو تو ایک ٹکڑا اسفنج کا خوب تر کر کے آدے کے ایک سستہ میں بھر کر جسم کے ایک ہی مقام پر قائم رکھیں جیسے اطراف اعلیٰ کے فالج میں کندھے پر یا کہنی کے خم میں اور دوسرے دستہ کو آہستہ آہستہ مفلج عضلوں پر پھیرنا چاہئے +

بجلی کا استعمال مختلف قسم کے فالج میں

اول دماغ۔ جب دماغ کی خرابی کے سبب فالج ہو تو کچھ عرصہ تک بجلی نہ لگانی چاہئے

اور عرصہ تک لگانے میں بھی بڑی احتیاط چاہئے۔ اگر دماغی سبب سے فالج تبدیل ہو
 بھی پیدا ہو پھر بھی بجلی کے لگانے میں احتیاط چاہئے خاص کر اگر دوسرے ہو یا سر
 پہاڑی ہو یا سرگرم ہوتا ہو ۛ

دوم پلے۔ را۔ لے۔ سس نخاعی جب آبائی نل کارڈ کی بیماری کے
 سبب سے کامل پلے۔ را۔ لے۔ سس ہو جائے اور بجلی کے لگانے سے مسلسل آسانی
 حرکت میں آوین تب اس علاج سے حرکت مذکور زیادہ ہین ہو سکتی مگر ہن بعض دفعہ
 ایسا ہو سکتا ہے کہ بجلی کے لگانے سے بلاڈ اور ریکٹم اور اعضاے تناسل کا فعل جو
 پلے۔ را۔ لے۔ سس کی بیماری میں اکثر بگڑ جاتا ہے حالت اصلی پر آ سکتا ہے ۛ جب
 پلے۔ را۔ لے۔ سس کامل ہین ہوتا اور مسلسل بالکل مغلوب ہو جاتے ہیں تب بجلی کے
 لگانے سے صرف اعتدال فائدہ ہو سکتا ہے کہ مسلسل اپنی اصلی حرکت کر سکیں لیکن یاد
 رہے کہ جب اس قسم کا پلے۔ را۔ لے۔ سس اکیوٹ ہو تب بجلی نہ لگانی چاہئے۔
 مگر جب پلے۔ را۔ لے۔ سس تبدیل ہو کر کڑا تک طور پر پیدا ہو تب بجلی کے لگانے سے
 بہت فائدہ ہوتا ہے ۛ پلے۔ را۔ لے۔ سس کے سبب جب ماتہ یا یاؤن غریب ہو کر
 تب گیارہ۔ را۔ لے۔ زم سے فائدہ ہوتا ہے ۛ

سوم جب کوئی خاص مقام مغلوب ہو جاوے اور دماغ کا سارا ٹروٹیا بالکل بیکار ہو جاوے
 اور بجلی کا اثر اس جگہ بالکل نہ ہو تب بجلی کے لگانے سے بالکل فائدہ نہ ہوگا۔ مگر ہن بعض
 دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹروٹیا کو رکی خرابی دور ہو جاتی ہے مگر اس مقام کے عرصہ تک
 بیکار پڑے رہنے کے سبب تھوڑی بہت پلے۔ را۔ لے۔ سس باقی رہ جاتی ہے
 غرض اس صورت میں بجلی کے لگانے سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایسی صورت میں
 جب دیکھیں کہ بجلی کے لگانے سے مسلسل حرکت کرتے ہیں تب عرصہ دراز تک اس
 علاج کو جاری رکھنا چاہئے۔ بعض قسم کے لوکل پلے۔ را۔ لے۔ سس میں جو سیم یا میٹری

یا کسی اور سبب سے پیدا ہو تب خفیف طاقت کی بجلی کے لگانے سے مسلسل کو جلد طاقت آجاتی ہے *

سوم پلے - را - پلی - جیا

تعریف - یہ ایک قسم کا فالج ہے جس میں کمر سے لیکر دونوں ٹانگیں اور شاید چند عضلات بااثر (مثانہ) اور ریکٹم (ستقیم) کے بھی مفلوج ہو جاتے ہیں *

اقسام - یہ فالج دو قسم کا ہوتا ہے - اول آر - گے - نک - پلے - را - پلی - جیا *

دوم ری - فلکس - پلے - را - پلیجیا *

آر - گے - نک - پلے - را - پلیجیا

علامات - جب یہ بیماری مائی - لائی - ٹس کے سبب سے پیدا ہوتی ہے تب مثل اوپر قسم کے فالجون کے یا تو دفعتاً یا رفتہ رفتہ پیدا ہو جاتی ہے - جب نچلے کے نیچے کا حصہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے اور اس سبب پلے - را - پلیجیا کامل ہو جاتا ہے تب دونوں ٹانگوں کی حس و حرکت بالکل جاتی رہتی ہے اور مثانہ اور ریکٹم بھی مفلوج ہو جاتی ہیں اور چونکہ بیمار مجبوراً بستر پر پڑا رہتا ہے اسلئے اُسکے چوڑوں اور کشت پر زخم پڑ جاتے ہیں - پیشاب مثانہ کے اندر جمع رہتا ہے اور اس سے ایو - نیا کی بو آتی ہے *

جب یہ بیماری کامل طور پر نہین ہوتی ہے تب دونوں ٹانگیں کمزور ہو کر سخت اور بیماری ہو جاتی ہیں اور انہیں جھٹاٹ اور چٹائی سے ریگتی سی محسوس ہوتی ہیں اور شل رہتی ہیں فکار کے وقت لڑکھڑاتی ہیں اور تھرتھراتی ہیں *

چونکہ یہ علامتیں بڑھتی جاتی ہیں پلے - را - پلیجیا کی بیماری کامل ہوتی جاتی ہے اور تب مثانہ اور ریکٹم بھی مفلوج ہو جاتا ہے یہ مرض اکثر اس وقت تک چھلک نہین ہوتا جب تک کہ دونوں تہہ سینہ اور نچلے کے عضلات

ری فلکس پے۔ را۔ پیلجیا

اطباء نے وقتاً فوقتاً ایسے بیمار پے۔ را۔ پیلجیا کے دیکھے ہیں جنکے متواسپائی۔ نل کارٹو کی ساخت اور نہ اسکے پردون میں اس بیماری کے سبب کسی طرح کی خرابی پائی گئی تھی بلکہ سبب اُنکے پے۔ را۔ پیلجیا کا صاف یہ ثابت ہوا تھا کہ یہ مرض جسم کے ایسے مقامات یا اعضا کے کی بیماری سے پیدا ہوا تھا کہ جو حرام مغز سے دور تھے اور جنکا علاقہ حرام مغز سے سلسلہ وار نہ تھا چنانچہ ڈاکٹر اسٹاملی صاحب نے ۱۹۳۳ء کے اندر چند مریضوں کا حال ایسا چھو ایا تھا جنکے دماغ یا حرام مغز میں پے۔ را۔ پیلجیا کی بیماری کے آثار بالکل بہین پائے گئے تھے بلکہ اُنکو عرصہ سے سوزاک کی بیماری تھی اور گردن اور منار میں انفلامیشن تھا۔ علاوہ ازیں بہتیرے اطباء نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ پے۔ را۔ پیلجیا کی بیماری نامزہ میں قح (اسٹریکچر) یا جسم میں کسی بیماری کے ہونے سے اور دانت کھٹے وقت اور پیش کے مرض کے باعث اور حمل کے ایام میں بھی پیدا ہوئی ہے اور ماہیت اس قسم کے پے۔ را۔ پیلجیا کے پیدا ہونے کی یہ بتلاتے ہیں کہ مرض کے مقام کے عصب کی خراش حرام مغز میں خون پہنچانے والی رگوں پر جو عصب پہیلے ہوئے ہیں انہیں متاثر ہوتی ہے۔ نتیجہ اُسکا یہ ہوتا ہے کہ حرام مغز کی وہ رگیں سکڑ جاتی ہیں جس سے حرام مغز کا دوران خون رُک جاتا ہے اور اُسکی پردریش بہین ہونے پاتی اس سبب سے پے۔ را۔ پیلجیا کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔

علامات۔ اس موقع پر ہم ڈاکٹر برون۔ سی۔ کارڈ کی کتاب سے دو قسم کی پے۔ را۔ پیلجیا کی علامتوں کو نقل کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو ان قسموں میں جو فرق ہے معلوم ہو جائے۔

الف

ب

ری فلکس پے۔ را۔ پلیمیا اعضاے آر۔ گے۔ نکٹ پے۔ را۔ پلی۔ جبا
بول کی خراش کے سبب * مائی۔ لائی۔ ٹس کے سبب *

۱۔ اسکے شروع ہونے سے پہلے یا تو مثلاً ۱۔ اس میں اکثر اعضاے بول کی بیماری
یا گردہ یا پراس۔ ٹٹ۔ گلانڈ میں بیماری نہیں ہوتی اور جو ہوتی بھی ہے تو نتیجہ
ہو جاتی ہے * اس مرض کا ہوتا ہے *

۲۔ اس میں کثرت و نوانگین ہی مفلوج ہو جاتی مقامات جسم کے مفلوج ہو جاتے ہیں *
ہیں *

۳۔ اس میں فالج اکثر اوپر کی طرف ہنیں ۳۔ اس میں فالج رفتہ رفتہ اوپر کی طرف
بڑھتا * اکثر بڑھ جاتا ہے *

۴۔ اس میں فالج اکثر نا کامل ہوتا ہے * ۴۔ اس میں فالج اکثر کامل ہوتا ہے *

۵۔ اس میں بعض عضلات نسبت اورون ۵۔ اس میں نوانگون کے مختلف عضلات کا
کے زیادہ تر مفلوج ہو جاتے ہیں * فالج ایک ہی درجہ کا ہوتا ہے *

۶۔ شانہ اور رودہ مستقیم بہت کم مفلوج ۶۔ شانہ اور رودہ مستقیم اکثر مفلوج
ہوتے ہیں * ہو جاتے ہیں *

۷۔ مفلوج عضلون میں شاذ و نادر شنج ۷۔ اس میں ہمیشہ تشنج ہوتا ہے *
ہوتا ہے *

۸۔ دبانیے یا ٹھونکنے یا ریشکنے یا برف کے لگانے ۸۔ پشت میں تھوڑا بہت درد ہمیشہ ہوتا ہے
سے پشت کی ٹہنی میں شاذ و نادر ہوتا ہے * ہے *

۹۔ سینہ یا شکم میں درد یا بندہن نہیں ۹۔ فالج کے اوپر کی حد پر مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے *

کو رسی سے مضبوط جکڑ دیا ہے *

۱۰۔ اعضاء مفلوج نہ تو چٹیان نیکی سی اور نہ سویان چھتی سی ہمیشہ معلوم ہوتی ہیں اور اعضاء میں اور نہ وہ اعضاء زیادہ گرم یا زیادہ سرد محسوس ہوتے ہیں *

۱۱۔ حس بہت شاذ و اعلیٰ ہوتا ہے + ۱۱۔ حس اکثر زائل ہوتا ہے +

۱۲۔ معدہ اکثر بگڑ جاتا ہے + ۱۲۔ معدہ اکثر درست رہتا ہے *

۱۳۔ پیشاب اکثر ٹرش رہتا ہے آلا اگر اعضاء بول خود بیمار ہوں *

۱۴۔ مرض کو شفا جلد ہوتی ہے + ۱۴۔ یہ مرض رفتہ رفتہ مہلک ہو جاتا ہے اور شاذ ہی شفا ہوتی ہے *

۱۵۔ اعضاء مفلوج کے عضلے اکثر لاغر ہنیں ہوتے اور انکی حرارت بھی تھوڑی ہی کم ہو جاتی ہے *

علاج۔ اگر گے۔ نہک پے۔ را۔ پلجیا۔ عین ابتدا مرض میں مای۔ لائی۔ گن کا علاج کریں کہ جس باعث یہ بیمار پیدا ہوتی ہے لیکن جب یہ مرض پُرانا ہو جاوے اور کل علامات انفلا میشن کی منقودہ اسوقت مقویات مثلاً ٹنکچر اف اسپیل یا معدنی تیزابوں کا یا کوئین کا استعمال کریں + اور اسٹرک۔ نیا ایک گرین کے نیسویں حصہ یا پندہویں حصہ کی مقدار میں ہی مفید ہے۔ اس دوا کے استعمال کرنے سے مفلوج عضلات

کو احتلاج ہوتا ہے لیکن اس پھر کئے سے ایسا قیاس نہ کرنا چاہئے کہ ان عضلوں میں طاقت آتی ہے۔ اگر اس مرض میں اعضا سے بول کی بھی بیماری ہو تو ٹنچر اف

کن۔ تھا۔ رمی۔ ڈوس کا استعمال مناسب ہے چنانچہ نسخہ۔ ٹنچر آف کن۔ تھا۔ رمی۔ ڈوس۔ ابو ندہ۔ پانی ڈیڑھ آونس۔ دو دو کو ملا کر ایک خوراک کریں اور ایسی ہی ایک ایک خوراک دین تین دفعہ پلاوین اور اس حالت میں وغیرہ تارپین بمقدار ایک ایک ڈرام کے مفید ہے۔

خارجی علاج اس بیماری کا اسطور پر کریں کہ ٹانگوں پر کسی ایسی میو۔ لنٹ لے۔ فی منٹ کی مالش کریں اور جب حرام مغز کی کل خراش منع ہو جاوے تب تار بجلی لگاؤں منع ہونا خراش کا اسطور پر ثابت ہوگا کہ مقام مرض پر دو ہینین ہوگا اور ٹانگوں پر بجلی ہو جائیگی علاوہ تار بجلی کے ٹانگوں کو آہستہ آہستہ دباوین یا ٹمک اور پانی سے دھو ڈالاکریں۔ پیشاب مثانہ میں رک جاوے تو ہر روز سلائی کے ذریعہ نکال دیا کریں۔ اسپین امیو سینا کی بو پیدا ہو جاوے تو مثانہ کو ہر روز آب گرم سے دھو ڈالاکریں۔ اور تاکہ بڈ مسور نہ ہونے پاوے مر لیٹیکو پانی کے بستر پر پلاوین اور صاف شہر رکھیں۔

علاج۔ رمی۔ فلکس۔ پے۔ را۔ پلیجیا۔ مطالب علاج کے تین ہیں۔ اول خراش بیڑنی کو جس باعث یہ فالج پیدا ہوتا ہے منع کریں۔ دوم حرام مغز کی پرورش کی صورت کریں۔ سوم لیٹے رہنے سے جو خرابی مصلوح اعصاب اور عضلوں پر ہوتی ہے اسکو روکیں۔ چنانچہ نامزدہ اور پراس۔ ٹیٹ گھانڈین اگر بیماری ہو تو ایک گرین اکثر ایکٹ اف بلا ڈومائے کر ہو بند لاڈم میں حل کر کے نائیزہ کے اندر چکار دی کریں اور پچکار دی کے عرق کو نصف یا ایک گھنٹہ تک اندر رہنے دیں بعد ازاں ایسی کے جوشاندہ کی پچکار دی کریں تاکہ نائیزہ کا رہتہ بخوبی ذہل جاوے۔ اس پچکار دی کو دوسرے تیسرے کرتے رہیں۔ اگر پراس ٹیٹ گھانڈ بڑھ جاوے تو مفید میں سپا۔ زی۔ ٹری کی گولی رکھیں۔ جس گولی کے بنانے

کی ترکیب یہ ہے۔ نسخہ۔ صاف شکر سفید صابون اور سفوف کم۔ ارا بابک (صنعتی)
 ہر بابک کا تین تین گرین + اسیون سفوف کی ہوتی۔ ڈیڑھ گرین + اکثر اگٹ ان بلا ڈونا
 ایک گرین + سبکو اچھ طور پر ملا کر ایک مخروطی شکل کی گولی بنا دیں اور پگھلے ہوئے موم
 کے اندر ڈوب کر بوقت ضرورت مفید مین داخل کریں + اگر رمی فلکس پے۔ را۔ پلجیا
 اندام نہانی یا رحم کی بیماری کے سبب پیدا ہو تو نصف گرین اکثر اگٹ ان بلا ڈونا اور
 ایک گرین ایفون کے ایک گولی بنا دیں اس گولی کو مٹل کے کپڑے میں لپیٹ کر اندام نہانی
 کے اندر رحم کے منہ کے پاس رکھ دیں اور اسیون ایک ڈوری باندھ دیں تاکہ جب تک موتون
 یا کم ہو جاوے تب اس گولی کو کھینچ لے سکیں +

بلا۔ ڈونا کا استعمال ہمیشہ نہ کرنا چاہئے بلکہ رمی۔ فلکس پے۔ را۔ پلجیا میں ایفون ہمراہ
 اسٹرکینیا کے زیادہ ترمید ڈرتی ہے۔ علاج کے دوسرے مطلب کے حاصل کرنے کے لئے
 یضے نخاع کی پرورش کو واسطے اسٹرکینیا ایک نہایت عمدہ دوا ہے۔ خوراک اس دوا کی
 نہایت کم ہونی چاہئے چنانچہ جب ایفون کے ہمراہ دیں تو ایک گرین کے چالیسویں یا
 یا تیسویں حصہ سے زیادہ نہ مانا جائے جب اسکو نہ استعمال کرنا منظور ہو تو ہر روز ایک گرتز
 کے بیسویں حصہ تک دے سکتے ہیں۔ اگر اکثر کینا میں ہمراہ بلا۔ ڈونا کے کہلانا منظور ہو تو ایک
 گرین کے بیسویں حصہ سے کینقدر زیادہ دے سکتے ہیں + ان حالات میں کہ جب نخاع میں
 نتو اجتماع خون کا اور نہ انفلامیشن کے آثار پائے جاویں اکثر کینا میں استعمال اچھ طور پر
 کرنا چاہئے لیکن جب اسکے کہانے سے مفلوج ٹانگوں کے عضلات کو خنک ہو یا ٹیڑھا
 سے باہر نکالنے سے دونوں پاؤں شل ہو جاویں تو اس دوا کو اسی وقت موقوف کر دینا
 چاہئے۔ گندمک کا بہاں ابھی اس مرض میں بہت مفید پڑتا ہے۔ تیسرے مطلب علاج کا
 مفلوج ٹانگوں کو دبانے اور پرتا۔ بھلی لگانے سے حاصل ہو سکتا ہے +

اسباب - یہ مرض اکثر سردی کے لگ جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ ضرب و زخم اور کان کی ٹڈیوں میں زخم پڑ جانا کسی ٹیو۔ مکر کا عصب مذکور کو دبا نا مثل کن پٹرون کا اور آتشک بھی باعث اس بیماری کا ہے۔

علاج - یہ بیماری چونکہ سردی کے سبب اکثر ہو جاتی ہے اس واسطے پہلے اسے لقوہ کا علاج بتلایا جاتا ہے جو سردی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا علاج اسطوریہ کریں کہ اسٹامی - لوئس - ٹائیڈ - فوری - من کے پاس کہ جہان سے یہ مریض ہر نکلتا ہے اور جس مقام پر اکثر درد بھی ہوتا ہے تین یا چار جونکین لگادیں اور بعد چوٹ جانے جو کنوں کے ایسا کریں کہ ایک بدہنی یا گنگا سا گرین خوب کہوتا ہوا پانی بہہ کر اور اس کے منہ کو بند کر کے ٹونٹی کو کان کے سوراخ کے اندر داخل کر دیں تاکہ پانی کا بہا نہ پنے شیشل زرد پر جا لگے اور زرد نکور کو اسکی سینک پہنچے۔ بعد ازاں روئی آگ پر گرم کر کے کان کو خوب حل سینکین اور اسی روئی کو کان پر جاکر مش ڈھانپنے کے بائذہ دین ضرورت ہو تو مریض کو ایک جلاب دین۔ اکثر اسی علاج سے فائدہ ہو جاتا ہے لیکن مرض رفع ہو تو کان کے پیچھے ایک بلٹر لگا دیں اور تین گرین بلو - پل - سہراہ ایک گرین ہسپون کے تین نین چار چار گنہٹ بعد کہلا دیں ورنہ آئیو - ٹرائیڈ اف - پوٹاشیم کا استعمال کریں۔ کان کے اندر زخم ہو اور اس باعث یہ بیماری پیدا ہو تو آب گرم سے کان کو صاف کریں اور اس میں عرق نامیشریٹ اف سلور یا سلفٹ زنک لگا دیں اور بیمار کو ادویات متجوی کہلا دیں کن پٹیرا اگر اس مرض کا باعث ہو تو اس کا علاج کریں۔ سبب اگر آتشک ہو تو آئیو - ٹرائیڈ اف - پوٹاشیم کا استعمال کریں۔

پنجم ہٹے - ریکل - پال سی

اس قسم کی پے۔ برا۔ لے۔ بیس میں ننو دماغ نہ نجاخ اور نہ اعصاب محرک کی ساخت

میں کسی طرح کی خرابی ہوتی ہے اُن عورتوں کو یہ بیٹائی ہو جا یا کرتی ہے جو ہیٹریا کے مرض میں مبتلا ہوتی ہیں اور بعض دفعہ سبب اس کا خوف یا طبیعت کا جوش یا خستہ الرحم کی وجہ سے یا زیادہ خون کا نکل جانا یا خراب غذا کا کھانا وغیرہ ہوتا ہے۔

جب دو لونڈا لگین مفلوج ہو جاتی ہیں تب اس مرض کو ہٹے۔ ریکل۔ پے۔ را۔ پیچیا کہتے ہیں اور جب ایک جانب کا فائدہ اور پاؤں سُسن ہو جاتا ہے۔ تب ہٹے۔ ریکل ہے۔ پیچیا بولتے ہیں اور بعض دفعہ کوئی خاص عضلہ یا چند عضلے کسی خاص مقام کے مفلوج ہو جاتے ہیں۔ غرض جب اس قسم کا فالج ہوتا ہے تب ساتھ اس کے مرض ہٹے۔ ریا کی اور علامتیں بھی پائی جاتی ہیں اور حیف بے قاعدگی اور ساتھ درجہ آتا ہے۔ قبض اور بد بعضی رہتی ہے۔ شکم میں نفخ۔ پس پشت اور شستگاہ پر درد ہوتا ہے اور بچہ بچے کا سادو بھی ہوتا رہتا ہے۔ پیشاب میں چنگ پیدا ہوتی ہے۔ رانوں کے اندر کی جانب عصبی درد ہوتا ہے اور اندام نہانی سے تھوڑی بہت رطوبت جاری رہتی ہے۔ یاد رہے کہ ہر قسم کے ہٹے۔ ریکل۔ پے۔ را۔ لے۔ سس میں جسم کے پرورش میں خلل پڑتا ہے اور یہ خلل خاص مکمل مفلوج عضلوں کے اعصاب میں واقع ہوتا ہے اور شاید دماغ اور نخاع کی پرورش ہی اچھے طور پر نہیں ہوتی ہے۔ پس مطلب علاج کا ایسا ہونا چاہئے جس سے جسم کی پرورش اچھے طور پر ہو سکے۔ مثلاً کوہن اور مرکبات تھو اور کاڈ۔ لیور ایسل کا استعمال کریں۔ مریض کو آب گرم سے غسل کروں اور کسی شغل میں مشغول۔ غذائے مقوی دیں اور عضو مفلوج پر تار بجلی لگا دیں۔

ششم رو۔ مائیک پے۔ را۔ لے۔ سس

اس قسم کے فالج میں صرف ایک ہی یا دو لونڈا لگین یا کلامی کے اکثر۔ ٹن۔ سسرل

مستہل ہو سکتے ہیں اور جب ڈال ٹمائید یا ٹراپے - نرمی - اس مسل مفلج ہو جاتے ہیں تب آہہ آہہ ہنیں سکتا اور حصص متاثرہ بے طاقت ہو جاتے اور انہیں درد کا ہونا اور بیمار کا پست ہو جانا یہ ساری علامتیں یا تو دفعۃً یا تدریجاً ظاہر ہو سکتی ہیں یہ بات قرین قیاس ہے کہ بعض حالتوں میں نخاع کے غلافوں کے محدود حصہ - میں وجع مفاصل کی بیماری کے سبب یا تو انفلامیشن یا صرف خراش پیدا ہو جاتی ہے مگر اس فالج کی بعض صورتوں میں وجع مفاصل کا مرض صرف عضلین ہی میں ہوتا ہے ۔ یہ عیسٰی علاج اس قسم کی بیماری کا آیو۔ ڈائیٹ اف ایرن یا آیو۔ ڈائیٹ اف پوٹاسیم اور کاڈرلیور۔ آئل سے کرنا چاہئے اور مقام ماؤف پر تار بجلی لگا دین ۔

ہفتم ڈف - تے - رائی - ٹک - پے - را - کے - سس

ڈف - تے - رائی کی بیماری سے جب مریض کو شفا ہونے لگتی ہے تو اکثر تھوڑے ہی دن بعد فالج شروع ہو جاتا ہے ۔ اکثر اٹیا کی بیراے ہے کہ جو حصہ بدن کا مفلج ہو جاتا ہے اسکے اعصاب کی بیرونی سطح میں پہلے کسی قسم کا تغیر پیدا ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ تغیر حرام مغز کو مبتلا کر لیتا ہے ۔ ابتدا سے فالج میں تالو اور حلق کے عضلے مفلج ہو جاتے ہیں جس سے بیمار کو گھٹنا و سوار ہو جاتا ہے ۔ بعض دفعہ یہ بات ہینون تک رہتی ہے گاہے گاہے گردن کے عضلے مفلج ہو جاتے ہیں کہ جس سے بیمار اپنا منہ قائم نہیں کر سکتا یا کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی آہہ یا کسی ٹانگ کی طاقت رفتہ رفتہ کم ہونے لگتی ہے ۔ بعض دفعہ جب ایسا ہوتا ہے کہ حلق کے عضلین کی جس حرکت دونو جاتی رہتی ہے تب حلق میں نوالہ پھنس جاتا ہے اور بیمار کو ہلاک کر ڈالتا ہے ۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا چاہئے کہ یہ مرض نہ تو مہلک اور نہ ناقابل شفا ہے کیونکہ علی العموم مفلج حصوں میں طاقت آ جاتی ہے اور مریض تندرست ہو جاتا ہے ۔

علاج - اس بیماری کا مقویات سے کرنا چاہئے مثلاً فولاد اور اسٹرکینیا اور
کاڈیلورہ آئیل " بیمار کو غذا مقوی میں اور مقام ستیم پر تا رہجلی لگنا دین "۔

ہشتم - سن - سری - پے - را - لے - سن
یعنی

زائل ہو جانا حس کا

جب کسی مقام کی حس میں تہوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے تب اصطلاح میں اس لحاظ
کو نامی - پس - تہ - شیا بولتے ہیں اور جب حس بالکل زائل ہو جاتا ہے تب
انس تہ - شیا کہتے ہیں " انہن سے جب کوئی حالت پیدا ہوتی ہے تب
اس مقام کا گوشت اور پوست دونوں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر بقصدہ صرف جلد یا سر
جگہ کے صرف مس کا حس زائل ہو جاتا ہے اور یہ کہ انس - تہ - شیا کی حالت یا تو
دفعتاً پیدا ہو جاتی ہے یا دکان کا حس بتدریج زائل ہو جاتا ہے - اور جب حس زائل
ہو گیا تب اس جگہ کے چوٹے سے یا چنگیان لینے سے یا سوزن چوٹے سے یا
اس مقام کو کسی اور طرح صدمہ پہونچانے سے بیمار کو ان حرکتوں کا اثر کچھ بھی نہیں
معلوم ہوتا - مگر دکان نامی - پس - تہ - شیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب مقام موقوف
پر کسی قسم کا صدمہ پہونچا یا جاتا ہے تب بیمار کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ اور
صدمہ پہونچانے والی شے کے مابین کوئی چیز ٹاٹل ہے جیسے کوئی موٹا کپڑا یا روٹی
کا گالا وغیرہ - یہ بات خاصہ کہ تہ یا پاؤں پر محسوس ہوتی ہے کہ جب ہاتھوں سے
بیمار کسی چیز کو پکڑنا چاہتا ہے یا پاؤں پر کپڑا ہونا لگتا ہے اس حالت نامی - پس - تہ - شیا
میں اور نیز جب دکان - تہ - شیا کی حالت پیدا ہونے والی ہوتی ہے تب بھی مختلف

مستم کی غیر طبعی کیفیتیں اکثر پیدا ہو جاتی ہیں جیسے مقام ماؤف کا سن ہو جانا یا اس جگہ پر چھٹیوں کا رنگینا یا وہاں ٹیسین پڑنی یا سوتیان سی چینی اور یہ عجیب بات ہے کہ بہت سناؤ و نادر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگرچہ جس لاسہ بالکل جاتا رہتا ہے تب بھی سردی اور گرمی محسوس ہوتی ہے اور صدمہ پہنچائے تو وہاں درجہ بھی محسوس ہوتا ہے ۔

موٹر پے۔ رالے بس (حرکت کا زایل ہو جانا) اور سن۔ مہری پے۔ رالے۔ سیر (حسن کا زایل ہو جانا) کے اقسام ایک ہی ہیں چنانچہ ہے۔ مے۔ پلیجیا جب ہو جاتا ہے تب اکثر حسن و حرکت دونوں میں فرق آ جاتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس پے۔ رالے۔ پلیجیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور نئے ریشٹل۔ پے۔ رالے۔ ریشٹل بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک جس میں صرف نئے ریشٹل نرؤ مبتلا ہوتا ہے اور چہرہ کی حرکت جاتی رہتی ہے یعنی قوہ اور دوسری جس میں پانچوں جوڑا عصب کا مبتلا ہوتا ہے اور چہرہ کے عضلات کا حسن جاتا رہتا ہے ۔

علاج۔ زان قسموں کی پے۔ رالے۔ ریشٹل کا بھی علاج ویسا ہی ہوتا ہے جیسا حرکت کے پے۔ رالے۔ ریشٹل کے مختلف قسموں میں بیان کیا گیا ہے لیکن جب جسم کے کسی محدود حصہ کا حسن سبب ب جائے اُس مقام کے نرؤ کے جاتا رہنے اور وہ جگہ سن ہو جاوے تب ایسا کرتے ہیں کہ کوئی اسٹی۔ میو۔ لنٹ لے۔ نی۔ منٹ کی ماش کرتے ہیں تاکہ اُس نرؤ کو تحریک ہو اور وہ لکنا حسن لوٹ آوے جیسے نی۔ منٹ اف ٹریچن۔ ٹائیز یا کٹن۔ تے۔ ری۔ ڈس وغیرہ ۔

بہم پرو۔ گرے۔ سیومش۔ کیو۔ لہ۔ اٹرو۔ فے

ماہیت۔ اس مرض کی ماہیت کی نسبت اکثر اطباء سببات پر متفق ہیں کہ جب نچاع کے اٹے۔ ری۔ آر۔ کار۔ نیوین کے انک انفلامیشن ہو جاتا ہے یا کسی مستم کی اتیری

(ڈی۔ جے۔ نے۔ ریشن) پیدا ہو جاتی ہے تب اس حصہ نخاع کی حرکت بخشنیوالے اعصاب کے کیسے بتدریج زایل ہونے لگتے ہیں بعد ازاں اثر اس خرابی کا کل اعصاب اور عضلات پر پیدا ہوتا ہے۔

صورت حال تشہیحی۔ جو جو عضلے اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ تھوڑے بہت لاغر اور نرم ہونے لگتے ہیں اور رنگت انکی ہلکی یا زردی یا بل ہو جاتی ہے۔ عضلوں کے اوپر کے حصہ پر اکثر زیادہ تغیر پایا جاتا ہے۔ نخاع کے اعصاب کے سامنے کی جڑیں اور سم۔ پے۔ ستبے ٹکٹ ٹرو کی وہ شاخیں جو اعصاب مذکورہ سے جابلیتی ہیں لاغر ہو جاتی ہیں اور عضلے مادہ کی جگہ عین نہایت خرد خرد دانے دار ریشہ پیدا ہونے لگتے ہیں۔ درحقیقت نخاع کے سامنے کے کار۔ نیوین ابتری آجاتی ہے۔

علامات۔ علامات اس بیماری کی یہ ہیں کہ اس میں ان عضلات کی ساخت میز وزن پڑ جاتا ہے جنکو ہم اپنی مرضی سے حرکت میں لاسکتے ہیں چنانچہ وہ دُبلے اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن تنو بیمار کی عقل و ہوش جو اس میں فرق پڑتا ہے اور نہ کوئی حصہ جسم اس مرض میں بے حس ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں پہلی علامت نصفہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہاتھ کے انگلیوں کے اونچے گوشے میں درد شروع ہوتا ہے اور تب اس جانب کی کلائی اور بازو کمزور ہونے لگتا ہے اور اُنکے عضلے دُبلے ہونے لگتے ہیں۔ گاہے گاہے یہ لاغری صرف اسی ہاتھ میں محدود رہتی ہے یا دونوں ہاتھ لاغر ہونے لگتے ہیں اور کبھی کبھی دونوں ٹانگیں اور شاؤنا و سارے جسم کے عضلے خشک ہو جاتے ہیں جس عضلہ میں یہ درد ہوتا ہے اُسکے چند ریشے اکثر پڑنے لگتے ہیں گو بیمار کو اس بات کی خبر نہ ہو اور جب کبھی کسی چیسے جلد کو خراش ہوتی ہے تب ان عضلاتی ریشوں میں اختلاج شروع ہو جاتا ہے بیمار روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہے اور ہاتھ پاؤں اس کے بیٹھے جاتے ہیں اور عضلوں کے لاغر ہوجانے کے سبب سے مقام ماؤن پر ایک

محجیب ہی قسم کی پٹرونگی چھا جاتی ہے اور چونکہ دونوں جانب کے عضلین کی لاغری میں فرق ہوتا ہے اس واسطے جسم بیمار کا بد ڈول ہو جاتا ہے کیونکہ جن عضلین میں بیماری کمتر ہوتی ہے وہ انکو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جو اس مرض میں زیادہ تر متبلا ہو جاتا ہے اپنی جگہ بے حرکت پڑ جاتا ہے جس اکثر قائم رہتا ہے اور عضلات متاثرہ میں اس قسم کے چٹکے نہیں پیدا ہوتے جو بے رائے۔ سس۔ اے۔ تائس کی بیماری میں ہو کرتے ہیں۔ نگاہے نگاہے عضلات ٹائف میں دروہونے لگتا ہے اور نہایت مری معلوم ہوتی ہے۔ عقل اور ہوش دھواں میں کی سطح کا فرق نہیں پڑتا اور بیمار اڈاؤں کو تر میں تندہ رہتا ہے اناجب چبانے اور نگلنے کے عصبے اس بیماری میں متبلا ہو جاتے ہیں اور بیماری غذا کم ہو جاتی ہے تب البتہ صحت میں حرف آ جاتا ہے ۔

اس مرض کے بیمار اکثر دم بند ہو کر مرتے ہیں کیونکہ جب ڈایا۔ فرام اور سیلیون کے پیچ کے عصبے اس بیماری میں متبلا ہو جاتے ہیں تب سینہ کی حرکت کم ہو جاتی ہے اور اس حالت میں بلغم اگر زیادہ پیدا ہو تو نفل نہیں سکتا بلکہ ہوا کی نالیوں میں جمع ہو کر بیمار کا دم بند کر دیتا ہے ۔

انجام۔ مدت اس مرض کی نو مہینے سے پانچ یا چھ سال تک کی ہوتی ہے بہت کم بیمار کو شفا ملتی ہوتی ہے لیکن بہتوں میں مرض رک جاتا ہے۔ جب اس مرض میں سینہ یا شکم متبلا ہو جاتا ہے تب انجام اسکا بڑا ہوتا ہے لیکن جبکہ یہ بیماری اطراف میں محدود رہتی ہے تب امید اسکے رک جانے کی ہوتی ہے لیکن اکثر مریضیں مریاری کے ہلاک ہو جاتے ہیں ۔

اسباب۔ کئی جنس کے عضلات کی لاغری میں بچہ پوڑے اور جو ان سب ہی مبتلا ہو سکتے ہیں لیکن جب یہ مرض عام نہیں ہوتا ہے تو اکثر ۳۰ اور ۵۰ سال کی عمر کے افراد پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض میں مرد بہ نسبت عورت کے زیادہ تر متبلا ہونے میں

اور یہ بیماری بلاشبہ موروثی بھی ہے۔ سروی کا گھٹانا۔ بارش میں ہیگیٹا اور حوام مغز پر مدہ کا پہنچنا بھی اسباب اس مرض کے ہیں۔ آتشک اور زیادہ کام لینا عضلات سے شدید بخار اور سیسہ کا زہر۔

علاج۔ دوا اور غذا مقوی سے اس بیماری کا علاج کرنا چاہئے مثلاً قولا داور کاٹ۔ لیور۔ آئیل اور بعض ادویات اس مرض کو نایمٹریٹ اف سلور سے فائدہ پہنچتا ہے اور تا ربجلی ہی لگانا مفید بتاتے ہیں ۔

دھم مروں کا فالج

انگریزی میں اس بیماری کو اسٹریکٹو۔ ٹرنٹس پائٹس یا رائی ٹرنٹس پائٹس ہی کہتے ہیں لیکن یہ نام اس بیماری کا واسطے درست نہیں معلوم ہوتا کہ یہ مرض صرف انہیں لوگوں کو نہیں ہوتا ہے جنکا کام تحریر کا ہے بلکہ اس بیماری میں حرفت پیشہ ہی مبتلا ہو جاتے ہیں جیسے ہمارا اور لومار اور قوال اور موچی اور خطاط وغیرہ میں ۔

تقریفاً۔ اس بیماری کے اندر خاص عضلوں میں تشنج ہوتا ہے اور یہ تشنج اسی وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب مریض ان خاص عضلوں کو اپنی مدت کے عادی اور خوگر حرکتوں میں لانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن درحقیقت عضلات مذکور کی قدرت اس کے اختیار سے باہر ہو جاتے ہیں اس واسطے جب مریض ان سے اپنا معمولی کام لینا چاہتا ہے تو اس کے قابو میں نہیں رہتے ۔

سبب۔ اس بیماری کا معلوم نہیں۔ کہتے ہیں کہ کثرت محنت سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے لیکن تجربہ اس بات کو قبول نہیں کر سکتا مگر عضلات ماؤف سے زیادہ کام لینے سے اس بیماری کو ترقی ہوتی ہے ۔

علامات۔ اس بیماری کی علامتیں نہایت پوشیدہ طور پر ظاہر ہوتی ہیں پہلے

پہل سارے دن کی محنت کے بعد دہنٹے ہاتھ یا بازو یا کلائی یا انگلیوں کے عضلے صرف کچل جاتے ہیں اور بعد ساری رات کے آرام کی یہ بات رفع ہو جاتی ہے تھوڑے ہی عرصہ بعد ایسا ہوتا ہے کہ لکھنے والا لکھتے لکھتے ایک ٹھٹھری لکھ کر کینچ دبتا ہے۔ بعد ازاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ یا کلائی کے عضلوں میں تھوڑا بہت درد اور جلن محسوس ہوتی ہے لیکن یہ دونوں علامتیں بعد چند گھنٹہ کے آرام کے رفع ہو جاتی ہیں مگر چون چون بیماری بڑھتی جاتی ہے تکلیفیں بھی زیادہ ہوتی جاتی ہیں اور تب قلم پکڑتے ہی تشنچ شروع ہو جاتا ہے۔ انگوٹھا ہتھیلی کی طرف کچل جاتا ہے اور پہلی اور بیچ کی انگلی کچل کر سخت ہو جاتی ہیں۔

علاج۔ اسلئے تاکہ علاج کارگر ہو بیمار کو تحریر کے کام سے دست بردار ہونا چاہئے کیونکہ بغیر آرام کے کوئی بھی علاج فائدہ مند نہیں ہو سکتا اور بطور دوا کے ٹائی۔ پوٹاس فاسفٹ اف سوڈا ہمراہ سٹکٹو مایا فولاد کے دیونین ان سے اگر فائدہ ہوگا تو نقصان بھی ہوگا اور بعض دفعہ تار بجلی کے لگانے سے بھی اس بیمار کو فائدہ ہوتا ہے۔

یازوہم اس۔ کلے۔ روس

صرف چند سال ہوئے کہ محققین نے یہ دریافت کیا تھا کہ عصبی مرکزوں میں ایلینے (ماغ اور نخاع) میں یہ حالت اس۔ کلے۔ روسس کی پیدا ہو جاتی ہے مختلف بیماریوں میں عصبی مرکزوں کے مختلف حصوں میں یہ حالت پیدا ہوتی ہے۔

ماہیت۔ جب باغ اور نخاع کے عصبی اجزا بیکار کر برباد ہو جاتے ہیں اور انکی جگہ کسی اور قسم کے اجزا پیدا ہو جاتے ہیں تب اس حالت کو اسلوع میں اس۔ کلے روسس کہتے ہیں۔ نتیجہ اس حالت کا آخر کار یہ ہوتا ہے کہ اصلی عصبی مادہ بالکل منت مابود ہو جاتا ہے یہ حالت کیونکر پیدا ہوتی ہے بعض کی رائے اسباب میں یہ ہے کہ نتیجہ مزمن انفلامیشن کا ہے اور بعض کی رائے میں اس۔ کلے روسس کی حالت اسطورہ سے

پیدا ہوتی ہے کہ خاص عصبی مادہ اپنی اصلی حالت سے بگڑ کر تبدیل جاتا ہے اسکے رویہ
کی اکثر حالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ عصبی اجزاء کے ارد گرد جو کاربک - یٹو نے - شیو ہوتا ہے
وہ ان اجزاء کو گہیر کر دبا دالتا ہے جس سے اجزاء کو رد کر نہ سیتا بلکہ وہ ہوجاتی ہیں لیکن
وہ - کو - مو - ٹر - اٹ - ماک - سی کی بیماری میں خود عصبی ریشونیں اسکے - روسس شروع
ہو جاتا ہے ۔ اسکے - روسس کی حالت میں عصبی مادہ کا رنگ سُرمئی ہو جاتا ہے اور
وہ جگہ کی قدر کم تر ہو جاتی ہے اور تھوڑی بہت سخت ہی ہو جاتی ہے آخر کار بالکل سخت
ہو جاتی ہے پہلے پہل تو وہ جگہ کی قدر پھول جاتی ہے اور تھوڑے ہی عرصہ بعد سکڑ کر
چوٹی ہو جاتی ہے آخر کار رنگ اُس حصہ کا سفید مائل نیلگون یا میلنا مائل زرد مئی پٹا ہو گا پھر
وہ مادہ عصبی اپنے پایا - نے - رے کے حصہ کے ساتھ جڑ بھی جاتا ہے -

اسکے - روسس کی حالت میں باریک بینی تیز تر اس قسم کی پائی جاتی ہیں کہ ابتداً
عصبی مادہ میں چوڑے چوڑے کیسے پیدا ہو جاتے ہیں اور اُنکے گرد خون کی رگیں ہوتی
ہیں اور ان کیسوں کے مابین بھی ایک قسم کا مادہ ٹھوڑا بہت پیدا ہو جاتا ہے اور جز
ریشون سے کیسہ مذکور آپس میں جڑے رہتے ہیں زکاکٹ - یٹو نے - شیو ان کے ہی
وانے بڑھ کر اُپر آتے ہیں - یہ حالت کچھ عرصہ تک رہ کر عصبی مادہ سکڑ کر سخت ہونے لگتا
ہے تب کیسے سکڑ کر نہایت چوڑے ہو جاتے ہیں اور کیسوں کے مابین کا مادہ باریک باریک
ریشون کے طور پر بن جاتا ہے ۔ خون کی رگوں کی دیوار میں موٹی ہو جاتی ہیں جن سے انکا
منفذ تنگ ہو جاتا ہے یا بعض دفعہ پھیل ہی جاتا ہے آخر کار کاربک - یٹو نے - شیو
کے ہر دار ریشون کے گچھ دکھائی دینے لگتے ہیں لیکن بہت مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ
عصبی مادہ میں ابتداً کے اندر بہت ہی کم فیرواقع ہوتا ہے - جب مرض کچھ عرصہ کا ہو جاتا
ہے اور عصبی مادہ کے سفید حصہ میں اسکے - روسس کی حالت پیدا ہو جاتی ہے تب
عصبی ریشے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے لگتے ہیں اور انہیں سے اکثر ریشے لاغر بھی

ہو جائے تین۔ گو بعض بعض معمولی مقدار پر قائم رہتے ہیں بلکہ بعض ن ریشو نہیں سے بڑھ
 بھی جاتے ہیں مگر آخر الامر سبب اسکے کہ انکے اوپر کا غلاف زایل ہو جاتا ہے ریشے مذکور
 نہایت لاغر ہو جاتے ہیں لیکن بالکل نیست و نابود نہیں ہوتے یہی حالت عصبی مادہ کے
 مکرر منہی حصہ میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ مشاہدہ سے ایسا دیکھا گیا ہے کہ اسکے۔ روس
 کی حالت عصبی مادہ کے کسی خاص ٹکڑے یا کسی خاص مقام پر پیدا ہوتی ہے اور وہیں محدود
 رہتی ہے اور اسکے۔ روس کی انہی عصبی مادہ پر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے اس کا فعل ناقص ہو جاتا
 یا بالکل زایل ہو جاتا ہے ۛ

محققین نے چار قسم کے اسکے۔ روس کا بیان کیا ہے۔ ایک وہ جو دماغ میں پیدا
 ہوتا ہے اسکو اصطلاح میں ڈوی۔ فیوژڈ سٹی۔ ری۔ برل اسکے۔ روس
 کہتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو نخاع میں پیدا ہو جاتی ہے اسکو اسپائیٹل
 اسکے۔ روس کہتے ہیں۔ تیسری قسم کے اسکے۔ روس میں دماغ اور
 نخاع دونوں میں ہوتے ہیں یا دماغ کے یا نخاع کے کئی حصے میں ہوتے ہیں۔
 اسکو ٹرس۔ سے۔ نے۔ ٹریڈ یا ٹل۔ ٹے۔ پل اسکے۔ روس کہتے
 ہیں۔ چوتھی قسم اس بیماری کی وہ ہے جس میں زبان لب اور لے۔ رنگش
 کے اعصاب میں ہوتا ہے اس واسطے اس۔ کئے۔ روس میں اس قسم کو
 کلا۔ سے۔ لے۔ بیو۔ لے۔ ریجی۔ ال۔ پے۔ را۔ نے۔ سس بولتے ہیں ۛ

اسباب۔ پیری ٹیو۔ زنگ کا زائس بیماری کا عمر ہے چنانچہ
 قسم اول یعنی ڈوی۔ فیوژڈ سے۔ ری۔ برل مہبطی میں شروع ہوتی ہے ۛ
 قسم دوم یعنی اسپائیٹل اکثر ۲۵ سے ۵۰ یا ۵۵ سال کی عمر میں ہو جاتی ہے۔
 تیسری قسم ۲۰ اور ۴۵ سال کی عمر میں اکثر ہو جاتی ہے اور ۴۰ برس کے بعد بہت
 کم ۛ مردوں کو نسبت عورتوں کے یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے اور بعض دفعہ یہ مرض

موروثی بھی ہوتا ہے، اس بیماری کے کسائی ٹانگ کا زور یافتہ نہیں ہو سکتے۔ جب دماغ اسپین مبتلا ہوتا ہے تب اسکے کسی حصہ میں خون کے جمع ہو جانے سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اور سر پر چوڑا لگ جانے سے۔ شدید بخار سے خاص کر ٹائیفائیڈ، فائڈ اور اس کا ر۔ لے۔ لے۔ ٹائیفائیڈ، مائٹن، رور۔ مائٹن اور آتشک کے سبب سے شدت کے رنج و غم سے، بکثرت دماغی محنت سے، یا بکثرت جسمانی محنت سے ایسی نزل قہم کا اسکے۔ رو۔ سس اکثر نتیجہ نفع یا اسکے علاوہ کے انفلامیشن کا ہوتا ہے۔ پشت کی ہڈی پر چوڑا کے لگنے یا صدمہ کے پہنچنے سے۔ کثرت محنت۔ سردی اور رطوبت کے اثر سے۔ نفرس خنایر یا آتشک کے سبب سے۔ کثرت شراب خواری سے برا بھوکے رہنا۔ کثرت مجامعت۔

دوم اسپائی۔ نزل اسکے۔ رو۔ سس کے اقسام چار ہیں چنانچہ (الف) لو۔ کو۔ مو۔ ٹر، (ب) ٹانگ، (ج) ر۔ ب، (د) پرائی۔ مری لے۔ لے۔ رل اسکے۔ رو۔ سس (دفع) ایمو۔ ٹرو۔ ٹیکس لے۔ لے۔ رل اسکے۔ رو۔ سس، (ج) سے۔ کن۔ ٹوری لے۔ لے۔ رل اسکے۔ رو۔ سس، (د) مرض اسکے۔ رو۔ سس کی قسم اول دیکھئے

ٹومی۔ فیوزوڈ سے۔ رمی۔ برن اسکے۔ رو۔ سس

ڈاکٹر ہے۔ منڈا اس بیماری کی ایک قسم ایسی بیان کرتے ہیں جس میں دماغ کے کسی لوب کا کوئی بڑا حصہ یا سارا لوب مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بعضہ نفع دماغ کی ایک جانب کا سارا ہے۔ مرن۔ فیار بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن دماغ کی بیڑنی سطح پر یہ مرض کم نمایاں ہوتا ہے اور دماغ کے مرنی رنگ کے مادہ میں کہیں نہیں ہوتا۔

علامات جب یہ بیماری عہد طفلی میں ہو جاتی ہے تب دماغ کے کل انزال کامل

طور پر نہیں پیدا ہوتے اور جب زیادہ عمر میں ہو جاتی ہے تب افعال مذکور بگڑ جاتے ہیں۔ مریض بات چیت کرنا نہیں چاہتا یا ٹوٹی بھٹی باتیں کرتا ہے اور جب بلوغت کے بعد یہ مرض پیدا ہوتا ہے تب بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس بیماری کے ساتھ گاہے تھوڑا کما ہے بہت ہے۔ بے۔ پلجیا بھی ہو جاتا ہے اور ماؤف جانب کے ہاتھ پاؤں بڑھنے سے رہ جاتے ہیں بلکہ سیکڑ کر کسی جانب کو مڑ جاتے ہیں اور ان کے حس میں بھی فرق پڑ جاسکتا ہے۔ جو اس قسم میں سے ایک دو حس بھی یا تو ضعیف ہو جاتے یا بالکل زایل ہو جاتے ہیں۔ اس مرض کے اکثر بیمار پیرائش ہی سے سادہ لوح (ای۔ ڈی۔ اٹ) پیدا ہوتے ہیں۔ انکی عادتیں نہایت گندی ہوتی ہیں اور انکا بول ویزا بے معلوم خطا ہو جاتا ہے۔ اسکے۔ روسنس کی بیماری کے انما میں صرغ کی نوبتیں بھی اکثر ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بیماری اکثر مزمن ہوتی ہے اور اس کے مریض اکثر عمر تک زندہ رہتے ہیں۔

۲۔ مرض اسپائیٹل اسکے۔ روسنس کے قسم اول

لو۔ کو۔ مو۔ ٹر اٹاک۔ سی

ماہیت۔ اسکے۔ روسنس کی قسم سبب میں اکثر دیکھنے میں آتی ہے۔ اکثر طبیب سبب اس بیماری کا آشک بتلاتے ہیں مگر اس امر کا ہنوز فیصلہ نہیں ہوا۔ اس بیماری کے شروع ہونے کا یہ قاعدہ ہے کہ یہ مرض نخاع کی پشت کے نیچے کے اور کمر کے حصہ سے شروع ہو کر جون جون اوپر چڑھتی جاتی ہے کم ہوتی جاتی ہے مگر نخاع کے سارے پچیلے کالم کو مبتلا کر لیتی ہے۔

لو۔ کو۔ مو۔ ٹر اٹاک۔ سی کی بیماری میں نخاع کا یہ حال ہوتا ہے کہ سامنے اور پیچھے کچا بنے چھٹا ہو جاتا ہے اور اسکے پچیلے کالم اور اعصاب کی جڑیں لاغر ہو کر

سکڑ جاتی ہیں۔ نخاع کے غلاف موٹے ہو کر نخاع کی پچھلی طرف اکثر جڑ جاتے ہیں۔ چھری سے تراشنے سے نخاع کا پھیلا کا لم سخت اور سیدھ رشتہ اف اور سر منی رنگ کا نظر آتا ہے۔

علامات - یہ بیماری اکثر پوشیدہ طور پر ظاہر ہو کر عرصہ تک جاری رہتی ہے لیکن شاؤدنا در ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسکی بیماری مسلمانین یا تو وقتاً یا جلد ظاہر ہو پڑتی ہیں۔

علامات مندرہ - تھوڑی سی محنت کے بعد دونوں ٹانگین اور جسم کا حصہ اسفل بہت تھکا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ناتھ پاؤں اور جوڑ وغینہ کا ہے گا ہے درد معلوم ہوتا ہے جس سے گمانِ دفع مفصل کا ہو سکتا ہے نیز۔ رل۔ جیا کی قسم کے درد وقتاً پیدا ہو کر تھوڑے ہی عرصہ بعد رفع ہو جاتے ہیں یہ درد کبھی تو بیٹون کی طرح کبھی کبھی دینے یا کاٹ دینے کا سہا یا بجلی کے صدمہ کے طور پر معلوم ہوتا ہے۔ بعض دفعہ سینہ اور کبھی ٹانگوں میں ایک ایسا درد پیدا ہو جاتا ہے کہ جیسا سخت بندھن کے باندھنے سے ہو کر رہتا ہے۔ بعض دفعہ قوتِ لامسہ اسقدر تیز ہو جاتی ہے کہ جلد کو چومتے ہی شدت کا درد معلوم ہوتا ہے اور کبھی چیونٹیاں رینگتی سی۔ سوئیاں جھتی سی اور کبھی سردی گمی کبھی جھٹا اور کبھی گد گدی اور کبھی کچھلی ہونے لگتی ہیں مگر بعض دفعہ جھکیان لیجئے تو وہ مقام سُن محسوس ہوتا ہے کسی قسم کا درد نہیں ہوتا وہ درد جو بجلی کے صدمہ کا سا پیدا ہوتا ہے کسی خاص عصب کی بالائی شاخو عین نہیں ہوتا بلکہ جسم کے گہرے حصو عین ہوتا ہے۔ جب نخاع کی گردن کے حصہ کے پچھلے اور باہر کے کالمون میں مرض ہو جاتا ہے تب وہ درد بازو سے شروع ہو کر سر کی طرف پھیل جاتا ہے۔ لامسہ کی تیزی نویت بہت پیدا ہو کر کبھی ایک جگہ کبھی دوسری پر ہوتی رہتی ہے۔

اس بیماری میں اندرونی اعضا میں بھی درد پیدا ہوتے ہیں مثلاً مثانہ میں نائزہ میں

یا مستقیم میں اور خاص کر معده میں اس شدت کا درد ہوتا ہے کہ مٹین اسکی گشت اور شکم کے چاروں طرف بلکہ اوڑ اور جانب کو بھی پھیل جاتے ہیں اور ساتھ اس درد کے تھے ہوتی ہے اور دیگر علامات بدضمی کی بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ بیمار کو غش آجاتا ہے دل کی حرکت نہیں فرق پڑ جاتا ہے مگر عیسائیتین بہ نسبت مردوں کے عورتوں ہی میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ حرکت یا حس کے اعصاب میں استرخا ہو جاتا ہے جو بعض دفعہ تھوڑے عرصہ تک اور کبھی ہمیشہ کے لئے قائم رہتا ہے اور کبھی پیدا ہو کر رفع ہو جاتا اور پھر ہو جاتا ہے *۔

لو کہ۔ مو۔ ٹر اٹاک۔ سی کے عین شروع ہی سے پے۔ ٹے۔ لمہ۔ رمی۔ فلکس کی حرکت جاتی رہتی لیکن ہر مریض میں یہ بات نہیں پائی جاتی سو۔ پر۔ فی شیکل رمی۔ فلکس حرکتوں میں اختلاف ہے لیکن ایسا کہتے ہیں کہ پلان۔ ٹر۔ رمی۔ فلکس حرکت ابتدا میں کم ہو جاتی ہے اور بعد میں بالکل مفقود ہو جاتی ہے *۔ اس بیماری کے اندر بصارت اور سماعت میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ بعض دفعہ بصارت دھندلی اور بعض دفعہ بیمار بالکل اندھا ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کی رنگت پہچان نہیں سکتا۔ کبھی ایک چیز کو دیکھتا ہے۔ گاہے احوال ہو جاتا ہے اور کبھی اوپر کا بعض مصلح ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی نسبت اس بیماری میں ایک بات یہ بڑی بیماری پائی جاتی ہے کہ پتلیاں آنکھوں کی سکر جاتی ہیں۔ گاہے گاہے بیمار بالکل ہیرا ہو جاتا ہے *۔ پہلے پہل تو طاقت مجامعت بہت زیادہ ہو جاتی ہے رفتہ رفتہ خون جو مرض بڑھتا جاتا ہے طاقت مذکور بالکل جاتی رہتی ہے منی اکثر خارج ہوتی رہتی ہے *۔ اس مرض کے ابتدا میں شانہ کے اندر ایسی خوراک رہتی ہے کہ پیشاب جلد جلد اور نہایت تکلیف سے آتا ہے اور بعض دفعہ پیشاب بند ہی ہو جاتا ہے۔ قبض اکثر رہتا ہے *۔

جب لوگوں کو موٹر اسٹاک سی کی بیماری کا مل طور پہنچا جاتی ہے تب ٹانگیں کے عضلے معمولی طور پر حرکت نہیں کر سکتے اور عضلوں کے حس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے پہلے پہل بیمار کی ٹانگیں بے قابو ہو جاتی ہیں اور معمولی طور پر قدم نہیں بڑھا سکتا بلکہ کبھی دھیر دھیر اُدھر لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے۔ یہ بات خاصکر اندھیرے میں یا جب آنکھیں بند کر کے چلتا ہے تب معلوم ہوتی ہے اور تاکہ اچھے طور پر چل سکے مریض کو اپنی ٹانگوں پر خاص توجہ کرنی پڑتی ہے۔ ٹانگیں مریض کے بے قابو ہو جاتی ہیں جس سے بے لگتا قدم ایسا بہرنے لگتا ہے کہ گرتے گرتے پیچ جاتا ہے۔ چلتے وقت پاؤں کو ضرورت سے زیادہ اونچا کر لیتا اور تپ سانبے اور باہر کی طرف دھب سے رکھ دیتا ہے اور زنتا جب گھومنے لگتا ہے تب لڑکھڑاتا لگتا یا گر پڑتا ہے۔ یہ باتیں تب ہی ہوتی ہیں کہ جب کھڑے رہنے کی حالت میں آنکھیں بند کر لیتا ہے اکثر لاٹھی کے سہارے چلتا ہے اور اپنے پاؤں پر یا اپنے سامنے زمین کی طرف نظر کو قائم رکھ کر چلتا ہے اور آہستہ آہستہ اور کوشش کر کے قدم با قدم برابر چلا جاتا ہے۔ جب اس بیماری کے ساتھ کوئی اور مرض نہیں ہوتا ہے تب سیدھا چلا جاتا ہے رفتاریہ وقت چونکہ مریض سہم سہم کے چلتا ہے تو اس خوف کے سبب اور دل کے دیگر حالات کے باعث بھی قدم زیادہ بے قاعدہ بہرنے لگتا ہو۔

یہ بات قابل یاد رکھنے کے ہے کہ اس بیماری میں ٹانگیں مقلع نہیں ہوتیں بلکہ بیمار کے لیٹے رہنے کی حالت میں ٹانگوں کو حرکت دینا کہیں نہ ہر طرف آسانی سے حرکت دے سکتا ہے اور بعض دفعہ ٹانگوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ آخر کار بیمار چلنے پہرنے سے رہ جاتا ہے کیونکہ جب چلنے کی کوشش کرتا ہے تو ٹانگیں بالکل کہنا نہیں مانتیں کبھی اُدھر اُدھر لڑکھڑانے لگتی ہیں۔ ٹانگوں کے عضلے متوالا سفر ہو جاتے اور انکی طاقت میں کسی طرح کا فرق پڑتا ہے جس میں اکثر فرق

نہ جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں میں درد برابر ہوتا رہتا ہے۔ پاؤں میں جھٹاٹ رہتی ہے
 اور سنسن ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کالسل یا گڑبڑ جاتا ہے کہ بیتا کو زمین محسوس
 نہیں ہوتی بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں پاؤں ریت یا روٹی پر دھرے ہوئے
 ہیں اور بعض دفعہ پاؤں کے مختلف حصے ایسے شل ہو جاتے ہیں کہ بجز گرمی یا سردی کے
 کسی اور چیز کی تحریک محسوس نہیں ہوتی۔ عضلات کالسل بھی تھوڑا بہت کم یا بالکل
 جاتا رہتا ہے۔ چنانچہ لیٹے رہنے کی حالت میں اگر نظر کو کام میں نہ لاوے تو بیسار یہ
 نہیں کہہ سکتا کہ انگلیں اس کی کہہ رہیں اور کہان ہیں۔ بجلی کا اثر بھی ان عضلوں میں
 محسوس نہیں ہوتا جن میں لمس نہ ہو۔ کو۔ کو۔ مو۔ ٹر ہٹاک۔ سی کی اکثر حالتوں میں جلد
 یا کچھ حصہ بس اطراف اعلیٰ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انگلیاں سنسن ہو جاتی ہیں یہ
 بات پہلے پہل خاصہ تیسری اور چوتھی انگلیوں سے شروع ہو کر ہاتھ اور کلائی تک پہنچ
 جاتی ہے انگلیاں اور ہاتھ اور بازو ایسے بے شکے حرکت کرنے لگتے ہیں کہ بیٹا ہٹیک
 طور پر کوئی کام ان ہاتھوں سے نہیں کر سکتا۔ آنکھوں کو بند کر لے تو یہ بھی نہیں
 کہہ سکتا کہ ہاتھ اس کے کفہ راوہ کس طرف کو حرکت کر رہے ہیں۔ ان ہاتھوں سے
 کچھ کام کرنا بھی چاہتا ہے تو جھٹکا کہا جاتے ہیں۔ بعض دفعہ سر۔ گردن اور سینہ کے
 عضلے بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بات کہنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ
 مختلف دماغی اعصاب بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جاسکتے ہیں اس واسطے نگلنا اور دم
 لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ جب بیماری زیادہ شدید ہو جاتی ہے تب سر۔ پشت۔ سینہ
 اور اطراف میں ایک درد شدہ برابر ہوتا رہتا ہے۔ بول و برازیاتور رک جاسکتا یا بے
 معلوم خطا ہو جاتا ہے۔ قوت باہ بالکل جاتی رہتی ہے۔ گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ خراج
 کے بغلی کالم اور سامنے کے کار۔ نوامین اسکے۔ روئش ہو جانے کے سبب عضلات
 لاغر ہو جاتے اور کچھ کھسک جاتے ہیں اور بڑے سوری بھی پیدا ہو جاسکتے ہیں۔

عارضات - اس بیماری کے انما میں وہ امراض بھی پیدا ہو جاسکتے ہیں جو جسم کی پرورش سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً خالصک بیماری کی شدت کے وقت جلد پر بشواری پیدا ہو جاتے ہیں اور جہان جہان بجلی کے مدد سے کا سادہ ہوتا ہے جبکہ اگر اوپر کیا گیا ہو وہ ان کے اعصاب کی نکل حد و تک بشواریات نکل کر پھیل پڑتے ہیں۔ چنانچہ جلد ہی بیماریوں میں سے یہ بیماریاں اکثر پیدا ہوتی ہیں۔ لائے۔ کرنہ۔ ار۔ لے۔ کے۔ ریا۔ ہر۔ ہر۔ زاس۔ ٹ۔ اکن۔ تھے۔ ما۔ ام۔ پے۔ نامی۔ گرو۔ اری۔ تھے۔ مانو۔ ڈو۔ زم۔ جب ٹانگیں پہلے پہل بے قابو ہونے لگتی ہیں تو اسیر علامت کے شروع ہی سے جسم کو بھی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں مثلاً گھٹنے گھٹنے یا کندھے مرض میں اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی ان کے اندر رطوبت پیدا ہو کر جوڑ کی ہڈیوں کی دونوں سطحیں جلد گھٹنے لگتی ہیں اور بعض دفعہ جوڑا کھڑا ہی جاتا ہے۔ اور ہڈیاں بھی ایسی کمزور ہو جاتی ہیں کہ خود بخود لوٹ جاسکتی ہیں مگر تو ان جوڑوں اور ٹانگوں میں کسی قسم کا درد ہوتا ہے مگر ان بیماری کے ذیل میں فرق آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر برنارڈ ایسا قیاس کرتے ہیں کہ یہ بائیں۔ ڈیو۔ لا۔ ای۔ لائے۔ کے مبتلا ہو جانے سے پیدا ہوتی ہیں۔

انجام۔ اکثر یہ بیماری نہایت مزمن ہو جاتی ہے اور برسوں بعد کامل طور پر پیدا ہو جاتی ہے۔ علاج عین ابتدائے میں کیا جاوے تو دوراں کاڑک جاسکتا ہے۔ بلکہ غمکو تخفیف یا شفا بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ لو۔ کو۔ مو۔ ٹانگ۔ سی کی بیماری روز بروز بدتر ہوتی جاتی ہے۔ ہوش و حواس میں فرق نہیں پڑتا بعض مہینوں کی نو بہتیں بھی ہو جایا کرتی ہیں اور گاہے گاہے کہا نسی دبا لگاتی ہیں بھی سنا ہے۔ مرض کے سبب کم بلکہ عرض کے سبب اکثر پیدا ہونے میں مثلاً لگنے یا دم لینے کی تکلیف سے اور کہا نسی سے۔ گرو۔ یا مثلاً نہ کی بیماری سے

یا بڑے سور کے سبب بیمار مرنے کا ہے ۔

علاج - بہت کم کوئی ایسا طریقہ علاج کا دریافت نہیں ہوا جس سے یہ بیماری مٹنے ہو سکے مگر تجربہ سے علاج ذیل مفید پایا گیا ہے - بروقت اگر کیا جاوے تو اس علاج سے اسکے - رورسٹس کی بیماریاں ترک جاسکتی ہیں وہ علاج یہ ہے کہ ان بیماریوں میں کسی ترکیب سے خون نہ لینا چاہئے - درو کے موقوف کرنے کے واسطے ہلا - ڈونا اور تارین فائدہ مند ہیں چنانچہ ایسا ہاؤن برابر انہیں سے کیسا استعمال کریں اور دُن دوا کی مقدار کو رفتہ رفتہ بڑھاتے جاوے بعض طبیب نائٹریٹ آف سلور کی بڑی تعریف کرتے ہیں - اسکے - رورسٹس کی بیماریوں کے علاج میں مریض کی طاقت کا فروغ خیال رکھیں کہ وہ کم طاقت نہ ہونے پاوے ۔

اسپائی نزل اسکے - رورسٹس کے متعلق اور جو بیماریاں ہیں جنکے نام اس مضمون کے ابتدا میں اوپر بتائی گئی ہیں وہ چونکہ مطب میں بہت کم دیکھی جاتی ہیں اس واسطے انکے بیان کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا ۔

یازوم ٹرے - مرمریو - ری - الیس

علامات - اس مرض کے ابتدائیں دونوں ہتھ کمر ہو جاتے ہیں اور وہ کمر کی رفتہ رفتہ بڑھتی جاتی ہے اور ساتھ ہی اسکے بیمار کے ہتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں یہی حالت دونوں انگلیوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے آخر کار سارا بدن کانپنے لگتا ہے یہ لرزہ حرکت کی وقت شروع ہوتا ہے اور آرام کے وقت موقوف - بیمار چلتا کیا ہے گویا ناچتا جاتا ہے - کسی چیز کو بکڑے نہیں سکتا یا تین جلد جلد اور ٹوٹی ہوئی ڈکرتا ہے اور جب یہ بیماری سخت ہوتی ہے تب چہرہ کا ہنسنے جاتا مریض اگر اپنے پیشے سے دست بردار نہ ہو تو کمال بے چینی بے خوابی اور ہڈیاں ہونے لگتا ہے بعض اوقات منہ بھی

آجائے رفته رفته مریض کمزور ہو جاتا۔ سخی متلاتا۔ ہوک مرجاتی۔ جلد خشک در زبان
میلی ہو جاتی ہے +

اسباب۔ سیاب کی کان میں کام کرنا کسی اذہ طور سے ذرات سیاب کے جسم کے
اندر ہریت کر جانا +

علاج۔ مریض کو اپنے پیشہ سے دست بردار ہونا چاہئے اور مرکبات فولاد یا ایوڈائیڈ
اف پوٹاشیم کا استعمال کرین اور غذا متویں +

سینروہم لڈ۔ پال سی

ماہیت۔ اس بیماری میں سینہ کے ذرات جسم کے اندر سرایت کر جاتے ہیں اور بیمار کو
قبض اور قولنج کا درد ہوتا ہے جس مرض کو اصطلاح میں لڈ۔ کا۔ ایک بولتے ہیں اور ہاتھ
پاؤں کے عضلوں میں فالج ہی ہو سکتا ہے آخر کار سوتے زخمی ہو جاتے ہیں اور گٹھے
کناروں پر ایک نیلی کبیر بڑھ جاتی ہے +

علامات۔ قبل از پیدا ہونے فالج کے ہاتھوں میں درد اور بیمار کو کٹی مرتبہ قولنج
ہو جاتا ہے + پہلے ہاتھ اور بازو کے اعصاب اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں پھر دھنوں
ہاتھ اور انگلیوں کے انکس۔ ٹن۔ سر مسلسل مفلوج ہو جاتے ہیں اور جب بیمار اپنے بازوؤں
کو دماز کرتا ہے اسوقت ہاتھ اسکے ٹک پڑتے ہیں +

علاج۔ مریض کو ایوڈائیڈ اف پوٹاشیم کھلا دین اور گندہ مک کا ہیا مادیون اور
مقام مفلوج پرتا بجلی لگا دین اور کچلے کا جو ہر ہی اس مرض کو بہت فائدہ کرتا ہے لیکن ہر صورت
بیمار کو اپنے پیشہ سے ضرور دست بردار ہونا چاہئے +

چہاروہم پے۔ را۔ لے۔ س۔ اچی۔ ٹانس

علامات۔ ابتدا میں مریض کے ہاتھ اور بازو کمزور ہو کر کانپنے لگتے ہیں اور بعض دفعہ

یہ مرض سر سے شروع ہو کر سارے بدن میں پھیلتا ہے اس وقت مریض ایک سخت کانپتا رہتا ہے جب قصہ چلنے پر نہ کھڑا ہوگا تو اس وقت اپنے پاؤں کی ایڑیوں کو اٹھا کر انگلیوں کے بل بے بس ہو کر ایسا دوڑنے لگتا ہے کہ گویا ہر قدم پر نہ کے بل گر پڑے گا اور جب یہ بیماری زیادہ تر شدید ہو جاتی ہے تب سوتے وقت بھی مریض کانپتا ہے بیمار اپنے منہ میں نوالہ داخل نہیں کر سکتا اور چہانہ اور نگلیا ہی تھمت سے ہوتا ہے۔ اور خواب میں بھی مریض کا بدن حرکت کرتا رہتا ہے جس سے نیند حرام ہو جاتی ہے رشتہ رفتہ حرکت نہایت تیز ہو جاتی ہے جسم سامنے کو اور ٹھوڑی سینہ کی ٹہنی پر جبک جاتی ہے طاقت گھٹتا رہتا تو کم یا بالکل جاتی رہتی بول و براہ یہ معلوم نکل جاتا ہے تب حالت یہ ہوشی اور ہدیائیں میں مریض اس دماغانی سے بچ کر جاتا ہے ۛ

اسباب - پیری - ڈسپو - زنک - کانہ بڑھنا یا اور یہ بیماری مردوں کی اکثر ہوا کرتی ہے ۛ
 اسکا ٹیکس کار کثرت محنت - روحانی یا جسمانی سروری اور روح مفاصل کی بیماری ۛ
علاج - مرض کے شروع میں کوئی نام اور ہن - بن کا استعمال کریں اور اخیر درجوں میں کبالت نوالہ اور تاجلی مفید پڑتی ہے ۛ

پانزدہم فیشیا اور افی - میا اور ام - نے شیا

بیمار کی قوت ناطقہ میں فرق پڑ جانا اور نوشت و خواند میں خلل واقع ہونا ایسی حالتیں ہیں جنکی تحقیقات ابطال میں نہایت شد و مد سے ہو رہی ہے ۛ علاوہ تو تاپن کے اس مرض کے اسباب کی دو اور جماعتیں ہیں جن سے قوت ناطقہ میں فرق آ جاتا ہے مگر اب وہ ہے کہ وہ اسباب متواتر نہ - شیا اور نہ افی - میا اور نہ ام - نے شیا کی حالت پیدا کرنے میں موثر ہوتے ہیں مثلاً ایک جماعت تو وہ ہے جس سے سادہ لوح تولیدی (ای ڈی اے) پیدا ہوتے ہیں کہ جس میں عقل اور ہوش پیدائش سے زایل ہو جاتا ہے اور اس سبب سے

بیمار نکم ہنہیں کر سکتا ۔ دوسری جماعت کے سبب جن سے مریض نکم ہنہیں کر سکتا وہ یہ ہیں جیسے زبان لبہاں اور تالو کے مفلج ہو جانے سے بیمار گفتگو ہنہیں کر سکتا مگر عقل اور ہوش میں کسی طرح کا فرق ہنہیں پڑتا ۔ عرض ایتے ۔ شیا اور ایتے ۔ میا اور ام ۔ نے ۔ شیا کی حالتیں زالی ہیں لہذا پیدا ہونا ان دونوں جماعتوں کے اسباب میں سے کسی سبب سے تعلق ہنہیں رکھتا ۔

ایتے ۔ شیا کی حالت میں اگرچہ قیام ہے کہ دماغی افعال میں تہوڑی بہت خرابی ضرور پیدا ہو جاتی ہے مگر اس قدر ہنہیں کہ جس سبب بیمار اپنے مطالب کو تحریر یا تقریر کے ذریعہ ظاہر نہ کر سکے بلکہ ایتے ۔ شیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بیمار کو الفاظ یاد ہنہیں ہتے انکو بھول جاتا ہے جس سبب سے دلی مطالب بھی ظاہر ہنہیں کر سکتا یا ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ تو یاد رہتے ہیں اور انکے معنی بھی ۔ مگر تحریر یا تقریر کے وقت ان لفظوں کو اسطور پر ترتیب ہنہیں کر سکتا جس سے کچھ معنی نکلیں اور جو کچھ کہنا یا کہنا چاہتا ہے وہ ظاہر ہو جائے ۔ لفظ ایتے ۔ شیا کے معنی اگرچہ قوتہ ناطقہ میں فرق پڑنے کے ہیں لیکن حال کے اطباء اس لفظ کے معنی میں ایتے ۔ میا اور ام ۔ نے ۔ شیا بھی شامل کرتے ہیں جبکہ مفصل معنی ذیل میں بتائے جائینگے ۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ایتے ۔ شیا کے کل اقسام میں صوت یعنی آواز کے پیدا کرنے کی طاقت تہوڑی بہت رہتی ہے ۔

ماہیت ۔ ایتے ۔ شیا کے مختلف صورتیں دہنی طرف کے ہے ۔ مے ۔ پلجیا میں اکثر پائی جاتی ہیں اور سے ۔ رمی ۔ برم کے بائیں نصف کی خرابی سے پیدا ہوتی ہیں اس خرابی میں سے ۔ رمی ۔ برم کا وہ مقام بھی بتا ہوتا ہے جسکو بائیں ٹل سے ۔ رمی ۔ برل اور ڈیج خون پہنچتا ہے ۔ خرابی مذکورہ ہوتی ہے جسکو اصطلاح میں ام ۔ بو ۔ لے ۔ زم بولتے ہیں یعنی شریان مذکور میں سست سے پیدا ہو جاتے ہیں ۔ اکثر اطباء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دماغ کی پیشانی کے حصہ کی بائیں جانب کا تیسرا خصل یعنی گن ۔ وا ۔ لیوشن میں قوتہ ناطقہ کی

ہوتی ہے۔ پس جب نطق میں کسی قسم کا نقص پیدا ہوتا ہے تب اس خلل کی خاصکر
 پچھلی تہائی مرض میں مبتلا ہوتی ہے اور جب اس حصہ دماغ کے دونوں جانب مرض میں
 مبتلا ہو جاتی ہیں تب ساتھ اپنے۔ شیا کے طاقت گھٹا رہی جاتی رہتی ہے اور
 اپنے۔ شیا کی وہ قسم جسکو اصطلاح میں اپنے۔ میا کہتے ہیں اور جس میں بیماریات حیت بالکل
 کر ہی نہیں سکتا دماغ کے اس حصہ کی خرابی میں پیدا ہوتی ہے جو یا تو خاص کار۔ پس
 اس۔ ٹرائی۔ ٹم میں واقع ہے یا اسکے نیچے کیونکہ ایسا قیاس کرتے ہیں کہ دماغ کے اسی حصہ
 میں تکلم کے پیدا کرنے کی حرکتیں موجود ہیں اور اسی مقام سے وہ حرکتیں تکلم کے عضلات
 کو حرکت دیتے ہیں۔

علامات۔ اپنے۔ شیا کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ پس سلامتوں کے بیان
 کرنے سے پہلے مختصر ذکر اٹکا کر ماضی ہے۔ پس واقع ہو کہ لفظ اپنے۔ میا کا اس صورت
 میں بولا جاتا ہے کہ جب بیمار کی گفتگو کی طاقت بالکل جاتی رہتی ہے اس میں مریض کہہ
 لیتا ہے اور عقل اور ہوش جو اس بھی اسکے قائم رہتے ہیں مگر بول نہیں سکتا اس صورت میں
 تکلم کے عضلات بھی مصلح نہیں ہوتے کیونکہ بجز تکلم کے اور باتوں کے لئے مریض ان
 عضلات کو حرکت میں لا سکتا ہے۔ مرگی اور ایو۔ پکسی کی نوبت کے بعد اپنے۔ میا
 کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔

ایک اور صورت اپنے۔ شیا کی وہ ہے جسکو اصطلاح میں ام۔ نے شیا کہتے ہیں اس میں
 ایسا ہوتا ہے کہ مریض لفظوں کو بلکہ فقرہ کو بھی بھول جاتا ہے اور عقل ماری جاتی ہے
 مگر بعض دفعہ یہ حالت اس وقت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب عقل سالم رہتی ہے اور جو
 کچھ کہا جاوے مریض سمجھ بھی سکتا ہے۔ ام۔ نے شیا کی حالت میں بات حیت اور
 کہنے پڑنے میں فرق آ جاتا ہے چنانچہ بات حیت کی نسبت ایسا ہوتا ہے کہ ایک یا دو
 باتیں یا چند ایسے فقرے مریض بار بار منہ سے نکالتا ہے کہ جو بخوبی سمجھ میں نہیں آتے۔

اور ان فقر و غنیمتیں ایسے ہی الفاظ ہوتے ہیں کہ جو بالکل بے معنی اور بے مطلب ہوں اشیاء اور لوگوں کے نام غلط لیتا ہے اور حرفوں کے نام بھول جاتا ہے اور دم فقر و لغت فقہ ایسا بھی کرتا ہے کہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا بول دیتا ہے اور لکھتے وقت صحیح حرف کی جگہ غلط حرف لکھ دیتا ہے۔ اس قسم کی غلطیاں پڑھتے وقت اکثر کر دیتا ہے مگر بعض دفعہ بار بار پڑھتے وقت تو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں مگر مابعض کوئی فقرہ لکھنے کہتے تو لکھا نہیں جاتا علاوہ ازیں تحریر کا یہ حال بھی ہو جاتا ہے کہ بشرطیکہ دہنی جانب کا ہے۔ مے۔ پلیجا ہنکیتا سے تو نقل کر سکتا ہے مگر کوئی مضمون خود آپ بنا کر صحیح طور پر لکھ نہیں سکتا اور نہ کسی اور کے بتائے ہوئے مضمون کو صحیح طور پر تحریر کر سکتا ہے۔ اور جو لکھ سکتے ہیں گاہی گاہی بے معنی بھی لکھ سکتے ہیں مگر اکثر بے معنی ہی لکھ لکھ دیتے ہیں۔ چہی ہوئی کتاب سے نقل کرنے کے ہیں مگر متوجہ و بچان سکتے ہیں اور نہ لفظوں کے معنی بتا سکتے ہیں۔ ان حالتوں کا علاج ان بیماریوں پر موقوف ہے جنکے شامل یہ پیدا ہوتی ہیں +

شانزدہم اے۔ لپ۔ سی

تعریف۔ اس بیماری کو عربی میں صبح اور ہندی میں مرگی کہتے ہیں اسمیں ایسا ہوتا ہے کہ مریض دفعتاً چیخ مار کر بیہوش ہو جاتا ہے اور گر کر ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے۔ **علامات**۔ یا تو بیمار اس مرض میں دفعتاً مبتلا ہو جاتا ہے یا تھوڑے عرصہ کے لئے اُسکو خبر ہو جاتی ہے کہ اب نوبت آئیوالی ہے اور تب بیہوش اور بے طاقت ہو جاتا ہے کھڑا ہو تو دفعتاً زور سے چیخ مار کر زمین پر گر پڑتا ہے اور ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے۔ چہرہ خوفناک ہو جاتا ہے۔ تیز ری چڑھ جاتی ہے۔ آنکھیں تپڑانے لگتی ہیں۔ یا سیاہی آنکھی اوپر کے پوٹوں کے اندر آ جاتی ہے اور سفیدی نظر آتی ہے تیلیاں پہیلی رہتی ہیں اور آنہروں میں دشمنی کا اثر نہیں ہوتا۔ مہشیاں سخت بندھ جاتی ہیں۔ دم

شکل سے لیا جاتا ہے۔ تلب شدت سے دھڑکتا ہے۔ سر کی رگیں خون سے پُر ہوجاتی ہیں اور چہرہ نیکون ہوجاتا ہے۔ منہ سے کف جاری ہوتا ہے اور وہ اکثر خون آمیز ہوتا ہے۔ دانتی لگ جاتی ہے دانتوں کے درمیان لب یا زبان آجھوسے تو وہ زخمی ہوجاتی ہے۔ بول دہرازا یا منی نکل پڑتی ہے اور قیض کو اکثر خیرش ہوتی ہے چند منٹ تک یہ نوبت رہ کر موقوف ہوجاتی ہے اسوقت مریض بے حرکت اور بیہوش ہو کر ایسا پڑا رہتا ہے کہ گویا نہایت خواب میں ہے۔ یہ حالت رفتہ رفتہ گزر جاتی ہے۔ بعض دفعہ کئی گھنٹہ تک نوبتیں پے درپے ہوتی رہتی ہیں۔ مرض کے اس مہتم کو گران سال (یعنی بڑی بیماری) کہتے ہیں اور جب نوبت اس بیماری کی خفیف ہوتی ہے تب اسکو پے۔ لے۔ مال (یعنی چوٹی بیماری) بولتے ہیں چنانچہ اسکی علامتیں یہ ہیں کہ تھوڑے عرصہ کے لئے بیمار کا سر گھومنے لگتا ہے اور وہ بیہوش ہوجاتا ہے۔

علامات مندر ۵۔ بعض دفعہ نوبت کے ظاہر ہونے سے پیشتر چند علامات مندر ۴ ظاہر ہوتی ہیں مثلاً کسی بیمار کو نوبت کے شروع ہونے سے پہلے درد سر ہوتا ہے یا کمزوری ہوجاتی ہے کیسکو مختلف رنگ کے دائرے نظر آتے ہیں یا چنگاریاں اڑتی سی دکھائی دیتی ہیں اور گاہے گاہے سکین بھی نظر آتی ہیں اور بعض مریضوں کے کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور کسی کے ناک میں بدبو معلوم ہوتی ہے اور کیسکی زبان کا ذائقہ نوبت سے پیشتر تلخ ہوجاتا ہے اور بعض دفعہ نوبت سے پہلے مریض کچھ طور پر نیند نہیں آتی یا بعض دفعہ طبیعت خواہ نخواہ خوف کہا جاتی ہے یا دل دھڑکنے لگتا ہے یا مفصل سرد ہوجاتے ہیں یا فم معدہ کا مقام پھر کئے لگتا ہے یا قے ہوتی ہے اور کبھی بیمار کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہتھ یا پاؤں کے کسی حصہ سے ایک درد یا سردی معلوم ہو کہ تدریجاً اوپر کی طرف کو چڑھتی جاتی ہے اور جب

مترکب پہنچ جاتی ہے تب بیمار بیدار ہو کر گر پڑتا ہے اس علامت کو اصطلاح میں آر۔ را۔ ایے۔ لپٹ۔ ٹیکا بولتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اکثر اوقات بغیر ظاہر ہونے کسی علامت مندرہ کے بھی مرگی کی نوبت ہو جایا کرتی ہے اور ان نوبتون کے وقفوں میں بھی بڑا اختلاف ہے چنانچہ کبھی تو رات اور کبھی دن اور کبھی خواب میں ہی مرگی کی نوبت ہو جایا کرتی ہے اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن کے اندر کئی نوبتیں متواتر ہوتی رہتی ہیں اور بعض اوقات ہمیشہ نوبتیں یا برسوں میں کوئی نوبت ہو جایا کرتی ہے اور اکثر یہ نوبتیں تین یا پانچ یا آٹھ منٹ تک رہتی ہیں لیکن بعض دفعہ آدھے یا ایک گھنٹہ تک برابر ہوتی رہتی ہیں۔

اسباب۔ پیری۔ ڈوسپو۔ زنک۔ والیدین یا کئی شتہ دار سے اس مرض کا درجہ حاصل کرنا۔ کانسہ سرکا بڑا بول ہونا۔ مروکا ہونا۔ کثرت مجامعت اور جلق۔
اکسیائٹک کارز۔ دفعتاً خوف کھا جانا۔ دانہوں کا کھلنا۔ کسی مقام میں شدت کا درہونا۔ کثرت سے خارج ہونا کسی طوبت کا۔ یا معمولی رطوبت کا بند ہو جانا۔ خاصکھ پیشاب اور صفرا کا دماغ یا کسی اور حصہ نظام عصبی کا کسی سولی سے دب جانا۔ اور بعض دفعہ مرگی کی نوبت زہر خورانی کی ایک علامت ہوتی ہے خاصکھ منگیا اور سیسہ کا زہر۔
علامات تشہیحی بعد وفات۔ دماغ کی رگیں خون سے اکثر بھر جاتی ہیں اور بعض دفعہ دماغ میں کسی قسم کی خراش بھی پائی جاتی ہے مثلاً یا تو دماغ کے پردے موٹے ہو جاتے ہیں یا دماغ میں کوئی کیچ ہوتی ہے یا اسپر کسی رسولی کا دباؤ ہوتا ہے۔
فریب۔ بعضہ فقہ فریبی مرگی کی نقل کر لیتے ہیں چنانچہ اصلی اور نقلی بیماری میں یہ فرق ہے کہ نقل کی آنکھیں بند رہتی ہیں روشنی کے لگنے سے آنکھوں کی پٹکیاں زلزلہ جاتی ہیں شدت سے ہاتھ پاؤں مارنے کے سبب جسم کی حرارت زیادہ ہوتی ہے۔
ہے انتقال کی زبان زخمی ہوتی ہے اور نہ بول دہرا نظر ہوتا ہے۔ اسلئے تاکہ کث

اسم جاننا۔ مجاہدہ حق۔ دماغ کی کڑواہٹ سے بیمار ہونا۔ اس کا سبب

جاری ہونے والی ہے مرنے کے اندر صابون کا ٹکڑا رکھ لیتے ہیں۔ نعال ایسی جگہ اور ایسا وقت نقل کرنے کے لئے پسند کرتا ہے کہ جس سے لوگ اسکا تماشا اچھے طور پر دیکھ سکیں ۱۰۔
لوہ گرم کر کے اگر داغ دین تو اپنی نقل بہول جاتا ہے اور دم دبا کر بہا جاتا ہے لیکن فیہ کے گرفت کی نہایت عمدہ ترکیب یہ ہے کہ ایک پر کی قلم میں تھوڑا سا تھاس بہر کر نعال کی ناک کے اندر پہونک دین اسی وقت مرگی کی نوبت منع ہو جائیگی اور جینکون کی نوبت شروع ہو جائیگی ۱۱۔

علاج نوبت کے وقت کا۔ مریض کو نرم بستر پر لٹا دین اور چپکن کی گھنٹی یا گلو بند کھول دین اور دامنون کے درمیان ایک ٹکڑا کاگ کا یا کپڑے کی گدی رکھ دین تاکہ زبان یا لب اُنکے درمیان آکر کٹ نہ جا دین۔ چہرہ پر آب سرد کے چھینٹنا دین بعد نوبت کے مریض کو سلا رکھین۔ بہت بڑا مال ہو جاوے تو کسی اشی۔ میو۔ ملٹ روکا استعمال کریں ۱۲۔

علاج وقفہ کے وقت کا۔ قبض ہو تو رفع کریں اور شکم میں کرم ہوں تو بذریعہ سہمات خارج کریں۔ دانٹ لکھنے والے ہوں تو مسوڑوں کو چیر دین مرض کے اکسانینک کا زکاد آرک کرین مثلاً داغ کی رنگون کو خون سے پھر ہونے دین غصہ اور غضب ٹکرا دین اور دماغ سہم جانا یا خوف کھا جانا نہ چاہئے۔ بری علاج دتوں سے دست بردار نہ ہونا چاہئے۔ مریض کا مزاج دمووی ہو تو گا بے گا ہے نصہ لین۔ غذا کم کر دین اور نہ کچن شباب دیا کریں اور گردن یا بازو پر سیٹن لگانے سے یا نشت پر گارنا۔ امٹک کے مرہم کی مالش کرنے سے بعض دفعہ مرض کو تخفیف ہو جاتی ہے۔ مریض کمزور ہو تو مقویات مثلاً کوئین یا زینک سا کوئی مرکب مثلاً سلفٹ یا اکسائیڈ یا وی۔ لے۔ رینج نٹ اف زینک کا استعمال کریں اور نائٹریٹ اف سلور اور سبکیا بھی اس مرض کو مفید ہے ایسے بیمار کو جمع اُنہمک ہو آخری کرنی چاہئے اور آب سرد سے غسل کرنا چاہئے مریض

عورت ہو تو اسکی حیض کا خیال رکھنا چاہئے ۔

لبض حکیم برود - مائیڈ اف پوٹاسیم کی بڑی تعریف کرتے ہیں چنانچہ ۵ گریں سے شروع کر کے ۲۰ یا ۳۰ گریں تک پہنچاتے ہیں ۔ کبھی اس دوا کو الیفوٹرن اف ڈی - جے - ٹی کے ہمراہ اور کبھی برود - مائیڈ اف پوٹاسیم اور آیوڈو مائیڈ اف پوٹاسیم کے ساتھ دیتے ہیں ۔ جسم میں آتشک کی برائی ہو تو مرکبات سیاہ یا آبیوڈو مائیڈ اف پوٹاسیم کا استعمال کریں ۔ ڈاکٹر ڈو مسابلا - ڈو - ناک کی بڑی تعریف کرتے ہیں ۔ اور سنہلیکا یہ نسخہ بنی مرگی کی بیماری میں مفید ہے ۔

لنٹی - ڈی - لیوٹ - مائیڈ - برود - ایکٹ - اسڈم آؤنس - فادر - اس - سور - لیوٹن - ڈیرہ ڈرام - سرب آف آئیج - ۲ آؤنس - ڈیٹیلڈ وائر اسقہر جتنے میں کل عرق ۲۰ آؤنس پہنچا دے ۔

مقدار - آدھا آؤنس مین تین مرتبہ پلانا چاہئے ۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف برود - مائیڈ اف پوٹاسیم کے استعمال سے فائدہ نہیں ہوتا ۔ اس صورت میں ہمراہ برود - مائیڈ کے ۱۵ سے ۲۰ بونڈ تک جو س اف بلا - ڈوڈا اور اگر نر کلورل - مائیڈ ریٹ ملا کر استعمال کرنا چاہئے اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب برود مائیڈ سے فائدہ نہیں ہوا ہے تب تیس تیس گریں کے مقدار میں بوراکس لینے سو گا کہ تعین و دفعہ دینے استعمال کرنے سے فوٹ مرگی کمی ٹک گئی ہے ۔

غذا - یاد رہے کہ اکثر اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ اس بیماری کو جبکہ غذا کی پرہیز سے فائدہ ہوتا ہے دوا سے نہیں ہوتا ۔ پس اس مرض میں ایسی غذا دینی چاہئے جس میں نائٹروجن بہت ہی کم ہو ۔ مثلاً صرغ کو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہئے جیسے گوشت - مچھلی - پیضہ - پنیر - مٹھریم کیونکہ ان میں بکثرت نائٹروجن ہوتا ہے ۔ مزے اچھے اور پرگزاردہ کرنا چاہئے ۔

کے۔ ٹے۔ لپ۔ سی

تعریف۔ مریض فتنہ بیہوش ہو جاتا ہے اور جسم اس کا حالت بیہوشی میں جسطور پر ہوتا ہے اسی طور پر پراکڑ کر رہ جاتا ہے *۔

علامات۔ یہ بیماری بہت کم دیکھنے میں آتی ہے، بہار غی سالت ایسی کی یہ ہے کہ نوبت کے وقت جسم بجا کا جس حالت پر ہوتا ہے مہاری نوبت تک اسی حالت پر رہتا ہے اور مریض بالکل بیہوش ہو جاتا ہے۔ نوبت اس بیماری کی کم جھلک ہوتی ہے لیکن بار بار کے ہونے سے عقل اور ہوش میں فرق پڑ جاتا ہے * سبب اس بیماری کا بچھنی اور یافت نہیں ہو سکتا اور علاج اس کا مثل مرگی کے کرنا چاہئے *۔

کوریا

عربی میں اس بیماری کو رعشہ بولتے ہیں *۔

تعریف جسم کے اعصاب محرک کے فعل کا بکڑ جانا اور جسم کا بے قاعدہ حرکت کرنا *۔

علامات۔ یہ مرض اکثر اسطور پر شروع ہوتا ہے کہ پہلے چہرہ یا کسی پاؤں پر تشنجی حرکت ہوتی ہے جو رفتہ رفتہ پہلی اور شدید ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ جسم کا نصف حصہ یا سارا جسم کانپنے لگتا ہے اور جب یہ بیماری کامل طور پر ہو جاتی ہے تب بیمار ہمیشہ حرکت کرتا رہتا ہے۔ سر کبھی اُدھر کبھی اُدھر جھٹکا کھاتا ہے مریض کھڑا ہو تو پاؤں اس کے ہل جاتے ہیں۔ بیمار جلد جلد چلتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس ٹانگہ میں بیماری ہوتی ہے وہ اُٹھ نہیں سکتی بلکہ مریض اس کو گھسیٹتا ہے گو یا وہ ٹانگہ مفلج ہو گئی ہے اور جب وہ ٹانگہ ایک جگہ قائم رہتی ہے تب پاؤں اکثر کبھی اندر کبھی باہر کھینچ کر جاتا ہے اور اس جانب کے ہاتھ بھی یہی حال ہوتا ہے یعنی اگر بیمار اس ہاتھ سے کوئی چیز

اُٹھنا کر منہ کے اندر داخل کرنا چاہئے تو ہاتھ اسکا جھٹکا ہلکا کر پہلے سر کے اوپر چلا جاتا ہے اور بعد کئی دفعہ کی کوشش کے مریض ایک جھٹکے کی حرکت سے لقمہ منہ کے اندر داخل کر دیتا ہے اور نہایت جلد نکل جاتا ہے مریض سے اُس ہاتھ کے اُٹھانے کی فرمائش کیجاوے تو انگلیوں کو قائم نہیں رکھ سکتا اور ہاتھ جلد پہنچ لیتا ہے۔ سوتے وقت عضلن کو اکثر حرکت نہیں ہوتی لیکن اس قاعدہ کا خلاف بھی وقوع میں آتا ہے۔ اس مرض میں اکثر قبض ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ بہت کم مر جاتی ہے اور مریض گندہ دہن ہو جاتا ہے اور جب یہ مرض عورتوں کو ہوتا ہے تو رحم کے فعل میں خلل پیدا ہو جاتا ہے بعض دفعہ مریض وادیات بچنے بھی لگتا ہے اور جب یہ مرض رو۔ ما۔ طیزم کے سبب سے پیدا ہوتا ہے آسین پے۔ رمی۔ کار۔ ڈائی۔ ٹش کی بیماری ہو جاتی ہے تب قلب کے مقام پر اکثر ایک مرمی کی آواز سنائی دیتی ہے۔

اسپاپ۔ پری۔ ڈیپو۔ زنک۔ کزوری۔ خردسالی چنانچہ یہ بیماری سات سے پندرہ برس کی عمر تک اکثر ہو جاتی ہے اور جوانی سے لیکر ۷۰ برس کی عمر تک بھی ہو سکتی ہے۔

اکسٹینڈنک کا۔ قبض اور شکم میں کچھ کے کا ہونا۔ رحم میں کبھی م کی خراش کا ہونا۔ دفعتاً خوف کہا جانا یا غصہ ہونا۔ گر ٹرنا۔ چوٹ لگنا۔ حوام مغزیائے اسکے پردہ میں کسی قسم کی خراش کا ہونا۔ بعض دفعہ وجع مفاصل کے بعد بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ **علاج**۔ چونکہ اس میں مزین اکثر قبض ہوتا ہے تو بذریعہ مسہلات کے پہلے نقیمہ شکم کریں اور تب ایسی تدبیر کریں جس پر زور ایک یا دو دست ہلکا کر دیا کریں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف جلا بون کے دینے سے یہ بیماری نفع ہو جاتی ہے کسی اور دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہلکا اس بیماری میں مفید بتلاتے ہیں۔ اگر رحم میں خراش ہو تو اسکا تدارک کریں مریض غرور کمزور ہو تو مقویات مثلاً سلفٹ یا وے۔ لے۔ رمی نہ افیک

برو۔ مایٹڈاف سمو۔ نیم۔ مگرین۔ سرب۔ مڈرام۔ پانی۔ ایک آؤفس۔
سب کو ملا کر ایک خوراک کریں اور دین تین دفعہ ملا دین۔

ہس۔ ٹے۔ ریا

تعریف۔ یہ ایک عصبی بیماری ہے جس میں ماضیہ اور نفیس میں خلل واقع ہوتا ہے اور
نوبت نبوت تشنج ہوتا ہے لیکن بیمار بالکل بیہوش نہیں ہوتا۔ ہندی میں باؤگولا اور
عربی میں اس بیماری کو اذناق الرحم کہتے ہیں۔

علامات۔ نوبت کے شروع ہونے سے پیشتر خم معده پر بوجہ معلوم ہوتا ہے جی
مستلما۔ کلیجہ جلتا اور شکم میں نفع ہوتا ہے۔ بعد ازاں جائبان اور اکثر اشیان آتی ہیں بیمار
سست اور اہلکون سے آہٹھٹھٹھ لگتے ہیں۔ کبھی سردی کبھی گرمی معلوم ہوتی ہے۔ دم
تکلیف سے لیا جاتا اور دل دھڑکتا ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بائیں قوس قلوب کی پاس
شدت کا درد ہوتا ہے اور اس مقام پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ایک گولا ادھر ادھر
پہر رہا ہے جسکو اصطلاح میں گلو۔ بس سٹیریکس کہتے ہیں۔ یہ گولا معده میں داخل
ہوتا ہے وہاں سے رنڈہ رنڈہ جوت قلع تک آجاتا ہے فوراً نوبت بیماری کی شروع
ہو جاتی ہے اور بیمار کا دم بند ہونے لگتا ہے۔ چہرہ سرخ۔ ناک کے تہنے پھیل جاتے
ہیں۔ شکم پھول جاتا ہے۔ سر پیچھے کو خم کہا جاتا ہے اور مریضہ ہاتھ پاؤں مارنے لگتی
ہے جاوہر کھل کہا کر شنبہ لگتی ہے یا چیخ مارتی ہے اور وہیات بکنے لگتی ہے۔ آخر کار
خوب کہل کر جب دکار آجاتا ہے اسوقت ہاتھ پاؤں کا مارنا موقوف ہو جاتا اور جب نوبت
رُخ ہو جاتی ہے تب بہت سا پیشاب خطا ہوا جاتا ہے اسوقت سر میں اکثر شدت کا
درد ہوتا ہے اور اعضا تنگی ہوتی ہے۔ بعد ازاں اس بیماری کی نوبت میں صرف اتنا
ہی ہوتا ہے کہ طاقت گھٹا اور حس و حرکت جاتی رہتی ہے اور بیمار کو تنگی نفس کی ہوتی ہے

کھلایا ہوا ہے۔ رخسار کے سرخ ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کے پوٹے جلد جلد حرکت کرنے لگتے ہیں اور نوبت کے زنج ہوئے کے وقت مریضہ رونے اور ٹھنڈی سانسینز بہانے لگتی ہے *

اسباب۔ پری۔ ڈسپو۔ زنک۔ عورت کا ہونا۔ بکر چوانی سے لیکر ۵ برس تک کی عمر کثرت مطالعہ اور حالت سکوت۔ فکر و تردد۔ نازک طبیعت۔ اگرچہ یہ بیماری مردان کو بہت کم ہوتی ہے لیکن ضعف اور فکر کے باعث بعض دفعہ ہو جاتی ہے *

ایکسائٹنگ کا زہ قبض۔ سوئے ہضمی۔ نفخ شکم۔ کسی طبیعت کا زیادہ عرصہ تک خارج ہونا۔ بند ہو جانا حیض یا نفاس کا۔ یا داتی یا کچی خون کی۔ رنج و غم و فکر۔ عورتیں جو ہنس۔ ٹے۔ ریاضی بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں طبع طبع کے مرض کی نقل کر لیتی ہیں چنانچہ بعضہ فحش نوبتوں کے دفعہ کے عرصہ میں مریضہ کا عجب حال ہوتا ہے لیکن بعض عورتوں کی روشنی کی بالکل برداشت نہیں ہوتی اور بعض کے پستانوں میں شدت کا درد ہوتا ہے کہ گویا کسی نے منہ ٹھونک دی ہے اس درد کو اصطلاح میں ککے۔ ٹوٹ

ہنس۔ ٹے۔ رمی۔ کٹن بولتے ہیں۔ بعض کٹا دل دھڑکنے لگتا ہے اور بعض عورتوں کی پشت میں درد رہتا ہے۔ اور مضعف کو ایک اشرف نژادی کا حال یاد ہے کہ جس نے تین روز تک برابر اپنا پیشاب بند رکھا تھا۔ مثلاً اُس عورت کا پیشاب سے ہتھکڑ پر ہو گیا تھا کہ متعلقین کو محل کا گمان ہو گیا تھا اور چونکہ مریضہ بیوہ تھی تو اسپر لوگوں نے اہتمام بدکاری کا لگایا تھا۔ اس امر میں چاری راسے لیگتی۔ بعد امتحان کے معلوم ہوا کہ مثلاً نہ پیشاب سے پر ہے چنانچہ سلاخی و غسل کرتے ہی پیشاب جاری ہو گیا اور محل کا گمان باطل۔ اور مریضہ لوگوں میں سرخ رو ہو گئی *

علاوہ بن ہو جانے پیشاب کے اس مرض کی عورتیں ان بیماریوں کا بھی قریب کر لیتی ہیں

چنانچہ کمائی - تنگی نفس - چپکین - جانیان افسوس آہ - چپکیان - شنائین پتھری -
ذات الحجب - فالج - بیٹھ جانا آواز کا ہسل کی بیماری - درد پشت یا مفاصل - مرض
پے - ری - ٹو - نائی - ٹس ۔

تشخیص - اس بیماری کی نوبت کو مرگی کی نوبت سے فرق کرنا چاہئے چنانچہ مرگی کی
نوبت کے وقت بیمار بالکل بیہوش ہو جاتا ہے - پس - ٹے - ریا کی نوبت کیہ متہ بیہوشی
کامل نہیں ہوتی ، مرگی کی نوبت کیہ وقت بیمار کا چہرہ اکثر اوپر اٹھ جاتا ہے اور منہ سے
سفید یا سرخی مائل کف جاری ہوتا ہے - پس - ٹے - ریا کی نوبت میں یہ باتیں نہیں
پائی جاتی ہیں ۔ مرگی کی نوبت کے وقت بیمار کے جسم کی ایک جانب پر بے نسبت
دوسری سکہ زیادہ اور زور زور سے تشنج ہوتا ہے اور دم خراٹے کے ساتھ لیا جاتا
ہے - پس - ٹے - ریا کی نوبت میں ماتہ پاؤں دفعتاً سکڑتے اور پیٹلیٹے ہیں اور جسم
طرح طرح پر بل کہا جاتا ہے - مریض گہری سانسین لیتی ہے اور سرد آہن بہتی جاتی
ہے اور کبھی روتی اور کبھی ہنستی ہے - مرگی کی نوبت کے وقت بیمار کا چہرہ ہلکا
ہوتا ہے - آنکھیں نیم ۱۱ اور آنکھوں کا ڈھیلہ اور ہر حرکت کرتا رہتا ہے - چہرہ ایک
جانب کو کھینچا جاتا ہے - مریض انتہیتا ہے - لہجہ کے سکڑ جانے سے دانت
دکھائی دیتے ہیں - زبان نکلی ہوئی اور اس سے خون جاری رہتا ہے + مٹے - ریا
کی نوبت کیہ وقت مریض کے رخسار سے سوجھ پونے اور آرام سے رہتے ہیں - آنکھیں
بند مگر پونے کا پتہ رہتے ہیں کہ پونے توڑ پیلے قائم اور مجھلا نظر آئینگے ۔

پس یاد رہے کہ بیہوشی ہو اور تشنج ہی درجہ اودا ہو - منہ سے کف جاری رہے اور
بدن کی ایک جانب پر بے نسبت دوسری کے تشنج زیادہ ہوتا ہو تو وہ مرض صرع
ہے اور پس - ٹے - ریا نہیں + ایک اور بڑا فرق ان دونوں بیماریوں میں یہ ہے کہ
پس - ٹے - ریا کی نوبت کے وقت اگرچہ لے - رہا گس میں بھی تشنج ہوتا ہے مگر

متفقہ ایسکا بندہ نہیں ہو جاتا۔ مگر مریگی کی نوبت کے وقت لے۔ وہ گس بندہ ہو جاتا ہے۔
علاج نوبت کے وقت کا۔ اسطور پر کریں کہ مریضہ کے چہرہ پر دھندلہ
 ہے اب سر و چہرہ کریں اور باؤز بندہ دھمکا دیں۔ کوئی پوٹاش تنگ ہو تو کہو لہین
 اور ایسکا ہوٹ گھما دیں یہ سمجھ کر کہ نوبت کی وقت مریضہ بھی پیش ہے کیئی کلام
 جو اسکے شان سے بعید ہو ہرگز نہ کریں کیونکہ درحقیقت مریضہ بھی پیش نہیں ہوتی۔
 بعد گزرنے نوبت کے ایسی مذہب کریں جس سے بیماری کا ازالہ ہو چنانچہ ملکہ کلیات
 سے نفع تبض کیا کریں چنانچہ

لنسخہ۔ اکثر کٹ اف سو۔ کو۔ ٹرائن اوز پم گرین + اکثر کٹ اف ٹکس۔ ایک
 پم گرین + سفوف ایلے۔ کلک پم گرین + جن۔ شن پاؤڈر۔ ۴۔ گرین + سکو ملا کر ایک
 گولی بنا دیں اور ایسی ایک ایک گولی ہر روز بعد غذا کے کھلا دیں + اور یہ نسخہ بھی
 قبض کشا خوب ہے۔

لنسخہ۔ اکثر کٹ اف ٹکس۔ وایسکا نصف گرین + خشک سلفٹ اف ایرن
 ایک گرین + اکثر کٹ اف سو۔ کو۔ ٹرائن اوز پم گرین +
 سفوف گلائی۔ سی رائی سڈرا ڈیڑہ گرین + سکو ملا کر ایک گولی بنا دیں اور صبح و شام
 کھلا دیں + مریضہ کمزور ہو تو مقویات کا استعمال کریں چنانچہ طاقت کے واسطے
 اگر وے۔ لے۔ ریٹن دینا ہو تو ان نسخوں میں سے کیسکا استعمال کریں چنانچہ

لنسخہ۔ امونئے۔ ڈیٹیکو اف وے۔ لے۔ ریٹن۔ ۴ قطرے +
 انیفیژن اف وے۔ لے۔ ریٹن ایک آؤنس + دو نو کو ملا کر گاہے گاہے پلا دیں یا
 لنسخہ۔ وے۔ لے۔ ریٹن۔ ۴ افی کوئین ۱۲ سے ۲۰ گرین تک +
 اکثر کٹ اف جن۔ شن۔ ۴ گرین + دو نو کو ملا کر بارہ گولیوں میں تقسیم کریں اور ہفت
 سے ایک ایک گولی دینیں تین دفعہ کھلا دیں +

بطور ٹانگ زنگ کا استعمال کرنا ہو تو ان نسخوں میں سے کسی کا استعمال کریں *
 نسخہ ۷۷۔ ۷۸۔ ری۔ زنگ ۱۲ سے ۲۴۔ گرین ٹک *
 اکشرکٹ اف بلا۔ ڈونا ۳۷ سے ۶ گرین ٹک * اکشرکٹ اف جن شن ۴۴ گرین *
 سب کو ملا کر بارہ گولیوں میں تقسیم کر کے اپنی چاندی کا ورق مڑھ دیں اور انہیں سے ایک
 ایک گولی دین میں تین مرتبہ کھلا دیں یا یہ نسخہ کام میں لادیں *
 نسخہ ۷۹۔ ۸۰۔ ری۔ زنگ ۱۲ اور فاس۔ فٹ اف زنگ ہر ایک کا دس

دس گرین * اکشرکٹ اف رو۔ برب ۴۴ گرین * دونو کو ملا کر بارہ گولیوں میں تقسیم کر کے
 اپنی چاندی کا ورق مڑھ دیں اور ایک ایک گولی دین میں دھکے دیں اور بطور ٹانگ کے
 نو لاد کا ہی استعمال کر سکتے ہیں چنانچہ ان نسخوں میں سے کسی نسخہ کو کام میں لادیں۔ یہ نسخے
 علاوہ ٹانگ کے عمدہ حیفز اور بھی ہیں چنانچہ

نسخہ ۸۱۔ ٹیکو اسٹیل۔ ایک آونس * گلائی۔ سی۔ ریمین ایک آونس * ڈسٹلڈ واٹر۔
 ۴ آونس * سب کو ملا کر مقدار دو ڈرام کے ہمراہ ایک آونس پینکے بعد غذا کے دن میں تین
 دفعہ بلا دیں۔ یا

نسخہ ۸۲۔ لائیگوار۔ فرای۔ پر۔ کلورائیڈم ایک آونس * کلورٹ آف پوٹاش نصف آونس *
 اسپرٹ اف کلورا۔ فارم ۳ ڈرام * ڈسٹلڈ واٹر ساڑھے آٹھ آونس * سب کو ملا کر مقدار
 نصف آونس کے ہمراہ قدرے آب سرد بعد غذا دین میں تین دفعہ بلا دیں * مزاج موی
 ہو تو تحلیل غذا کریں۔ آب سرد سے غسل دیں ہوا خوری کر دیں اور تبدیل آب دہو ابھی
 اس مرض میں مفید ہے *

بعض غذا جس طرح سے پہنچانہ ہوتا ہے کہ نوبت کی وقت مرضہ کو چھیریں ہنیں بلکہ اپنی
 حالت میں پڑی ہنیں دیں۔ بعض غذاں معدہ کے مقام پر یا او۔ وے۔ ری کے متعاقب ہنیں
 دبانے سے نوبت فوراً ٹک جاتی ہے * دوسری ایک ترکیب یہ ہے کہ جس سے نوبت ٹک

جاتی ہے چنانچہ کپڑے کے تین چار گدیان ایک چوٹی دوسری کچھ اُس سے بڑی اور تیسری بہ نسبت دوسری کے ذرا اور بڑی بنا کر ایک آنکھ پر رکھ دیں اور دوسری آنکھ پر بھی اسی طرح کی تین چار گدیان بنا کر رکھ دیں اب دونوں آنکھوں کو کپڑے کی چوڑی بھی سے باندھ کر سر کے پیچھے گرہ لگا دیں اور چند منٹ تک اسی طرح رہنے دیں۔ اسکے کرنے سے مریضہ کو نیند آ جاتی ہے اور خود بخود ہوش میں آ کر جاگ پڑتی ہے ہنین تو اُس کو جگا دین بہ اور تار بجلی کے لگانے سے بھی نوبت رفع ہو جاتی ہے مثلاً ایسا کریں کہ تار کا ایک سر ایشیا پر اور دوسرا سر شکم یا کسی نوپر رکھ کر اُلٹا گھما دیں اور اُد کو لگاتا رہ گھما کر رہ کر حرکت دیں اس سے نوبت جلد رفع ہو جاتی ہے اور مریضہ ہوش میں آ جاتی ہے ۛ

ہیٹیریا کی بہتری مریضہ اس قسم کے مطب میں آتی ہیں کہ انکے جسم پر ایک یا کئی محدود مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر دبانے سے یا کسی تہر جنیر کے لگانے سے بیماری کی نوبت شروع ہو جاتی ہے ۛ غرض جب اُس جگہ تہلی میں بہر کہ برف لگائی جاتی ہے یا اتھر چڑھ کا جانا ہے تب نوبت رُک جاتی ہے ۛ بعض دفعہ رنگین عینک کے لگانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ تجربہ سے یہ پایا گیا ہے کہ بعض رنگ ایسے ہوتے ہیں جنکے دیکھنے سے نوبت فوراً شروع ہو جاتی ہے اور بعض ایسے ہیں جنکے دیکھنے سے مریضہ کی طبیعت خوش ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مریضہ کا حال ایسا دیکھا گیا ہے کہ صبح شیشہ کی عینک لگانے سے نوبت رُک گئی اور یہ نہیں ہوئی ۛ پس مختلف رنگ کی عینک لگا کر دیکھیں جو نسے موافق آئے اُسکا استعمال کرادیں ۛ

ٹے۔ ٹے۔ نس

یہ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے ایک کو ٹرو۔ مائیک ٹے۔ ٹے۔ نس اور دوسرے کو ای۔ ڈیو۔ پے۔ تھک ٹے۔ ٹے۔ نس کہتے ہیں ۛ عربی میں اس مرض کو کرا ز بولتے ہیں۔

ماہیت۔ حال کی تحقیقات کے بموجب اس مرض کے پیدا ہونے کی بابت طبائری رائے یہ ہے کہ یہ بیماری نہایت خروخرو کم کے سبب سے پیدا ہوتی ہے اور یہ کرم ایک قسم کا نباتی جو ہر پیدا کرتے ہیں اور وہ جو منظم عصبی پر اپنا اثر پیدا کر کے اس مرض کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اس مرض کا بیا جب مرجاتا ہے تب اسکی لاش کے امتحان سے چونکہ جسم کے کسی حصہ میں اس بیماری کے کوئی بھی آثار نہیں پائے جاتے ہیں تو اس سے اوپر کی رائے کو اور بھی تقویت ہوتی ہے کہ ضرور کرم ہی کے سبب سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

علامات۔ اکثر حالات میں اس بیماری کی ابتداء دریافت نہیں ہو سکتی لیکن جب ضرب و زخم کے باعث پیدا ہوتی ہے تو ٹھڑے۔ ٹیک۔ ٹس۔ لٹے۔ انس کے شروع ہونے سے پیشتر جو ٹ کے مقام پر اکثر درد ہوتا ہے لیکن دو نو قسم کے مرض میں پہلی علامت یہ پیدا ہوتی ہے کہ گردن کے پیچھے اسقدر درد اور سختی معلوم ہوتی ہے کہ مریض گردن کو حرکت نہیں دے سکتا بعد ازاں جڑے بیٹھ جاتے ہیں اور ٹکٹنا و شوار ہو جاتا ہے اور اسٹرنم بڑی پر بھی نہایت سخت درد ہوتا ہے ٹیس اُس درد کی پشت تک پہنچتی ہے رفتہ رفتہ دو نو جڑے زیادہ تر کچ جاتے ہیں اور دانتی لگ جاتی ہے اگر گردن کا گوشت جب کچ کر اینٹھ جاتا ہے تب سر پیچھ کچ جاتا ہے۔ بیماری کے اس درجہ کو ٹرس۔ ٹس یا لا۔ کٹ۔ جاکتے ہیں اور چہرہ کے عضلے بھی ایسے کچ جاتے ہیں کہ بیمار کے دانت نظر آتے ہیں۔ جون جون بیماری بڑھتی جاتی ہے سینہ اور پشت کے عضلے کچھ کر اینٹھ جاتے ہیں آخر کا جسم کے وہ کل مسل جبکہ ہم اپنے ارادہ سے حرکت میں لاسکتے ہیں اینٹھ جاتے ہیں مگر ہاتھ اور آٹھکون کے مسل اور زبان کا گوشت نہیں اینٹھتا اسوقت سارا جسم حم کہا کہ یا تو مثل کمان کے ہو جاتا ہے جبکہ اصطلاح میں اور پس۔ تہا۔ ٹوٹر بولتے ہیں یا مریض سامنے کو جھیک جاتا ہے جبکہ ام۔ پراس۔ تہا۔ ٹوٹر کہتے ہیں یا بیمار دہنی یا بائیں طرف جھیک جاتا ہے جبکہ اصطلاح میں پو۔ راس۔ تہا۔ ٹوٹر کہتے ہیں۔

ہیں یا اینٹھا ہو اس میں پڑا رہتا ہے جسکو اصطلاح میں ار - تھو - ٹولس کہتے ہیں آخر کار بیماری ہر ایک عضو میں پھیل پڑتی ہے اسوقت ہاتھ پاؤں سخت کچ جاتے ہیں شکم کے عضلات بھی کچھ سخت مانند تختہ کی ہو جاتے ہیں آنکھیں پتھر لے لگتی ہیں - پیشانی پر شکن پڑ جاتے ہیں - جڑے سخت بیٹھ جاتے ہیں امدمنہ کی باجھیں بھی کچ جاتے ہیں - زرت بنوبت تشنج ہونے لگتا ہے - پہلے پہل تو خفیف اور دیر دیر بعد ہوتا ہے لیکن تھوڑے ہی عرصہ بعد جلد جلد اور زور زور سے ہونے لگتا ہے اور دیر تک رہتا ہے - نبض سیرج ہو جاتی ہے - دم یا تو بند ہو جاتا یا تکلیف سے لیا جاتا ہے - جسم کی حرارت زیادہ ہو جاتی ہے اور بدن پسینہ سے تر رہتا ہو جاتا ہے - دس یا پندرہ منٹ بعد تشنج کسی قدر کم ہو جاتا ہے لیکن اگلے باعث سے مثلاً بیمار اگر حرکت کرے یا کوئی شخص اس کے پاس زور زور سے باتیں کرے یا اسکو چپولے پر تشنج ہونے لگتا ہے - جب بیمار کو نیند آ جاتی ہے تب عضلات ڈھیلے ہو جاتے ہیں + جب بیماری ٹھیک ہو نیوالی ہوتی ہے تب علامتوں کی شدت بڑھنے لگتی ہے تنگی نفس کی شدت اس قدر ہوتی ہے کہ بیمار کا دم بند ہونے لگتا ہے - بدن بیمار کا سر و پسینہ سے مرق ہو جاتا ہے نبض پہلی درجے معلوم ہوتی ہے - ہنہ سے کف یا خون آمیز رطوبت جاری ہونے لگتی ہے - چہرہ نیلگون ہو جاتا ہے - بعض دفعہ بدیان ہو جاتا ہے - تب یا تو تکان کے باعث یا نفس کے عضلوں کے کچ جانے کے سبب بیمار دم بند ہو کر مر جاتا ہے - اکثر اوقات مرتے دم تک بیمار باہوش و حواس رہتا ہے +

مدت - اس بیماری کی اکثر مدت دن سے ۸ دن تک کی ہوتی ہے اور جب یہ مرض آرام ہو نیوالا ہوتا ہے تو مدت اسکی مہفتہ سے دو یا تین مہینے تک کی ہوتی ہے اور اثر اس مرض کا چند منٹ سے دس مہفتہ تک پوشیدہ رہ سکتا ہے لیکن علی العموم چار روز سے چودہ دن کے اندر یہ مرض ظاہر ہو پڑتا ہے +

اسباب - پری - ڈیپو - زنک - مرد کا ہونا - طاقتور جسم - ممالک گرم - عہد طفلی +

اکسا میڈنگ کا۔ تغیرات موسم۔ سرور یا رطوبت یا زیادہ گرمی کا لگنا۔ زیادہ
تھک جانا۔ ضرب و زخم۔ اشیاء زہریلوں کا معده یا امعاء میں ہونا۔ اسٹرکینا۔ اور دیگر نباتی
زہروں کا کھا جانا۔

تشخیص۔ اسٹرکینا کے کہانے سے بھی علامات مثل مرض ٹے۔ ٹے۔ نس کے پیدا ہوتی
ہیں۔ لیکن ان میں اور اصل مرض کی علامتوں میں یہ فرق ہے کہ اسٹرکینا کے زہر کی ابتدائی
علامتیں اچھے طور پر نمایاں نہیں ہوتیں اور آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہیں اور جڑوں کے کچ جانے
اور نکلنے کی تکلیف کے عرصہ بعد جسم اور ہڈیوں کے عضلات کچ جاتے ہیں۔ علاوہ بریز
ٹے۔ ٹے۔ نس کے مرض کا نتیجہ نیک یا بد کنی گھٹنے یا کنی دونوں کے بعد معلوم ہو جاتا
ہے برخلاف اسٹرکینا کے زہر کے جو ۵۰ منٹ سے تین گھنٹہ کے اندر دھماک ہو جاتا ہے۔

انجام۔ اس مرض کا اکثر ہوتا ہے خاصہ کہ جب ضرب و زخم کے سبب پیدا ہوتا ہے اور
اسوقت جب یہ بیماری بعد ضرب و زخم کے دفعتاً ظاہر ہو کر جلد شدت پکڑ لیتی ہے بہ نسبت
اُس کے نتیجہ جلد اور اونے باعث سے پیدا ہوتے ہیں بہ نسبت اسکے کہ جب اُن تشنخون میں
عرصہ دراز گزر جاتا ہے۔ جب یہ بیماری چار دن تک دھماک نہیں ہوتی ہے تب انجام ایکا
اکثر نیک نکلتا ہے۔

علاج۔ اس بیماری کو علاج سے اکثر فائدہ نہیں ہوتا۔ حال میں کے۔ ٹے۔ بار۔ میں
کا استعمال کیا گیا اور اس سے کئی بیماروں کو فائدہ ہوا۔ چنانچہ اس دوا کے جو ہر اس بیمار
کی پچکاری جلد کے اندر کی گئی اور اس سے اُن کو فائدہ ہوا۔ ترکیب اس پچکاری کی یہ ہو کہ
ایک گرین کے بیوین حصہ سے بارہویں حصہ تک پچکاری جلد کے اندر کرنی چاہئے۔ بلکہ ایک
گرین کے آٹھویں حصہ سے نصف گرین تک کی پچکاری چار چار گھنٹہ بعد کرتے ہیں لیکن
اس پچکاری سے جب ٹے۔ ٹے۔ نس کی علامتیں نفع ہو جاتی ہیں تب مرض نہایت
نڈال ہو جاتا ہے اسوقت اسٹی۔ میو۔ لٹ دوا کا استعمال کرنا چاہئے۔ کیو۔ را۔ را۔

علاج اسٹرکینا بہت ہی آسان ہے اور اسوقت بھی تمام بیماریاں اس سے

اور نئے۔ کوٹھین اور مار۔ فیما کی چکرا رہی کرنے سے فائدہ مقصود ہے۔ چنانچہ کریہ۔ را۔ سا کی
چکرا رہی کا یہ نسخہ اچھا ہے۔

لشخہ۔ سفوف کیو۔ را۔ ماہ گرین۔ ڈیڑہ سٹکڈ واٹر حسب ضرورت لیکر کیو۔ را۔ رابن
اسقندر ملا دین حسین ایک تیلی لہی سی بنجاوے۔ اب اسکو ایک فنل مین چوڑی کچر
کا سوراخ دینسکی ہوئی روئی سے اٹکا ہوا ہو۔ اب اسپر آہستہ آہستہ ڈسٹکڈ واٹر اور ڈالیز
حسین ایک ڈرام مقطر ہو جاوے۔ ایک دفعہ کی چکرا رہی کے لئے اس عرق کے ایک
نم سے ۱۰ نم تک لے سکتے ہیں۔

جلد کے اندر مار۔ نیا کی چکرا رہی ہی فائدہ مند ہے کھورا۔ فارم سنگھ کر مریض کو گھنٹوں
تک بیہوش رکھ سکتے ہیں لیکن جب بیہوش مین آجاتا ہے تب بیماری کی علامتیں ہر
لوحی مین۔ بعض دفعہ اکثر کٹ اف انڈین سمپ سے بھی فائدہ ہوتا ہے چنانچہ
لشخہ ۱۰ تیکچو آف سمپ۔ ۱۰ نم۔ ۱۰ کھورل۔ ٹائیڈ ریٹ۔ ۱۰ گرین۔ ۱۰ بڑی ٹائیڈ اف سوڈیم
۱۰ گرین۔ ۱۰ کھورک۔ ایتر۔ ۱۰ نم۔ ۱۰ میو سلج۔ ایک ڈرام۔ ۱۰ پانی۔ ۱۰ ڈرام۔ ۱۰ سبکو
ملا کر ایک خوراک کرین اور چار چار گھنٹہ بعد پلا دین اور اکثر کٹ اف کے۔ لے۔ یا ریز
کی گولیاں بھی مفید ہیں مثلاً پہلے فی گولی مین ایک گرین کا چھٹا حصہ دیوین اور تب
تبدیل بڑھا کر نصف گرین تک کی گولیاں کہلائیں اور مین مرض میں ملا۔ ڈونا بھی بعض دفعہ فائدہ
کرتا ہو جسکے استعمال کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ بیمار کو نکلنے مین تکلیف ہو تو غذا یا دوا کی
چکرا رہی کرین۔ پشت پر برف لگانا بھی نافع ہوتا ہے۔ اس بیماری مین اکثر فیض ہوتا ہے
تو گاہے گاہے کٹر ایل اور ٹرین۔ ٹائین کا حقہ کرنا چاہئے اور جو بیمار نکل سکتا ہو تو
کیا۔ لورل اور جلب کا استعمال کرنا چاہئے۔ مریض کو علیحدہ مکان مین رکھیں کہ جہاں
شور و غل نہ ہو۔

غذا۔ بیمار کی تیلی اور مقوی ہونی چاہئے مثل دودھ شوربر سفید وغیرہ۔

بہترین نسخہ ہے۔ چنانچہ کریہ۔ را۔ سا کی
چکرا رہی کا یہ نسخہ اچھا ہے۔
لشخہ۔ سفوف کیو۔ را۔ ماہ گرین۔ ڈیڑہ سٹکڈ واٹر حسب ضرورت لیکر کیو۔ را۔ رابن
اسقندر ملا دین حسین ایک تیلی لہی سی بنجاوے۔ اب اسکو ایک فنل مین چوڑی کچر
کا سوراخ دینسکی ہوئی روئی سے اٹکا ہوا ہو۔ اب اسپر آہستہ آہستہ ڈسٹکڈ واٹر اور ڈالیز
حسین ایک ڈرام مقطر ہو جاوے۔ ایک دفعہ کی چکرا رہی کے لئے اس عرق کے ایک
نم سے ۱۰ نم تک لے سکتے ہیں۔
جلد کے اندر مار۔ نیا کی چکرا رہی ہی فائدہ مند ہے کھورا۔ فارم سنگھ کر مریض کو گھنٹوں
تک بیہوش رکھ سکتے ہیں لیکن جب بیہوش مین آجاتا ہے تب بیماری کی علامتیں ہر
لوحی مین۔ بعض دفعہ اکثر کٹ اف انڈین سمپ سے بھی فائدہ ہوتا ہے چنانچہ
لشخہ ۱۰ تیکچو آف سمپ۔ ۱۰ نم۔ ۱۰ کھورل۔ ٹائیڈ ریٹ۔ ۱۰ گرین۔ ۱۰ بڑی ٹائیڈ اف سوڈیم
۱۰ گرین۔ ۱۰ کھورک۔ ایتر۔ ۱۰ نم۔ ۱۰ میو سلج۔ ایک ڈرام۔ ۱۰ پانی۔ ۱۰ ڈرام۔ ۱۰ سبکو
ملا کر ایک خوراک کرین اور چار چار گھنٹہ بعد پلا دین اور اکثر کٹ اف کے۔ لے۔ یا ریز
کی گولیاں بھی مفید ہیں مثلاً پہلے فی گولی مین ایک گرین کا چھٹا حصہ دیوین اور تب
تبدیل بڑھا کر نصف گرین تک کی گولیاں کہلائیں اور مین مرض میں ملا۔ ڈونا بھی بعض دفعہ فائدہ
کرتا ہو جسکے استعمال کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ بیمار کو نکلنے مین تکلیف ہو تو غذا یا دوا کی
چکرا رہی کرین۔ پشت پر برف لگانا بھی نافع ہوتا ہے۔ اس بیماری مین اکثر فیض ہوتا ہے
تو گاہے گاہے کٹر ایل اور ٹرین۔ ٹائین کا حقہ کرنا چاہئے اور جو بیمار نکل سکتا ہو تو
کیا۔ لورل اور جلب کا استعمال کرنا چاہئے۔ مریض کو علیحدہ مکان مین رکھیں کہ جہاں
شور و غل نہ ہو۔
غذا۔ بیمار کی تیلی اور مقوی ہونی چاہئے مثل دودھ شوربر سفید وغیرہ۔

ٹے۔ ٹے۔ ٹس۔ نیو۔ نا۔ ٹو۔ رم

علامات - پیدائش سے دوسرے یا تیسرے مہینے یہ مرض اسطور پر شروع ہوتا ہے کہ جیڑوں کے عضلون میں تشنج ہوتا ہے جو بعض اوقات سارے جسم میں پھیل جاتا ہے اور بچہ کو جلد ہلاک کر ڈالتا ہے ۔

اسباب - خراب غذا - امحاین سواد فاسدہ کا ہونا - خراب ہوا - شدت کی سرفوی - ناف کا زخم ۔

علاج - فوراً جلاب دیکڑ بچہ کو آب گرم میں بٹھا دیں اور بطور غذا کے یا تو شیر مادر یا صرف شیر مادہ کا دہلا دیں ۔ کسٹرائیل کا جلاب اس مرض میں مفید ہے ۔ بچہ کو ایسے مکان میں رکھیں جہاں ہوا کی اچھی آمد و رفت ہو ۔

ٹے۔ ٹے۔ نی

یہ ایک بیماری ہے سابق میں جبکی نسبت اطبا کے رائے میں بہت اختلاف تھا۔ مگر حال میں جو تحقیقات اسکی نسبت ہوئی ہیں۔ ان سے یہ ایک مرض خاص ثابت ہوا ہے اسباب اور ماہیت - واضح ہو کہ کس سبب یہ بیماری پیدا ہوتی ہے یہ بات اب تک اچھے طور پر دریافت نہیں ہوئی اور نہ یہ دریافت ہوا ہے کہ اسکے ہونے سے نظام عصبی کا کونسا حصہ مآؤف ہو جاتا ہے مگر کان تجربات اور مشاہدات سے یہ دریافت ہوا ہے کہ بہت مردوں کے یہ بیماری عمر تو ن کو زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ کہ اگرچہ یہ مرض ہر عمر میں پیدا ہو سکتا ہے تاہم پندرہ سے تیس سال کی عمر میں اکثر ہو جاتا ہے جن باتوں سے طبیعت اس بیماری میں مبتلا ہونے کے لئے مایل ہو جاتی ہے وہ یہ ہیں کہ نثر۔ و نس۔ ٹم۔ پے۔ رسی۔ منٹ اور کمزوری چاہے کثیف غذا یا دانت

نکلنے سے یا کسی شدید بیماری کے سبب یا عرصہ کے اسہال سے یا ابتداء سے حیض کے شروع ہونے سے یا حمل کے باعث یا چاہے عرصہ تک درودہ پلانے سے یہی پیدا ہو۔ اس مرض کے اکسا ٹینک کا زکری نسبت کہتے ہیں کہ یہ مرض بیچ و غم فکر یا سروی کے لگنے یا بارش میں بیگنے یا اسہال کے ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر ابر-کرام- بے فرماتے ہیں کہ رسی-کٹش کے سبب بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے *
 اس مرض کی مائیت کی نسبت بھی کوئی بات ٹھیک نہیں دریافت ہوئی تاں ایسا خیال کرتے ہیں کہ جب دماغ اور نخاع کے فعل میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہوتی ہے تب یہ مرض ہو جاتا ہے *

علامات - اس مرض میں جسم کے بعض بعض عضلات کچ جاتے ہیں ساتھ اس کچا ڈٹ کے درو بھی ہوتا ہے اور ہاتھ اور کلائی کے عضلے اکثر کچ جاتے ہیں مگر بعض دفعہ ٹانگوں کے عضلات میں بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے اور جسم کے دونوں جانب کے عضلے اکثر متبلا ہوتے ہیں مگر ہوش و حواس میں فرق نہیں پڑتا * یہ بیماری اکثر اسطور سے شروع ہوتی ہے کہ انگلیوں یا ہاتھوں اور دونوں کلائی کے عضلوں میں یا توٹیں پیدا ہوتی ہیں یا یہ درد کرنے لگتے ہیں یا سین ہو جاتے ہیں تب تشنج شروع ہو جاتا ہے اور ایک یا کئی انگلیاں کچ جاتی ہیں خاص کر جب ان کے کام میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے چنانچہ انگلیاں اوپر کی طرف کچ جاتی ہیں اور تب کل انگلیاں جڑ کر ہاتھ کی شکل مخروطی ہو جاتے ہیں لیکن بعض دفعہ درمیان کی دو انگلیاں اُڑوں سے علیحدہ رہتی ہیں۔ دونوں انگوٹھے ہتھیلی پر زور سے مڑ جاتے ہیں پنچون کا جوڑ اکثر کسیدہ مڑ جاتا ہے اور کل ہاتھ الٹا ہڈی کی طرف گھوم جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلائی کسیدہ مڑ جاتی ہے اور بازو پہلو کی طرف کچ جاتا اور ہاتھ کچکڑ شکم پر آ جاتا ہے۔ جب یہ بیماری اطراف اسفل میں جو نیوانی ہوتی ہے تب پاؤں کی انگلیاں یا تو سست معلوم ہوتی یا ان میں شین پڑنے لگتی ہیں

اور تب تلوے کی طرف صحر کر و سیمین زور سے جھڑ جاتی ہیں اور پاؤں کے انگوٹھے اکثر تو انگلیوں کے نیچے خم کہا جاتے ہیں مگر بعض دفعہ کچھ سیدہ رہ جاتے ہیں۔ پاؤں خم کہا کر شل کمان کے ہو جاتا ہے اور ایٹری اوپر کو اٹھ آتی ہے اور ٹانگ کچھ سیدہ ہی رہ جاتی ہے۔ جب یہ بیماری سخت ہوتی ہے تب گردن کے پیچھے کے عضلے اور سینہ اور شکم اور چہرہ کے اور چبانے اور نگلنے کے بھی اور عضلہ ڈایا۔ فرام اور لے۔ رنگس کے عضلات بھی کچ جاتے ہیں جس سبب جھڑ سخت بیٹھ جاتا ہے نگلنے اچھی طرح پر ہونے پر سکنا اور دم لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ چون چون سے عضلے کچ جاتے ہیں وہ اس قدر سخت بھی ہو جاتے ہیں کہ شکل سے سیدہ کئے جاسکتے ہیں اور تب چہرہ مسکڑ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ انکے ریشے کانپنے بھی لگتے ہیں۔ خواب کی حالت میں بھی عضلے کچھے ہوئے رہتے ہیں۔ اس بیماری میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عضلون کا تشنج نوبت بنو تب پیدا ہوتا ہے اور نوبت مذکور چند منٹ سے لیکر ایک یا دو گھنٹہ یا کبھی اس سے بھی زیادہ عرصہ تک ہتی ہے مگر شاید ہی بارہ گھنٹہ سے زیادہ رہتی ہے اور کبھی ایک یا دو گھنٹہ یا کئی روز یا کئی ہفتوں کے بعد نوبت ہو ا کرتی ہے۔ عضلے جب کچ جاتے ہیں تب درد بھی کرنے لگتے ہیں۔ کہیں کچھ سیدہ یا کچھے تو اور بھی درد کرنے لگتے ہیں۔ نوبت تشنج کی جب رون ہو جاتی ہے تب مقام ماذن پر طرح طرح کی کیفیتیں محسوس ہوتی ہیں جیسے چنٹیاں ریگتی سی وغیرہ۔ بچوں کو جب یہ بیماری ہو جاتی ہے تب ساتھ اسکے ان کو لارن۔ جس مٹن۔ اس۔ ٹرائی۔ ڈیو۔ لس کا مرض بھی ہو جاتا ہے۔

مذمت۔ اکثر یہ بیماری تھوڑے عرصہ تک ہتی ہے اور خفیف ہو ا کرتی ہے اور عرصہ تک رہے ہی ہم علاج سے اکثر رون ہو جاتی ہے۔

علاج۔ ۱۔ مول علاج کا یہ ہے کہ اسٹائینک کا زکوہ رون اور بیمار کی طاقت کو قائم کریں۔ کوئی جی خرابی ہو تو اسکو رون کریں جیسے ری۔ کلس۔ ٹنک۔ اسکر۔ مینولا

وغیرہ۔ مقویات کا استعمال بہر صورت کرنا چاہیے اور ادویات مضبوطی دل بھی مفید
 مین جیسے برو۔ مائیڈ اف پوٹا۔ سیم برو۔ مائیڈ اف ایمو۔ نیم برو۔ کورل مائیڈ
 ایفون۔ مائبرجلی کے لگانے سے چند ان فائدہ نہیں ہوتا اور نہ تفصیل سے ۔

مائیڈ رو۔ فو۔ بیا

اعرف۔ نظام عصبی کا شدت سے بڑھ کر جانا اور اس باعث خلق میں خراش
 ہو کر نکلنے کے عضلات میں تشنج کا ہونا ۔

علامات۔ کسی دیوانہ باز کے کاٹنے کے مختلف عرصہ بعد زخم پر درد کچا وٹ اور
 انفلامیشن ہوتا ہے ٹیس اس درد کی بذریعہ اعصاب کے پھیل جاتی ہے۔ لیکن یہ علامتیں
 اکثر اوقات پیدا نہیں ہوتی ہیں ۔ بعد چند گھنٹہ یا چند روز کے جسم کے مختلف مقامات
 میں درد ہوتا ہے۔ بگڑا اور خلق کچ جاتا ہے۔ مریض بے چین اور اٹھنے لگتا ہو جو صلہ
 ہو جاتا۔ بار بار آہ سرد دہراتا ہے اور نیند خوابات متوحش سے ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہے عین
 ابتدا اس بیماری کی اس طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ بیمار کو تیلی چیزوں کے نکلنے میں
 بہت تکلیف ہوتی ہے اور یہ تکلیف بڑھتے بڑھتے استقدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ بیمار پانی
 کے نام یا آواز سے چونک پڑتا ہے اور جسم میں تشنج ہونے لگتا ہے۔ مریض نہایت
 بے چین رہتا ہے۔ چہرہ نہایت فکرمند اور خوف کیا یا ہوا ہوتا ہے۔ بہوین سکڑ جاتی
 ہیں اور آنکھیں خونناک اور پتھرنے لگتی ہیں۔ مریض کو روشنی اور آواز کی برداشت
 نہیں ہوتی۔ تشنگی شدت۔ زبان خشک۔ جسم گرم و خشک اور بار بار ابکائی آنی ہیز
 مریض اکثر زور زور سے چیخیں مارتا ہے اور بلند اور حکومت کی آواز سے نکل کر تا ہے
 بند دانٹوں کے درمیان سے ایک لمبے اور طو بے تھوکتا جاتا ہے اور زور سے آواز
 بلند اُس طور پر کہ کتا ہے جس طور پر کتے کیا کرتے ہیں۔ باوجود ان سخت علامتوں کے بھی

بیمار مرتے دم تک باہوش رہتا ہے لیکن بعض دفعہ ہڈیاں بھی ہو جاتا ہے، سوقت مریض جلد جلد اور بے لگا بکے لگتا ہے اور اس قدر رے چین ہو جاتا ہے کہ ذرا سی آواز یا روشنی یا ہوا یا کسی چیز کی چمک سے دم اسکا بند ہونے لگتا ہے اور سارے جسم میں تشنج ہو جاتا ہے۔ یہ تشنج اب اس قدر شدت سے ہونے لگتا ہے کہ اسی حالت میں بیمار ہلکے یا دم بند ہو کر مسافر راہ عدم کا ہو جاتا ہے *

پھیان سگ دیوانہ کی۔ جب کتا دیوانہ ہو جاتا ہے تو اُس میں عیسائیتین پائی جاتی ہیں۔ کتا بھونک نہیں سکتا بلکہ کوکتا ہے۔ اسکے رونگٹے کھڑے رہتے ہیں اپنی آنکھوں کو عجیب طور پر حرکت دیتا ہے۔ گھاس بھوس بال یا کاغذ وغیرہ کو ہمیشہ کاٹتا اور نگلتا رہتا ہے۔ اکثر پانی کا خوف نہیں ہوتا بلکہ پانی پینے کی نہایت خواہش ہوتی ہے اگرچہ گلو کے عضلون کا تشنج مانع پانی پینے کا ہو سکتا ہے اگر فالج کے سبب نیچے کا جبرائیلک جاوے تو کتے سے بھونکا نہیں جاتا۔ جانور تیسرے اور آٹھویں دن کے اندر مر جاتا ہے *

مدت اس بیماری کی دو سے تین دن تک کی ہے اور بعض ۴۰ گھنٹہ اور شاید ۵۰ گھنٹہ سے نو دن تک بھی رہتا ہے *

مدت زہر کے بیکار رہنے کی۔ تین یا چار ہفتہ سے کئی چھینے یا کئی برس تک لیکن علی العموم زہر اس بیماری کا ۲۰ سے ۴۰ دن تک بیکار رہتا ہے۔

علاج۔ جو وقت دیوانہ کتا کاٹے اسی وقت اسکے زخم کو چھری سے خوب کاٹ کر پھینک دیں بلکہ ساتھ اسکے تھوڑا سا تیز رست گوشت بھی تراش ڈالیں تب کئی قدر لمبائی سے اُس میں خیم پیر پانی کا دھار جو ٹرین تاکہ خوب ڈھل جاوے بعد ازاں ٹائٹریٹ اف سلور کے قلم سے خوب طرح جلا ڈالیں اور تب پولیس اور مریم نکا کر زخم کو خشک کر دیں * بطور دوا کے پھینک دوا کا استعمال کریں جن کا ذکر مرض

اور مریض کی حرکات مثل بچن کے ہو جاتی ہیں *

سوم سو۔ نو۔ مے۔ نیا

اس قسم کی دیوانگی میں بیمار کے دل پر کسی خاص بات کا خیال ایسا جم جاتا ہے کہ جس کو عقل بالکل مٹا نہیں سکتی اور نہ بیمار کے تجربہ سے وہ خیال دور ہو سکتا ہے مثلاً بعض بیمار دن کو ہلکی چیزیں بہا رہی معلوم ہوتی ہیں اور بعض بہا رہی چیزیں دن کو ہلکی تصور کرتے ہیں اور بعض بڑی چیزیں دن کو چھوٹی تصور کرتے ہیں اور گرم کو سرد محسوس کرتے ہیں بعض کے خیال میں آدمی کی تشکیل نظر آتی ہیں اور انکے تکلم کی آواز سنائی دیتی ہے حالانکہ نہ کوئی آدمی ہے اور نہ کوئی گفتگو کرتا ہے *

چارم مے۔ لن۔ کو۔ لیا

اس قسم کی دیوانگی میں پیٹ بہت ہو جاتا ہے اور طبیعت اسکی خودکشی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ زندگی تلخ ہو جاتی ہے بیمار حوصلہ مار دیتا ہے۔ صحبت بُری معلوم ہوتی ہے تنہائی پسند کرتا ہے اور بعض دفعہ خود و نوش سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ مریض کا حافظہ بگڑ جاتا ہے۔ خویش واقارب کی محبت دل سے دور ہو جاتی ہے بیمار بے چین رہتا ہے خیالات خام دل پر پیدا ہوتے رہتے ہیں نیند اچھے طور پر نہیں آتی اور جو آتی بھی ہے تو وحشت انگیز خوابوں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ماضیہ بگڑ جاتا ہے۔ زبان میلی۔ فم معدہ پر بوجہ اور براز میں کمی صفر کی۔ سر میں ایک بوجہ اور خفیف درو۔ نبض کمزور *

پنجم مے۔ نیا

مے۔ نیا دو قسم کا ہوتا ہے ایک ایکوٹ۔ دوسرا کرائنک۔ یہ دیوانگی کامل ہے اور اس میں

کل ہوش و دواس میں فروں پڑ جاتا ہے +

علامات - ابتدا مرض میں یا تو بیمار سُست یا خوش و مخرم رہتا ہے یا چالاک و بہت
یا کاروبار کی طرف سے بالکل نفرت ہو جاتی ہے۔ بعد ازاں ادنیٰ سی بات میں
چڑ جاتا ہے بال بچوں کی محبت جاتی رہتی رہے کاروبار اور خانگی معاملات سے دست بردار
ہو جاتا ہے گھر سے بالکل ہوا لگتا ہے اور حرکات خلاف عادات کرنے لگتا ہے اگر اس سے خوشتر
و اقارب پیار و محبت سے پیش آدین تو چڑ جاتا ہے۔ اسکی باتیں اور حرکات اور خیالات دنیا
سے زائے ہوتے ہیں۔ اُن سے جتنی پہلے مُجتب رکھتا تھا اب نفرت کرتا ہے اور طبیعت میں
غصہ اور غضب کا جوش ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بھر جناب و جدل مارنے پٹینے اور نقصان کرنے
کے کچھ اور سوچتا ہی نہیں۔ جب عورت اس قسم کی دیوانگی میں مبتلا ہوتی ہے تب
پردہ عصمت کو پہاڑ ڈالتی ہے۔ سنگے ناموس کا بالکل خیال نہیں رہتا جوش غصہ اور
غضب میں چلنا چور ہو کر کپڑوں سے باہر نکل آتی ہے شرم و حیا کو خاک میں ملا دیتی ہے
یہ ستر ہو جاتی ہے مان باپ بہائی بہن یا دیگر کچھ کسی کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتی۔ پاس ادب
اور محبت دل سے دور ہو جاتی ہے اور اُنکے مارنے کا دل میں خیال رکھتی ہے۔ ہر ایک
دیوانہ کیساں نہیں ہوتا کیسکو اس بات کا جنون ہوتا ہے کہ قتل کیجئے۔ اسکو اصطلاح میں
ہو۔ مے۔ سائی۔ ڈل مے۔ نیا کہتے ہیں۔ بعض دیوانہ خود اپنی جان ہلاک کرنا چاہتے
ہیں اصطلاح میں اسکو سوئی۔ سائی۔ ڈل مے۔ نیا کہتے ہیں۔ بعض کو مرنے کی سببات
کا جنون ہوتا ہے کہ آگ لگا دیجئے اور اسکی سیرو پھٹئے اس قسم کے مے۔ نیا کو اصطلاح
میں بائی۔ رو مے۔ نیا کہتے ہیں۔ بعض دیوانے ایسے ہوتے ہیں کہ انکو چوری کی عادت
ہوتی ہے اسکو اصطلاح میں کلپٹو مے۔ نیا کہتے ہیں + اور وقت رز کا حال مئے۔
جس کسی پر یہ چیز نکل سائے مگن ہوتی ہے اُسے پگنل بنادیتی ہے تب اس کو اصطلاح میں
ڈپ۔ سو۔ مے۔ نیا کہتے ہیں +

علاماتِ منذرہ - دیوانگی کا دل سے پیشتر یہ چند علامتیں پیدا ہوتی ہیں جنکا علاج اگر شروع سے کیا جاوے تو غالب ہے کہ یہ مرض پیدا ہونے پاوے۔ وہ علامتیں یہ ہیں کہ بیمار کا مزاج بگڑ جاتا اور وہ پست ہمت ہو جاتا ہے۔ سر گھومتا اور اُس میں درد ہوتا ہے۔ کاروبار کی طرف سے طبیعت متغیر ہو جاتی ہے۔ حافظہ جاتا ہوتا ہے۔ دل بے چین طبیعت منتشر رہتی ہے کسی چیز پر دل نہیں لگتا۔ دماغ میں ضعف اور نکان معلوم ہوتا ہے۔ طبیعت موت کو چاہتی ہے۔ جن باتوں سے بیمار پہلے خوش ہوتا تھا انکی طرف سے اب اُسکو نفرت ہو جاتی ہے۔ دن بے چینی میں اور رات بے خوابی میں لگتی ہے۔

اہم سبب دیوانگی کے - اکثر اوقات دیوانگی کا سبب نہایت مشکل سے دریافت ہو سکتا ہے لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ دیوانگی اکثر موروثی ہوتی ہے اور بعض دفعہ جب نہایت قریب کے رشتہ داروں میں بیاہ ہوتا ہے تب بھی دیوانگی پیدا ہو سکتی ہے اور گاہے گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب والدین کے جسم میں آتش کا زہر ہوتا ہے یا جب وہ کثرت سے شراب خوار ہوتے ہیں تب انکی اولاد کو یہ مرض ہو جاسکتا ہے اور جسم میں جب اشکرا - نیو - لائیٹ خنا زیر اور ٹیو - برکل کا مادہ ہوتا ہے تب بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے جس کی تعلیم و تربیت ناقص ہوتی ہے یا جب والدین اپنی اولاد کو علم یا دولت یا عزت حاصل کرنے میں نہایت ترغیب دیتے ہیں تب بعض دفعہ دیوانگی پیدا ہو جاتی ہے اور جب مذہبی خیالات میں آدمی مستغرق رہتا ہے تب بھی اُسکو یہ بیماری ہو جاسکتی ہے جب کسی بات کا خیال دل میں شعلہ ہو جاتا ہے اور آدمی اس میں شب و روز غوطہ کھاتا رہتا ہے اور نا اُمید کی سبب جب پست ہمت اور بے وصل ہو جاتا ہے تب بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے مثالیز انکی بہت ہیں اور میں نے اپنی کتاب طب متعلقہ عدالت میں دی بھی ہیں

مگر اُس کتاب کے چمکے شائع ہونے کے بعد دوبارہ ون کو مین نے دیکھا۔ ایک تو کسی کا عاشق نہ رہتا۔ جب معشوقہ مر گئی اُسکے فراق میں پاگل ہو گیا۔ آخر کار اپنی ہی جان دی آدمی آدمی لیاقت تھا اپنی معشوقہ کا خیال اُسکے دل میں موج زن ہوتا تھا تب یہ چند اشعار دیوانہ وار پڑھ کر کہی روتا اور کہی ہنس دیتا چنانچہ حالتِ مایوسی میں یہ دوسوخت پڑھتا تھا۔

او چارہ گر آچک کہ دم چارہ گری ہے مین جان سے مر تا ہوں تجھے بیخبری ہے
کیون پہلے ہی مان مین یقین ہے اپنی سی تو کر دیکھ عجب نسخہ وری ہے
ہو جاؤں مین جان بر تو تیری نام درسی ہے اور یوں عوی بے صرفہ تو بہودہ سری ہے
گرہم سے مریضوں کی دوا ہوئے تو جانین

بیارِ محبت کو شفا ہوئے تو جانین
بعض دفعہ مایوس ہو کر غصہ مین آتا اور چیخا کر یہ شعر زبان پر لاتا۔ شعر
کچھ کام نہیں پنچ و خم زلف دوتا ہے
کہا یا کرے بل سینکڑوں اب میری ٹا ہے
اور بعض دفعہ اپنی معشوقہ کی تعریف مین یہ شعر پڑھتا۔ شعر

جانور جو تیرے صدقہ مین رہا ہوتا ہے اے شہِ حسن وہ چھپتے ہی ہٹا ہوتا ہے
اور کہی یہ شعر پڑھ کر اپنے دل کو سمجھاتا۔ شعر
کیسکی مرگ پر ایدل نہ کچے چشم تر ہرگز بہت سارے اپنے جو اس جینے پر تلے ہرگز
دوسرے دیوانہ کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اُس نے دیوانی کا ایک مقدمہ مار دیا تھا۔ اسکا مقدمہ ایسا پیونچا کہ خود دیوانہ ہو گیا۔ اور فیقری اختیار کر کے دیوانہ دار یہ صدا کرتا تھا۔

صد
جج صبا کا کہہ دینین عدا گڑ بڑ کرتے ہین

یہ کل سبب جینکا ذکر اوپر ہوا ہے دیوانگی کے پیری ٹیپو۔ زنک کا زینفی میلان
 طبع میں اور اس مرض کے اکسائیٹنگ یعنی اشتعال دینے والے سبب یہ ہیں کہ
 سر میں چوٹ کا لگنا۔ کثرت سے شراب کا پینا۔ اور ایفون یا تنباکو کا استعمال کثرت۔
 کثرت مجامعت اور جلق۔ اور بعض دفعہ شدت کا تقویٰ اور پرہیز گاری بھی باعث
 اس بیماری کا ہوتا ہے۔ حیثیات اور مرض اسی۔ سپ۔ کش یا نقرس کا عضو اندرون
 میں سرایت کو جانا بھی ایک سبب میں سے ہے اور جو سبب منسوب باخلاق ہیں
 وہ یہ ہیں۔ یاس حرمان عاقبت کے خیالات میں تجاوڑ کرنا زیادہ غم کھانا۔ فکر و تردد۔ عرصہ
 تک مصیبت کا پڑنا۔ عرصہ دراز تک دماغی محنت کا کرنا اور افلاس۔ جب دماغ کی پورک
 کیواسطے خون کم پہنچتا ہے تب ہی دیوانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مرض عورت اور مرد دونوں
 کو برابر تعداد میں ہو جاتا ہے لیکن بعض کی راسے میں مردوں کو بہ نسبت عورتوں کے
 یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ عورت کو یہ مرض اکثر ۳۵ اور ۴۵ سال کی عمر میں ہو جاتا ہے
 اور مردوں کو ۲۵ اور ۵۰ سال کی عمر میں۔

علامہ انین پتے اکثر اس مرض سے محفوظ رہتے ہیں لیکن یہ بیماری خاصکے جانون کو
 زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ بیماری موروثی بھی ہے۔ بعض بیماریاں بھی اس مرض کے سبب
 پیدا ہو جاتی ہیں مثل مرگی۔ شدت کا بخار اور سولے ہفتی۔

علاج۔ ابتدا میں اگر دیکھیں کہ دماغ میں خون کی زیادتی ہے تو بذریعہ
 قند یا جو کون کے اسکو کم کریں۔ تب ہی تو بذریعہ سہلات کے رفع کریں۔ مریض
 کمزور ہو تو مقویات کو کام میں لادیں۔ بیمار کو غذا مقوی اور صبر الہضم دیں۔ اور کاروبار
 اور زیادہ محنت سے پرہیز کروں اور بیماریاں کے خیالات اور مطالب میں چنداں دخل دین
 جب بیماری چھ طور پر پیدا ہو جاوے اور بیمار کے دماغ میں زیادتی خون کی پائی جاوے
 تو فصلیں یا جو مکین لگا دیں۔ تیز سہلات دیں اور تعلیل غذا کریں۔ اگر مریض بہت ہی کمزور

رفتہ ہو جاوے اور نیت نہ آتی ہو تو اینون کا استعمال کریں۔ آب سرد سے غسل کر دیں اگر صُغف یا کمی خون کی ہو تو مقویات کا استعمال کریں۔ مریض سے شفقت پیش آویں اور کوئی بات ایسی نہ کریں جس سے اسکا غصہ بڑھ کر جاوے۔ اسکی محافظت کریں تاکہ اپنے کو ہلاک نہ کر ڈالے ۛ

ہائی۔ پو۔ کن ڈرائی۔ سس

علامات۔ اس بیماری میں ماضیہ بگڑ جاتا ہے اور مریض کی پسلیوں میں ایک خفیف سا درد ہوتا رہتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سیٹھے جاتے ہیں۔ کار و بار کی طرف سے طبیعت نفرت کرتی ہے و لیکن ہمیشہ کسی نہ کسی بات کا دھڑکاٹا رہتا ہے بیمار اپنے مرض کو دھماکیاں کرتا ہے اور سلامتیوں کو بڑے بڑے بیان کرتا ہے ۛ

اسباب۔ بدبھی ایسے خیالات جن سے دل پر صدمہ پہنچے ۛ علاج بدبھی کا کریں

ڈے۔ لے۔ ریٹم ٹرمی۔ منس

علامات۔ یہ مرض اسطور سے شروع ہوتا ہے کہ پہلے بیمار بہکی بہکی باتیں کرتا ہے اور اسکے ہاتھوں کی انگلیاں اور زبان کا پنے لگتی ہے جون جون مرض بڑھتا جاتا ہے بیمار نہایت جلد جلد باتیں کرتا ہے اور ایک جگہ پر تو رہنیں پکڑتا بلکہ ادھر ادھر حرکت کرنے لگتا ہے۔ انکھوں کے سامنے مختلف شکلیں نظر آتی ہیں اور وہ ان باتیں کرتا ہے بعض دفعہ سانپ بچو یا شیر کی شکل نظر آتی ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دشمن تصور کرتا ہے اور گھر سے بھاگ جائیکہ قصد کرتا ہے بدن پسینہ سے مرق ہوتا ہے۔ زبان کی تعداد میلی اور نبض سریع لیکن کمزور ۛ جب بیمار میٹھا ہونیوالی ہوتی ہے تب مریض نہایت کمزور ہو جاتا ہے۔ اور بعض جلد جلد باتیں کر شیکے

اسکو نہ بیان ہو جاتا ہے آخر کار تنگی نفس کی ہوتی ہے اور اسی حالت میں دم بند ہو کر
مر جاتا ہے۔ بعض دفعہ اس بیماری کے باعث دماغ میں انفلامیشن ہو جاتا ہے اور بعض
دیوانہ بھی ہو جاتا ہے +

اسباب - کثرت شراب خوری یا دفعتاً شراب کا چھوڑ دینا۔ رنج و غم فکر کثرت
مشقت ضعف +

علاج - بیمار کو علیحدہ مکان میں رکھیں اور اسکی محافظت کریں تاکہ اپنے کو ہلاک
نہ کر ڈالے بڑے مطلب علاج کا یہ ہے کہ بیمار کو کیسٹلچ نیند آ جاوے کیونکہ جب نیند بہر سو لیتا
ہے تب طبیعت اسکی درست ہو جاتی ہے۔ پس نیند لانے کے لئے کلورل ٹائیڈ
تھنیا ہمزہ برورسائیڈ اف پوٹاشیم کے استعمال کریں چنانچہ

لشجہ - کلورل ٹائیڈ ریٹ ۲ یا ۳ کریں + برورسائیڈ اف پوٹاشیم ۱۵ یا ۲۰ اگرین
پانی ایک اونس + سبکو حاکر پلا دین - کہتے ہیں کہ ٹنگرواف ڈی - جے - ٹی - لس کے زیادہ
مقدار میں استعمال کرنے سے اس بیماری کو فائدہ ہوتا ہے مگر ہم کو اس پر شک ہے کیونکہ
اس سے بفضل اس قدر کمزور ہو جا سکتی ہے کہ بیمار کی جان کا اندیشہ ہوتا ہے +

دماغ میں انفلامیشن کے آثار پائے جا دیں تو جو ممکن لگا دیں اور دیگر ادویات مناسب
اسکو برقع کریں - غذا متوی اور صبر الہفتم دین +

ان فن - ٹائیسل کن - ول - شن

اس بیماری کو عربی میں ام الصبیان کہتے ہیں +
اگرچہ پیدائش سے لیکر ساتویں یا آٹھویں سال کے اخیر تک بچوں کو اکثر کنولشن ہو جاتا ہے
لیکن عہد طفلی میں ہی یہ مرض اکثر پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ عہد ہے جس میں بچوں کی
طبیعت ادنیٰ اسی بات سے بڑک جاسکتی ہے اور انکے دماغ اور نخاع پر جو ہنوز غما

ہوتے ہیں خاص طور پر تھک ہو سکتے ہیں ۔

کنولشن کے حملے بشیراً یہ وہ کسی دماغ کی رشتہ پر بیماری کی علامت ہو جا سکتی ہے کہ خرابی پیدا کرنے کے نفع ہو جاتے ہیں ۔ لیکن جب کنولشن - دل - شن بار بار ہوتا رہتا ہے تب بچہ کے عقل اور ہوش و حواس میں فرق پڑ جا سکتا ہے اور اسکی تندرستی میں بھی حرف آ سکتا ہے اور بعض صورتوں میں چمک بھی ہو جا سکتا ہے ۔ پیدائش سے چند روز بعد بچہ کے ماتھے پاؤں میں کیسے تشنج ہو جا سکتا ہے چنانچہ بظاہر وہ سوتا ہوا معلوم ہوتا ہے مگر آنکھیں اور ہر طرف سرگھماتا رہتا ہے یا سیاہی آنکھوں کی اوپر کے پوٹوں کے نیچے آجاتی ہے ۔ آہستہ آہستہ کھاتا ہے ۔ دم تھوڑی بہت تکلیف سے لیتا ہے ۔ چہرہ کے عضلاتوں میں تھوڑا بہت تشنج ہوتا ہے اور بعض دفعہ دہن کے گرد ایک نیلا حلقہ پیدا ہو جاتا ہے ۔ یہ حالت شکم میں نفع یا بدبھنی کے ہونے سے پیدا ہوتی ہے ۔ اور جب یہ حالت پیدا ہو تب بچہ کی غذا کی طرف توجہ ہونا چاہئے اور شکم کو آہستہ آہستہ مالش کرنے سے اور اس نسخہ کا استعمال کرنے سے نفع ہو سکتی ہے ۔

نسخہ - اردو - مائیک اسپرٹ اف ایمو - نیاس قطرے ۔ اسپرٹ اف ایتھر
یاس قطرے ۔ ڈل واٹر ایک ڈرام ۔ سیکو ملا کر ایک یا دو دفعہ پلاوین ۔ یہ نسخہ ایک یا دو ہینے کے بچے کے لئے موزون ہے ۔

اسباب - وہ باتیں جن سے نظامِ عصبی میں بہت ضعف پیدا ہو یا جو مانع ہوں دماغ یا متاع کی فعل کے اچھے طور پر انجام دینے کے ان سے تشنج لینے کنولشن پیدا ہو سکتا ہے پس نوبت کنولشن کی ٹو - بر - کیو - لرے - ٹن - جانی - ٹش کے سبب سے پیدا ہو سکتی ہے ۔ اور ان سببوں سے بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ جب دماغ میں خون کم پہنچتا ہے جیسے کمزور اور خراب طور پر پلے ہوئے بچوں میں ہوتا ہے یا انجین جو مرض اسہال کے سبب کمزور ہو جاتے ہیں اور یہ مرض اسوقت بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب خون

پہلا اور کثیف ہو جاتا ہے جیسے بعض دفعہ آن چوٹ میں ہو جاتا ہے جنہیں سجاوٹ
 پیدا ہوتے ہیں یا جب خون گردوں کی بیماری کے باعث کثیف ہو جاتا ہے
 اور دانت کھٹکتے وقت اور شکم میں کرم کے ہونے سے اور گردہ سے کنکری کے
 گزرتے وقت اور صرف بد ہضمی سے اور بدن میں سوزن کے چڑھ جانے سے اور ستر
 اور مرطوب ہوا کے لگ جانے سے جب سارے جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے
 اور دفعتاً خوف کھا جانے سے ہی نوبت کنولشن کی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور بعض دفعہ
 کوئی بھی سبب اس مرض کے پیدا ہونے کا دریافت نہیں ہو سکتا یا بعض حکیموں
 کی یہ بھی رائے ہے کہ آن والدین کے بچوں کی طبیعت کنولشن میں مبتلا ہونے کے
 لئے زیادہ تر یا لہتی ہے جتنا بیاہ یا تو نہایت چوٹی یا بہت ہی زیادہ غریزہ
 ہوتا ہے نسبت ان کے جتنا بیاہ جوانی میں ہوتا ہے اور یہ مرض موروثی بھی ہے *
علامات - جب یہ بیماری خفیف ہوتی ہے تب صرف وہی چند علامتیں ظاہر
 ہوتی ہیں جتنا ذکر اس ضمن کے شروع میں کیا گیا ہے لیکن اکثر اوقات ان
 سے بھی زیادہ تر شدید علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں جتنا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہو *
 وضع ہو کہ بعض دفعہ یہ مرض مثل مرگی کی نوبت کے باکسی سلامت مندرہ کے
 دفعتاً ظاہر ہو پڑتا ہے اور بعض دفعہ تو بچہ زور سے چیختا ہے اور بعض اوقات کوئی بھی
 آواز پیدا نہیں ہوتی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چند لمحہ کے لئے بچہ معمولی حالت کی نسبت
 بہت زیادہ بشاش نظر آتا ہے کھٹکی بندہ جاتی ہے۔ بیہوش ہو جاتا ہے چند لمحہ
 تک نام اسکا بند ہو جاتا ہے اور بدن اگر کڑکے حرکت ہو جاتا ہے اور تب نوبت مرض
 کی گزر جاسکتی ہے لیکن اکثر تشنج ہونے لگتا ہے اس وقت عضلے کھینچے اور سکرٹنے
 میں - اطراف کبھی پیسے اور کبھی سکرٹ جاتے ہیں - ہاتھوں کی مٹھیاں اکثر سخت بند
 جاتی ہیں مگر انگوٹھے ہتھیلیوں پر مڑ جاتے ہیں اور سر یا تو سامنے یا پیچھے پکڑی جاتا

کو جھٹکا کہتا رہتا ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اطراف سر اور چہرہ کیساگی
جلد جلد اور زور زور سے جھٹکا کہتا رہتا ہے اور چہرہ اس سبب خوفناک ہو جاتا
ہے کہ اسکے عضلے زور زور سے اور جلد جلد پھٹنے لگتے ہیں جبکہ اوپر اوپر اور
حرکت کرتا رہتا ہے اور بلین ہر چہرہ طرف کچ جاتی ہیں اور سر اور چہرہ کی جلد پہلے تو
منح اور تباہی ہو جاتی ہے آنکھیں وا اور گھومنے لگتی ہیں اور پتلیاں پھیلاتی ہیں
اور اکثر انہر و شنی کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ بچہ دم جلد جلد اور تکلیف سے لیتا ہے نبض
کمزور مگر نہایت تیز ہو جاتی ہے اور چونکہ شکم کے عضلوں میں تشنج ہوتا رہتا ہے
اس واسطے بول و براز بے معلوم نکلتا ہے۔ یہ حالت ڈیڑھ منٹ سے م یا س منٹ
تک رہتی ہے تب بچہ ایک گہری سانس بہتا ہے اور نوبت رفع ہو جاتی ہے
اور تب ماتہ یا پاؤں اور چہرہ کے عضلے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور مریض کی شکل صحت
حالت اصلی پر آ جاتا ہے خون اب اچھے طور پر صاف ہونے لگتا ہے اور بلین اور
چہرہ کی رنگت حالت اصلی پر آ جاتی ہے اس وقت بچہ خوف کہا یا ہو معلوم ہوتا
ہے اور رونے لگتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعد نوبت کے فوراً سو جاتا ہے اور خواب
میں بدن سکا پسینہ سے تر ہو جاتا ہے لیکن جب یہ بیماری جھٹکا ہو نیوالی ہوتی
ہے تب مریض بالکل بیہوش ہو جاتا ہے اور ایسی حالت میں مر بھی جاسکتا ہے ایسا
شافہی ہوتا ہے کہ ایک ہی نوبت ہو کر یہ بیماری رفع ہو جاوے بلکہ نوبت اسکی کبھی
جلد اوپر کبھی زیر سے پہر لوثی ہے جبکہ تو جسم کے ایک ہی جائزین تشنج ہوتا ہے اور کبھی
ایک ہی ماتہ یا پاؤں میں اور بعض دفعہ صرف چہرہ ہی کے عضلے پھٹنے لگتے ہیں
لیکن ہر حالت میں ایسا کم ہوتا ہے کہ عضلوں کا تشنج بدن کے درمیانہ خط کے دونوں
طرف برابر پیدا ہو چنانچہ اس واسطے آنکھیں چہرہ اور سارے بدن بدوول ہو جاتا ہے
اور بہت بیمار کی بالکل بدل جاتی ہے۔ یا درہے کہ نوبت جبکہ خفیف ہوگی اس وقت

زیادہ دیر تک رہ سکی۔ اور یہ کہ نصفہ منفعہ تشنّج گھٹنوں تک برابر ہوتا رہتا ہے اور ان کے درمیان کا وقفہ نہایت کوتاہ ہوتا ہے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نوبتیں اس مرض کی تین چار گھنٹہ تک موقوف رہ کر پھر ظاہر ہو پڑتی ہیں۔ پس ایک ہی روز کے اندر اس مرض کی چہر سات نوبتیں ہو جا سکتی ہیں۔ نہایت خراب نتیجہ اس کا فالج ہو سکتا ہے یا آدھا جسم بچہ کا مفلج ہو جا سکتا ہے یا وہ ہمیشہ کے لئے ہینگا ہو جا سکتا ہے یا اسکی بصارت یا سماعت یا تکلم میں کسی طرح کا نقص پیدا ہو سکتا ہے اور دماغ میں بچہ کے یا تو اس قدر کم صدمہ پہنچ سکتا ہے کہ صرف مزاج ہی چڑچڑا اور غصہ در ہو جاتا ہے یا صدمہ زیادہ پہنچ کر اسکو احمق بنا دے سکتا ہے۔ یا بچہ بالکل احمق ہی ہو جا سکتا ہے۔

علاج اس مرض کا سبب پر منحصر ہے۔ مگر اصول علاج کے یہ ہیں کہ نوبت کیوقت گلے سینہ اور کمر کے کپڑوں کو ڈھسکا کر دین اور مریض کے کمرہ کو خوب ہوا دار کر دین سر کو ذرا اونچا کر دین اور چہرہ پر آب سرد چھڑک دین۔ اندیشہ دوسری نوبت کا ہو تو بچہ کو آب گرم میں ٹہا دین اور سر پر آب سرد رکھیں اسپائین پر برائی کی ٹپی لگانی بھی غلّہ مند ہے۔ قبض ہو تو کوئی سہل دین اور نفخ ہو تو ادویات یہج شکن کا استعمال کریں اور معدہ میں غیر منہضم غذا ہو تو تھے کر دین۔ بچہ دانتوں پر ہوا دوسوڑے سے ہوئے ہوں کہ جس سبب دانتوں کے نکلنے میں تکلیف ہو تو فوراً چیر دین اور تھوڑا مائیدان بوتام کا استعمال کر دین اور نکلنے کی طاقت ہو تو اس دوا کو شوربہ میں حل کر کے بذریعہ پکاری کے داخل کر دین بعد ازاں اگر بے چینی ہو تو ڈائیکویٹ ٹائیدروسیا۔ نک۔ اسڈ ہمارا چند قطرے ٹنچکراف ٹائیو۔ سی۔ ٹس کے پلا دین۔ شکم میں کرم ہوں تو ادویات کرم کش سے انکا علاج کریں۔ خون بچہ کا پتلا پڑ گیا ہو تو مرکبات فولاد کام میں لادین اسباب کو یاد رکھیں کہ کوئی علاج ایسا نہ کر دین جس سے ضعف پیدا ہو جیسے

جو مکین بلشر کیا۔ لو۔ مل اور اسٹ۔ موئی وغیرہ کہلاوین۔ جب شتج کی نوبتین
پے در پے ہونے لگیں تو بچہ کو کلوراسفارم سنگہاؤین اور ساتھ ہی اسکے برومائڈ اف پوٹاشیم
کا استعمال بھی کریں۔

بچہ کن کے کن۔ ول۔ شن کی بیماری میں برو۔ مائیڈ اف پوٹاشیم ہمراہ کلورل مائیڈریٹ
کے بہت مفید ہے چنانچہ حال میں پیدا ہوئے بچہ کو پون (۳) گرین کلورل دے سکتے
ہیں۔ چہرہ جھینے سے برس دن کے بچہ کو فی خوراک نین ۸ گرین۔ دو سال کے بچہ کو
۳ سے ۵ گرین تک۔ سات سے بارہ سال کے لڑکے کو چہرہ سے تیرہ گرین تک
دے سکتے ہیں۔

باسوم

امراض اعصاب و روان خون

مقالہ اول

دل کی وہ بیماریاں جو اعضاء کے فعل کے متعلق ہیں
اول پلے۔ لے۔ شن

عربی میں اس مرض کو خفقان بولتے ہیں۔ اس میں دل اس شدت سے دھڑکتا ہے
کہ بیمار کو اسکی حرکت محسوس ہوتی ہے اور ساتھ ہی اسکے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا

دل سکڑا دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ مریض بیہوش بھی ہو جاسکتا ہے۔ دل اکثر اس وقت زیادہ دھڑکتا ہے کہ جب مریض بستر خواب سے اٹھتا ہے۔

اسباب۔ پیری۔ ڈیپو۔ زنک۔ نازک مزاج۔ اور عورتوں کی طبیعت ایتلی پی مین مبتلا ہونے کے لئے یا مل رہی ہے۔

اکسائیڈنگ کا۔ رنج و غم غصہ و فکر و تردد۔ کثرت مرزوش۔ کمزوری۔ زیادہ خون کا بعضی نایا کسی طوبت طبعی کا زیادہ خارج ہو جانا۔ مسہدات کا بار بار لینا۔ بعضی اور نفع شکم کمی غذا۔ کثرت شراب خواری۔ تنباکو کا کثرت سے استعمال کرنا۔ بے خوابی۔

کسی صیبت کا پڑنا۔ کثرت مطالعہ۔ کثرت مجامعت۔ جلق۔ بعض دفعہ زیادہ چار کے استعمال کرنے سے بھی دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اور قلب کیوڑون کی بیماری میں بھی قلب اکثر دھڑکا کرتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سٹل کی بیماری کی علامتوں کے ظاہر ہونے سے بہت پہلے بیمار کا دل شدت سے دھڑکنے لگتا ہے۔ پس یاد رہے کہ جس کیکا دل با کسی ظاہر سبب کے دھڑکتا ہو تو اسکے شش کو فہر در امتحان کرنا چاہئے۔ جو عورتیں نازک مزاج ہیں اور جنکو معمولی طور پر حیض نہیں آتا ہے وہ اکثر اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔

علاج۔ اگر جسم میں زیادتی خون کی ہو اور دل بھی شدت سے دھڑکتا ہو تو فصد لے سکتے ہیں۔ یا قلب کے مقام پر جو نمکین نگا دین اور نمکین جلاب دین اور بیمار کی غذا کم کر دین لیکن اکثر اس بیماری کا علاج مقویات اور نفعات سے کرنا چاہئے۔ پیپٹریک کے بعض امراض میں اور قلب کیوڑون کی کٹل بیماریوں کے شروع میں علاوہ دوا و علامتوں کے بیمار کا دل بھی دھڑکا کرتا ہے۔ لیکن جب کچھ عرصہ تک یہ علامت جاری رہتی ہے تب ان بیماریوں کو ترقی ہوتی ہے۔ پس ایسی حالتوں میں عرصہ تک دوا دل دھڑکتا رہے تو ڈی۔ جے۔ ٹی۔ انس اور مائیڈرو۔ سیالک اسڈ کے استعمال سے اس کو ٹھیک

چاہئے اور قلب کے مقام پر بلا۔ ڈو۔ نایا۔ او۔ پیچم پلاسٹر کے ٹکائے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔
جب بدبھنی کے سبب دل دھڑکتا ہے تب بدبھنی کا علاج کرنا چاہئے۔ جب شکم میں تھک
بہر جاتی ہے اور اس سبب سے فم معدہ پر دل کی دھڑکن معلوم ہوتی ہے تب یہ نسخہ
مفید پڑتا ہے۔

نسخہ۔ کنیا وٹڈ۔ ٹیکچر آف کار۔ ڈی۔ مم۔ ڈرام۔ کار بونٹ اف گلے۔ شبیا
۱۰۔ اگریں۔ انفیئرین اف رو۔ بریب۔ ڈیڑھ آونس۔ ایک خوراک کر کے پلاوین۔
یا صرف گرمی۔ گو۔ ریزہ۔ پاؤڈر کا استعمال کریں۔

دوم ان۔ جامی۔ نا۔ پکٹورس

تعریف۔ سینہ میں خاصکر اسٹرنم ٹی پی پر وقتاً ایک شدت کا درد ہونا اور بیمار
کا فکر مند ہو جانا اور اسکو موت کا اندیشہ ہونا۔

علامات۔ یہ بیماری اکثر ایسے آدمیوں کو ہو جاتی ہے جو ساری باتوں میں
تندست ہوتے ہیں۔ اس درد کی نوعیت خاصکر اسوقت ہوتی ہے کہ جب بیمار درشت
میں مشغول ہوتا ہے یا جب ہوا کے خلاف کسی اونچے مقام پر چڑھتا ہے یا یہ درد
بعد کہانا کھانے کے پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ چھاتی میں ایک شدت کا درد ہوتا ہے
جو بائیں یا دونوں بازو پر ڈول۔ ٹھانڈ مس کے آخر ہونے کی جگہ تک محسوس ہوتا ہے
اور بعض اوقات پہونچون اور انگلیوں تک ہی پہنچ جاتا ہے۔ یہ درد اسقدر شدید
ہوتا ہے کہ بیمار کے فوراً مرجانے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ درد کے شروع ہوتے ہی
بیمار اگر چلنے سے باز رہ جائے تو کل علامات میں بیماری کی فوراً رفع ہو جاتی ہیں
لیکن جب نوعیت اس بیماری کی بار بار ہوتی رہتی ہے تب اسکی سبب سے یہ مرض اٹھ
کھڑا ہوتا ہے اور شدت پکڑ کر دیر تک رہتا ہے۔ مگر اس بیماری کی نوعیت خاصکر

اُسی وقت زیادہ ہوتی ہے کہ جب صبح کو بیمار ہوتا ہو اُٹھنا چاہتا ہے۔ آخر کار ایک شدت کی فوبت بیمار کو ہلاک کر ڈالتی ہے یا ایسا ہی ہوتا ہے کہ بلا دریا کسی اور علامتوں کے مریض اچان چک مر جاتا ہے ۰

علامات تشریحی بعد وفات۔ بعض دفعہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک یا دو نوکا۔ رو۔ نرمی اور۔ ٹھری کے پیدا ہونے یا بند ہو جانے کے باعث قلب کی ساخت میں خون کم ہو جاتا ہے اور کبھی قلب پر زیادہ جبری جمع ہو جاتی ہے یا قلب کی ساخت جبری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ سلفیڈ یا ہائیڈروجن سلفائیڈ کے اندر رسولی کے دبانے سے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات کوئی ہی علامت اس مرض کی بعد مرگ کے نہیں پائی جاتی ہے تب ایسا گمان ہوتا ہے کہ دل میں شدت کا تشنج ہو کر یہ دور پیدا ہوتا ہے ۰

اسباب۔ پری۔ ڈیپسو۔ زنگ۔ یہ بیماری مردوں کو زیادہ اور عورتوں کو بہت کم ہوتی ہے اور بعد ۵۰ سال کی عمر اکثر ہو جایا کرتی ہے۔

اکسائٹمنگ۔ کاز۔ کثرت سے ورزش کرنا۔ سنج غصہ فکر و تردد۔ بعضی اور شراب خوری ۰

علاج۔ اس بیماری کا علاج دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے ایک تو فوبت کی وقت اور دوسرا دفعہ کے وقت کا علاج۔ چنانچہ

فوبت کے شروع ہوتے ہی بیمار کو نائٹرائٹ اف۔ یا ایل کاعرق جسکے ۱۰۰ حصہ میں ایک حصہ ہو سنگھانا چاہئے۔ اسکو سنگھتے ہی چند سکند کے بعد مریض کا چہرہ سنج ہو جاتا ہے سر کی رنگین خون سے پر ہو جاتی ہیں اور تپل ایک دفعہ زور سے دھڑک اُٹھتا ہے اور درود فرار آئے ہو جاتا ہے اور کل تکلیف دور ہو جاتی ہے ۰ لیکن یہ بات یاد رہے کہ بعض پر اس دو کا اثر بہ نسبت دوسری کے بہت زیادہ ہوتا ہے مثلاً کوئی بیمار

تو اسکے ۵ یا ۱۰ قطرہ تک ہی ہونگے۔ لے سکتا ہے یا ناک کے پاس شیشی رکھ کر اس کا
 بخار دم کے ساتھ اندر بکینچ سکتا ہے۔ اور کوئی ایسے ہی ہوتے ہیں کریشی کو ناک
 سے دور رکھ کر ایک مرتبہ بھی اگر اسکا بخار سونگھ لیں تو فوراً سر گھومنے لگتا ہے ہوشور
 حواس میں فرق پڑ جاتا ہے اور کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ پس بعض ۵ یا ۱۰ قطرہ
 کے پہلے دو یا تین قطرے رد مال میں چھڑ کر سنگھانا چاہئے اور جب اسکی برداشت
 ہو جاوے تب مقدار کو بتدریج ۵ یا ۱۰ قطرے تک بڑھانا چاہئے۔ پہلے پہل حکیم کو
 خود بخواتین سر سنگھانا چاہئے تاکہ دریافت ہو جاوے کہ بیمار کو اس دوا کے سونگھنے کی کتنی
 برداشت ہے لیکن ایک یا دو دفعہ سونگھنے کے بعد مریض کو اسکا تجربہ حاصل ہو جاتا
 ہے اور تب وہ خود اپنے آپ سے سونگھ لیتا ہے۔

اسٹی۔ میو۔ لنٹ اور ان۔ ٹین۔ پاڑ۔ مو۔ ڈوک دو آیتن ہی اس بیماری کی نوبت کو خاتمہ
 کرتی ہیں۔ مگر ٹائٹریٹ اف۔ ایل۔ کی طرح نہیں۔ چنانچہ یہ نسخہ اعلیٰ میو۔ لنٹ
 اور ان۔ ٹین۔ پاڑ۔ مو۔ ڈوک خوب ہے۔

نسخہ۔ اسپرٹ اف ایٹھر۔ ۹ بوند۔ ارو۔ مائیٹ اسپرٹ اف ایو۔ نیام ڈرام +
 ٹینکچر آف بلا۔ ڈر۔ نا۔ ۳۰ بوند + ٹینکچر آف کرن۔ تے۔ ری۔ ڈس۔ ۸۰ بوند +
 کینیاؤنڈ۔ ٹینکچر آف کلور۔ سا۔ فارم۔ ۴۰ بوند + کفر وائر۔ ۴۰ آونس + بسکولالین +
 خوراک۔ ایک آونس۔ چار چار گھنٹہ بعد جب تک درد موقوف نہ ہو دل کے مقام
 پر رائی کی پٹی لگانے سے یا بلا۔ ڈر۔ نا اور کلور۔ سا۔ فارم کے۔ لے۔ نے۔ منٹ کی
 مالش سے بھی درد کو افاقہ ہو جاتا ہے۔

علاج وقفہ کے وقت کا۔ شراب اس بیماری کا دشمن ہے۔ اس سے یکدم
 پرہیز کرنا چاہئے۔ جس دن کہا نا ہضم نہیں ہوتا ہے اور پیٹ میں نفع ہو جاتا ہے
 اسی دن اس بیماری کی نوبت اڑھ کھڑی ہوتی ہے پس کہا نا کہانے میں ہر طرح

کی احتیاط و کار ہے۔ ریاضت شدید سے پرہیز کرنا چاہئے۔ ریح و عشم دل سے دور کریں کیونکہ اس سے بھی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ حسب ضرورت مناسب ادویات کا استعمال کریں۔

یاد رہے کہ یہ بیماری چونکہ اکثر بد ہضمی کے سبب سے پیدا ہوتی ہے تو ایسے بیمار کو اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ قبض نہ ہونا پادے غرض اسحاق التہین سلفٹ اف گلکوشیا سے زیادہ تر فائدہ منصور ہے بہ نسبت نامے۔ ٹریٹ اف رابائل کے تاکہ قبض رفع ہو جاوے اس بیماری کو جلد کے اندر مایٹرو۔ گلکائی۔ سی۔ رین کی چھکاری سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب ایک گرین کا ایکسٹریکٹ (حصہ (ریٹ)) سے لیکر ایک گرین کے ساٹھویں حصہ (ریٹ)) تک کی چھکاری جلد کے اندر کیجاتی ہے فوراً فائدہ ہو جاتا ہے۔

سومرن۔ کو۔ پی۔ لینی غشی

علامات۔ بصارت میں فرق پڑ جاتا ہے اور اکھوں کے سامنے ہشیا جھولتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کانوں میں باجا بجا سانس سنائی دیتا ہے۔ چہرہ اور لبہاں ہلکی پڑ جاتی ہیں۔ ساجسم سر دینہ سے معرق ہو جاتا ہے۔ اسوقت بیمار کو نہ تھا مابادے تو زمین پر گر پڑتا ہے۔ نبض اور نفس کی حرکت ایسی کمزور ہو جاتی ہے کہ بہت کم محسوس ہوتی ہے اور بعض حالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے کوئی بھی آثار نہیں پائے جاتے اور چہرہ پر مردہ پن چھا جاتا ہے۔ ہر اطراف ہو جاتا ہے۔ اکھیں بند اور دست و پا ٹھٹھیلے ہو جاتے ہیں۔ جب حالت غشی سے رلیض ہریش میں آنے لگتا ہے تب ہنڈی سانسین بہر تا ہے اور اکثر دست رتے ہو جاتی ہے یا شل صر کے اسکو تشنج ہونے لگتا ہے۔ جب یہ مرض خفیف ہوتا ہے تو یہ پوشی

کامل نہیں ہوتی صرف نبض کمزور ہو جاتی ہے۔ چہرہ پھیکا اور بیمار کا جی متلاتا ہے اور پیشانی پر پسینہ کے قطرات نمودار ہوتے ہیں +

اسباب - پیری - ڈسپو - زہک - نازک مزاج - ضعف - خون یا کسی اور رطوبت کا نکل جانا - قلب کی ساخت یا فعل کی بیماریاں +

اکسائیٹینک کارڈ - ریج و غشم فکر و تردد - شدید درد - زیادہ خون کا نکل جانا +

تشخیص - سن - کو پی کی حالت کو کو - ماکہ حالت سے فرق کرنا چاہئے کیونکہ ان دونوں حالتوں میں بیہوشی طاری ہو جاتی ہے + پس مایور سے کم سن - کو - پی کی بیہوشی زیادہ خون کے نکل جانے یا کسی اور سبب سے یا کم طاقتی کے پیدا ہونے سے ہو جاتی ہے + کو - ماکہ بیہوشی شراب یا افیون کے نشہ میں ہو جاتی ہے یا خون میں کسی زہر کے سمریت کر جانے سے اور ا - پو - پلکسی یا مرگی کی بیماری میں پیدا ہوتی ہے + سن کو پی کی بیہوشی میں چونکہ دماغ میں خون کم پہنچتا ہے اس واسطے مریض کا چہرہ - آنکھیں اور لین سلی پڑ جاتی ہیں اور نبض نہایت کمزور ہو جاتی ہے اور دل بھی نہایت آہستہ آہستہ حرکت کرتا ہے +

کو - ماکہ بیہوشی میں دماغ کی رگیں خون سے پُر ہوتی ہیں اس واسطے مریض کا چہرہ سرخ یا اودا پڑ جاتا ہے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں - کینٹی اور گلو کی رگیں زور زور سے تڑپتی ہیں نبض پُر اور سخت چلتی ہے دل دھڑکتا ہے + سن - کو - پی کی بیہوشی میں مریض سانس لینا سخت آہستہ آہستہ لیتا ہے کہ سانس لینے کی حرکت نہایت کم محسوس ہوتی ہے + برخلاف اس کے کو - ماکہ بیہوشی میں مریض سانسین گہری گہری اور خراٹے کے ساتھ لیتا ہے + سن - کو - پی کی بیہوشی کے علاج میں بیمار کا سر بہ نسبت جسم کے نیچا رکھنا چاہئے تاکہ دماغ کی طرف خون رجوع کرے - مگر کو - ماکہ بیہوشی میں مریض کا سر اوپر رکھنا چاہئے تاکہ دماغ کی طرف خون رجوع کرمانا پاوے + سن - کو پی کی بیہوشی میں بیمار کو

ایمو۔ نیا وغیرہ اور اسٹی۔ میو۔ لٹ۔ دو اینٹیں منگھانی چاہئیں تاکہ قلب کی حرکت تیز ہو جاوے۔ کو۔ ماکہ بیہوشی میں ان دواؤں کو نہ منگھانا چاہئے۔

علاج۔ جب صرف صنف یا نزاکت کے باعث غشی طاری ہوتی ہے تو اس میں چندان لذت نہیں ہوتا۔ بیمار کو فوراً اس ترکیب لہا دیں کہ مہر اسکا بر نسبت جسم کے نیچا ہوتا کہ دماغ کی طرف خون رجوع کر سکے اور کھلی ہوا میں رکھیں۔ چہرہ اور گردن پر آب سرد چھڑکیں اور ایمو۔ نیا کی ہونٹ منگھالیں جسکے پیدا کرنے کی آسان ترکیب یہ ہے کہ تولہ بہر نوشادر پیکر ایک شیشی میں چھوڑ دیں اور اس میں آتھن ہی پان کھانے کا چونڈا لیں بعد ازاں اس شیشی میں کوئی تولہ یا دو تولہ پانی چھوڑ کر منہ اسکا خوب بند کر دیں اور اسکو لہا دیں۔ اس ترکیب سے ایمو۔ نیا کی ہوا اس شیشی کے اندر پیدا ہو جائیگی۔ ڈانٹ کہو لکر شیشی کا منہ مریض کی ناک کے سامنے لیجائیں۔ اس تیز ہوا کے سونگھتے ہی مریض ہوش میں آجاتا ہے۔ اگر کوئی شیشی پاس نہ ہو تو آسان تر ترکیب پوانڈ کو رکے پیدا کرنے کی یہ ہے کہ تھوڑا چونڈا نوشادر پیکر اپنی ہتھیلی میں گرہن اور مریض کو منگھالیں۔ کوئی پوشاک تنگ ہو تو اسکو کہو لیں۔ جب ہوش آ جاوے اسٹی۔ میو۔ لٹ۔ دوا کا استعمال کریں۔

مقالہ دوم

پردہ پے۔ رمی۔ کار۔ ڈوی۔ ام کی بیماریاں

اول پے۔ رمی۔ کار۔ ڈوی۔ لٹ

پردہ پے۔ رمی۔ کار۔ ڈوی۔ ام کا انفلاشن و قسم کا ہے۔ ایک ٹیوٹ۔ دوسری کالکٹ

ایکویٹ پے۔ رمی۔ کار۔ ڈوائی۔ ٹس

یہ مرض از خود بہت کم پیدا ہوتا ہے بلکہ ایکویٹ رو۔ ما۔ ٹیزم کے سبب سے اکثر ہوتا ہے ۴

علامات۔ جاڑا چڑھ کر قاعد کے مقام پر درود ہوتا ہے۔ ٹیس اس درد کی بائیں بازو اور بعض دفعہ پہنچے اور انگلیوں تک پہنچ جاتی ہے یا تو درد شدید یا خفیف ہوتا ہے۔ قلب اکثر شدت سے دھڑکتا ہے۔ قدرے بخار رہتا ہے۔ نبض یا تو وسیع پر سخت اور باقاعدہ چلتی ہے یا نہایت وسیع ضعیف اور بے قاعدہ حرکت کرتی ہے۔ دم لینے میں تکلیف یا سچکیان آتی ہیں۔ مریض بے چین اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا دم ہکا گھٹتا جاتا ہے۔ بدن یا تو پسینہ سے نہا جاتا ہے یا خشک اور گرم ہوتا ہے۔ چہرہ سیلا یا نہایت فکر مند۔ بعض دفعہ تھوڑا بہت تشنج ہوتا ہے یا تھوڑے عرصہ کے لئے مریض کو نڈیان ہو جاتا ہے۔ جب بیمار سوجاتا ہے تو خوابات متوحش سے نیند اُسکی ٹوٹ جاتی ہے اور بعض اوقات نیند بالکل آتی ہی نہیں۔ بعض دفعہ بیمار کو اپنے مرض کا استقد رائیشہ اور بیماری سے استقد رکلیف ہوتی ہے کہ مارے ڈر کے حرکت نہیں کرنا چاہتا۔ جب یہ بیماری ٹھہرے۔ ہونیوالی ہوتی ہے تو دم لینے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ چہرہ نیلگون ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کا نور جاتا رہتا ہے اور جسم سرد پسینہ سے معرق ہو جاتا ہے۔ قلب کے مقام پر انگلیوں سے ٹھونکین تو آواز ٹھوس سنائی دیتی ہے اور چون چون پے۔ رمی۔ کار۔ ڈیم کی تہلی میں پانی زیادہ پیدا ہوتا جاتا ہے۔ آواز پر کشن کی زیادہ تر ٹھوس ہوتی جاتی ہے۔ مقام مذکور پر کان دہر کر سنیں تو رگڑ کی آواز سنائی دیتی ہے جبکہ مصلح میں ذرک۔ شن سا دھبہ ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ آواز ملایم ہوتی ہے لیکن جب لف پیدا ہو جاتا ہے اس وقت تیز

ہو جاتی ہے اور چون چون پے۔ ری۔ کار۔ ڈویم کی تہلی میں پانی زیادہ پیدا ہوتا جاتا ہے آواز مذکور پیدا نہیں ہوتی اور اسوقت بھی یہ آواز بند ہو جاتی ہے کہ جب دلو سطح پر وہ پے۔ ری۔ کار۔ ڈویم کے لف سے جڑ جاتے ہیں ۴۔ زن کی آواز پہلے تو سینہ کے درمیان حصہ کے کسے قدر بائیں طرف اور سینہ کی ہڈی کے قریب درمیان حصہ پر سنائی دیتی ہے اور دمان سے سارے مقام قلب پہنچا ہے اور ساتھ اس فرق۔ زن کے ایک اڈر آواز مرمر کی بھی پیدا ہوتی ہے جب کسے مذکور میں پانی زیادہ پیدا ہوتا ہے تب قلب کی آواز پہلے تو وہی پیدا ہوتی ہے بعد ازاں چون چون پانی زیادہ پیدا ہوتا جاتا ہے کمتر سنائی دینے لگتی ہے آواز کا بالکل سمع نہیں ہوتی ۵

نتائج۔ یا تو یہ بیماری بالکل رفع ہو جاتی ہے یا ایکٹ سے یہ مرض کرناک ہو جاتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ پر وہ پے۔ ری۔ کار۔ ڈویم جڑ جاتا ہے یا بیمار مر جاتا ہے ۵

اسباب۔ جب رو۔ ما۔ ٹیزم یا گاؤٹ کی بیماری موروثی ہوتی ہے ۵

اکسائٹنگ کاز۔ سردی یا وجع مفاصل کی بیماری کا پر وہ پے۔ ری۔ کار۔ ڈویم میں انتقال کر جانا۔ گردہ کی بیماری اور مرض بائتی۔ میا ۵

تشخیص۔ عین تہہ امین پے۔ ری۔ کار۔ ڈویم۔ ٹین کو انڈو۔ کا۔ ڈوئی۔ ٹین سے فرق کرنا چاہئے۔ مگر علامتوں کے ذریعہ ان دو بیماریوں میں فرق کرنا نہایت مشکل ہے لیکن درد اگر شدت کا ہو تو پے۔ ری۔ کار۔ ڈویم۔ ٹین کا گمان ہونا چاہئے اس مرض کے فرق۔ زن کی آواز کا مطالعہ بلو۔ ری۔ سے کے فرق کی آواز سے ہو سکتا ہے۔ امتحان کیہ وقت مریض کو سانس بند کرنا کہیں اس سے بلو۔ ری۔ سے کے فرق کی آواز سنائی دے گی مگر پے۔ ری۔ کار۔ ڈویم۔ ٹین کی جیسے آواز سنائی دے گی

علاج۔ مقام مرض پر جو کہین لگا دیں یا بذریعہ کلاس کے خون لین اور اسی کے

پول۔ ٹیننگا دین اور اسکو دودو گنٹھ بیدلہ یا کرین مستبض ہو تو ایک جٹابین اور
غذا بیمار کی کم کر دین جب شدت مرض کی کم ہو جاوے تب مقام قلب پر ایک
بلٹرنگا دین اور اسکے زخم کو کئی روز تک سداون کی مرہم سے ہر ایک دین اور کہانے
کو او۔ پیہم کا استعمال گنٹھ گنٹھ یا دودو یا تین تین گنٹھ بعد کرین تاکہ درد کو افاقتہ ہو
اور مرض کو چین آجاوے۔ اگر مرض نہایت شدید اور از خود پیدا ہو تو ایک گرین کا
چٹا یا چہتا حصہ ٹار۔ ٹار۔ امٹک کا استعمال کرین۔ اگر یہ مرض وجع مفاصل کے باعث
ہو تو سا۔ لے۔ سی۔ لٹ۔ اف۔ سو۔ واکا استعمال کرین جیسارو۔ ما۔ ٹیرم کے
علاج میں بتلایا گیا ہے۔

کرانک پے۔ ری۔ کار۔ ڈامی ٹیس

یہ مرض اکثر نتیجہ ایکوٹ بیماری کا ہوتا ہے اور خاصکر یہ بیماری وجع مفاصل شدید
میں ہو جایا کرتی ہے۔

علامات۔ دل دھڑکتا ہے۔ دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور ساتھ ان
علامتوں کے ہضد فحہ خشک کہانسی بھی ہوتی ہے۔ بیمار بائین کر دٹ لیٹ نہیں
سکتا۔ مقام قلب پر کیتھاردر دیا بے چینی معلوم ہوتی ہے۔ بیمار کا دم گٹھنے لگتا
ہے۔ کمال ضعف ہو جاتا ہے۔ اسحالت سے یا تو آہستہ آہستہ شفا ہونے لگتی ہے یا
بائید ٹرو۔ پے۔ ری۔ کار۔ ڈیریم ہو کر بیمار ملک بقا کو کوچ کر جاتا ہے۔

علاج۔ مقام مرض پر بلٹر یا آئیوڈین ٹنگا دین اور آئیوڈائیڈ اف ایرن۔
اور کوئین کا استعمال کرین۔

دوم ٹائیڈرو۔ پے۔ رمی۔ کار۔ ڈیم

اس بیماری میں پے۔ رمی۔ کار۔ ڈیم کی تھیلی میں پانی بھر جاتا ہے۔ یہ مرض ڈراپ۔ سی کی قسم ہے۔ اور دورانِ خون میں جب رکاوٹ ہوتی ہے پیدا ہوتا ہے۔
علامات۔ قلب کے مقام پر ایک بوج اور بستی معلوم ہوتی ہے۔ دم لینے میں نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ چہرہ ہرا ہرا یا سیاہ۔ مریض کو اکثر غش آ جاتا ہے یا بھانچ ہو جاتا ہے۔ نبض سیرع کمزور اور بیقاعدہ چلتی ہے۔ مریض اکثر بستر پر بٹھا رہتا ہے اور حرکت کرنے یا کروٹ بدلنے سے نہایت خوف کھاتا ہے۔ جب پانی بہت پیدا ہو جاتا ہے تب قلب کا مقام اونچا ہو جاتا ہے اور مقاماتِ بائیں پسلیوں کے بھی اونچے ہو جاتے ہیں ٹھونکنے سے آواز اُس جگہ کی ٹھوس نکلتی ہے جب بیمار لیٹا رہتا ہے تب قلب کی حرکات محسوس نہیں ہوتیں۔ اور جب کھڑا یا بٹھا رہتا ہے اُس وقت وہ حرکتیں ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کرتی رہتی ہیں۔ آوازِ قلب کی بہت خفیف سنائی دیتی ہیں لیکن سینے کے اوپر کے حصہ پر زیادہ سموع ہوتے ہیں اور بیمار کی کروٹ بدلنے سے ٹھوس آواز ٹھونکنے کی بھی بدلتی رہتی ہے۔

علاج۔ اس مرض کا مثل اور ڈراپ۔ سی کی بیماریوں کے بذریعہ مسہلات اور مدرات کے کرنا چاہئے۔ قلب کے مقام پر بڑا سا بلٹہ لگا دیں اور اسکے زخم کو سادہ کے مرہم سے ہرا کہیں۔ بعض صورتوں میں کہ جب پانی بہت جمع ہو گیا ہو ٹیٹے پینگ کر کے اُس پانی کو نکال لایا ہے۔ جگہ ٹیپ کرنے کے پانچوین اور چھٹی پسلی کی میچ کی جگہ ہے۔ ٹرو۔ کار کو پانچوین اور چھٹی پسلی کے درمیان دھل کرنا چاہئے۔

مقالہ سوم

دل کی اکیوٹ بیماری

ان - ڈو - کار - ڈوائی - ٹس

ان - ڈو - کار - ڈویم وہ باریک جھلکی ہے جو دل کے خانون اور کیوٹوں میں پائی ہے۔
غرض اسی جھلکی کے انفلیمیشن کو اصطلاح میں ان - ڈو - کار - ڈوائی - ٹس کہتے ہیں۔
یاد رہے کہ یہ مرض مہنے خانون میں بہت کم ہوتا ہے اور بائیں خانہ کے ہی خاصہ کیوٹوں
ہی پر ہوجاتا ہے۔

اسباب - یہ بیماری اکیوٹ رو - ما - ٹیزم میں اکثر ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ
مرض اسکار - نے - ٹینا اور پیور - پے - رل فیوڈیا گروڈن کی بیماری میں بھی ہو جاتا
کرتی ہے۔ گادٹ کی بیماری کے ساتھ ہی یہ مرض لگا ہے گا ہے پیدا ہوتا ہے۔

ماہیت - جب یہ مرض کیوٹوں پر ہوتا ہے تب اپر خون جمع ہو جاتا ہے اور
وہ موٹے ہو جاتے ہیں اپر لف کے چھوٹے چھوٹے دانے پیدا ہو جاتے ہیں اور چونکہ
ان کیوٹوں پر خون کا غائی - برین بھی منجمد ہو جاتا ہے اس واسطے وہ کھردور سے ہو جاتے
ہیں اور کچھ عرصہ بعد کٹ رہے ہو جاتے ہیں اور مسکڑا کر سخت یا جڑ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے
سخت ہو جاتے ہیں کہ ان کا دور وارہ مسکڑ جاتا ہے اور وہ ٹکٹے ہو جاتے ہیں۔

علامات - جب یہ مرض نتیجہ اکیوٹ رو - ما - ٹیزم کا ہوتا ہے تب اسکی علامتیں
بہت نمایاں نہیں ہوتی ہیں۔ اس صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض کیفیت رکھو مگر سیرج
ہو جاتی ہے اور مریض دم جلد جلد لیتا ہے۔ چہرہ اسکا نر مند ہو جاتا ہے لیکن وہ بہت

خفیف یا کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہ مرض اکثر کم ٹھنک جاتا ہے لیکن اسکے نتائج بہت بُرے ہوتے ہیں مگر جب یہ بیماری از خود پیدا ہوتی ہے تب نہایت شدید اور اکثر ٹھنک ہو جاتی ہے۔ ہضوتین سن کے مقام پر ایک بوجہ اور بے عینی معلوم ہوتی ہے اور بیمار بے چین اور فکر مند ہو جاتا ہے اور چیت بڑا رہتا چاہتا ہے۔ سہیز بخار ہوتا ہے اور نبض کمزور ہو جاتی ہے اور سر دسینہ بھی آتا ہے۔ تنگی نفس کی ہوتی ہے۔ تاہم باونین تشنج اور غشی طاری ہوتی ہے۔

فے۔ زمی۔ کل۔ سائینس۔ اس بیماری میں دل کے مقام پر تھہر گئے سے دل نہایت دھڑکنا پو محسوس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ دل کانپتا پو ابھی معلوم ہوتا ہے۔ دل کے مقام کو ٹھونکنے سے ٹھوس آواز کی حد بڑھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ کان لگا کر سنیں تو ایک ملائم مرمر کی آواز سمجھ ہوگی یعنی اسی آواز جیسے گواہ کی دوہونگنی سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر مرمر کی آواز دل کے پینہ سے پر بہت صاف سنائی دے تو جاننا چاہئے کہ انفلمیشن یا ریڈ ٹاک کے کیوڑون میں ہے اور اگر دل کی پہلی آواز کے ساتھ سنائی دے تو اس سے خون کا بطن میں ہیر لوٹ جانا ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر مرمر کی آواز دل کی نوک پر آد اسکے بائیں طرف بھی خوب صاف سموع ہو تو بیماری مائی۔ ٹرل۔ وا۔ لو میں ثابت ہوگی۔

علاج۔ اس مرض کا بعینہ مثل بے۔ ری۔ کار۔ ڈوائی۔ ٹرس کے ہے لیکن چونکہ ایمو۔ نیا خون کے مائی۔ برین کو جمع ہونے نہیں دیتا اس واسطے عین ابتدائے مرض سے اس بیماری میں یا تو کار۔ بونٹ ان ایمو۔ نیا یا رو۔ ماٹک اسپرٹ ان ایمینیا کا استعمال چھ طور پر کرنا چاہئے۔



مقالہ چہارم

دل کے نرمن امراض

اول وال - ویلو - لہر - ڈومی - زینر

دل کے کیوڑوں کی بیماریاں


ان بیماریوں کے بیان کرنے سے پہلے دل کی مختصر تشریح اور اس عضو کا کام کیا ہے یہ بیان کرنا ضروری ہے۔ پس واضح ہو کہ قلب کی مختصر تشریح یہ ہے کہ یہ ایک لحمی عضو ہے اور سینہ کے اندر ترچھا اسطور پر واقع ہے کہ جب ہم بٹھتے یا کھڑے ہوتے ہیں تو قلب کا پئید اور پر اور پشت کی طرف اور دہنی جانب کو ہوتا ہے اور نوک اسکی پیچھے اور آگے اور بائیں طرف ہوتی ہے۔ قلب کے ان حصوں پر اور بڑی رگوں پر شش بہنیں ہوتی ہیں یعنی پلوی - نری - ارٹری کی جڑ پر۔ ایسا رہا کہ چڑھتے ہوئے حصہ پر دہنی بطن کے سامنے کی سطح پر کچھ تھوڑا دہنی اُذن پر۔ اور بائیں بطن کی نوک اور سامنے کے کنارے پر۔

تاکہ مرض کی تشخیص میں آسانی ہو اسلئے ہم دل کے مختلف حصوں کے مقام کو علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں۔ ناظرین جب اس بیان کو پڑھیں تب تصویر ذیل کو مد نظر رکھیں۔

یاد رہے کہ دل کے قریب دو تہائی (دیکھ تصویر کو) درمیانہ خط کے بائیں طرف ہوتی ہے۔ دو نو آریکلس یعنی اُذن کے اوپر کا کنارہ اس خط کے برابر ہوتا ہے جو دہنی طرف کی دوسری اور تیسری پسیلی کے بیچ کی جگہ سے شروع ہو کر سینہ کی

پڑی گئے پار گزر کر بائیں طرف کی پہلی اور دوسری پہلی کی بیچ کی جگہ پر آخر ہوتا ہے۔

(تصویر سینہ کی)



وہنا اذن دریکہو تصویر کے حرف الف کو چوڑائی میں یہ اذن پہیلا ہوا ہے
سینہ کی پڑی کے وہیے کنارے کے تریبا ایک پنخ فاصلہ سے لے کر اسی

ہڈی کے بائیں نصف کے بیچ تک اور لمبائی میں دہنی کتری کے درمیانہ حصہ سے لیکر
چوتھی کتری کے نیچے کے کنارے تک *۔

بایان اُذن لمبائی میں پہلیا ہوا ہے بائیں طرف کی دوسری اور تیسری پسلیوں کے
بیچ کی جگہ سے لیکر بائیں طرف کی چوتھی کتری کے اوپر کے کنارہ تک اور چوتھی میں
بشت کے اٹھویں فقرہ اور اُس کے قریب کی پسلی کے سرے کے برابر تک *۔

دہنا بطن لمبائی میں بائیں طرف کی تیسری کتری سے لیکر چوتھی کتری تک پہلیا ہوا
ہے *۔ گول کنارہ بائیں بطن کا بائیں طرف پہلیا ہے تیسری پسلی سے لیکر پانچویں
اور چوتھی پسلیوں کے بیچ کی جگہ کے اُس نقطہ تک جو دو پنج سیدھا پستان کے
سر کے نیچے واقع ہے *۔

دل کی نوک (دیکھو تصویر حرف ب) پانچویں اور چوتھی پسلی کے بیچ کی جگہ میں ہوتی
ہے بلکہ چوتھی پسلی کے اوپر کے کنارے کے قریب اور درمیانہ خط کے قریب ساڑھے
تین انچ بائیں طرف پر واقع ہے *۔

ٹرائی - کس - پڈ - وَاَلُو - سینہ کی ہڈی کے نیچے کے چہارم حصہ کے نیچے واقع
ہے *۔

مانی - ٹرل - وَاَلُو - تیسری اور چوتھی پسلیوں کے بیچ کی جگہ سے لیکر پانچویں کتری
تک سینہ کے ہڈی کے بائیں نصف کے نیچے واقع ہے *۔

پلمو - نرمی - وَاَلُو - واقع ہے سینہ کی ہڈی کے ٹھیک بائیں طرف اور اُس میں
اور تیسری کتری کے کنارے کے نیچے *۔

ا - یار - ٹاکٹ - وَاَلُو کا یہی کچھ حصہ سینہ کی ہڈی کے بائیں نصف کے نیچے واقع
ہے اور پلمو - نرمی - وَاَلُو کے یکدیگر نیچے اور تیسری کتری اور تیسری اور چوتھی پسلیوں کے
بیچ کی جگہ کے نیچے کے حصہ کے مقابلہ پر ہوتا ہے *۔

پلمو- نرمی اور نرمی - یہ شریان سینہ کی ہڈی کے قریب اور بائیں طرف کی دوسری اور تیسری اسپی کے بائیں ہونی ہے ۔

۱۔ یار۔ ٹا۔ اس شراب کا چڑھتا ہوا حصہ سینہ کی ہڈی کے بچون بیچ ہوتا ہے اور
۲۔ نیو۔ بریم ہڈی کے پیچھے سے یہ شراب جسم کا شراب شروع کرتی ہے اور بائیں طرف کو
اگر پہلی اور دوسری پہلی کے درمیان اس کا محراب بنتا ہے اس شراب کا اترتا ہوا
حصہ تیسرے فقرہ پشت کے بائیں طرف شروع ہوتا ہے ۔

قلب کا تھان مثل شش کے دو ترکیبوں سے کرتے ہیں۔ اول پرکش اور دوم سکلے رشن۔
اول پرکش۔ اگر کسی تندرست اور توانا آدمی کے سینے کے اُس مقام کو ٹھونکن جو
 سینہ کی ہڈی کے بچے کے نصف کے بائیں طرف واقع ہے کہ جہاں قلب کی حرکت
 محسوس ہوتی ہے اور جبکہ قطر قریب دو انچ کے ہے تو ٹھوس دانہ پیدا ہوگی۔ واضح ہو
 کہ یہ مقام وہ حصہ قلب کا ہے جس پر شش نہیں ہوتا عموماً وہ اُس جگہ کے ٹھونکنے کی
 آواز صفائی پر آتی جاتی ہے اور زیادہ اور کم ہونا اُس صفائی کا پیڑھے کی مانند
 پر منحصر ہے لیکن اگر دوسرے ٹھونکن تو پیڑھے سے گزر کر آواز ٹھوس پیدا ہوگی۔ جب
 قلب بڑا ہو جاتا ہے یا پے۔ رمی۔ کار۔ ڈیم کی ہتھیلی میں بانی پیدا ہوتا ہے تب حلقہ
 ٹھوس آواز کا بھی بڑھ جاتا ہے اور اس وقت بھی یہ حلقہ بڑھ جاتا ہے کہ جب قلب کے
 اوپر جو حصہ شش کا ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے یا جب پے۔ رمی۔ کار۔ ڈیم اور
 سینہ کے مابین کوئی رسولی ہوتی ہے یا جب جگر کا بائیں گوش بڑھ جاتا ہے +
 برعکس اسکے اگر قلب کے مقام کو ٹھونکنے سے آواز صاف نکلے تو اس سے یہ ثابت نہیں
 ہوتا کہ قلب بڑھ نہیں گیا ہے کیونکہ جب پیڑھے میں ام۔ فائی۔ سی۔ مائی بیماری ہو جاتی
 ہے یا مرض نیو۔ مو۔ تھو۔ مارکس میں یا جب معدہ میں ہوا بہر جاتی ہے تو ٹھونکنے سے
 آواز اس قدر صاف نکلتی ہے کہ قلب کی بیماری ثابت نہیں ہو سکتی اور تندرست

اول پرسش۔ اگر کسی تندرست اور توانا آدمی کے سینے کے اس مقام کو ٹھونکیں جو

سینہ کی ہڈی کے نیچے کے نصف کے بائیں طرف واقع ہے کہ جہاں قلوب کی حرکت

محسوس ہوتی ہے اور جبکہ قطر قریب دوپانچ کے ہے تو ہڈیوں کی دانہ پیدا ہوگی۔ واضح ہو

کہ یہ مقام وہ حقہ قلب کا ہے جس پر شش نہیں ہوتا۔ علامہ اُس جگہ کے ٹھونکنے کی

آواز صفائی پر آتی جاتی ہے اور زیادہ اور کم ہونا اس صفائی کا پتہ ہے کہ مہارت

پرمختصر ہے لیکن اگر دور سے ہوں تو یہ نہیں سے گزیر کر آواز ہوس پیدا ہوگی۔ جب

غلب بڑا ہو جاتا ہے یا پے۔ رمی۔ کار۔ ٹیم کی ہتھیلی میں پانی پیدا ہوتا ہے تھلے

ہوس آواز کا بھی بڑھ جاتا ہے اور اس وقت بھی یہ حلقہ بڑھ جاتا ہے کہ جب قلب کے

اور جو حدیث کا ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے یا جب پے۔ رمی۔ کار۔ ڈویم اور

سینہ کے مابین کوئی رسولی ہوتی ہے یا جب جگر کا بائیں گوشہ بڑھ جاتا ہے +

برعکس سکے اگر قبضے کے مقام کی ٹھونکنے سے آواز صاف نکلے تو اس سے یہ ثابت نہیں

ہو ماکہ کتب بڑے ہندین گیا ہے کیونکہ جب پٹنہ میں ام۔ فاضل۔ سی۔ ماکہ جاری ہو جاتی

آدمیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سوتے وقت یا لمبی سانس لیتے وقت ہونچکے سے آواز صاف نکلتی ہے +

دوم اسکٹے۔ لشن - واضح ہو کہ قلب کی دو حرکتیں ہیں ایک انقباض اور دوسرے انبساط یعنی سکڑنا اور پھیلنا + حرکت انقباض کو اصطلاح میں سٹوٹے اور حرکت انبساط کو ڈا - یس - ٹو - لے بولتے ہیں + قلب کے دونوں اُذن (آریکل) ایک ہی ساعت میں سکڑتے ہیں اور دونوں بطون (وینٹریکل) بھی ایک ہی فہ سکڑتے ہیں اور آریکل کے سکڑنے کے بعد ہی وینٹریکل فوراً سکڑ جاتی ہیں اور قلب کے ہر حصہ کے ریشوں کے سکڑنے کے بعد ہی پھر وہ ریشے فوراً ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور دونوں وینٹریکل کے پھیلنے اور اور دونوں آریکل کے دوسری دفعہ کے سکڑنے کے مابین ایک وقفہ گزرتا ہے - پس ماورے کہ قلب کے ہر ایک پورے فعل کے بعد متواتر دو آوازیں پیدا ہوتی ہیں اور ان دونوں آوازوں کے مابین ایک وقفہ گزرتا ہے - انہیں سے ایک آواز کو فرسٹ ساؤنڈ یا سٹامک ساؤنڈ کہتے ہیں کیونکہ یہ آواز اُس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب دونوں بطن سکڑتے ہیں اور جب دل کی نوک سینہ کی دیوار پر ٹکڑ کھاتی ہے اور جو وقت بڑی بڑی شراہیں ترتیبی ہیں + اس آواز کو قلب کی نوک پر سنا چاہئے + دوسری آواز کو اصطلاح میں سیکنڈ ساؤنڈ یا ڈا - یاس - ٹو - لک ساؤنڈ کہتے ہیں کیونکہ یہ آواز اُس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب دونوں بطن پھیلنے میں اور جب دل ٹکڑ کھانے کے بعد سینہ کی دیوار سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور جب دل کی بڑی شراہیں بے حرکت ہو جاتے ہیں + اس آواز کو اسٹریم ٹیڈی کے بچوں پر اور اسکے مابین کنارہ کے قریب اور دوسری دتیریری پسی کے مابین سنا جاتے +

فرسٹ ساؤنڈ کے بعد نہایت تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے کہ جو صرف اُس وقت معلوم ہو سکتا ہے کہ جب نبض ۶۰ وقفہ سے زیادہ نہیں حرکت کرتی ہے لیکن دوسری آواز

کے بعد خاصہ دراز وقفہ پڑ جاتا ہے۔ جب ان دونوں آوازوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو پہلی آواز نسبت دوسری کے لمبی اور بھٹی ہوتی ہے اور دوسری آواز زیادہ تر صاف تیز اور جلد گزر جاتی ہے۔

مقامات کہ جہان جہان سے یہ آوازین گزرتی ہیں۔ پہلی آواز اوپر کی طرف گزرتی رہتی ہے۔ مین۔ پراسس تک جاتی ہے لیکن اٹنا براہ میں کمزور ہو جاتی ہے اور دہنی طرف کی اگر دہمین۔ پراسس کی طرف اسکی تیزی زیادہ تر کم ہو جاتی ہے مگر بائین طرف نسبت پر خوب صاف سنائی دیتی ہے۔ دوسری آواز قلب کے پندے کی طرف خوب سنائی دیتی ہے اور دل کے اور مقامات کی نسبت اکثر اسٹرنم بڈی کے پچونچ دوسری اور تیسری پسلی کے بائین زیادہ تر صاف سنائی دیتی ہے۔

قلب کی آواز حالت مرض میں۔ اسکو ممر کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ممر ایک غیر معمولی آواز ہے جو دل کی معمولی آوازوں کے ساتھ بیماری کی حالت میں پیدا ہوتی ہے۔ ممر کی آواز قلب ایک یا دو نو تندرست آوازوں کے ہمراہ سنائی دیتی ہے۔ ممر کی آواز کئی قسم ہو سکتی ہے یعنی یا تو مثل وہن مکنی کی آواز کے یا سو مان کے گزرنے کے یا از کشی کے مثل وہن مکنی کی آواز کے۔

قلب کے مقام کی چار جگہ پر ممر کی آواز خوب صاف سنائی دیتی ہے اول قلب کی نوک کی بائین جانب کے کچھل پیر۔ دوم کوڑی رائن سی۔ فارم کار۔ ٹم۔ ج کے تھوڑی اور اسٹرنم بڈی کے پچونچ۔ سوم تیسری اور چوتھی پسلی کے مابین۔ چہارم اس مقام پر کہ جہان بائین جانب کی تیسری پسلی اسٹرنم بڈی کے ساتھ ملتی ہے۔

اسباب۔ ممر کی آواز چار سببوں سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اول جب قلب کو بی دماغ صرف سکڑ جاتا ہے۔ دوم جب قلب کا کوئی دماغ صرف پہلی جاتا ہے۔ سوم جب قلب کے

اندر کی کوئی سیج پہ دروہی ہو جاتی ہے چہاں جب تیسرے سبب اول در دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے ۴ جب ممر کی آوازیں ان سببوں سے پیدا ہوتی ہیں تب ان کو آر۔ گے۔ نہت کہتے ہیں اور جب خون کے پتلا پڑ جائے یا قاب کے افعال میں خلل واقع ہونے سے پیدا ہوتے ہیں تب انکو آر۔ گے۔ نہت ممر کہتے ہیں ۵

اسباب اور ماہیت دل کے کیواڑوں کی بیماریوں کے۔ اکثر تغیرات جو دل کے خاتون کے استر میں واقع ہوتے ہیں وہ انفلامیشن کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں یعنی جب اس پردہ میں (ارن۔ ڈو۔ کار۔ ڈی۔ ام) انفلامیشن ہوتا ہے تب اس کے نیچے اور اوپر لطف پیدا ہو جاتا ہے جس سے دل کے کیواڑ (وائٹس) موٹے ہو کر سخت ہو جاتے ہیں یا سکر جاتے ہیں نہین تو آپس میں یا خاتون کی دیواروں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ان کیواڑوں سے جو ڈوریان (کار۔ ٹری۔ ٹن۔ ڈی۔ نی) نگے ہوتے ہیں وہ بھی موٹی ہو کر تنگ ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں ۶ علاوہ ان میں ان کیواڑوں کی ساخت میں مٹی یا چونہ کا مادہ بھی جم جاتا ہے یا آپرچوٹے چوٹے دانے پیدا ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ چر بھی جاتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ان کے دروازے پھیل جاتے ہیں تب کیواڑوں دروازوں کو پیچے طور پر بند نہیں کر سکتے ۷

در۔ ما۔ ٹیڈم کی بیماری میں جب پردہ ارن۔ ڈو۔ کار۔ ٹری۔ ام بھی مبتلا ہو جاتا ہو تب اس کے کبھی جمع ہو جانے سے دل کے کیواڑ (وائٹس) سخت ہو جاتے ہیں اور خون کے آنے جانے میں مزاحمت ہوتی ہے اس مرض کو ایکوٹ انڈو۔ کار۔

کرونیٹس کہتے ہیں ۸ کرائمک انڈوسکار۔ ڈی۔ ٹس کی بیماری میں بھی دل کے کیواڑ سخت ہو جاسکتے ہیں اور آپرچوٹے کا مادہ پیدا ہو جاسکتا ہے ۹

چنانچہ بڑے بڑے مین۔ مرض اکثر ہو جاتا ہے خاصکر جھگوٹا ڈاٹ یا گروہ کی فرمیں جاری بھی ہو جاتی ہے۔ علاوہ ان میں آنشک اور مشراب خوارسی سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے

اور کثرت و زرخش اور دوا لوس کے شوق ہو جانے یا لاغر ہو جانے اور دل کے خافوز کے پہیل جانے یا دل کے کیواڑوں کے کسی تولیدی نقص کے سبب سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ جب خون سے فانی - برین خارج ہو کر دل کے کیواڑوں پر جمے ہو جاتا ہے تب بھی وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ دل کے ہر ایک کیواڑ اور دروازہ پر دو قسم کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک وہ جس سے خون ایک خانہ سے دوسرے میں آکر پیچھے لوٹ جاتا ہے (رہی - گر - جی - ٹے - شن) اور دوسرے خون رک کر آتا ہے (آ - بس - ٹرک - شن)۔ پس ان دو قسم کی بیماریوں کا بیان الگ الگ کیا جائیگا۔

قلب کے چار خانے اور چار دھانے ہیں یعنی چار خانے یہ ہیں کہ وہ بطون اور دواؤں اور چار دھانے یہ ہیں یعنی ایک دھانہ بائین بائین بطون اور اُون کے اور دوسرا درمیان دھانے اُون اور بطون کے۔ تیسرا دھانہ ایار - ٹاکا اور چوتھا پیلو - نری - ار - طری کا۔ ان دھانوں پر کیواڑ لگے ہوتے ہیں جنکو اصطلاح میں داکوئس کہتے ہیں چنانچہ بائین اُون اور بطون کے دھانے پر جو کیواڑ لگے ہوتے ہیں انکو بائی - ٹرل والو کہتے ہیں اور جو دھانے بطون اور اُون کے دھانے پر ہیں انکو ٹرائی - کس - پڈ والو کہتے ہیں اور جن کیواڑوں سے ایار - ٹاکا دھانہ کہلتا اور بند ہوتا ہے انکو ایار - ٹاکٹ والو کہتے ہیں اور جو کیواڑ پیلو - نری - ار - طری کے دھانے پر لگتا ہے انکو پیلو - نری والو کہتے ہیں۔ قلب کے ہر ایک دھانے میں دوسری کیواڑ پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک خون کے رک جانے کی اور دوسری خون کے لوٹ جانے کی۔ پہلی کو کنش - ٹرک - ٹیو اور دوسری کو ری - گیو جی ٹینٹ ممر کہتے ہیں۔ پس اس حساب سے کل ممر کی آواز آٹھ پیدا ہو سکتی ہیں۔ ممر کی آواز کس قسم کی ہے۔ اس بات کے دریافت کرنے سے پہلے قلب کی دونوں آوازوں کو دریافت کرنا اہم ضروریات سے ہے یعنی یہ جاننا کہ یہ آواز تو یہی اور یہ دوسری ہے

اور تب بھی قایل یاد رکھئے کہ ہے کہ جانتے کسی سبب سے پیدا ہو اگر مری آواز نہ کیے پہلی آواز کے بعد سُنائی دے تو یہ معلوم کرنا چاہئے کہ وینٹر کیل کے سکڑنے کے وقت پیدا ہوتی ہے اور اگر قلب کی دوسری آواز کے بعد سموع ہو تو وینٹر کیل کے پھٹنے کے وقت پیدا ہوتی ہے +

ایک آوز بات یہ بھی یاد رہے کہ دل کا بائین بطن جب سکڑتا ہے تب ایارٹیکٹ والو کھل جاتا ہے تاکہ خون بطن سے ایارٹیا میں آسانی سے گزر جائے مگر راجی - ٹرل ڈا کو اُس وقت بند ہو جانا چاہئے تاکہ اُذن سے بطن میں جو خون آگیا ہے وہ پُر اُذن میں نہ لوٹ جاسکے اور دہنے بطن میں بھی یہی بات ہوتی ہے تاکہ خون پلو - نری - ار - ٹری میں بھجی داخل ہو سکے مگر لوٹ کر پھر دہنے بطن میں نہ جاسکے +

جب ایارٹیا کے سے - سے - لو - نہ والو میں بیماری ہوتی ہے اور اُس بیماری کے سبب سے فرض کر دو کہ دل کے سکڑنے کی وقت بطن کا خون ایارٹیا میں آسانی سے نہ گزر سکے تب ایارٹیکٹ آئشن - ٹرک - ٹیو - مری کی آواز دل کی پہلی آواز کے ساتھ پیدا ہوگی یہ آواز دل کے ان مقاموں پر صاف سُنائی دیگی یعنی دل کے پینڈ سے پر ہٹرم ہڈی کے قریب دہنی جانب کی دوسری اور تیسری پسلی کے بائین کی جگہ پر اور تھوڑا سیکنڈ ایارٹیا پر دہنی پسلی کی ہڈی تک اور دونوں جانب کے کے - راڈڈ ٹریٹریٹون پر بھی سُنائی دیتی ہے + لیکن اسٹے - تھس - کوپ کو جون جون نیچے دل کی ٹوک کی طرف اُتارتے جاؤ گے تو ان اس آواز کی تیزی کم ہوتی جاوے گی + جب بیماری کے سبب بائین بطن کے پہلے کی وقت ایارٹیا کا کیواڑا چھ طور پر بند نہیں ہو سکتا ہے تب ایارٹیا سے خون لوٹ کر بائین بطن میں آجاتا ہے اُس وقت دل کی دوسری آواز کے ساتھ

ایارٹیکٹ - سی - گر - جی - ٹنٹ - مری کی آواز پیدا ہوگی - یہ آواز دہنی جانب کی دوسری اور تیسری پسلی کے بیچ کی جگہ پر سُنائی دیگی اور تیسرے طور پر نیچے اور بائین

سمت کو جد ہر خون ادا رہتا ہے کہ بطن میں آگرتا ہے اور بعض دفعہ اس طرح بھی
کے نیچے کے سرے پر بھی خوب صاف سنائی دیتی ہے اور بعض دفعہ خوب تیزی
کے ساتھ دل کی نوک کی سمت پر بھی سموع ہوتی ہے یہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا
ہے کہ ایشیشن اور ری - گر - جے - ٹے - شن دونوں کی مرکز کی آوازیں ایک ساتھ
سنائی دیتی ہیں ۔

ایسا کہ کیو اڑکی بیماری میں نبض باقاعدہ چلتی ہے مگر آئیں ٹرک - شن کی بیماری
میں نبض خالی اور اسکی ضربان کی قدر دراز ہو جاتی ہے اور ری - گر - جے - ٹے - شن
کے مرض میں نبض میں وقفہ جھٹکے کی حرکت محسوس ہوتی ہے اس واسطے اس قسم کی
نبض کو جر - کنکٹ پنشن کہتے ہیں ۔

جب مامی - ٹرل مایو جوں کے بائیں بطن اور آؤن کے بائیں کے دماغ پر لگا ہوا
ہوتا ہے بیماری کے سبب سے مٹا ہو کر سخت ہو جاتا ہے اور اسکی ڈوریان (رکا - ٹیوی
ٹن - ٹوی - نے) کچھ سخت ہو جاتی ہیں جس سبب سے دل کے سکڑنے کے وقت
اپنے دروازہ کو اچھے طور پر بند نہیں کر سکتا ہے تب بائیں بطن سے خون بائیں
آؤن میں لوٹ کر رہ جاتا ہے اور ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ کیو اڑنڈ کو رسکر کر چھوڑا جائے
اور اسکے مختلف حصے سخت ہو کر ایسے کھڑے رہیں کہ بائیں بطن کی دیواروں پر گر کر
چسپان ہو سکیں اور خون کے آؤن سے بطن میں آنے میں سبب راہ ہو جاوین تب
دل کی دوسری آواز کے ساتھ مامی - ٹرل آئیں ٹرک - ٹیو (رکا ڈٹ) مرکز کی آواز
پیدا ہوگی - یہ آواز دل کی نوک کی بائیں طرف خوب صاف سنائی دیتی ہے اور
مامی - ٹرل ری - گر - جے - ٹنٹ مرکز کی آواز جوں کی پہلی آواز کے ساتھ پیدا
ہوتی ہے وہ بھی دل کی نوک کے بائیں طرف خوب صاف سموع ہوتی ہے اور دل کے
بہت سے حصوں پر اور دونوں اسکا - پیو - لاٹھی کے بائیں اسپائین پر بھی یا بائیں

اسکا۔ پیو۔ لائڈی کے نیچے کی نوک پر سناہی دے سکتی ہے، اس بیماری میں
 نبض بے قاعدہ چلتی ہے اور عظیم اور سیرج ہوتی ہے، مائی ٹرل والو کی بیماری میں
 چاہے ٹوکاٹ کی یا خون کے ٹوٹ جانے کی ہو پیٹرے کے دوران خون کے اندر
 فرق پڑ جاتا ہے یعنی پیٹرے کی ریگن خون سے پُر ہو جاتی ہیں اور پیٹرے میں ہمیشہ خون کا
 اجتماع رہتا ہے کیونکہ خون اس میں ٹوک ٹوک کر دورہ کرتا ہے اس واسطے ہوا کے کیوں کے
 اندر خون بہہ جاتا ہے۔ آخر کار دہنا بطن موٹا ہو کر پہلی جاتا ہے اس موقع پر اپنی انامی
 پر دہیان رکھو کہ دہنا بطن موٹا ہو کر کیوں پہلی جاتا ہے اور جسم کی کُل دہیوں کے دوران
 خون میں ٹوکاٹ پڑ جاتی ہے جسے جگہ اور گردن میں بھی اکثر اجتماع خون کا ہو جاتا ہے
 اور یہ تھان اور استعار ڈراپ۔ سی) اور ال۔ پیو۔ مے۔ نو۔ ریا کی بیماریاں پیدا
 ہو جاتی ہیں۔

پلو۔ نری۔ اور ٹری کے ومانہ پر جو کیو اڑ گئے ہوئے ہیں ان میں نہایت شاذ بیماری ہوتی
 ہے۔ برقعہ برا شرم ٹڈی کے بائین کنارے کے پوچھ کوئی مرکز کی آواز سناہی دے
 اور وہ آواز بائین شہلی کی ٹڈی تک پہنچے مگر سب۔ کلی۔ وی۔ ان یا کر ٹڈی شریاؤن
 بہت سناہی دے تو ایسا گمان ہے اس صورت میں نبض کے اندر کسی طرح کا تغیر نہیں واقع ہوتا
 دہنی طرف کے اذن اور بطن کے مابین کے ومانہ پر جو ٹڈی۔ کس۔ ٹڈی اڑ گئے ہوئے ہیں ان میں
 بھی بیماری بہت ہی کم ہوتی ہے اور جب بھی بیماری ہو جاتی ہے تب ایار۔ ٹکٹ یا
 مائی۔ ٹرل۔ ٹالو کی بیماری کے ساتھ ٹڈی۔ کس۔ پڈ۔ واثو میں مرض پیدا ہوتا ہے
 چنانچہ جب مائی۔ ٹرل۔ ٹالو کی بیماری کے سبب سے اذن سے خون بطن میں ٹوک ٹوک
 جاتا ہے تب بائین اذن خون سے پُر ہو جاتا ہے اور اثر اسکا دل کے دہنے بطن پر یہ
 پیدا ہوتا ہے کہ بطن مذکور خون سے پُر ہو جاتا ہے (اپنی انامی کو یاد کر دکھ کیوں دہنا بطن
 خون سے پُر ہو جاتا ہے) تب ٹڈی۔ کس۔ پڈ۔ ری۔ گر۔ جی۔ ٹے۔ شن (خون ٹوٹ جانا)

کیونکہ سناہی دے کہ آواز مذکور پلو۔ نری شریاؤن کے ومانہ پر سناہی دے کر

کی آواز پیدا ہو سکتی ہے لیکن جب اس ٹڑائی کس۔ پڈکیہ اڑ پڑیادہ زور پڑتا ہے تب اکثر کڑانک انفلامیشن پیدا ہو جاتا ہے جس سے کیواڑ مذکور موٹا ہو کر مسکڑ جاتا ہے لیکن تب بھی اس کیواڑ پر مرمر کی آواز چاہے پیدا ہو یا نہ ہو اور جو پیدا ہو جاوے تو کوڑھی کی کڑی دران۔ سی۔ فا۔ رم۔ کار۔ لٹ۔ ج۔ پیریا اسکے قریب وہ مرمر کی آواز نہایت صاف سنائی دیگی اور ساتھ ہی اسکے یا تو مائی۔ ٹرل۔ ری۔ گر۔ ج۔ ٹینٹ یا مائی۔ ٹرل۔ آبس۔ ٹرک۔ ٹیو۔ مرمر کی آواز بھی سنائی دیگی اور جب ہٹنے بطن کے پہیل جانے کے سبب سے ٹڑائی کس۔ پڈ۔ واؤمین بیماری پیدا ہو جاتی ہے تب دونوں طرف کے جو۔ گو۔ لر۔ وریڈ خون سے پڑ ہو جاتی ہیں اور دونوں بطن کے ہر ایک انقباض (سسن۔ ٹوٹ) کے وقت درید مذکور مثل شریانی نبض کے ٹڑتی ہی ہیں ۔

خلاصہ مرمر کی آوازوں کا جُل کے کیواڑوں کی بیماریوں
مین پیدا ہوتی ہیں اختلاطات جو ان بیماریوں
کے سبب سے نبض میں پڑ جاتے ہیں
اول مرمر کی آوازیں

اول اگر مرمر کی آواز دل کی پہلی آواز کے ساتھ قلب کے پینڈے پر خوب تیز سنائی دے اور وہ ہنی طرف کی دوسری اور تیسری پہلی کے بیچ کی جگہ پر اور اوپر گردن کی طرف تک بھی سموع ہو تو وہ آواز ایار۔ ٹک۔ آئسن۔ ٹرک۔ ٹیو۔ مرمر کی آواز ہے ۔
دوم۔ اگر مرمر کی آواز دل کی پہلی آواز کے ساتھ قلب کے پینڈے پر خوب صاف سنائی دے اور بائیں جانب کی تیسری اور چوتھی پہلی کے بیچ کی جگہ پر اور اوپر پہلی کی ہڈی کے درمیان

چہارم مائی۔ ٹرل۔ رمی۔ گر۔ جے۔ ٹے۔ شن کی بیماری میں نبض باقاعدہ چلتی ہے اور کمزور ہوتی ہے اور کبھی آہستہ آہستہ اور کبھی جلد جلد چلتی ہے۔

لیکن یاد رہے کہ صرف ایار۔ ٹمک اور مائی۔ ٹرل۔ رمی۔ گر۔ جے۔ ٹے۔ شن کی بیماری میں صحن نبض کے چال میں بہت ہی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔

دل کے کیواڑن کی بیماریوں کے سبب تھکے ساخت اور غسل میں اس قسم کے تغیرات پیدا ہوتے ہیں کہ

ایار۔ ٹمک۔ ابس۔ ٹرک۔ شن کی بیماری میں چونکہ ایار۔ ٹمک کا دماغ تنگ ہو جاتا ہے اس واسطے جسکے اندر خون کے دھکیلنے کے لئے دل کو زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے پس اس سبب سے باپان بطن موٹا ہو جاتا ہے تاکہ زیادہ زور لگاسکے۔

ایار۔ ٹمک۔ رمی۔ گر۔ جے۔ ٹے۔ شن کی بیماری میں باپان بطن موٹا ہو جاتا ہے (دماغ۔ پر۔ ٹرو۔ نئے) اور پھیل بھی جاتا ہے (ڈمٹی۔ لا۔ ٹے۔ شن) کیونکہ خون کے پیچھے لوٹ آنے کے سبب سے بطن مذکور خون سے پُر رہتا ہے۔

یاد رہے کہ جب ایار۔ ٹمک۔ دائو میں دونوں میں سے کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے تب اس مرض کا صدمہ مائی۔ ٹرل۔ دائو پر پڑتا ہے (راپنی۔ ناما۔ ٹی کو یاد کرو) جس سے دائو مذکور یا تو پیٹ جاتی ہیں یا آئینہ انفلامیشن ہو جاتا ہے جس سبب موٹی ہو کر سکڑ جاتے ہیں اور تب مائی۔ ٹرل۔ رمی۔ گر۔ جے۔ ٹے۔ شن کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن مائی۔ ٹرل۔ رمی۔ گر۔ جے۔ ٹے۔ شن یا مائی۔ ٹرل۔ ابس۔ ٹرک۔ شن کی بیماریاں خود اسی دائو کے بگڑ جانے سے اکثر پیدا ہوتی ہیں اور ان دونوں میں سے جب کوئی بھی بیماری مائی۔ ٹرل۔ دائو میں ہو جاتی ہے تب پہلے سے خون رگ رک کر آتا ہے جس سے پیٹر ون میں اجتماع خون کا ہو جاتا ہے اور انکے نتائج پیدا ہو جاتے ہیں یعنی جب پہلے خون سے پُر ہو گئے تب ہنہ بطن کو زیادہ زور لگانا پڑیگا تاکہ پیٹر ون سے

خون بائین بطن میں آجائے پس واسطے دہنا بطن موٹا ہو جائیگا (ماتمی)۔ پر ٹرو سنی) اور ماتمی ٹرل ری۔ گرہ۔ طے۔ شن کی بیماری میں بایان بطن موٹا ہو جائے گا اور ماتمی ٹرل ایش۔ ٹرک۔ شن میں بایان اُون موٹا ہو جائیگا۔ پس دہنے بطن کے موٹے ہو جانے سے اور ماتمی ٹرل والو کی بیماری کے سبب بھی اکثر پلو ستری۔ پلو۔ پلکسی مرض پیدا ہو جاتا ہے وہ پٹرون کا خون سے پُر ہو جانا اور جب دل کا دہنا خانہ پہ پٹرون میں خون پہنچانے سے نہمک جاتا ہے تب وہ خون سے پُر ہو جاتا ہے اور اُس کے پُر ہو جانے سے جسم کی کل وریدوں کے خون میں روکاوٹ پڑ جاتی ہے جس سبب سے جگر۔ گرہ۔ امعا وغیرہ اعضا کے دوران خون میں روکاوٹ پڑ جائے گی آخر کا ڈراپ۔ سہی کی بیماری پیدا ہو جائیگی۔

علامات دل کے کیواروں کی بیماریوں کی۔ ان مرضوں کی علامتیں خون کے دورہ کرنے میں متور پڑ جانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ پس بعض وقت بیمار کا دل شد سے دھڑکنے لگتا ہے سینہ پر بوجہ اور دم لیٹو میں تکلیف معلوم ہوتی ہے۔ سر میں درد ہوتا ہے کافون میں باجا بجا سستہ ماتمی دیتا ہے دوران سر اور گاہے گاہے غشی بھی طاری ہوتی ہے خاصکر ایڑا کے کیوار کی بیماری میں۔ لیکن بہاری عسلامتین کیواروں کی بیماریوں کی اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب پہ پٹرون کے دوران خون میں روکاوٹ پڑتی ہے چنانچہ اس صورت میں کہانشی ہوتی ہے دم تکلیف سے لیا جاتا ہے۔ پہ پٹرون میں اجتماع خون کا ہو جاتا ہے جس سبب سے بیمار خون تھوکتا ہے پلو ستری۔ پلو۔ پلکسی اور نیو۔ مو۔ نیما کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے پلو راکھی تہیلی میں پانی جمع ہو جاتا ہے چہرہ خون سے پر اور ابھرا ہوا اور رنگت اُسکی اودھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اودھی اور آنکھیں مجھتا ہو جاتی ہیں۔ اور چون چون دل کا دہنا خانہ زور کرنے سے مار دیتا ہے تو توین جسم کی کل وریدوں کے دوران خون میں روکاوٹ پڑتی ہے جس سبب سے

جگر اور طحال بڑھ جاتی ہے گردون میں اجتماع خون کے سبب پیشاب میں البیومن
 پایا جاسکتا ہے اس سے خون جاری ہو سکتا ہے (یعنی مے۔ لے۔ ناکی بیماری) آخر کا
 استعفا ہو جاتا ہے۔ یہ کس عسائین جینکا ذکر یہی ہوا ہے خاص کر مائی۔ ٹرل دالو کی بیماری
 میں اکثر پیدا ہوتی ہیں اور خصوصاً جب تہہ اسکے ٹرائی۔ کس۔ پڑ۔ رمی۔ گر۔ جے۔ ٹے۔ ٹر۔
 کی بیماری بھی ہو جاتی ہے ۴ جون جون یہ عسائین میں یہ ہوتی جاتی ہیں مریض کمزور
 ہوتا جاتا ہے اور مزاج اسکا چڑچڑا اور دم لینے کی تکلیف کے سبب نیند نہیں پڑتی اور جب
 آتی بھی ہے تو مریض فوراً چونک پڑتا ہے اور بے دم ہو جاتا ہے خوابات متوحش ہو سکو
 سکتے ہیں۔ بیمار سے لیٹا نہیں جاتا آخر کار حالت بیہوشی میں یا دماغ میں خون بہ
 جانے کے سبب سے تکلیف متفن کے باعث مریض کا مرغ روح تڑپ تڑپ کر قفتر
 عسری سے پرداز کر جاتا ہے ۵

نتیجہ کیو اڑون کی بیماریوں کا۔ جب دل کے کیو اڑون میں جاری ہوتی ہے
 تب خون کی آمد و رفت میں دو قسم کا ہرج و مرج واقع ہو سکتا ہے۔ ایک تو دروازہ ہلکا کر
 تنگ ہو جاسکتا ہے جس سے خون کی رفتار میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے جبکہ اصطلاح میں
 آئش۔ ٹرک۔ شن بولتے ہیں۔ اور دوسرا ہرج و مرج یہ ہو سکتا ہے کہ کیو اڑون کے کھڑکے گر چوتے
 ہو جانے کے سبب سے ان سے دروازہ اچھے طور پر بند نہیں ہو سکتا ہے اور تب وہ
 خون جو خانوں میں آ جاتا ہے تھوڑا سا اسکا پیچھے لوٹ جاتا ہے جس کو اصطلاح میں
 رمی۔ گر۔ جے۔ ٹے۔ شن بولتے ہیں ۶ پس یاد رہے کہ جب دل کے کیو اڑون میں
 کسٹھی مسج کی خرابی پڑ جاتی ہے تب دل میں دو قسم کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔
 ایک خون کے ہلکاوٹ کی (آئش۔ ٹرک۔ شن) دوسری خون کے پیچھے لوٹ جانے
 کی (رمی۔ گر۔ جے۔ ٹے۔ شن) ۷

تشخیص دل کی بیماریوں کی۔ ان بیماریوں کی تشخیص میں دربا توں کا

لحاظ رکھنا چاہئے ایک تو اسکاٹے۔ شن اور پرنسشن کی آوازوں کا دوسرے علامات عامہ کا *

جوان آدمی تندرستی کی حالت میں ایک منٹ کے عرصہ کے اندر ۸۰ دفعہ دم لیتا ہے اور نبض اسکی ۷۲ سے ۸۰ دفعہ چلتی ہے * لیکن بیماری کے سبب سے ان دونوں کی تعداد میں فرق پڑ جاتا ہے چنانچہ دل کی حرکت کرنے میں جب تنگی ہوتی ہے تب بیمار دم جلد جلد لیتا ہے اور یہ تکلیف م لینے کی یا تو تھوڑی ہوتی ہے یا نہایت سخت ہوتی ہے۔ مگر دل کی بیماری میں خاص مگر دم لینے ہی کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور اس سبب سے مریض لیٹ نہیں سکتا یا تو ن کو نہایت بے چین رہتا ہے اور دل کی بیماری میں یہ بھی بات دیکھی جاتی ہے کہ جب تک مریض اپنے کاروبار میں تھوڑا بہت مشغول رہ سکتا ہے تو ذرا زیادہ کوشش سے بھی دم اسکا اگڑ جاتا ہے اور ضیق شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے برا نکاحی۔ ٹس یا نیو مو۔ گس۔ ٹرک نزد کے تنگی نفس کے وقت آواز پیدا ہوتی ہے ویسے دل کی بیماری کے ضیق النفس میں نہیں ہوتی *

دل کی معمولی آوازوں میں بھی فرق پڑ جاتا ہے یعنی ایک یا دو لو آوازوں کے ساتھ یا ایکے عوض میں ایک آواز دہونے کی آواز کی طرح پیدا ہو جاتی ہے جس کو بے۔ لوس مرمر کہتے ہیں یہ مرمر کی آواز یا تو خون کی رگ کا وٹ کے سبب دینے خون کے بطن میں یا بطن سے دل کی بڑی رگوں میں حائل ہونے کے وقت یا پیچھے لوٹ جانے کی سبب یعنی ٹری گونسو بطن میں یا بطن سے اوزن میں لوٹ جانے کے وقت پیدا ہوتی ہے تیب اسکو آر۔ گے۔ ٹاک مرمر کہتے ہیں (یوہان آر۔ گے۔ ٹاک کے معنی مل کی مافت کی بیماری کے ہیں) اور جب خون کے اجزاء میں فرق پڑ جاتا ہے یا دل کے کسی خانہ میں خون کا کوئی مسدود پیدا ہو جاتا ہے تب بھی مرمر کی آواز پیدا ہو سکتی ہے۔

ان صورتوں میں اسکو ان-ار-گے-نکٹ یا فینک-شو-ریش مرمر کہتے ہیں کیونکہ
اس صورت میں دل کی ساخت میں کسی طرح کی خرابی نہیں پیدا ہوتی *
دل کے علاوہ شریانیں کی ساخت میں بھی مرمر کی آواز پیدا ہو سکتی ہے چنانچہ جب
شریان اسقدر پھیلتی ہے کہ جس سے خون کی رفتار میں فرق پڑ جاتا ہے یا جب
شریان کا منفذ تنگ ہو جاتا ہے تب اس شریان کی دیواروں میں خون رک کر
بہتا ہے اور تب بھی ہی مرمر کی آواز پیدا ہوتی ہے *

سب-کلی-وے-ان-ار-ٹری پر بھی مرمر کی آواز اکثر سنائی دیتی ہے خاص کر
اُن لوگوں میں جو سخت جسمی مشقت کرتے ہیں کیونکہ اس صورت میں ار-ٹری مذکور
پر تڑپنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے مگر اپنے کندھے کو اوپر اوپر کر کے آدمی جب
چاہے تب اس قسم کی مرمر کی آواز پیدا کر سکتا ہے اور بند بھی کر دے سکتا ہے *
سل کی بیماری میں بائیں نسل کی ٹڈی کے نیچے بیضیہ مرمر کی آواز سنائی دیتی
ہے وجہ اسکی یہ معلوم ہوتی ہے کہ سب-کلی-وے-ان-ار-ٹری پر ٹیو-بر-کل کے
مادہ کا مادہ پہنچتا ہے *

آر مختلف کیوٹرون کی بیماریوں کا

اول ٹرائی-کس-پلہ-وائٹو کے رمی-گر-جے-ٹے-شن کی بیماری
میں خود قلب پر یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ دہنا خانہ کیقد رموٹا ہو جاتا ہے-قلب کے
مقام کی دہنی جانب سے پرک-شن کی آواز زیادہ تر ہوس نکلتی ہے اور قلب کی
پہلی آواز کے ساتھ ایک عام مرمر کی آواز کوڑی کی کڑی پر سنائی دیتی ہے * دور
کے اعضا پر اس مرض کا اثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلو کی دریدین خون سے زیادہ تر بے گنج جسم
جسم کی کل دریدین خون پر چلتی ہیں اور اس سبب شریانیں کے دونوں نین ہی کا وٹ ہوتی ہے

نتیجہ جیسا کہ دماغ کی طرف خون کا غلبہ ہوتا ہے اس سبب سے مریض کی طبیعت مرض ۱۔ پلو۔ پیکسی مین مبتلا ہونے کے لئے مائل رہتی ہے ۲۔ جگر خون سے پُر اور بڑھ جاتا ہے نتیجہ جیسا کہ پور۔ ٹل سرکیولیشن مین ٹرکاوٹ ہوتی ہے اور معدہ اور اس کا مینو۔ کس پر وہ خون سے پُر ہو جاتا ہے ۳۔ تشنگی کمال اور مریض بو اسیر کی بیماری مین مبتلا ہو جاتا ہے۔ آخر کار گردے بھی خون سے پُر ہو جاتے ہیں اس وقت پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہے اور راسین البیو۔ مین ہوتا ہے شکم مین پانی بھر جاتا ہے پاؤں پھول جاتے ہیں اور سارے جسم مین پانی بھر جاتا ہے ۴۔

دوم۔ جب دہنے اُذن اور بطن کے مابین کا دروازہ سبب بیماری کے تنگ ہو جائے مگر اسکے کیوڑ تندرست ہوتے ہیں تب ایسا ہوتا ہے کہ دریدون کے دوران خون مین کسی قدر ٹرکاوٹ ہوتی ہے مگر دریدون مین حرکت نہیں پاتی جاتی اور شاید کوٹھی کی کمری پر ایک ممر کی آواز بھی سنائی دے سکے لیکن یہ حالت بہت کم پیدا ہوتی ہے ۵۔

سوم جب پلو۔ نری دائیہ برابر کھلے رہتے ہیں تب خاص قلب پر یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ قلب کے دہنے خانہ موٹے ہو جاتے ہیں اور ایک ممر کی آواز قلب کے پینڈے پر سنائی دیتی ہے اور ساتھ ان علامتوں کے بیا رکودم لینے مین تکلیف ہوتی ہے اور دل اسکا دھڑکتا ہے ۶۔

چھارم جب پلو۔ نری دائیہ مین ٹرکاوٹ کی بیماری ہوتی ہے تب خون دہنے بطن سے شش کے اندر بخوبی داخل نہیں ہو سکتا نتیجہ جیسا کہ پہلے تو بطن خون سے پُر ہو جاتا ہے اور تب اُذن مین خون جمع ہو جاتا ہے کہ جس باعث جسم کی کل دریدون سے پُر ہو جاتی ہیں ۷۔ لیکن اس کیوڑ کی بیماری بہت کم ہو کرتی ہے ۸۔

پنجم۔ دائی۔ ٹرل دائیہ کے ری۔ گری۔ ٹے۔ شن کی بیماری کا اثر جس مین

و نیز یککل سے خون آری کل مین لوٹ جاتا ہے خاص قلب پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بایان بطن بڑھ جاتا ہے۔ قلب کی بائیں جانب کو ٹھونکنے سے زیادہ تر ٹھوس دوز پیدا ہوتی ہے۔ قلب کی نوک حالت صحت سے کچھ نیچے اور کچھ زیادہ تر بائیں طرف کو محسوس ہوتی ہے۔ دل زور سے دھڑکتا ہے اور قلب کی پہلی آواز کے ہمراہ ایک مرمر کی آواز دل کی نوک پر خوب صاف سنائی دیتی ہے اور پسند کے پر بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ نتیجہ اسکایہ ہوتا ہے کہ شریان مین خون اچھے طور پر نہیں پہنچتا اس واسطے نبض کمزور اور باریک ہو جاتی ہے اور شش خون سے پُر ہے۔

ششم۔ بیماری بائیں بطن اور اُون کے دماغ کی جس سے خون اُون سے بطن مین ٹوک ٹوک کر داخل ہوتا ہے جب اس دماغ کے مسکڑ جانے کے باعث مائی۔ ٹرل دالو مین بیماری ہو جاتی ہے تب شش خون سے پُر ہو جاتے ہیں اور ان سے خون جاری ہو جاتا ہے یعنی پلمو۔ نری۔ پو۔ پلکسی کی بیماری اور ہیمپ۔ ٹے۔ سینس کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ بیمار کو دم لینے مین کمال تکلیف ہوتی ہے۔ کرانک برانکائی۔ ٹس کی بیماری ہو جاتی ہے کچھ عرصہ کے بعد شش کے دوران خون مین کڑکاوٹ ہونے کے سبب قلب کی دہنی جانب پر یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ دہنا بطن اور دہنا اُون دونو ہیکل بڑھ جاتے ہیں جسم کی ساری ورید خون سے پُر ہو جاتی ہیں جس باعث بیمار کے جسم مین پانی بھر جاتا ہے۔ اس بیماری مین ایک مرمر کی طام آواز قلب کی دوسری آواز کے ساتھ دل کی نوک پر خوب صاف سنائی دیتی ہے۔

ہفتم۔ بیماری ایار۔ ٹا کے کیو اُون کی جس سے خون بائیں بطن سے بدقت ایار۔ ٹا مین چڑکتا ہے۔ اس بیماری کا اثر خاص قلب پر یہ ہوتا ہے کہ بایان بطن بہت موٹا ہو جاتا ہے۔ قلب نہایت شدت سے دھڑکتا ہے اور دل کی پہلی آواز کے ساتھ ایک تیز مرمر کی آواز اسٹرم ہڈی کے چوڑے سنائی دیتی ہے اور قلب

کی نوک پر بہت کم یا بالکل نہیں نتیجہ اس خرابی قلب کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایارٹیا کا دماغ بہت ہی مسکڑ جاوے تو نبض اگرچہ باقاعدہ چلتی ہے لیکن سیرال اور سخت ہو جاتی ہے۔

ہشتم۔ ایارٹیا کے کیوٹرڈن کی بمبیا جس سے دماغ ایارٹیا کا بند نہیں ہو سکتا اور اس سبب سے خون ایارٹیا سے بائین بطن میں پہر لوٹ جاتا ہے۔ اس بیماری کا اثر خاص قلب پر یہ ہوتا ہے کہ بائین بطن بہت ہی موٹا ہو جاتا ہے اور قلب نہایت شدت سے دھڑکتا ہے قلب کے پہلی یا دوسری یا دونوں آوازوں کے ہمراہ ایک مرکز کی آواز سٹرغم ہڈی کے پچو پچ خوب صاف سنائی دیتی ہے۔ نتیجہ اس خرابی کا یہ ہوتا ہے کہ نبض جیٹا کہا کہ چلتی ہے شرائین کی ٹرپ نظر آتی ہے۔

غلامات کشریحی الوس کی بمبیا یون کی دماغ نے قلب کے پہلیاتے ہیں اور کیوٹرڈن کو بھی بند نہیں کر سکتے یا ایسا ہوتا ہے کہ کیوٹرڈن جڑ جاتے ہیں یا قلب کے دماغ نے مسکڑ جاتے ہیں اور کیوٹرڈن برساوہ غضروفی یا ہڈی یا کسی آؤر شے کے جمع ہو جانے سے وہ سخت اور گہر دور سے ہو جاتے ہیں یا کیوٹرڈن کو ریش ہو جاتے ہیں۔

چند اشارات و رباب کیوٹرڈن کی بمبیا یون کے۔ بائین جانب قلب کے بہ نسبت دہنی جانب کے مرض میں زیادہ تر متبلا ہوتی ہے۔ دوم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب دہنی جانب قلب کی بیماری متبلا ہوتی ہے تب بائین جانب میں بھی بیماری ہو جاتی ہے۔ سوم دہنی جانب کی بیماری میں دریدون کے دوران خون میں خلل ہوتا ہے اور خون جوگو۔ لڑ دین میں لوٹ جاتا ہے جس سے دریدون میں نبض کی ٹرپ محسوس ہوتی ہے اسکو وی۔ ہنس۔ پٹنس کہتے ہیں۔ چہارم بائین جانب کی بیماری میں شرائین کی ٹرپ میں خلل واقع ہوتا ہے یعنی نبض بے قاعدہ ہو جاتی ہے۔ پنجم دہنی جانب کی بیماری میں جسم میں اکثر پانی پیدا ہو جاتا ہے اور بائین جانب کے مرض میں شش پر صدمہ پہنچتا ہے اور ایارٹیا کی بیماری میں دماغی غلامات پیدا ہوتی ہیں۔

وال - ویو - لر ڈیزیز کا بیان جو اوپر ہوا ہے وہ نہایت شرح اور بسط کے ساتھ تھا اب
الکا حال بالاجمال اور اُنکی نسبت کچھ اور اور باتیں بھی نیچے درج کیجاتی ہیں تاکہ ناظرین ان
بیاریوں کی تشخیص میں غلطی نہ کریں ۔

الف مائی - ٹرل رمی - گر جے - ٹے - شن

علامات - کان لگا کر سنیں تو دل کی نوک کے بائیں جانب دل کے پہلی آواز کے
ساتھ مرمر کی آواز سنائی دے گی اور پہلو - منری والی پر دل کی دوسری آواز تیز سمجھ ہوگی
اثر اس مرض کا دوران خون پر یہ ہوگا کہ شرائین میں خون کافی نہیں پہنچتا بلکہ بے قاعدہ
پہنچتا ہے - اس واسطے نبض بھی اور کمر و ہوا جیگی اور کبھی زیادہ اور کبھی کم پڑے اور کبھی زور
سے اور کبھی آہستہ جیگی - اس بیماری میں دو بہاری عیالمتین یہ بھی پائی جاتی ہیں کہ بیا
کے چہرہ پر آنے - میا کے آثار پر اسے جانیگے - دوسری یہ کہ اگرچہ دل زیادہ بھی دھڑکے
اور گلو کی رنگین خون سے خوب پڑ بھی ہو جائیں یہ بھی ان رنگوں میں بالکل کم تر پڑ محسوس
ہوگی اور خون کے لوٹ جانے کے سبب سے شش میں اجتماع خون کا ہو جائیگا - اور کچھ
عرصہ دراز بعد دل کے دھننے خانہ اور جسم کی کھل و ریدوں میں اجتماع خون کا ہو کر ڈرہیسی
پیدا ہو جائیگی ۔

اثر اس مرض کا دل پر - پہلے تو اس کا بایان اُذن ہیلک موٹا ہو جائیگا اور تب
دھنا بطن نتیجہ جکایت ہوگا کہ ٹرائی - کس - پڈ - رمی - گر جے - ٹے - شن کی بیماری ہو جائیگی
کچھ عرصہ بعد دل کا بایان بطن بھی موٹا ہو کر پہلی جاتا ہے اور دل کی ساخت میں ابتری
مید ا ہو جاتی ہے اور بائیں اُذن کا پرہہ ان - ڈو - سکا - ڈوی - ام مکتور اور موٹا ہو جاتا
ہے اور اسپرٹ کا مادہ جمع ہو جاتا ہے ۔

دوسرا ماتی ٹرل ایس ٹرک شن کی بیماری

علامات - اس بیماری میں جو مری کی آواز سنائی دیتی ہے وہ یا تو صرف دل کی پہلی آواز سے کچھ بیشتر یا دوسری آواز کے شروع ہو جانے سے دیکر پہلی آواز کے شروع ہونے تک بیماری رہتی ہے * اور اس بیماری میں دل کی دوسری آواز خلک پیندے پر خوب تیز سنائی دیتی ہے *

اس بیماری میں نبض کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ عرصہ دراز تک نبض باقاعدہ چلتی ہے پہلی اکثر بے قاعدہ ہی چلتے نکلتی ہے - دل کا بائیں خانہ چڑھا ہوا جاتا ہے اور لاغر ہونے کی طرف مائل رہتا ہے مگر بائیں آؤن میں زیادہ صدمہ پہنچتا ہے اور آؤن مذکور سینہ کی ٹہنی کی بائیں جانب چوتھی سبلی پر ہڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے - یاد رہے کہ اکثر اوقات مای ٹرل ری - گرسج - لے ٹرشن اور ایس ٹرک شن دونوں ایک ہی دفعہ پیدا ہوتی ہیں - اس صورت میں دل کی دونوں آوازون کے ساتھ دوسری کی آواز سنائی دیتی ہے - وضع یہ کہ ماتی ٹرل والو کی بیماری جو آؤن کو اکثر ہو جاتی ہے *

(ت) ایس ٹرک ایس ٹرک شن کی بیماری

علامات - دل کی پہلی آواز کے ساتھ ایس ٹرک شن پر ایک مری کی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی مقام پر دل کی دوسری آواز یا تو کمزور ہو جاتی ہے یا پیدا نہیں ہوتی *

اس بیماری کا اثر دورانِ خون پر - اگر شرائین میں خون اچھے طور پر نہ پہنچے پاوے تو چہرہ پیدا ہو جاتا ہے اور دماغ میں خون کم پہنچنے کے سبب خرابیاں پیدا ہونگی نبض کی ٹرپ کم ہو جائیگی - اور دبائے تو نبض آسانی سے دب جائیگی مگر

باقاعدہ حرکت کر لگی۔ اس بیماری میں شش کے دوران میں کسی قسم کی مرگاہٹ
 کی کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی بشرطیکہ مائی۔ ٹرل والوکا دروازہ بھی اس
 مرض میں شامل نہ ہو کہ جس سے بطن سے خون کون میں لوٹ جاسکے (ری۔ گر۔ جے۔ ٹیشن)
 یہ بات یاد رہے کہ اس بیماری میں ایار۔ ٹاک کے کیوٹرون سے خائی۔ برین کے ذرات
 علیحدہ ہو کر دوران خون کے ذریعہ جسم میں سترے پیدا کر دے سکتے ہیں مگر سترے
 مذکور خاصکہ دماغ ہی میں اکثر پڑ جاتے ہیں۔

اس بیماری کا اثر ڈول پر۔ ایار۔ ٹاک کے آئین۔ ٹرک۔ شن کی بیماری
 میں دل کا بایان خانہ موٹا ہو جاتا ہے (مائی۔ پر۔ ٹرون فی) جس سے دوران خون کی
 مزاحمت کو فائدہ ہے مگر شرط یہ ہے کہ مائی۔ پر۔ ٹرون فی کے ساتھ دل کی ساخت
 میں کسی قسم کی تیزی واقع نہ ہو جیسے چربی وغیرہ میں بدل جانا۔ جب یہ بیماری
 کچھ عرصہ کی ہو جاتی ہے تب مائی۔ ٹرل۔ ری۔ گر۔ جے۔ ٹیشن کا مرض ہو جاسکتا
 ہے کیونکہ ایار۔ ٹاک کے دروازہ کا مرض یا تو مائی۔ ٹرل دروازہ تک پہنچاتا ہے یا
 ایار۔ ٹاک۔ آئین۔ ٹرک۔ شن کے سبب سے دل کا بایان خانہ چونکہ خون سے پُر
 ہو جاتا ہے تو وہ خون مابے۔ ٹرل والوکا کو بزدل مٹا دیکر بائین وٹھری۔ کل سے
 بائین آری۔ کل میں لوٹ جاتا ہے یعنی مائی۔ ٹرل۔ ری۔ گر۔ جے۔ ٹیشن
 کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔

(ث) ایار۔ ٹاک۔ ری۔ گر۔ جے۔ ٹیشن کی بیماری

علامات۔ ایار۔ ٹاک کے مقام پر دل کی دوسری آواز کے ساتھ ایک
 مرکز کی آواز نہایت صاف سنائی دیتی ہے۔ لیکن اس بیماری میں نبض کی طاقت
 میں بڑا بہاری فرق پڑ جاتا ہے کیونکہ اس میں وککا بایان بطن چونکہ پہلے ٹرہ جاتا ہے

تو خونِ رگون کے اندر نہایت زور سے داخل ہوتا ہے جس سے رگہائے مذکور بہت ہی پسلی جاتی ہیں لیکن پہلی ہی بائینِ بطن میں خون کے پھروٹ آنے کے سبب سے (ری - گر - جے - ٹے - شن) وہ رگین پہر جلد مسکڑ جاتی ہیں - رگون کا اس طرح پر پسلینا اور پہر جلد مسکڑ جانا آد آف تھال - ماس کوپ کے وزیہ آنکھوں کی چوٹی چوٹی رگون میں بھی نظر آتی دیتی ہیں کیونکہ دل کے ہر دفعہ مسکڑنے کے وقت وہ رگین تڑپتی ہوئی نظر آتی ہیں اور کچھ سے کی طرح پیدا ہو کر لمبی بھی ہو جاتی ہیں - نبض کو ملاحظہ کیجئے تو انگلیوں کو ایک دھکا سا اور کوئی شے سخت محسوس ہوگی بعد ازاں فوراً نبض گھٹ جائیگی - مریض اپنا بازو سیدھا اٹھائے تب بھی نبض میں وہی باتیں پائی جائیں گی بلکہ آدھ ہی زیادہ ہو جائیں گی لیکن جب تک دل کی ساخت میں کسی طرح کی ابتری نہیں واقع ہوتی تب تک نبض باقاعدہ چلتی ہے + ایار - ٹاک ری - گر - جے ٹیشن کی بیماری میں بعض دفعہ بیمار کے بدن کی رنگت نہایت پسلی پڑ جاتی ہے اور جب اس بیماری کے ساتھ دل کا بایانِ بطن موٹا ہو جاتا ہے (ٹائی - پر - ٹرو - رنی) تب عروقِ شعریہ (رکے - پے - نے ریز) میں بھی تڑپ محسوس ہوتی ہے چنانچہ یہ بات ناخن یا رخسار سے یا پیشانی کی عروقِ شعریہ میں اکثر پائی جاتی ہے چنانچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مقام کہیں تو خون سے پھر ہو کر منج اور کہیں خون سے خالی ہو کر پیلے پڑ جاتے ہیں + اس بیماری کے اندر دل میں بڑا بیماری یہ تغیر پیدا ہو جاتا ہے کہ دل کا بایانِ بطن موٹا (ٹائی - پر - ٹرو - رنی) ہو کر پھیل (ٹرو - ٹی - نے - ٹے - شن) جاتا ہے + اس مرض کے ابتدا میں دل کا بایانِ بطن چونکہ ضرورت سے زیادہ موٹا ہو جاتا ہے اس واسطے شریں خون سے بہت ہی پُر ہو جاتی ہیں لیکن کچھ عرصہ بعد دل کی ساخت میں کسی نہ کسی قسم کی ابتری پیدا ہو جاتی ہے + ایار - ٹاک ری - گر - جے - ٹے - شن اور ایار - ٹاک اس - ٹاک - شن کی بیماری میں ٹائی - ٹرل دروازہ کے مبتلا ہو جانے کا بھی بڑا خطرہ

ہوتا ہے اسوقت اس دروازہ کی بیماری کی معمولی علامتیں پیدا ہونگی بشرط
 کہ بیمار اس عرصہ تک جیتا رہا۔ تجربہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا رشک دروازہ پر
 دونوں قسم کی بیماریاں ایک ہی دفعہ پیدا ہو جاتی ہیں اس صورت میں دروازہ مذکور
 پر دوسری آوازیں ایسی سنائی دیتی ہیں جیسے گویا کہ دل کے اندر آرام حرکت
 کر رہا ہے +

دج (ڈرائی) کس۔ پڈ۔ رمی۔ گرج۔ ٹے شن کی بیماری

اسباب۔ تجربہ سے ایسا پایا جاتا ہے کہ یہ بیماری دو سبب سے پیدا ہو سکتی
 ہے ایک تو یہ کہ شش کے دوران خون میں جب کسی قسم کی مزاحمت ہوتی ہے
 جیسے خاصہ مرض ام۔ غائی۔ سی۔ ما اور برنگائی۔ ٹش میں بدل کے دونوں ہٹنے
 خانے پہل جاتے ہیں اور یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے + دوسری یہ کہ مائی۔ ٹرل
 بیماری کے سبب سے بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے +
 علامات۔ اس بیماری میں دل کی پہلی آواز کے ساتھ جو مرمی آواز سنائی
 دیتی ہے وہ ایسی باریک ہوتی ہے کہ بدون مشاق کے کسی آواز کو سنائی نہیں
 دیتی اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آواز مذکور پیدا ہی نہیں ہوتی اور بعض بعض مرتبہ
 صاف بھی سنائی دیتی ہے +

اس مرض کا اثر دوران خون پر۔ ڈرائی۔ کس۔ پڈ۔ رمی۔ گرج۔ ٹے شن
 کی بیماری میں زیدی دوران خون کو بہت جلد نہایت نقصان پہنچتا ہے اور درد دن
 کے خون سے پڑ جوجانے سے جو عسلہ متین پیدا ہو سکتی ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں
 اور اسی سبب سے کار۔ ڈیاک۔ ڈراپ۔ سی بھی جلد پیدا ہو جاتی ہے۔ شکم کی آواز
 میں چونکہ دس کم ہوتے ہیں (دواؤ) تو شکم کے دوران میں ابتدا ہی کے اندر مرج

واقع ہو جاتا ہے عسلاوہ اُن علامتوں کے اس بیماری میں یہ علامتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں کہ گلو کی ورید میں خاصکر دائیں جانب کی بیرونی جو - گو - لہ ورید خون سے پُر ہو کر کیچے کی طرح پیچا رہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ سینہ کی بیرونی وریدوں کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے عسلاوہ اڑین گلو کی وریدوں اور بعض دفعہ دہی - نا - کے - وا - رٹ - نے - رمی - آرا و جگر کی ورید میں ضربات محسوس ہوتی ہیں اور بیرونی جو - گو - لہ ورید کو دبا کر خالی کر دین تو نیچے کی جانب خون سے پُر ہونے لگتی ہے یہ اس مرض میں شش کے دوران خون پر سے بوجھ کم ہو جاتا ہے ہوا سٹے ماتی - ٹرل - وا کو کی بیماری میں جب ٹرائی - کس - پڈ - رمی - گر - جے - ٹے - شن کا مرض عارض ہو جاتا ہے تب شش کی تکلیفیں اکثر کم ہو جاتی ہیں *
 اس مرض کا اثر دل پر ٹرائی - کس - پڈ - رمی - گر - جے - ٹے - شن میں دل کا دھنسا بطن مٹا ہو جاتا ہے اور دھنسا آئزن بڑھ جاتا ہے *

پچ (ٹرائی - کس - پڈ - ابس - ٹرک - شن کی بیماری

یہ بیماری شاذ و نادر وقوع میں آتی ہے - اس میں بھی ایسی علامتیں پیدا ہوتی ہیں جیسے رمی - گر - جے - ٹے - شن کے مرض میں ہوا کرتی ہیں - صرف اتنا فرق ہے کہ اس بیماری میں جو ممر کی آواز پیدا ہوتی ہے وہ دل کی دوسری آواز کے سلسلہ اور پہلی آواز کے شروع ہونے سے پہلے پیدا ہوتی ہے *

(ح) پلمو - نرمی - ابس - ٹرک - شن اور

رمی - گر - جے - ٹے - شن کی مہربان

یہ بیماریاں مگر خاصکر پلمو - نرمی - رمی - گر - جے - ٹے - شن کی بیماری بہت شاذ و نادر

وقع میں آتی ہے۔ اس مرض میں دل کی بائیں جانب دل کے پینڈے پر ایک مرکز کی آواز مسمع ہوتی ہے * اس مرض کا اثر نبض پر نہیں ہوتا جس سے اس بیماری کو ایسا ٹمک مرض سے فرق کیا جاسکتا ہے۔ جب یہ بیماری کچھ عرصہ کی ہو جاتی ہے تب دل کا دھنا بطن موٹا ہو جاتا ہے اور پہل بھی جاتا ہے اور ساتھ ہی ٹرائی - کس - پڈ - رمی - گر - جے - ٹے - شن کی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور جسم کی نکل وریدیں خون سے پُر ہو جاتی ہیں پلو - نرمی - رمی - گر - جے - ٹے - شن میں دل کے پینڈے کی بائیں جانب دوسری آواز کے ساتھ مرکز کی آواز پیدا ہوتی ہے

دوم بڑھ جانا دل کا

قلب کئی طور سے بڑھ جاسکتا ہے چنانچہ اسکی لمبی یو این موٹی ہو جاسکتی ہیں جبکہ مائی - پیر - ٹرو - نی آف - دی ہارٹ کہتے ہیں * دل کے خانے پہل جاسکتے ہیں جبکہ اصطلاح میں ڈرائی - لا - ٹے - شن آف - دی ہارٹ کہتے ہیں * لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل کی یہ دونو حالتیں شامل پیدا ہوتی ہیں مثلاً دل جب موٹا ہو جاتا ہے تب اسکے خانے پہل بھی جاتے ہیں جن حالت کو اصطلاح میں مائی - پیر - ٹرو - نی ویتھ ڈرائی - لا - ٹے - شن کہتے ہیں لیکن موٹا ہونے کے ساتھ دل پہل بھی جاتا ہے اور جب دل زیادہ پہل جاتا اور کم موٹا ہوتا ہے تب اس حالت کو ڈرائی - لا - ٹے - شن ویتھ مائی - پیر - ٹرو - نی کہتے ہیں * دل کی مائی - پیر - ٹرو - نی اور ڈرائی - لا - ٹے - شن کو یکجا بیان کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بیان نجی سمجھ میں آجائیگا - میں

اسباب دل کے بڑھ جانے کے - جب دل کے دروازوں یا ریگوں میں خون کے آنے جانے میں مزاحمت ہوتی ہے تب دل بڑھ جاتا اور پہل بھی جاتا ہے - یہ مزاحمت ایسا ٹمک یا مائی - ٹرل دروازوں میں اکثر پیدا ہوتی ہے اور

پلیو۔ نرمی اور ڈرائی۔ کس۔ پڈور وازون میں بہت شاذ و نادر مثلاً ایار ٹاکے
 دروازہ پر چہ نہ یا مٹی کا مادہ جمع ہو کر اسکو تنگ کر دے سکتا ہے اور اس وجہ
 سے خون کے آنے جانے میں مزاحمت ہو سکتی ہے اور دروازہ مذکورہ ان سپوز
 سے بھی تنگ ہو جا سکتا ہے اینو۔ ریزم کے دباؤ سے اور ایار۔ ٹاکا دھانکسی
 رسولی کے دباؤ سے بھی بکرتنگ ہو جا سکتا ہے ۴ خون کے آنے جانے
 میں جب مزاحمت ہوتی ہے تب اسکا نتیجہ اکثر عامی۔ پر۔ ٹرو۔ فی ہوتا ہے لیکن
 رکاوٹ جب دفعتاً پیدا ہو جاتی ہے تب ڈائی۔ لا۔ ٹے۔ رشن ہو جاتا ہے
 یعنی دل کے خانے پہل جاتے ہیں لیکن جب رکاوٹ بتدریج پیدا ہوتی ہے
 تب دل صرف موٹا ہی ہو جاتا ہے ۵

ایک اور بہت بھاری سبب دل کے بڑھ جانے کا وہ ہے جو سبب زیادہ دباؤ کے
 دل کے پہلنے کیوقت (ڈا۔ یاس۔ ٹو۔ لے) اسکے خانوں کی دیواریں کچھ پہل جاتے
 ہیں چنانچہ بات ایار شک اور مائی۔ ٹرل ری۔ گر۔ جے۔ ٹے۔ رشن کی بیماریوں
 میں ہوا کرتی ہے اور ڈرائی۔ کس۔ پڈ۔ ری۔ گر۔ جے۔ ٹے۔ رشن کے مرض میں ہی
 ہوا کرتی ہے مگر کم۔ ان امراض مذکورہ بالا میں ایسا ہوتا ہے کہ جس خانہ میں خون لٹک
 پھرا جاتا ہے اسی خون کی دودھار میں سخت زور سے آگرتی ہیں یعنی ایک تو وہ
 رہا جو خون کے لوٹ آنے سے پیدا ہوتی ہے اور دوسری وہ جو دوسرے خانہ سے
 اُس خانہ میں خون کے داخل ہونے سے پیدا ہوتی ہے مثلاً ایار۔ ٹاک
 ری۔ گر۔ جے۔ ٹے۔ رشن میں ایسا ہوتا ہے کہ دل کے مسکرتنے کے وقت (رسن۔ ٹے)
 جو خون بائین بطن سے ایار۔ ٹاک کے اندر جاتا ہے وہ ایار۔ ٹاک والو کے ناقص
 ہونے کے سبب سے بائین بطن کے پہلنے کیوقت (ڈا۔ یاس۔ ٹو۔ لے) پھر اسی خانہ
 میں آگرتا ہے اور بطن مذکور کی اسی حالت میں بائین آؤن کا خون بائین بطن میں
 آگرتا ہے۔ پس ان دونوں دھاروں کے زور سے آجائے کے سبب بائین بطن

پہلے تو پہلیجاتا ہے (ڈائمی - لا - ٹی - شن) مگر اسکی دیوارین جلد موٹی ہی ہو جاتی ہیں
 (ڈائمی - پیر - ٹرو - فی) یعنی دل بہت ہی بڑھ جاتا ہے ۔

پلو - راین پانی پیدا ہونے کے سبب یا سینہ کے بد ڈول ہونیکے سبب یا
 پیے - رمی - کار - ڈومی - ام دحجاب القلب کے بڑھ جانے کے باعث دل کے کچلے طور
 پر حرکت کرنے میں فراحت ہو تی ہے تب وہ بھیچارہ عضو زور لگاتا ہے جس سے بہت
 اسکی بڑھ جاتی ہے ۔

علاست - جب دل کی دیوارین صرف موٹی ہو جاتی ہیں (پیو - ٹائی - پری - ڈوفی)
 بشرطیکہ یہ حالت ان دیواروں کی صرف خون کے آگے بڑھنے کی فراحت کے رفع
 کرنے کے لئے پیدا ہوئی ہو تب کوئی بھی سلامت نہیں پیدا ہوتی - لیکن اکثر صورتوں
 میں ڈائمی - پیر - ٹرو - فی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اسوقت دل شدت دھڑکنے لگتا ہے
 اور شریانیں بھی زور زور سے تڑپتی ہیں نتیجہ حکما یہ ہوتا ہے کہ شریانوں میں مگر خاصکر
 دماغ کی شریانیں میں اجتماع خون کا ہو جاتا ہے یعنی جب بابیان لطن موٹا ہو جاتا ہے تب
 دماغ میں اور دایان لطن جب موٹا ہو جاتا ہے تب دونوں شش میں خون جمع ہو جاتا
 ہے اور یہ علامتیں ان باتوں سے شدت پکڑ جاتی ہیں جن سے دل کو تحریک ہوتی ہے
 مثلاً تھوڑی سی محنت کے سبب دل زیادہ دھڑکنے لگتا ہے + علاوہ ازیں دل جب
 زیادہ موٹا ہو جاتا ہے تب شریانوں سے بہت ہی پرمو جاتی ہیں نتیجہ حکما آخر الامر
 یہ ہوتا ہے کہ ان رگوں کی ساخت میں اتیری آ جاتی ہے جس سے دماغ کی رگیں بہٹ
 جاتی ہیں اور پلو - پلکسی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے + لیکن جب ڈائمی - پیر - ٹرو - فی بہت
 نہیں ہوتی یا جب ڈائمی - پیر - ٹرو - فی کے ساتھ ڈائمی - لائیشین یا ڈی جے - نے - ریشن
 (ڈائمی) بھی شامل ہوتی ہے تب زیادہ تر اندیشناک علامتیں پیدا ہوتی ہیں مثلاً جب
 دل کے جانے موٹے ہو کر پھیل بھی جاتے ہیں یعنی جب ڈائمی - پیر - ٹرو - فی دیکھتھ

ڈاٹھی۔ لا۔ ٹے۔ شن ہو جاتا ہے تب دل زیادہ دھڑکنے لگتا ہے۔ کوتاہ دمی ہوتی ہے اور گاہے گاہے دل بے قاعدہ حرکت کرتا ہے۔ جب مایہ۔ پر۔ ٹرو۔ فی کے ساتھ ڈھی۔ جے۔ نے۔ ریشن بھی ہو جاتا ہے تب خون کا دورہ سست ہو جاتا ہے۔ دل کی حرکت کمزور اور بے قاعدہ ہو جاتی ہے اور بیمار کی طبیعت غشی کی کی طرف مایل رہتی ہے۔ اور تب یہ یاد رہے کہ دل کے خانہ حقیقہ زیادہ پسپائی لگے یعنی ڈاٹھی۔ لا۔ ٹے۔ شن حقیقہ زیادہ ہوگا اسقدر دل کے افعال میں زیادہ خلل واقع ہوگا اور اس کے حرکت کرنے کی طاقت بھی اسقدر کم ہو جائیگی اور اسقدر زیادہ دشواری سے خون دورہ کریگا تب یہ بات ہوگی کہ خون کا دورہ نہایت سست ہو جائیگا اور خون اچھے طور پر صاف نہیں ہو سکیگا اور دریدین اور عروق شعیہ خون سے پر ہو جائیگی اور شریانون میں خون کم ہو جائیگا۔ عرض جب یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں تب دل کے مقام پر طبع طبع کی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ان۔ جاتی۔ ناکا در دیدا ہو جاسکتا ہے اور ادنیٰ سبب سے جیسے تھوڑی ہی درزش سے یا قدر سے نفع شکم کے سبب سے دل دھڑکنے لگتا ہے اور اس کی حرکتیں بے قاعدہ ہو جاتی ہیں اور دم تکلیف سے لیا جاتا ہے اور وہ کل خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو شش میں اجتماع خون کے سبب سے ہو کر تھیں اور دل کے دہنے خانے جتنے پہل جاتے ہیں تب وہ کل عیالستیں ظاہر ہو جاتی ہیں جو دریدون میں اجتماع خون کے سبب سے پیدا ہوتی ہیں جیسے ڈراپ۔ سی وغیرہ۔ اور یہ بات یاد رہے کہ دل جب موٹا ہو جاتا ہے تب پیشاب میں کسی قسم کا تغیر نہیں پیدا ہوتا لیکن ساتھ مایہ۔ پر۔ ٹرو۔ فی کے جب ڈاٹھی۔ لا۔ ٹے۔ شن ہی شامل ہوتا ہے تب حقیقہ ڈاٹھی۔ لا۔ ٹے۔ شن زیادہ ہوتا ہے پیشاب بھی اسقدر کم اور زیادہ گاڑا ہوتا ہے اور تب مسین الیوس میں ہی ہوتا ہے۔ دل جب موٹا ہو جاتا ہے تب دل کا مقام ابھر ہی جاتا ہے۔ ان بیماریوں میں دل کی ضربان میں بھی بہت

ہی مختلف پڑ جاتا ہے مثلاً ٹائی - پر - ٹرو - مینی کی بیماری میں دل پیچھے اور بائیں
طرف دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے یہاں تک کہ بعض دفعہ ساقوں میں یا آٹھویں پسلی اور
پستان سے تین انچ بلکہ اس سے بھی زیادہ دور تک دھڑکتا ہے اور بہت زور
زور سے دھڑکتا ہے ۔

ڈائی - لا - طے - شن کی بیماری میں دھڑکن کا صدمہ آٹھ انچ صکر دائیں طرف محسوس
ہوتا ہے اور اس مرض میں دل کمزور ہو جاتا ہے اس واسطے دھڑکن بہت خفیف محسوس
ہوتی ہے + دل جب بڑھ جاتا ہے تب اس مقام کو ٹھونکنے سے ٹھوس دان کی حد بڑھ
جاتی ہے چنانچہ تشخیص کے وقت اس بات کو دیکھنا چاہئے کہ ٹھوس دان کی حد اور
شکل کیا ہے مثلاً ٹائی - پر - ٹرو - مینی کی بیماری میں ٹھوس دان کی حد نیچے اور بائیں
طرف بڑھ جاتی ہے اور شکل اسکی سترچی اور لمبی ہو جاتی ہے لیکن ڈائی - لا - طے - شن
کے مرض میں ٹھوس دان کی حد آٹھی اور آٹھ انچ دائیں طرف بڑھ جاتی ہے اور شکل
اس حد کی یا تو چوڑی یا گول ہو جاتی ہے ۔

دل کی آواز دو ٹکا یہ حال ہوتا ہے کہ ٹائی - پر - ٹرو - مینی کی بیماری میں پہلے آواز دل کی کو
پر صاف نہیں سنائی دیتی اور کمزور بھی ہو جاتی ہے کیونکہ دل کا گوشت بڑھ جاتا ہے
اس مرض میں پینہ سے پر دل کی دوسری آواز اس قدر تیز اور صاف سنائی دیتی ہے
کہ مثل پہلی آواز کے تیز ہو جاتی ہے + ڈائی - لا - طے - شن کی بیماری میں اگرچہ دو آواز تیز
کمزور ہو جاتی ہیں پر بھی صاف اور تیز سنائی دیتی ہیں + پینہ سے پر پہلی آواز کمزور
ہو جاتی ہے لیکن دھان پر دوسری آواز صاف سموع ہوتی ہے + جب ٹائی - پر - ٹرو - مینی
کے ساتھ ڈائی - لا - طے - شن بھی ہوتا ہے تب پہلی آواز تھپا بلند پر لمبی اور تیز اور دھندلے
ہم سنائی دیتی ہے - نبض کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب بائیں بطن مٹا ہو جاتا ہے تب بڑی
بڑی شریان خوب زور زور سے ترپتی ہیں اور بعض دفعہ چوبلی شریان بھی ترپنے لگتی ہیں

نبض کا تو اثر کم ہو جاتا ہے اور نبض سخت پیدا رہتا ہے اور باقاعدہ حرکت کرتی ہے ۛ

سوم اٹ۔ رونی آفدی مارٹ

بعض پیدائش سے دل چوٹا پیدا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جب دل کے غلاف میں پانی پیدا ہوتا ہے تب اس کے بوجھ سے دل چوٹا ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں صرف یہی علامت پیدا ہوتی ہے کہ خون کا دورہ شست ہو جاتا ہے ۛ

چہارم فی ٹی ڈی جی۔ نی۔ لیشن آفدی مارٹ

جب دل کی پردہ ریش کے لئے کو۔ رو۔ نری شرائین میں خون اچھی طرح بہنیں پہنچتا ہے تب دل کی ساخت چربی میں بدل جاتی ہے اور جب دل زیادہ موٹا ہو جاتا ہے (دماغی۔ پر۔ ٹرو۔ فی) یا پھیل جاتا ہے (ڈائی۔ لا۔ ٹے۔ شن) تب بھی دل کی خستہ میں اس قسم کی ابتری پیدا ہو جاتی ہے اور بعض طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اعضا سے چربی میں بدل جانے کے لئے مایل رہتی ہیں اور ناس۔ فو۔ رس کے زہر میں بھی دل کی ساخت چربی میں بدل جاسکتی ہے ۛ

پیرسی۔ ڈسپو۔ زنک۔ کا۔ زیادہ عمر۔ مرد کا ہونا۔ شست عادات۔ مرغن اور مصالحہ دار غذا کا زیادہ کھانا اور شراب کا پینا۔ لگاؤٹ کی بیماری اور برائی۔ لیشن۔ ڈوئیز ۛ

علامات۔ یہ یاد رہے کہ بعض دفعہ زندگی کھالت میں کوئی بھی ایسی سلامت بہنیں پیدا ہوتی ہے جس سے یہ مرض گرفت میں آسکے۔ چنانچہ اس مرض کے بیمار اچان چک مر گئے ہیں مگر زندگی کھالت میں کوئی بھی سلامت اس بیماری کی جہین پائی گئی ہے پہر بھی اکثر اوقات اس بیماری میں علامات ذیل پائی جاتی ہیں چنانچہ

دل کے مقام پر طرح طرح کی بے چینی پیدا ہوتی ہے اور لوہیت بنوہیت و روہی ہو سکتا ہے۔ چون جو ان اہتری بڑھتی جاتی ہے۔ دل کثر زیادہ دھڑکنے لگتا ہے اس سبب سے ہنہن کہ دل کے ریشے چربی مین بدل گئے ہنہن بلکہ دل کے زیادہ دھڑکنے کا سبب یہ ہے کہ جو ریشے ہنہن چربی مین ہنہن بدلے ہنہن اور کام دے سکتے ہنہن وہ دل کی معمولی حرکت کے لئے کافی ہنہن ہوتے اس واسطے انکو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے تب دل زیادہ دھڑکتا ہے ۔

خاص خرابیاں دل کی حرکت کی نسبت یہ پائی جاتی ہنہن کہ اسکی ضربات کی تعداد ہفتہ گنت جاتی ہے کہ ایک منٹ کے عرصہ مین دل ۵۰ یا ۶۰ یا ۷۰ یا ۸۰ یا ۹۰ یا ۱۰۰ یا ۱۱۰ یا ۱۲۰ بلکہ بعض دفعہ اس بھی کم دھڑکتا ہے اور حرکتیں دل کی کمزور اور بے قاعدہ ہو جاتی ہنہن بیمار و زہی حرکت کر کے تو دل زیادہ دھڑکنے لگتا ہے اور حرکتیں اسکی بے قاعدہ بھی ہو جاتی ہنہن ۔

بیمار کے چہرہ کے ملاحظہ سے ہی اس بیماری کا ہونا ثابت ہو سکتا ہے چنانچہ چہرہ یا تو پیلا پڑ جاتا ہے جیسے انے۔ میا کی حالت مین ہوا کرتا ہے یا لبین نیلگون اور گالوں کے عروق شعیرہ خون سے پر ہوتی ہنہن بدن کے گوشت اکثر ڈھیلے ہوجاتے ہنہن اور پردہ کار۔ تیا کے کنارہ دن پر آرکس۔ سی۔ نامی۔ پس پیدا ہو جاتا ہے بیمار کمزور اور مست رہتا ہے گویا کہ اس مین جان ہی ہنہن ہے۔ بدن پر پیرری معلوم ہوتی ہے اور محنت کا کوئی بھی کام ہنہن کر سکتا ہے اور جو کوئی کام کرتے ہی لگتا ہے تو دم چڑھ آتا ہے۔ غشی کی حالت طاری ہونے پر ہوتی ہے یا اقمی میں شلتر آجاتا ہے بعضہ دفعہ بے اختیار اُف کرنے لگتا ہے ۔

چونکہ دماغ اور نخاع مین خون کافی ہنہن پہنچتا تو طرح طرح کی عصبی سلامتین ظاہر ہوتی ہنہن چنانچہ بیمار رست بہت ہو جاتا ہے۔ مزاج چڑچڑا اور مریض معوم رہتا ہے

سر میں طرح طرح کی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بصارت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ فہم اور ارادہ میں فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔ حافظہ کم ہو جاتا اور بیمار کسی چیز پر اپنا خیال جما نہیں سکتا چلتے وقت ٹانگیں کا نپٹنا یا لڑکھڑانے لگتی ہیں۔ دفعتاً دوران سر ہو جاتا ہو اور تاکہ گرجا سے بچ رہے بیمار کسی نزدیک کی چیز کو پکڑ لیتا ہے۔ نیند اچھے طور پر آتی نہیں اور مریض خواب میں بے چین رہتا ہے اور دم بند ہونے کے خوف سے چونک چونک پٹتا ہے۔ ماتہ پاؤں میں طرح طرح کی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ اس بیمار ہی میں دماغ میں دفعتاً خون کم ہو سچ سکتا ہے جس سے بیمار کو غش آ سکتا ہے یا۔ پلو۔ پلکسی یا اچھے۔ لپ۔ پسی کی نوبتیں ظاہر ہو سکتی ہیں مگر وہ نوبتیں جلد رفع ہو سکتی ہیں اور بیمار اپنی اگلی حالت پر آ جا سکتا ہے۔ اس بیمار ہی میں ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ فم معدہ کے مقام پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ جگہ بیٹھی جاتی ہے۔ قوت باہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔

یہ بات یاد رہے کہ دل کی مائی۔ پر۔ ٹرو۔ فی یا ڈائسی۔ لے۔ ٹے رشن کے ساتھ نئے۔ ٹے۔ ڈی۔ جی۔ نے۔ رے رشن بھی ہو جا سکتا اس صورت میں جو جو مسلمانین اور پر بیان کیلگی ہیں رنجان و دونو بیماریوں کی علامتیں بھی شامل ہو جا سکتی ہیں اور اس صورت میں خون کے دورہ کرنے میں نہایت دقت ہوتی ہے۔

فی۔ نرمی۔ کل۔ سائینس۔ دل کے فی۔ ٹی۔ ڈی۔ جے۔ نے۔ ریشن میں نشانات ذیل پائے جاتے ہیں دل کی دھڑکن کمزور ہو جاتے ہے یا محسوس نہیں ہوتی۔ دل کی آواز کمزور ہو جاتی ہیں علی الخصوص پہلی آواز ایسی کمزور ہو جاتی ہے کہ سنائی نہیں دیتی اور خاص کر دل کے پندے پر بہ نسبت نوک کے بہت ہی کم سنائی دیتی ہے۔ دوسری آواز کی مقدار صاف سمع ہو سکتی ہے۔ لیکن جب مرض بہت ہی بڑھ جاتا ہے تب کوئی بھی آواز نہیں سنائی دیتی بغض نہایت کمزور اور مہین خون یا سقمہ کم ہوتا ہے کہ رہائے

لو آسانی سے دب جاتا ہے ۔

دور اور انجھام اس مرض کا۔ جنکا دل چربی میں بدل جاتا ہے وہ اس مرض میں برسوں مبتلا رہ سکتے ہیں لیکن جب بیماری بڑھ جاتی ہے تب اچانک مرجانے کا نہایت خطرہ ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام میں زور لگانے سے غشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور دوم نکل جاتا ہے یا ایسا ہی ہوتا ہے کہ دل دفعتاً یا بتدریج شق ہونے لگتا ہے دماغ میں خون کم پہنچنے سے یا نہایت کمزوری کے سبب سے ڈراپ۔ سی کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے لیکن اس مرض میں ڈراپ سی بہت ہی شاذ و نادر ہو کر آتی ہے ۔

پنجم شق ہو جانا دل کا

اس بیماری کو رپ۔ چر آف می مارٹ کہتے ہیں۔ جب دل کے قانون کی ساخت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے تب دیوارین اُن قانون کی شق ہو جا سکتی ہیں مثلاً جب دل کی ساخت چربی میں بدل جاتی ہے یا دیوارین بہت پھیل جاتی ہیں یا دل میں اینو۔ ریزم کی بیماری ہو جاتی ہے یا ڈنسل پیدا ہو جاتا ہے یا سبب نہ ختم یا کسی اور سبب سے پردہ اندوہ کار۔ ڈی۔ ام گھباتا ہے۔ یہ بیماری اکثر مردوں اور بوڑھوں ہی میں پائی جاتی ہے اور یہ مرض بائین دن۔ ٹری۔ کل میں زیادہ پایا جاتا ہے لیکن جب ضرب یا زخم سے پیدا ہوتا ہے تب اکثر دہنا خانہ شق ہو جاتا ہے ۔

علامات۔ دل کے شق ہوتے ہی بیمار فوراً مرجا سکتا ہے یا چنچ مار کر میوش ہو جاتا ہے تب اسکا دم نکلتا ہوتا ہے اور چونہ مراتب ایسا ہوتا ہے کہ دل کے مقام پر دفعتاً ایک شدت کا درد پیدا ہوتا ہے اور دم لپنے میں کمال تکلیف ہوتی ہے اور اس صدمہ سے مریض نہایت نڈھال ہو جاتا ہے ۔

ششم کار - ویاک اینو - ریزم

اسکے معنی میں دل کی دیوار دن کے کسی خاص مقام کا پھیل جانا۔ یا تو دیوار کی کل ساخت کی تہیلی بنجاتی ہے یا پردہ اندر - کار - ٹوی - ام اور اسکے قرب کے گوشت کے ریشے اس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں دل کا اینو - ریزم دوست کا ہوتا ہے ایک تو وہ جبین دل کی دیوار کا ایک حصہ سارے کا سارہ پھیل جاتا ہے اور دوسرے کسی جگہ ایک تہیلی ہی بن جاتی ہے اور منہ اسکا دل کے خانہ میں کھلتا ہے اور اس تہیلی میں طبق با طبق نانی - ریزم یا منجم خون کے ٹپے ہو کر تے ہیں جس سے وہ تہیلی پڑ ہو کر بالکل بند چلو سکتی ہے۔ اور مرض رنج ہو جا سکتا ہے۔ « اینو - ریزم کا مرض خاص کر بائیں دن - ٹری - کل ہی میں ہو کر تا ہے اور بعض دفعہ ایک سے زیادہ بھی پیدا ہو جا سکتا ہے »

اسباب - جب دل کی دیوار دن میں کسی قسم کی ابتری واقع ہوتی ہے جیسے چربی میں بدل جانا یا انفلا میشن کا ہو جانا یا کسی سبب سے وہ دیوار نرم ہو جاتی ہیں تب یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے یہ قاعدہ ہے کہ یہ مرض بتدیج پیدا ہوتا ہے مگر زیادہ زور لگانے کے سبب سے اینو - ریزم دفعتاً ہی پیدا ہو جا سکتا ہے »

علامات - اس بیماری میں ایسی کوئی بھی علامت نہیں پیدا ہوتی جس سے یہ مرض پہچانا جاسکے مگر ان بعض دفعہ دل کے مقام پر ایک بلندی ظاہر ہو جا سکتی ہے جس پر دل کی حرکت محسوس ہوتی ہے اور کان لگا کر سننے سے ایک یا دو نو مر کی آوازیں سموع ہو سکتی ہیں - جب یہ مرض کچھ عرصہ کا ہو جاتا ہے تب دل کا ٹائی - پوڈ ٹروسی اور ڈو ای - لے - لے - شن پیدا ہو جاتا ہے اور اینو - ریزم کے شق ہو جانے سے بیمار دفعتاً مر جا سکتا ہے »

مزن دل کی بیماریوں کی تشخیص اور انجام نیک و بد کننا اور ان کا علاج اول تشخیص

پرانی دل کی بیماریوں کی تشخیص کی نسبت یہ باتیں مد نظر رکھنی چاہئیں کہ جو علامتیں کسی
خاص بیماری میں پائی جاتی ہیں آیا وہ دل کی ساخت کی بیماری کے سبب سے پیدا ہوئی
ہیں یا صرف اُس عضو کے فعل کے بگاڑ سے ہیں ۔

اگر بیماری مذکور دل کی ساخت کے بگاڑ سے ہے تو یہ دریافت کریں کہ دل کی
کونسی ساخت بگڑ گئی ہے اور کس قدر بگڑی ہے اور وہ بگاڑ کس قسم کا ہے یعنی دل
کے کیوڑ (ڈائوٹس) یا دروازہ (آری۔ منس) بگڑے ہیں یا دل کے حجم یا طاقت
میں فرق پڑ گیا ہے یا دل کی دیوار میں کسی قسم کا فرق آ گیا ہے یا جو خون دل کی بڑیر
کیوڑ سے آتا ہے اُسکے آنے میں کسی طرح کی مزاحمت واقع ہوئی ہے یا دل کے خلاف
میں (بے۔ ری۔ کارڈی۔ ام) پانی جمع ہو گیا ہے یا اُسکی سطحیں آپس میں جڑ گئی
ہیں۔ ممکن ہو تو یہ بھی دریافت کرنا چاہئے کہ نقص مذکورہ بالا کس سبب سے واقع
ہوئے ہیں ۔

دل کی مختلف بیماریوں کی تشخیص مفصل طور پر مختلف بیماریوں کے بیان کے ساتھ پیچھے
بتائے گئی ہے۔ اس موقع پر صرف یہ بتلایا جائیگا کہ ان بیماریوں کے دریافت کرنے کا
طریقہ کیا ہے۔ پس واضح ہو کہ بیمار کے پچھلے حالات کو دریافت کریں آیا کبھی اُس کو
جمع مفاصل شدید ہوئی تھی یا نہیں یا اُس کے کبھی کسی کام میں حد سے زیادہ زور لگایا
تھا یا نہیں اور یہ بھی دریافت کرنا چاہئے کہ بیمار کے خاندان میں دل کی بیماریاں اور وراثی

۱۔ مین یا نہین + بیمار کی عمر وہ مرد ہے یا عورت جسم اسکا لاغر ہے یا فربہ۔ اسکی طبیعت پتر
 کسی مرض کی استدلال ہے یا نہین ان باتوں کو بھی دریافت کرنا چاہئے جو جو علامتیں
 موجود ہوں اب انکی طرف دھیان لگانا چاہئے اور یہ دیکھنا چاہئے کہ خون کے دورہ کرنے
 میں کسی قسم کا روک تو نہین ہے اور جو ہے تو اس سبب سے کون کونسی علامتیں پیدا
 ہوئی ہیں دل کو ہڑونگنے سے اور اسکی آواز دن کو کان لگا کر سننے سے کیا کیا علامتیں
 باہر جاتی ہیں انکو بھی ضرور سننا چاہئے کیونکہ دل کی بیماریوں کی تشخیص تب ہی کامل ہوتی ہے
 کہ جب پرکشن اور آسکل ٹپے۔ شن کی ترکیبوں سے دل کا امتحان کیا جاتا ہے مثلاً ان
 ترکیبوں سے یہ باتیں دریافت کرنی چاہئیں کہ جہاں پر دل واقع ہے سینے کے اس مقام
 کی صورت شبہا بہت اور حدود میں فرق ہے یا نہین۔ اس جگہ اپنا ہاتھ رکھ کر
 دیکھیں کہ دل کس طور پر ہڑکتا ہے یا ہتھارے ہاتھ کو دل کے خلف کی دونوں سطحوں کے
 آپس میں رگڑنے کی جھڑ محسوس ہوتی ہے یا نہین۔ اس مقام کے مختلف حصوں پر
 آدھ اس۔ ٹپے۔ تپس کو پ لگا کر دل کی آوازوں کو سنکر انکا مقابلہ کریں کہ آوازیں
 مذکور کسی جگہ تیز یا کسی جگہ شست سناہی دیتی ہیں یا نہین۔ ممر کی آواز بھی مسموع
 ہوتی ہے یا نہین اور جو ہوتی ہے تو آواز مذکور دل کے کس کیواڑ پر اور کس آواز کے ساتھ
 سناہی دیتی ہے۔ علاوہ ازیں شرایتیں اور دین کو بھی خوب طرح ملاحظہ کرنا چاہئے۔ دل کے
 ملاحظہ کے وقت یہ بھی یاد رہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سینہ کی کسی بیماری کے
 سبب دل اپنی جگہ سے اُدھر اُدھر کسک جاتا ہے تب اسکی آوازوں میں فرق پڑ جاتا
 ہے حالانکہ خود دل میں کسی قسم کی بیماری نہین ہوتی اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خود
 دل میں بیماری ہے مگر اسکے متصل کے اعضا سے کسی کسی خاص حالت کے سبب دل
 کی ساخت کی بیماریوں کی آوازوں میں فرق پڑ جاسکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا
 ہے کہ جو ممر کی آواز تم سن رہے ہو وہ یا تو دل کی ساخت کی بیماری کے سبب سے

یا اسکے فعل کے بگاڑ کے باعث (نک - شو - نل) پیدا ہوئی ہے۔ علاوہ اسکے ایسا
 بھی ہو سکتا ہے کہ جب دل کے دہنے خافون میں کچھ عرصہ کے لئے خون زیادہ آجاتا
 ہے یا جب ایار - ٹامین اینو - ریزم کی بیماری ہو جاتی ہے یا جب کوئی رسولی یا ڈنبل
 پیدا ہو جاتا ہے یا جب مے - ڈی - اس - لے - نم میں چربی جمع ہو جاتی ہے یا جب
 پردہ پلوراک کی ہتیلی کے خاص لُٹس حصہ میں پانی جمع ہو کر بند رہتا ہے کہ جو حصہ خود دل
 کے اوپر واقع ہے یا جب دونوں شش مگر خاص کر بائیں شش کے اگلے کنارے بیماری
 کے سبب سے سخت ہو جاتے یا سُکر جاتے ہیں تب اُن حالات مذکورہ بالا کے
 سبب سے سینہ کا وہ مقام جہاں دل بیوتا ہے اونچا ہو جاتا ہے اور اُسکو ٹھونکنے
 سے آواز نہیں پیدا ہوتی ہے۔ غرض اس ٹھوس وارڈ اور اُن وجوہات مذکورہ
 بالا سے جب سینہ کا مقام اونچا ہو جائے تو اس سے یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ ٹھوس
 آواز اور وہ بلندی سینہ کے پردہ پے - ری - کار - ڈی - ام میں پانی جمع ہونے
 سے یا موٹا ہو کر دل کے بڑھ جانے سے پیدا ہوئی ہے۔ علاوہ برین یہ بھی یاد رہے
 کہ بعض دفعہ دل کی ساخت میں بہت ہی خرابی پیدا ہوتی ہے بہرہی کوئی علامت
 یا کوئی آواز غیر معمولی بالکل نہیں پیدا ہوتی یہ بات خاص کر مرض کے عین ابتدائے
 میں ہوا کرتی ہے۔ اور گاہے گاہے اسکا خلاف بھی ہوا کرتا ہے یعنی صرف دل کے
 فعل میں خلل پڑ جانے سے بھی مریض دل کی بیماری کی نہایت سختیت کرتا ہے۔

دوم پراگ - نو بیس

انجامِ نیک یعنی
 یا بد کا کہنا

دل کی ساخت کی بیماری ہمیشہ بُری ہوتی ہے اور اس بات کی ضرورت سیاط کہنی

چاہئے کہ دل کی ساخت کی بیماری کو اُس کے فعل کی بیماری اور اس کے فعل کی بیماری کو ساخت کی بیماری سمجھ کر اسے نہ دین اور صرف بیمار کے بیان پر اعتماد کر کے انجام نہ کہنا چاہئے۔

دل کی بیماری کی نسبت رائے دیتے وقت ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہئے مثلاً بیمار کے وقتاً مرجانے کا اندیشہ ہے یا نہیں۔ اُس بیماری کے دور کے وقت کن باتوں کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ بیماری کس عرصہ تک رہ سکتی ہے، مرض مذکور شفا پذیر ہے یا نہیں۔ ان باتوں کا جواب نیچے دیا جاتا ہے۔

ترکیب۔ پرکشن اور اسکلٹے۔ شن سے دل کو خوب طرح امتحان کر کے دیکھیں کہ وہ کس قسم کا مرض ہے اور دل کے کس جگہ ہے اور دل کا کس قدر حصہ اس میں مبتلا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پروہ ان۔ ڈو۔ کار۔ ڈی۔ ام کے کمر اور ہونے سے مرمر کی آواز سنائی دے سکتی ہے پس اس جو رتین چند ان اندیشہ نہیں ہے بشرطیکہ وہ خرابی دل کے کیوٹرون یا دروازہ دن تک نہ پہنچ جائے۔

جب دل کے کسی دروازہ کی ساخت میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے جس سے خون کی آمد و رفت میں روک ہو یا داخل ہو کہ کس قدر خون پہنچے لوٹ جاوے تب یہ باتیں ضرور اندیشناک ہیں لیکن مختلف دروازہ کی بیماری میں مختلف قسم کے اندیشہ ہیں کیونکہ دل کی مختلف بیماریوں کا اثر دوران خون پر یکساں نہیں ہوتا اور دل کی بیماریوں میں جو مرگ مہاجات ہو جاتا ہے تو وا کو کی اُس بیماری میں اس حادثہ کے واقع ہونے کا احتمال ہوتا ہے جیسے اریا ریٹمک ری۔ گر۔ جے۔ لے۔ شن ہوتا ہے لیکن ایسا ہی کہتے ہیں کہ شاذ و نادر مائی۔ ٹرل ری۔ گر۔ جے۔ لے۔ شن کی بیماری میں ہی مرگ مہاجات ہو جاتا ہے۔ دل کے جب دونوں بائیں دروازہ دن میں ابٹ۔ ٹرک۔ شن کی بیماری ہو جاتی ہے تب خون پیچھے کو ہٹ جاتا ہے اور خون کے اس پس پا ہونے کا

اثر دل اور ریش اور دوران خون پر پہنچتا ہے * ایسا ریشک ایسے ٹرک ریش کی بیماری بلا کسی خاص قسم کی خرابی پیدا کرنے کے عرصہ تک رہ سکتی ہے اور بہتری و فدا یا سہی حال مائی - ٹرل ائین - ٹرک ریش کی بیماری کا بھی ہو جاتا ہے *
 مائی - ٹرل والو کی بیماری کا اثر چونکہ بیڑن پر ہوتا ہے تو اسلئے وہ جھک سوجاتی ہے - دہنی طرف کا اری - کیو - لو - ون - ٹری - کیو - لمر اری - فس جب ناقص ہو جاتا ہے اور اس سبب سے خون جب دہنے بطن سے دہنے آؤن مین لوٹ جاتا ہے (ٹری - کس - پڈ - ری - گر - جے - ٹے - شن) تب جسم کی کل - رید خون سے پر ہو جاتا ہے میں جس سے نہایت خراب نیتاج پیدا ہو جاتے ہیں - یہ مرض اکثر بتدریج بڑھتا ہے عرصہ تک ہوتا ہے اور بیماری کی زندگی نہایت تلخ کر دیتا ہے اور اگرچہ یہی نیتاج پلو - نری ائین - ٹرک ریش اور ری - گر - جے - ٹے - شن مین بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن بہت آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں - پس یاد رہے کہ جب دل کا کوئی دروازہ بہت بگڑ جاتا ہے یا اسمین دونوں قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں لیئے ائین - ٹرک ریش اور ری - گر - جے - ٹے - شن کے تب انجام اسکا اکثر بہت بُرا ہوتا ہے * والو کی بیماریاں شفا پذیر ہیں یا نہیں اسباب مین اگرچہ بہت شاذ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان بیماریوں کو یکے بعد دیگرے ہو جائے پہر ہی امراض مذکورہ اکثر شفا پذیر ہیں ہوتے ہیں * اوسط درجہ پر دل جب موٹا ہو جاتا ہے (مائی - پری - ٹرو - فی - آڈیٹ) تب اس سے بُرائی متصور نہیں ہے بلکہ بھائی ہے - مگر مان ل جب بہت ہی موٹا ہو جاتا ہے تب البتہ اس سے کئی باتوں کا نقصان ہے مثلاً رگون مین خون زیادہ آکر وہ پھٹ جاسکتی ہیں خاص کر جب رگ ٹے مذکورہ خود بیمار ہوتی ہیں اور دل جب موٹا ہو جاتا ہے اور اس سبب سے رگین ہمیشہ خون سے پُر رہتی ہیں تو عرصہ تک پہلے دہنے سے خواہ مخواہ بیمار بھی رہتی ہیں * جب دل کا دہنا خانہ موٹا

ہو جاتا ہے تب مسمورت میں یہ پڑا جی ایک اور پیدا ہو جاتی ہے کہ دونوں
شش ہمیشہ خون سے پُر رہتے ہیں ۵۰

دل کا پہیلیجانا نہایت ہی بُرا ہے اور دل حقیقتہً زیادہ پھیل جاتا ہے اور وہ پہیلی
 دینے ڈھائی - لے - لے - شن) بہ نسبت دل کی فربہی (یعنی مائی - پر - ٹرو - سنی)
 کے حقیقتہً زیادہ ہوتا ہے اُسکا انجام بھی سیقتہً زیادہ بُرا ہوتا ہے کیونکہ دل کی
 ساخت جب ڈھیلی ہو کہ پہیلی جاتی ہے تب دل کمزور بھی ہو جاتا ہے اس سبب
 مریض مُعتماً تلف ہو جا سکتا ہے اور پہیلی ہو اگر فوراً دل خون کو اپنے اندر نہ تو اپنے
 طور پر لے سکتا اور نہ باہر پہنچ سکتا ہے جس سے خون کے دورہ کرنے میں ہرج مرج
 ہو کر ڈھاپ - سسی کی بیماری اور دیگر اندیشناک علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں »
 جب دل کی ساخت بگڑ کر کسی اڈر شے میں بدل جاتی ہے خاصکر چربی میں تب ایک
 نہایت مُہلک بیماری ہو جاتی ہے »

رائے دیتے وقت دل کی بیماری کی علامات موجودہ پر بھی توجہ ہونی چاہئے مثلاً
 دل میں اگر شدت کا درد ہو دل کی حرکتیں بے قاعدہ ہوں یا دل وقفہ سے حرکت
 کرتا ہو یا اتنا رمرض میں بیمار کو غش آجائے یا رپو۔ پلکسی یا مرگی کی نوبتیں
 ہو جائیں کرتی ہوں جب اُس دل کی بیماری کے سبب سے ویدوں کے دوران
 خون میں بہت رکاوٹ ہو گئی ہو اور اُس سبب سے ڈراپ سی کی علامتیں
 ظاہر ہو گئی ہوں تب وہ کل علامات مذکورہ بالا پیغام بر موت ہوتی ہیں
 دل کی بیماری جس سبب سے پیدا ہوئی ہو اُس سبب پر بھی اس مرض
 کا رفع ہونا یا نہ ہونا بہت منحصر ہے مثلاً دلو کی بیماری اگر اکیوٹ انفلیمیشن کے سبب
 سے پیدا ہوئی ہو تو اُس کا رفع ہونا ممکن ہے برعکس اسکے جب دل کی ساخت
 میں کوئی خرابی خرابی ایسی پیدا ہو گئی ہو جس سے ساخت مذکورہ چربی یا کسی اور

عینِ شے میں بدل گئی ہو تب اُس مرض کا رنج ہونا بہت ہی شواہد ہے علاوہ
 ان میں راسے دیتے وقت دیگر اعضا اور بانستوں کی حالت کا بھی خیال رکھنا چاہئے
 کہ وہ تندرست ہیں یا کسی بیماری میں مبتلا ہیں خاصہ کشش اور گردے اور مثلاً
 کا خیال مقرر رکھنا چاہئے علاوہ اُن باتوں کے جنکا ذکر اوپر کیا گیا ہے بیمار کی عمر
 کا اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہئے کہ اُسکے خاندان میں دل کی بیماری موروثی
 ہے یا نہیں اور اسکا بھی لحاظ رہے کہ مریض کی عمر اور حادثات اور ملت کیسی ہے کیونکہ
 بیمار جب کم سن ہوتا ہے اور جب اُسکو فارغ البالی ہوتی ہے جس سے آسائش سے
 زندگی بسر کر سکے اور فکرِ معیشت نہ ہو تب اُسکی زندگی کچھ عرصہ تک دراز ہو چکی ہے
 کیونکہ زیادہ محنت اور مشقت کا کرنا اور بری عادات میں خاصہ شراب خواری اور کثرت
 مجامعت دل کی بیماری کے لئے بہت ہی مضر ہیں ❖

سوم عام اصول علاج کا دل کی مریض بیماریوں میں

اگرچہ مریض دل کی بیماریوں میں شفا کی امید بہت ہی کم ہوتی ہے پہر عجیب علاج
 مناسب سے بیمار کی زندگی بڑھ جاسکتی ہے قلب میں کچھ آؤز خرابی نہیں پیدا
 ہو سکتی ہے اندیشہ مال اور تکلیف دہندہ عساکتیں روکی جاسکتی ہیں دل میں
 جب کوئی ایکوٹ بیماری ہو تو جب تک عضو کو رختی الوسع اپنی اصلی حالت پر نہ آئے
 تب تک مریض کے نگہبان حال رہنا چاہئے اگرچہ مختلف قسم کی دل کی بیماریوں کے
 علاج میں بھی اختلاف ہے لیکن اس موقع پر علاج کے اُن اصول کا ذکر کیا جائیگا جو
 کم و بیش دل کی کل بیماریوں میں راست آسکتے ہیں۔ پس مریض ہو کہ دل کی بیماری
 کے علاج میں صرف دوا ہی پر اتکنا نہ کرنا چاہئے بلکہ علاوہ دوا کے اور باتوں پر

بھی توجہ کرنی چاہئے چنانچہ جس کشتی میں غم کو دھکی بھاری ہو اس کے لئے لازم ہے کہ امن و چین سے رہے محنت کے کاروبار چھوڑ دے ہر قسم کی محنت سے باز آئے۔ دوڑ دھوپ جلد جلد چلنا پھرنا۔ پانخانہ کے وقت زور لگانا۔ زینہ پر زور زور سے چڑھنا اترنا منع ہے۔ دل کی بعض بیماریوں میں مریض کو بالکل حرکت نہ کرنا چاہئے لیکن بعض دفعہ ہوا بہت ریاضت یا گاڑی میں ہو اخوری مفید ہوتی ہے۔ کس قدر ریاضت کرنی چاہئے یہ بات خاص بیماری کی قسم پر منحصر ہے لیکن عام طور پر بتلایا جاسکتا ہے کہ دل حقیقہً زیادہ پھسل گیا ہو (ڈائی۔ لا۔ ٹے۔ شن) یا اس کی ساخت حقیقہً زیادہ بگڑ گئی ہو (سٹیفڈ ریاضت کم کرنی چاہئے اور ایسا بڑھک رہی۔ گر۔ جے۔ ٹے۔ شن کی بیماری میں بھی بیمار کو آرام و چین سے رہنا چاہئے۔ مریض قلب کو برنج و عنق و کمر و تہ و دو سے محفوظ رہنا چاہئے۔ لیکن دین اور کاروبار میں غلطان پہچان رہنا پو۔ لی۔ ٹی۔ کل معاملات میں سرگرم رہنا اور کثرت مطالعہ اور وہ باتیں بھی منع ہیں جن سے طبیعت میں جوش پیدا ہو۔ حد اعتدال تک آرام سے خواب کرنے کی عادت ڈالنی چاہئے۔ بڑی عادتوں کو جن سے دل کی عصبی طاقت گھٹ جاتی ہے ترک کر دینا چاہئے جیسے زیادہ شراب کا پینا زیادہ حقہ یا چار پیینی۔ عرصہ تک شب بیداری کرنی کثرت جماعت۔ ان عادتوں کی نسبت بیمار کو درپردہ مارتے رہنا چاہئے۔ تبدیل آب دھوا سے بھی دل کی بیماری کو اکثر فائدہ ہوتا ہے۔

بیمار کی غذا اور اسکے ماضیہ کا بھی بہت خیال کہنا چاہئے مثلاً دل کی ساخت اگر بگڑ گئی ہو تو غذا مقوی اور زود ہضم دینی چاہئے۔ قبض نہ ہونا چاہئے۔ دل کی بیماری کے علاج میں ایسی دواؤں کی اکثر ضرورت پڑتی ہے جن سے ماضیہ کو تقویت ہو۔ اور شکم میں نفخ نہ ہونا پادے کیونکہ پیٹ جب پھول جاتا ہے تب دل بھی طرح حرکت نہیں کر سکتا ہے مریض میں اگر کوئی جسمی خرابی باقی جاوے جیسے گاوٹ (نفرس) یا آتشک کی

تو اسکا تذکرہ کرنا چاہیے خون اگر رقیق ہو گیا ہو جیسے اُنے۔ میا میں ہوا کرتا ہے تو فلواد کا استعمال کریں اور جو خون کی وہ حالت نہ ہی ہو پھر بھی دل کی بیماریوں میں فلواد نفع بخشا ہے جیسے نیکو آف سٹیل۔ علاوہ فلواد کے دل کی بیماریوں کے علاج میں خاصکر جب دل کی ساخت بگڑ گئی ہو یا جب دل کمزور ہو گیا ہو دیگر مقویات کی بھی اکثر ضرورت ہوتی ہے جیسے کوئین اور معدنی تیزاب اور اسٹرکینیا یا نیکو آف نکس۔ ۱۱۔ میسکا *

اودیات کے باب میں نے زمانہ بہت سی تحقیقات ہو رہی ہیں دلپڑتی ہے۔ ٹے۔ لیس کا اشرعہ دراز سے معلوم ہے اور تجربات سے ثابت ہے کہ اس دو کا اثر صرف دل ہی پر نہیں ہوتا بلکہ شریانوں پر بھی ہوتا ہے چنانچہ دو کی مقدار میں کمی جی۔ ٹے۔ لیس کے استعمال سے دل کج حرکت کا تو اثر کم ہو جاتا ہے۔ دل عرصہ تک پیلا رہتا ہے (ڈا۔ یاس۔ ٹو۔ لے) جس سے دل کے دونوں بطنوں خون سے اچھی طرح پُر ہو جاتے ہیں دل کے دونوں بطنوں زور سے کامل طور پر سکڑ جاتے ہیں جس سے دونوں بطنوں کو اچھی طرح باہر نکال دے سکتے ہیں اور یہ کہ شریانیں کے اندر خون زیادہ اور زور سے داخل ہو جاتا ہے اور شریانیں تنے ہوئے رہتے ہیں جس سے خون عمدہ طور پر دورہ کرتا ہے دل کی کمزوریوں میں ڈی۔ جی۔ ٹی۔ لیس مفید ہے اور اسکے استعمال کرنے کی عمدہ ترکیب کوئی ہے۔ اس بات میں اطباء کی رائے میں اختلاف ہے لیکن ان باتوں کی نسبت ان رائیوں کو غلبہ ہے کہ اول جب ڈی۔ جی۔ ٹی۔ لیس کا استعمال کریں تب اس کے اثر کو خوب طرح ملاحظہ کریں گرنہ خاصکر اس بات کو ضرور دیکھیں کہ اسکا اثر دل کی حرکتوں پر کس طرح کا ہوتا ہے اور یہ کہ اسکے استعمال سے نبض کس طرح چلتی ہے پیشاب کیسا آتا ہے اور جو ڈراپ۔ سی ہے تو اسکا کیا حال ہے۔ جب دل جلد جلد اور بے قاعدہ حرکت کرتا ہو یا کھلے طور پر حرکت نہ کر سکتا ہو اور ساتھ اربع ساتوں کے

نبض بھی کمزور چلتی ہو اور استحال میں تم نے ڈمی - جی - لٹے - لٹے اس کا استعمال شروع کر دیا ہے تو اس دوا کا نیک اثر یہ ہوگا کہ دل کی سرگت میں بھی ہو جائیگی اور دل باقاعدہ اور زور زور سے حرکت کرے گا اور اس سبب سے خاص خاص مقامات کی جو جو تکلیف ہند علامتیں ہیں انکو بھی فاقہ ہو جائیگا اور دل کی حرکتیں چون چون باقاعدہ ہوتی جائیگی نبض کی حالت بھی بہتر ہوتی جائیگی یعنی سرعت کم ہو جائیگی نبض پُر اور طاقتور ہو جائیگی اور قاعدہ کے ساتھ چلیگی - بعض کی رے یہ ہے کہ اگر نبض کی حرکتیں میں وقفہ پایا جائے تو اس دوا کو نہ دینا چاہئے لیکن نبض کی اس حالت میں اکثر صورت کے اندر اس دوا سے فائدہ ہوتا ہے گو اس وقت اس کے استعمال میں زیادہ احتیاط درکار ہے مثلاً اسکے دینے سے اگر نبض بے قاعدہ یا وقفہ سے چلے اور بہت کمزور بھی ہو جائے تو موقوف کر دینا چاہئے - جب دل کی بیماری میں ڈراپ - سی ہو جاتی ہے تب اس دوا کے استعمال سے پیشاب بھی زیادہ آتا ہے اگر کم آنے لگے تو موقوف کر دینا چاہئے اگر ایسا سمجھیں کہ ڈمی - جی - لٹے - لٹے اس کے استعمال سے دل کے مقام میں تکلیف کے آثار پائے جاتے ہیں یا بیمار کو غش آئیو لایا ہوگا نون میں آدازین پیدا ہوتی ہوں اور بار بار تھمتی ہوتی ہو تو ضرور اس دوا کو موقوف کر دینا چاہئے - مان اس دوا کی نسبت ایسا بھی قیاس کرتے ہیں کہ اثر اسکا جسم میں جمع ہو جاتا ہے اور تب دفعتاً نہ ہر کی علامتیں پیدا کر کے بیمار کو ہلاک کر دیتا ہے جب ایسا ہوتا ہے تب اس دوا کے زہر سے ڈراس - لٹے - لٹے کے وقت دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور خون کا دورہ رگ کربار تلف ہو جاتا ہے -

دوم ڈمی - جی - لٹے - لٹے اس کو اکثر یا تو ٹینکچر یا ایفیوژن کے طور پر دیا کرتے ہیں - لیکن یہ منطوق رہو کہ اسکا اثر دل پر جلد پیدا ہو جاوے اور یہ کہ ڈراپ - سی کم ہو جاوے تو بتوں کا تازہ ایفیوژن تیار کر کے استعمال کرنا بہتر ہے مگر عرصہ تک استعمال کرنے کے لئے اس دوا کا ٹینکچر بہتر ہے - اگر یہ چاہو کہ اثر ڈمی - جی - لٹے - لٹے

عرصہ تک قائم رہے تو پتوں کا سفوف بہتر ہے اور جو بیمار نہ کہا سکے تو پتوں کا پولٹس یا نوٹکے انفیوژن کا فوہین۔ ٹے۔ شن کر سکتے ہیں خاص کر جب پیشاب زیادہ پیدا کرنا اور ڈراپ۔ سی کو کم کرنا منظور ہو پہلے اس دوا کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا بہتر ہے مثلاً انفیوژن کا نصف سے ایک ڈرام تک اور نیچر کے ۵ سے ۱۰ قطرے تک دینے میں یا چار دفعہ جب مناسب مقدار کو بڑھا سکتے ہیں اور وقفہ کو بھی گٹا سکتے ہیں یہ دوا مقویات جیسے فولاد وغیرہ اور مدد رات کے ہمراہ بھی سی جاسکتی ہے بعض دفعہ اس دوا کو عرصہ دراز لینے پر سون تک استعمال کرنا پڑتا ہے مگر اس صورت میں گاہے گاہے چند روز تک موقوف کر کے پھر شروع کر دینا چاہئے جب دل کی بیماری بہت بڑھی ہوئی نہین ہوتی ہے تب اس دوا کا اثر ایسا عمدہ پیدا ہوتا ہے کہ عرصہ دراز تک موقوف کر دے سکتے ہیں لیکن جب دیکھیں کہ دل کی تکلیفیں پھر لوٹی ہیں تب پھر شروع کر دینا چاہئے جب بیماری بہت ہی بڑھ جاتی ہے اور سارے جسم میں ڈراپ۔ سی پیدا ہو جاتی ہے تب یہ دوا بے اثر ہو جاسکتی ہے اور تاکہ اثر پیدا ہو جاوے اسکی خوراک کو بہت بڑھا نا پڑتا ہے مگر یہ بدعلا مت ہے۔

صوم۔ کرن کرن حالتو نہین اس دوا کا استعمال کرنا چاہئے اور کرن میں نہین اب ان کا ذکر کیا جاتا ہے مثلاً دل کا بایان بطین صرف موٹا ہی ہو گیا ہو تب اس دوا کے استعمال کرنے کی ضرورت نہین ہوتی مگر دل بہت موٹا ہو گیا ہو اور بہت زور زور سے حرکت کرتا ہو اور جب دل کی اس فریہی سے خون کی آمد و رفت میں سہولت نہ ہو تب اسکے استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یاد رہے کہ حالت مذکورہ بالا میں اس دوا کو بہت کم مقدار سے شروع کرنا چاہئے اور اسکے اثر کو باقتیاداً ملاحظہ کرنا چاہئے کیونکہ ایسی صورت میں اس سے نہ ہر کی عملات میں جلد پیدا ہو جاتی ہیں۔

دل چقدر زیادہ پسکڑ ڈاچی۔ لے۔ ٹے۔ شن ڈیلا ہو جاتا ہے اور اس سبب سے

اپنا کام اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا اسقدر ڈی۔ جی۔ ٹی۔ لیس کے استعمال سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اسقدر اسکی مقدار کو بھی بڑھانا چاہئے اور بیمار کو ہلکی شش بھی اسقدر زیادہ ہوتی ہے۔

یہ قاعدہ ہے کہ مائی۔ ٹرل والا کو کی بیماری میں اور اس سبب سے دل کی ساخت میں جو تغیرات پیدا ہوتے ہیں ان میں ہی یہ دو بہت ہی فائدہ کرتی ہے اور دل کی اس مرض اور اسکی ساخت کے ان تغیرات کے سببے شش میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں انکو اور دیگر اندیشناک علامتوں کو بھی اس دوا سے فائدہ ہوتا ہے +
بہترے طبیب اس دوا کو اس حالت میں دینا منع کرتے ہیں کہ جب ایار۔ ٹاکے دوا میں بیماری ہوتی ہے لیکن دل کی اس حالت میں بھی اس دوا کو دینا بتکراتے ہیں بشرط کہ دل کا یا باطن بطن ڈھیل ہو کر پھیل گیا ہو لیکن ایسی صورت میں اس کے استعمال میں نہایت احتیاط چاہئے + جب شش کی بیماری کے سببے دل کا دھنا بطن صرف پھیل جائے اور ٹراچی۔ کس۔ پڈ۔ ری۔ گر۔ جے۔ ٹی۔ لے۔ شن بھی موجود ہو تب ڈی۔ جے۔ ٹی۔ لے۔ لیس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان متصور ہے۔ مگر ان اسحالت میں دل اگر بے قاعدہ حرکت کرتا ہو فائدہ تب ہو سکتا ہے لیکن جب تغیرات مذکورہ بالا مائی۔ ٹرل والا کی خرابی کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں تب اس دوا کے استعمال سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے +

جب دل کی ساخت چربی میں بدل جاتی ہے تب بھی اس دوا کو دینا منع بتاتے ہیں لیکن اس کے استعمال کی ضرورت ہو اور حسیٹا سے دیجاوے تو بلا شک فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس صورت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دینے سے دل کے ان لیون کو سکڑنے اور پھیلنے میں مدد ملتی ہے جو تندرست ہوتے ہیں اور چربی میں نہیں بدل گئے ہیں +

دل کی بیماری کے ساتھ جب کہالشی کی نو متین ہی (برائیاں) (ٹس) ہو جاتی ہیں
تب ڈی - جی - لے - ٹس سے بہت افادہ ہو جاتا ہے بشرطیکہ دل زیادہ دھڑکتا
ہو (پل - پے - ٹس - شن) اور بے قاعدہ ہی حرکت کرتا ہو یا دل تکلیف سے
حرکت کرتا ہو اور کمزور ہو گیا ہو ۛ علاوہ ڈی - جے - ٹس کے اور بھی دوائیں
ہیں جنکا اثر دل پر خوب ہوتا ہے لیکن اس موقع پر صرف انہی کے نام بتائے جائینگے جن پر
اعتماد کیا جاسکتا ہے - چنانچہ اکو - نائیٹ اور اسکا جوہر - کو - نے - ٹیا - بلا - ٹو - نا
اور اسکا جوہر اسٹ - رو - پیا - مار - جیا - اسٹ - نائین ۛ ہائیڈروسیانک اسٹ
ڈی - را - ٹریا ۛ کے - لے - بار - مین اور اسکا جوہر فائی - ساس - ٹیکٹ مین ۛ
کے - فین ۛ اس - کو - نیل ۛ ا - مائل - نائے - ٹریائیٹ ۛ پے - لو - کار - مین ۛ
معالجہ بعض دفعہ یہ سوچتا ہے کہ بیماری کھالت میں ایسی ہی کوئی دوا ہے جس
سے دل اصلی حالت پر آسکتا ہے اور یہ کہ اس دوا کا استعمال کرنا مناسب ہے یا
نہیں - جواب اسکا یہ ہے کہ جب دل کی کسی دوا میں بیماری ہو تو علاج سے اسکو
رفع کرنے کی کوشش کرنی بے فائدہ ہے - اور دل جب موٹا ہو گیا ہو (مائی پر پڑتی)
اسکو لاغر کرنے کی کوشش نہ کرنی چاہئے کیونکہ اس بات میں شک یہی ہے کہ موٹا
دل دوا کے ذریعہ لاغر ہو سکتا ہے یا نہیں اور دل کو لاغر کرنے کے لئے جو بار بار
فصد لیتے ہیں بیماری کی غذا کم کر دیتے ہیں - سخت جلابے تے ہیں اور زیادہ زیادہ
مقدار میں جو آئیوڈائیڈاف پورٹا سیم کھاتے ہیں ایسا ہرگز نہ کرنا چاہئے بلکہ ایسی دوا
میں منشا علاج کا ایسا ہونا چاہئے جس سے حتی الوسع دل کی پردریش ہوتی رہے
تاکہ دل پہلے نہ پاوے (ڈائی - لے - ٹس - شن) اور حالت اسکی بدل کر تیز نہ ہو جائے
پاوے (ڈی - جی - نے - ریشن) ۛ دل جب پہلیا جاتا ہے (ڈائی - لے - ٹس - شن)
تب بخراچی غذا اور مقوی دوا اور ڈی - جے - لے - ٹس کے استعمال کے کسی

اور ترکیب سے وہ حالت رفع نہیں ہو سکتی ہے ۔

دل کی بیماری کے دور میں بعض بعض مسلمانین ایسی پیدا ہو سکتی ہیں جنکو رفع کرنا ضرور چاہئے مثلاً جو مسلمانین خاص دل کی بیماری کے سبب سے پیدا ہو سکتی ہیں وہ یہ ہیں ۔
 درودیا جین اور بے چینی ، خفقان ، ان ۔ جاتی ۔ نا ۔ پک ۔ ٹو ۔ رس ۔ اور
 غشی ، جلن وغیرہ بے چینی کی علامتوں کو دل کے مقام پر بلا ۔ ڈونا یا سٹرنگا نے
 سے بہت افادہ ہوتا ہے اور بعد دفعہ بلا ڈونا ۔ لے ۔ نی ۔ منٹ کی مالش سے بھی
 فائدہ ہوتا ہے اور ان ۔ جاتی ۔ نا ۔ پک ۔ ٹو ۔ رس اور غشی کا علاج ہر کوئی جانتا
 ہے اور خفقان (پل ۔ پے ۔ لے ۔ شن) اور کوتاہ دمی کو مار ۔ فیما کے پچکاری (ایک
 کرین کا بار ہوان یا چٹا حصہ) سے بہت فائدہ ہوتا ہے چاہیں تو تین اٹ ۔ روپیا
 بھی ملا دیں ، اور تہایت تہوڑی تہوڑی مقدار میں اکو ۔ نامیٹ کے استعمال سے
 بھی فائدہ ہو سکتا ہے ، شش کے متعلق اگر کوئی تکلیف ظاہر ہو تو معمولی علاج
 سے رفع کرین مگر اسکو بھی ڈوی ۔ جی ۔ ٹے ۔ لس سے بہت افادہ ہو جاتا ہے ، دل
 کی بیماری میں کہا نشی ہو جاوے تو معمولی دواؤں سے اسکا علاج کرنا چاہئے ، تنگی
 تنفس کی جب دل کی بیماری کے سبب سے ہوتی ہے تب ڈوی ۔ جے ۔ ٹے ۔ لس
 سے بہت فائدہ ہوتا ہے نہیں تو ادویات سی ۔ ڈوی ۔ ٹیو اور ان ۔ ٹس ۔ باز ۔ موڈون
 کا استعمال کرین ۔ نفع شکم کے سبب سے کوتاہ دمی ہو تو اسکا علاج مناسب کرین
 اور مریض کو بستر پر مٹھا دینے سے بھی افادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ڈایا ۔ قوام پر سے نیچے کا
 بوجھ ہٹ جاتا ہے بعد دفعہ دم کی تکلیف اسقدر ہوتی ہے کہ بیمار بستر پر لیٹ نہیں
 سکتا ، صورت میں سامنے کوئی گاڈیکہ رکھ کر مریض کو مٹھا دینا چاہئے تاکہ ہاتھوں
 کو ٹکا کر مٹھا رہے ۔ دل کی بیماری میں مریض اگر خون تہوکتا ہو (ہو ۔ پے ۔ لے ۔ سٹس)
 تو بستر طیکہ زیادہ ہو اس خون کو دفعتاً نہ روکنا چاہئے کیونکہ اس خون کے آنے

سے دل کی تکلیف کو افاقہ ہو سکتا ہے *

خارجی ادویات سے بھی دل اور پھیپھڑے کی بیماریوں کو بہت افاقہ ہو سکتا ہے جیسے ڈرائی کیننگ + ٹر - پن - ٹی - مین - فو - من - لے - شن اور راعی کی پٹی + جس صورت میں بہت شدید علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ دل کا دھنا خانہ خون سے پُر ہو گیا ہے تب مضد یا کیننگ یا جو نکلین لگا کر خون لینے سے کچھ عرصہ کے لئے بہت افاقہ ہو جاتا ہے لیکن خون لینے سے پہلے اس بات کو خوب طرح سوچ لینا چاہئے کہ خون کے نکلانے سے انے - میا ہو جائیگا اور دل کی پرورش میں خلل پڑ جائیگا جس سے بعض فائدہ کے نقصان متصور ہے - پس خون لینے سے پہلے اُن کل امور پر غور کرنا چاہئے - دل کی اکثر بیماریوں کے دور میں ڈراپ - سی ہو جایا کرتی ہے - اس صورت میں بیمار کو آرام و چین سے رکھنا چاہئے اور اُن ددرات کا استعمال کرنا چاہئے جنکا اثر دل پر ہوتا ہے جیسے خاصکر ڈی - جے - لے - ٹی - ٹش اور کن - ۱۱ - لے - ری ادر کے - فین + وٹی - پربا تہ یا ٹاک - یار تا تہر بھی اس قسم کی ڈراپ - سی میں مفید ہے - مسہلات بھی اس بات کو فائدہ مند ہیں مگر ضعف کا خیال رکھنا چاہئے دل کی ڈراپ - سی کے دور میں ست آتے ہوں تو روکنا نہ چاہئے بشرطیکہ زیادہ ضعف نہ ہو جائے کیونکہ دستوں کے آنے سے رگوں سے خون کا بوجھ بٹ جاتا ہے + بعض صورتوں میں غذا اور دوا دونوں مقوی دینی چاہئے - نار - سار - کا کے سبب بہت تکلیف ہو تو پچھتے لگا کر پانی رسنے دینا چاہئے *

دل کی بیماری جب بہت بڑھ جاتی ہے تب اکثر نیند نہیں پڑتی اس صورت میں نیند لانے کے لئے ادویات منوم جیسے کلورل ٹائیڈ ریٹ یا برو - مائیڈاف پوٹاسیم یا امیون کے مرکبات نہایت مضر پڑتے ہیں کیونکہ جب انکا اثر پیدا ہوتا ہے تب

بیمار اپنے ارادہ سے دم نہیں لے سکتا ہے۔ پس دم بند ہو کر جلد مر جا سکتا ہے مگر بعض دفعہ کہنا یہی پڑتا ہے ۛ

سائے - نو - سیش

انگریزی میں اسے بلوڈ نریز کہتے ہیں ۛ

ماہیت - یہ مرض نتیجہ نقص تولیدی کا ہے جس سے قلب کی دونوں جانب میں ایک سوراخ رہ جاتا ہے کہ جبکہ ذریعہ ورید اور شریان کا خون مل جاتا ہے یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پلویو - نری اور - ٹری ہیٹ تنگ ہو جاتی ہے یا اریار - ٹما اور پلویو - نری اور - ٹری دونوں ایک ہی مقام سے شروع ہوتے ہیں ۛ

علامات - جلد لین اور زبان کی رنگت نیلی اور سارا جسم سرور ہوتا ہے دل دھڑکتا ہے اور گاہ بے گاہ دم لینے میں تکلیف بھی ہوتی ہے اور تھوڑی سی محنت یا بیخ و غصہ کے باعث مریض کو غش آتا ہے۔ نبض کمزور اور بے قاعدہ چلتی اور جسم کے مختلف مقامات میں پانی پیدا ہو جاتا ہے۔ دل کی جس جگہ سوراخ ہوتا ہے وہاں پُرسٹے سے ایک تیز آواز مرمر کی سنائی دیتی ہے ۛ

علاج - محنت و مشقت روحانی و جسمانی سے پرہیز کریں اچھی آب و ہوا گرم پوشاک پرہیز از غذا۔ مانتہ کو درست رکھنا۔ تبص ہونے دینا ۛ

نلگے - شیا - ڈوئس

تعریف - اس مرض میں نفے - مو - دل - وین یا نفے - مو - دل اور امی - لائیک وین میں انفکامیشن ہو کر سُدہ پڑ جاتا ہے ۛ

علامات - بعد وضع حمل کے ایک ہفتہ سے ۵ ہفتہ کے اندر یہ بیمار سچی پڑ جاتی ہے

اسمین ایسا ہوتا ہے کہ ایک یا دو نوٹانگوں میں چند دن اندام ہوائی کی لبون اور راتوں سے
 لیکر پائون تک ایک دردناک ورم پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں شدت کا درد اور
 گرمی ہوتی ہے۔ ورم مذکور پیدا اور بچتا ہوتا ہے۔ مریضہ کی ٹانگ کچھ سخت ہو جاتی ہے
 مگر اس ورم کے پیدا ہونے سے پہلے مریضہ کو ارزہ چڑھتا ہے اور کمر اور شکم میں درد
 ہوتا ہے اور بخار بھی ہوتا ہے۔ بغیر تیز نشگی درد سر غشیان اور زبان میلے ہو جاتی
 ہے۔ اسباب۔ پری ٹوسپیو۔ زنگ کا۔ حالتِ ترجمہ کی۔ اسٹینڈیک کا۔
 نے۔ مو۔ رل اور ای۔ لایک وین کا انفلمیشن۔ اور یہ انفلمیشن اکثر پہلے رحم
 کی وریدوں میں شروع ہوتا ہے۔

علاج۔ یہ بیماری اگر عارض ہو تو جس مقام پر نہایت شدت کا درد ہو
 اُس پر جو ٹیکن لگا دیں اور فورسین۔ ٹے۔ شن کریں اور کھانے کو زیادہ مقدار
 میں اسیون ہمراہ کیا۔ لو۔ مل کے دین تاکہ کُڑیہ آ جاوے اور درد کو بھی افاقہ
 ہو۔ عصفواؤنٹ کو سیدھا یا کسی قدر اونچا کرہین اور تبص نہونے دین۔
 بخار کی شدت ہو تو ٹیکن مسہلات کا استعمال کریں۔ جب بیماری مزمن ہو جائے
 اور انفلمیشن رفع تو آئیو۔ ٹو ایڈ آف جو۔ ٹا۔ سی۔ ام کا استعمال کریں اور
 مرہم سیاب یا آئیو۔ ٹین کی مالش کریں۔ اس بیماری کی نسبت اگر زیادہ علم
 حاصل کرنا ہو تو دیکھو میری کتاب امراض النساء۔

باحیام

امراض اعضا تنفس


مستالہ اول

مختصر تشریح آلات تنفس کی

قبل از بیان امراض مختلفہ آلات تنفس ان اعضا سے کی مختصر تشریح اور افعال کا ذکر کرنا
 پُر ضرور ہے جنکے وسیلہ سے آدمی ملےتا ہے۔ پس واضح ہو کہ سانس لینے کا آہل
 سے شروع ہوتا ہے اور حلق سے لیکر سینہ کی ٹہی تک اسکی ایک نالی ہوتی ہے۔ جب
 یہ نالی سینہ کی ٹہی کے قیعد ریچھے اتر آتی ہے تب دو حصوں میں منقسم ہو کر
 ایک دہنی اور دوسری بائیں پیڑے کو جاتی ہے۔ جو وقت یہ نالیان پہیڑوں
 کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اُس وقت بے حساب شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہیں اور
 یہاں تک باریک ہو جاتی ہیں کہ آنکھوں سے دکھائی نہین دیتیں تب اُنکی ساخت
 میں بھی اسقدر فرق پڑ جاتا ہے کہ گلوب سے بڑی بڑی شاخوں تک تو ان میں کریوں
 کے چیلے ہوتے ہیں لیکن جب نہایت باریک ہو جاتی ہیں تب غضروف کے عوض
 انکے جُول میں صرف باریک جھلی ہی ہوتی ہے عسلا وہ کریوں کے ان نالیوں میں
 عضلاتی ریشے بھی ہوتے ہیں اور انکے اندر ایک پردہ ہوتا ہے جسکو میوہ کس جہیز
 کہتے ہیں۔ مشرعیں نے ان نالیوں کے مختلف حصوں کے مختلف نام رکھے ہیں

چنانچہ گلو کے اوپر کے حصہ کو اصطلاح میں سسے۔ رنگس لیتے ہیں اور گلو کے نیچے کے حصہ کو ٹریسے۔ کیا اور جب یہ دہنی اور بائیں شاخون میں تقسیم ہو جاتی ہے تب بران رکس کہتے ہیں اور جب براکس نش کے اندر داخل ہو کر شاخ و رشاخ میں تقسیم ہو جاتا ہے تب ان شاخون کو براکیسل۔ ٹیوب کہتے ہیں اور عربی میں قصبات کہتے ہیں۔ جب ہوا کی نالیان بہت باریک ہو جاتی ہیں تب انکو کہتے ہیں۔ لے۔ ری براکیسل۔ ٹیوب کہتے ہیں۔ اب پھیڑے کی موٹی ٹشیر کا حال سنئے۔ ہر ایک پھیڑے میں چھوٹے چھوٹے گوشے ہوتے ہیں اور ہر ایک گوشہ بنتا ہے چھوٹے چھوٹے رکیون سے جنکو اصطلاح میں ایار۔ سلس

تصویر ف



کہتے ہیں چنانچہ جیان یا ریلنس کے جمع ہو جانے سے ایک گوشہ بنا تو اس گوشہ کے اندر نہایت باریک شاخیں براکیسل۔ ٹیوب کی بھی درج ہوتی ہیں چنانچہ دیکھو (تصویر ف) کہ جس میں الف الف پھیڑے کے دو چھوٹے گوشے ہیں اور ب ایار۔ سلس ہیں اور ت و نہایت باریک۔

براکیسل۔ ٹیوب میں ایار۔ سلس کے اوپر پلو۔ نرمی اور نرمی کی شاخیں نہایت باریک ہو جاتی ہیں اور ان ہوا کے رکیون پر مشال جال کے پہل جاتی ہیں اور ان سے پلو۔ نرمی وین کی شاخیں نکلا کر کلیکے بائیں غار میں درج ہوتی ہیں پس حکیم مطلق نے خون کے صاف ہونے کا یہی بندوبست رکھا ہے کہ خون کثیف


قلب کے دہنہ خانہ میں بذریعہ پلمو۔ نری۔ ار۔ ٹری کے ایار۔ سلس تک آتا ہے اُس پر دم کشی کی ہوا کا اثر ایسا پیدا ہوتا ہے کہ وہ صاف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہی سانس لیتا ہے تو باہر کی ہوا برا نکسل۔ ٹیوب کے ذریعہ پہلے کے ایار۔ سلس میں داخل ہوتی ہے اور اس ہوا کے اندر اکسے۔ جن ہوا ہوتی ہے جو ایک جان بخش جزو ہوا کا ہے غرض جب دم کشی کی ہو جسم میں جان بخش جزو ہوا کا اکسے۔ جن ہوتا ہے پلمو۔ نری۔ ار۔ ٹری کے کثیف خون کے کار۔ بن یعنی کوئلہ کے ساتھ ملتی ہے تو ان دونوں یعنی ہوا کے اکسے۔ جن اور خون کثیف کے کار۔ بن یعنی دُغانی مادہ کا آمیزہ معاقلہ اس گرم سچی سے ہو جاتا ہے کہ جیسے دودھ کے پٹھے ہوئے یارون کا ہوتا ہے نتیجہ اس گلے گلے ملنے کا یہ ہوتا ہے کہ گرمی پیدا ہوتے ہی اور یہی گرمی خون صاف یعنی شریانی خون کے ساتھ ملکر دورہ کرتی ہے اور جسم کے ہر حصہ کو گرم رکھتی ہے۔ یہی حرارت ہے جسکو اطباء دیسی حرارت فریزی کہتے ہیں پس دیکھا تم نے کہ خون وریدی دم کشی کی پہلے سے کیونکہ صاف ہو گیا۔ غرض جب ہوائے خون وریدی سے دُغانی مادہ کو لے لیا تب وہ خود کثیف ہو کر شکل کار۔ با۔ ناک۔ اسٹڈیٹس کی برآمدگی دم کے ساتھ ناک کی آہ باہر نکل جاتی ہے۔ پس جب وہ خون کثیف پلمو۔ نری۔ ار۔ ٹری کا دم کشی کی ہوا کے وسیلہ سے صاف ہو جاتا ہے تب پلمو۔ نری۔ دین کے ذریعہ قلب کے بائیں خانہ میں آ جاتا ہے اور وہاں سے ایار۔ ٹما کے ذریعہ سارے جسم میں منتشر ہو کر ہر ایک عضو بدن کی پرورش کرتا ہے اور اُس عضو کی کثافت یعنی کار۔ بن کو لیکر اور خود کثیف ہو کر قلب کے دہنہ خانہ میں آ جاتا ہے وہاں سے بذریعہ پلمو۔ نری۔ ار۔ ٹری کے ایار۔ سلس پر جا کر ہر صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ کیا شان کبریا ہے! ہر خداوند کریم نے ایسا عمدہ انتظام مخفی کیا ہے کہ کہا ہے لینا اور چوڑا سانس کا زیست کے واسطے ہشت ضروریات سے ہے بقول سعدی رحمۃ اللہ ہر نفسے کو فرد میر و محمد حیات است

دو چوں برمی آید مفرج ذات پس در ہر نفس دو نعمت موجود است و ہر نفس شکر سے

واجب *

دم لینے کے آئوں کی مختصر تشریح کا بیان ہو چکا اب اُن ترکیبوں کا ذکر مسوجن سے

تصویر



سینہ کی بیاریوں کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ لیکن ان ترکیبوں کے بیان کرنے سے پہلے سینکڑوں اُن قلمی لکھی کا ذکر کرنا چاہئے جنکو اطباء نے بیاری کی عدد و قائم کرنے کے لئے مقرر کی ہیں۔ پس واضح ہو کہ سینہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو سامنے کا حصہ۔ دوسرا پیچھے کا حصہ یعنی پشت اور تیسرا حصہ دو تو بھلیں *

حصہ اول سامنے کا حصہ (دیکھو بقصویر ل) اظہار نے اس حصہ کی تقسیم اقلیم ذیل پر کی ہے :-

اول سو۔ پرا۔ کلا۔ وی۔ کیو۔ لر۔ می۔ جن۔ یہ ایک مثلث جگہ ہے (دیکھو الف بقصویر ل) جسکے اوپر کی حدود خط ہے جو ہنسی کی ہڈی کے باہر کے حصہ سے لیکر ٹری۔ کیا تک پہنچا ہوا ہے نیچے کی حد پر ہنسی کی ہڈی ہے اور اندر کی حد ٹری۔ کیا۔ اس تسلیم میں پہ پڑے کی نوک ہوتی ہے اور بڑی بڑی گین۔ دوم کلا۔ وی۔ کیو۔ لر۔ می۔ جن۔ یہ مقام وہ ہے جو خاص ہنسی کی ہڈی پر واقع ہے اسکے نیچے پہ پڑا ہوتا ہے (دیکھو ب بقصویر ل)

سوم انفر۔ کلا۔ وی۔ کیو۔ لر۔ می۔ جن۔ اسکے اوپر کی حد ہنسی کی ہڈی نیچے کی تیسری پسلی اندر کے اسٹرنم ہڈی کا کنارہ اور باہر کی حدود سیدھی پکھر ہے جو ہیوس ہڈی کے سرے تک پہنچتی ہے دونوں جانب کی اس قلم میں پہ پڑے کے اوپر کا گوشہ اور براؤنکس ہوتا ہے لیکن بائیں جانب کی اس قلم کے نیچے کی حد نیز دل کا پنڈیا ہوتا ہے :-

چہارم مے۔ مے۔ می۔ جن۔ تیسری پسلی سے چہٹی پسلی تک دہنی جانب کی اس قلم میں پہ پڑا ہوتا ہے اور اکثر جگہ ہی چوتھی پسلی تک پڑہ جاتا ہے اور تیسری اور پانچویں پسلی کے بیچ میں کچھ تھوڑا سا دہنی آرٹیکل اور اوپر کا حصہ دہنی وئٹریکل کا ہوتا ہے اور اس تسلیم کی بائیں جانب میں بھی شش اور قلب ہوتا ہے :-

پنجم انفر۔ مری۔ می۔ جن۔ چہٹی پسلی سے چھٹی پسلی تک دہنی طرف اوپر کو پہ پڑا نیچے کو جگہ اور بائیں طرف کو معدہ اور دہنی طرف کے سامنے کا کنارہ اور کسی قدر بائیں گوشہ جگہ کا :-

ششم سے۔ پیرا۔ اسٹریمل رسی۔ جن۔ سے۔ نیو۔ بریم ڈھی کے
 اوپر کے محراب کو کہتے ہیں اس میں بالکل ٹری۔ کیا ہوتا ہے اور شش مہین ہوتا ہے۔
 اسٹریمل رسی۔ جن۔ اسٹریمل رسی کے پیچے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اس میں
 بڑی بڑی رگیں تھک کے مختلف حصہ اور کچھ تھوڑا سا حصہ شش کا بھی ہوتا ہے
 بغلوں کے مقام کو دو اقلیموں میں تقسیم کیا ہے ایک اگزی دوسری
 انفرا۔ اگزی۔ لری۔ رسی۔ جن۔

اول اگزی۔ لری۔ رسی۔ جن۔ نیو۔ بغل کا مقام دو درجہ جانب کی اس
 اقلیم میں شش ہوتا ہے۔
 دوم انفرا۔ اگزی۔ لری۔ رسی۔ جن۔ بغل کے نیچے سے لیکر فائس۔ ٹری
 تک کے مقام کو کہتے ہیں۔

دو درجہ جانب کی اس اقلیم میں شش ہوتا ہے لیکن دہنی طرف جگہ اور بائیں طرف
 طحال اور کچھ حصہ معدہ کا بھی ہوتا ہے۔

پشت کو کئی اقلیموں میں تقسیم کیا ہے چنانچہ اول اسکا۔ پیو۔ لری۔ رسی۔ جن۔ استخوان
 کتف کے مقام کو کہتے ہیں اس میں نر یا پٹرا ہوتا ہے۔ دوم انفرا۔ اسکا۔ پیو۔ لری۔ جن۔
 استخوان کتف کے نیچے کی نوک سے لیکر بارہویں پسلی تک کے مقام کو کہتے ہیں
 دو درجہ جانب کی اس اقلیم میں شش ہوتا ہے مگر دہنی طرف جگہ اور بائیں طرف طحال بھی
 ہوتی ہے۔ سوم انٹر۔ اسکا۔ پیو۔ لری۔ رسی۔ جن۔ دو درجہ استخوان کتف کے پیچے کی جگہ کو کہتے
 ہیں۔ اس میں پٹرا۔ ٹری۔ لری۔ براہیکسل۔ ٹیوب اور براہیکسل۔ گھانڈھوئے ہیں۔

ترکیبیں سینہ کی ہڈیوں کی تشخیص کرنے کی

ان ترکیبوں کے بیان کرنے سے پہلے ہم اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ اگر ان

ترکیبون سے سینہ کی بیماریوں کی تشخیص کرنا چاہو تو پہلے تندرست آدمی کے سینہ کے ہر ایک مقام کی آواز کو مانتھوں سے ٹپو ٹپ کر اور کانوں سے منکر خوب طرح بھانپ لو تا کہ بیماری کی آوازیں مانتھاری گرفت میں آجائیں کیونکہ تم یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ جب تک طبیعت صحت کی حالت سے واقفیت کامل نہیں پیدا کرتا ہے تب تک اسکی سمجھ میں بیماری کی حالت ہرگز نہیں آسکتی ہے چنانچہ اس واسطے طبیعت کے درسوں میں پہلے صحت کا بیان کرتے ہیں۔

ہاں ایک اور بات میں تاکید کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب سینہ پر کان لگا کر سنو تب میں دوسرا کا دہندہ مابھول جاؤ اور اپنی ساری توجہ سینہ کے اُس مقام پر رجوع کرو۔ جسکے اندر کی آواز تم سُنتا چاہتے ہو ایسا نہ کرنا کہ کان تو سینہ پر ہے اور دل کسی اور جگہ۔ ایسا کر دگے تو سینہ کی آوازیں مانتھاری سمجھ میں بالکل نہیں آویں گی۔

ترکیب اول۔ انس۔ پک۔ شن۔ یعنی سینہ کو دیکھنا بہانہ۔ تندرست آدمی کا سینہ اوپر سے نیچے کی طرف گھاؤم ہوتا ہے اور اسکی حرکت بہت کم معلوم ہوتی ہے لیکن جب سینہ کے اندر کے اعضا میں بیماری ہوتی ہے تب اسکی ہیت بدل جاتی ہے اور اسکی حرکت میں بھی فرق آجاتا ہے۔ ان دونوں باتوں کا ذکر ہر ایک بیماری کی ذیل میں کیا جاوے گا۔

ترکیب دوم۔ پل۔ پے۔ شن۔ یعنی سینہ پر مانتھ رکھنا۔ اس ترکیب سے باتیں دیتا ہو سکتی ہیں کہ سینہ کی حرارت کس درجہ پر ہے سینہ ہموار ہے یا کہیں سے اونچا یا نیچا ہے۔ معمول کو بات کرنا کہیں تو اسکی آواز کی جہڑاٹ مانتھوں کو محسوس ہو سکتی ہے اسکی اصطلاح میں ڈوکل فری۔ می۔ ٹس کہتے ہیں۔ اگر کہاںسا کہیں تو اس کی کہانی کی جہڑاٹ مانتھوں کو محسوس ہو سکتی ہے۔ اسکو ٹشینو فری۔ می۔ ٹس کہتے

مین اور پل پے۔ شن کی ترکیب سے شش کی غیر معمولی آوازوں کی جھڑپ ہی معلوم ہو سکتی ہے اسکو رائنکل فرمی۔ مے۔ ٹس بولتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جلدی فرمی۔ مے۔ ٹس ہین سینہ کی دہنی طرف بہ نسبت بائیں جانب کے اور مردوں میں بہ نسبت عورتوں کے اور جوانوں میں بہ نسبت بچوں کے تیز تر محسوس ہوتی ہیں۔

ترکیب سوم۔ سینہ کو ناپنا جسکو اصطلاح میں من۔ سیو۔ ری۔ شن کہتے ہیں سینہ کو پتیا لٹر کے ٹیوٹ سے ناپتے ہیں۔ جب کسی جانب کا سینہ بہ نسبت دوسرے کے بچا یا اونچا ہوتا ہے وہ اس ترکیب سے معلوم ہو جاتا ہے۔

ترکیب چہارم۔ پرکشن یعنی سینہ کو ٹھونکنا۔ اگرچہ سینہ کو ٹھونکنے کے لئے آٹے بنے مین پھر بھی انگلیوں ہی سے ٹھونکنا بہتر ہے ترکیب جسکی یہ ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو سینہ پر اس ترکیب سے جما دیں کہ ان دونوں کے بائیں ہوا کا گزر نہ ہونا پادے تب ہنسنے یا تھکنے کی دو یا تین انگلیوں سے زبرد ضرب لگادیں۔ اگر ہپڑے کے گہرے حصہ کی آواز پیدا کرنی ہو تو کسی قدر زور سے ٹھونکنا چاہئے ورنہ آہستہ آہستہ ٹھونکنا کافی ہے۔ اس ترکیب سے دستم کی آواز پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک تو ہاؤس یعنی ڈل۔ دوسری صاف یعنی کلیر۔ یعنی جب شش کے اندر صرف ہوا ہوتی ہے تب تو ٹھونکنے سے آواز صاف نکلتی ہے اور جب بیماری کے سبب پیپڑا سخت ہو جاتا ہے یا سپن کے اندر پیپ یا پانی یا جب کوئی رسولی ہوتی ہے تب آواز ہاؤس نکلتی ہے جیسے رانو پڑ ٹھونکنے سے نکلتی ہے۔ پیپڑوں کے اندر جب قدر زیادہ ہوا ہوتی ہے ٹھونکنے کی آواز بھی سیدہ زیادہ صاف نکلتی ہے چنانچہ ایسواسطے جو آواز دم کشی کے وقت ٹھونکنے سے نکلتی ہے وہ زیادہ تر صاف ہوتی ہے بہ نسبت اسکے جو بہت کم دم کی دم کی وقت ٹھونکنے سے پیدا ہوتی ہے اور جب شش بہت ہی زیادہ ہوا سے بھر جاتا ہے تب ٹھونکنے کی آواز بھی بہت صاف ہوتی ہے جیسے ایم۔ نامی۔ سی۔ مائی۔ مائی یا ری

مین برعکس سکے جب شش مین ہوا کم ہوتی ہے تب ٹھونکنے کی آواز ٹھوس ہوتی ہے جیسے کن رخش جن اور انفلامیشن اور سل کی بیماری مین اور جب پلور کی تہیلی مین پانی پھر جاتا ہے اور اُس باعث پیٹھ ادب جاتا ہے تب ٹھونکنے سے آواز ٹھوس نکلتی ہے جیسے مرض فائیڈرو۔ تھوراکس اور ام بائی۔ میا مین برعکس سکے جب پلور کی تہیلی مین ہوا پھر جاتی ہے تب ٹھونکنے کی آواز صاف پیدا ہوتی ہے جیسے نیو۔ مو۔ تھوراکس مین لیکن یہ بھی یاد رہے کہ سینہ کی دیواروں کی دبازت پر بھی ٹھونکنے کی آواز کا صاف ٹھوس ہونا منحصر ہے مثلاً اگر دوا دمی کے سینہ مین ہوا کی مقدار برابر ہو تو اس نینو کے ٹھونکنے کی آواز صاف نکلیگی جبکہ دیوار پتلی ہوگی اور جب دمی کے سینہ پر گوشت اور چربی بہت ہوگی اُسکے ٹھونکنے کی آواز کمتر صاف نکلے گی نسبت اُسکے جولاغز اندام ہوگا چنانچہ ایسا وسطے و نوشتاؤن اور پھاتی کے عضلوں پر ٹھونکنے کی آواز ٹھوس اور ہسلی کی بڑی کے اوپر اور نیچے کی اقلیموں کے اور بخل اور استخوان کتف کے نیچے کی آواز صاف نکلتی ہے اور یہ بھی بات یاد رہے کہ جس جگہ شش پتلا ہوگا اُس جگہ کے ٹھونکنے کی آواز کا صاف باٹھوس ہونا اُس تیلے پٹیرے کے نیچے جو حصہ ہوتا ہے اُس پر منحصر ہے مثلاً چوتھی پسلی کے نیچے جو حصہ پٹیرے کا جگر پر ہوتا ہے وہ پتلا ہے عرض اُس پر ٹھونکنے کی آواز نسبت سینہ کے اوپر کے حصہ کے ٹھوس ہوتی ہے اور یہی حال سینہ کی بائیں طرف کا بھی ہے کہ جہاں پتلا حصہ پٹیرے کا قلاب پر ہوتا ہے مگر ان حالتوں مین ایسا ہوتا ہے کہ آہستہ ٹھونکنے سے آواز صاف اور زور سے ٹھونکنے سے آواز ٹھوس نکلتی ہے جب گہری سانس لیتی ہے تب صفائی کی حد بڑھ جاتی ہے کیونکہ اُس حرکت سے شش پھیلتے ہیں اور زور سے دم چھوڑنے سے صفائی کی حد گھٹ جاتی ہے کیونکہ اُس حرکت سے پٹیرے سکڑ جاتے ہیں * مین

ٹھونکنے کی آواز بیماری کی حالت مین نقشہ ذیل سے معلوم ہو سکتی ہے *

شش کے باہر	شش کے اندر
<p>مرض نیو-مو-تھوراکس میں پردہ پلورا میں پانی بہہ جانے سے مرض ٹیڈرو-تھوراکس میں پردہ پلورا میں رسولی کے ہونے سے - قلب کی بیماری میں -</p>	<p>حالات صحت میں اور مرض ام-فائی میں اور سبب مادہ ٹیو-بر-ککل کے شش میں جب غار پیدا ہو جاتے ہیں - شش میں خون کے جمع ہونے سے شش کے سخت ہو جانے سے شش کے سکڑ جانے سے - ورم شش میں اور مادہ ٹیو-بر-ککل کے جمع ہو جانے سے</p>

ترکیب چھب رم - اسکلے شن یعنی سینہ کی آواز کو کان سے سُنا - بہتر تو یہ ہے کہ اپنے کان کو ریض کے سینہ پر لگا کر آواز کو نہیں لیکن اس میں بعض دفعہ یہ وقت عائد ہوتی ہے کہ مستورات کے سینہ پر کان لگانا بے حجابی ہے اور جب مریض نہایت میلا کھینچا ہوتا ہے اس وقت سینہ پر کان لگا کر سننے سے نفرت ہوتی ہے - پس ان وقتوں کے منع کرنے کے لئے آئے بنائے گئے ہیں جنکو اصطلاح میں اسٹے - تھس - کوپ کہتے ہیں جسے سینہ میں - یہ آدہ ہی کئی قسم کا ہوتا ہے - لیکن معمولی قسم اسکی وہ ہے جو کٹڑی کی ہوتی ہے یعنی کٹڑی کی ایک نلی جسکی دونوں جانب جوڑی ہوتی ہے مگر وہ سر اس کا جو سینہ پر رکھا جاتا ہے دوسرے سرے سے جیڑکان لگایا جاتا ہے کم چوڑا ہوتا ہے ترکیب اس کے لگانے کی یہ ہے کہ کم چوڑے سرے کو سینہ پر اسطور سے لگا دیں کہ درمیان اس لڑاؤ پر نیچے ہوا کا دخل نہ ہو بعد ازاں اپنے کان کو آدہ کی چوڑی جانب پر اسطرح چپان کریں کہ دونوں کے مابین ہوا کا دخل نہ ہو سکے جب اس ترکیب سے سینہ میں کو

جالیات ہمد تن گوش ہو کر سینہ کی آواز کو سنا جائے۔ اس وقت تو جبہ ذرا بھی کسی اور طرف جائیگی تو کوئی بھی آواز نہ سمجھیں نہ آئیگی۔

اول سینہ کی آواز حالتِ صحت میں

اگر کسی تندرست آدمی کے سینہ پر کان لگا کر سنیں تو منفس کی دو آوازیں مسموع ہونگی ایک بوقت دم کشی اور دوسری برآمدگی دم کی وقت۔ لیکن ان آوازوں کی خاصیت میں فرق ہے چنانچہ شش کی آواز اگلی ہے۔ برائکس کی آواز زالی ہے اور تری کی آواز کی خاصیت علیحدہ ہے چنانچہ

اول پیپرے کی آواز۔ دم لیٹے کی وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ ایسی خوشگوار ہوتی ہے جیسے خوشہ گندم پر باد صبا گزرنے سے پیدا ہوتی ہے لیکن دم چوڑنے کی آواز نسبت پہلی آواز کے کیفہ ترین مگر بہت تیز نہیں ہوتی۔ ان دونوں آوازوں میں چند باتوں سے فرق پڑ جاتا ہے چنانچہ بچوں کے منفس کی آواز بہ نسبت جوانوں اور بوڑھوں کے زیادہ تر تیز ہوتی ہے جسکو اصطلاح میں پیو۔ رائسل۔ ریپے۔ ریشن کہتے ہیں۔ اور بوڑھوں کے منفس کی آواز کمزور ہو جاتی ہے اور شش آدمیوں کے دم کھینچنے کی آواز کو ماہ ہوتی ہے اور دم چوڑنے کی آواز اور عورتوں کے منفس کے آواز بہ نسبت مردوں کے زیادہ بلند ہوتی ہے اور سینہ کے اوپر کی حصہ کی آواز بہ نسبت حصہ انفل کے اور سینہ کے سامنے کی بہ نسبت پشت کے زیادہ تر ہوتی ہے۔ اور چٹکا مزاج۔ دس ہوتا ہے اور جو کسی عصبی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں مثلاً مرض ہٹے۔ ریائکے منفس کی آواز اکثر تیز ہوتی ہے۔

دوم برائکی۔ ال۔ ریپے۔ ریشن۔ یہ آواز بہ نسبت شش کی آواز کے زیادہ تر تیز اور بلند ہوتی ہے۔ مابین دونوں استخوان کتف اور سینگ کے ہڈی پر بننا ہی دیتی ہے۔

دوم سینہ کی آواز حالت بیماری میں

بیماری کی حالت میں سانس کی آوازیں یا تو بدل جاسکتی ہیں یا انکے ساتھ کوئی غیر معمولی آواز پیدا ہو جاسکتی ہے جسکو اصطلاح میں رائکس یا رائل کہتے ہیں۔

اول تنفس کی آواز کا متغیر ہو جانا۔ تنفس کے صحت کی آوازیں کسی طور پر فرق پڑ سکتی ہیں یعنی یا تو آواز مذکورہ بہ نسبت صحت کے تیز یا کمزور ہو جاسکتی ہے یا بہت کم سنائی دے سکتی ہے۔ جب تنفس کی آواز بہت تیز ہو جاتی ہے تب اس کو ایکٹیل رس۔ پے۔ ریشن کہتے ہیں چنانچہ جیسے نیو۔ مو۔ نیا کے دوسرے درجہ میں ماؤٹ شش پر سنائی دیتی ہے کہ جب وہ شش مانند جگر کے سخت ہو جاتا ہے، بعد فقہ حالت بیماری میں تنفس کی آواز ایسی بدل جاسکتی ہے کہ جیسے کسی مجوف چیز کے اندر پہونچنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس قسم کی تنفس کی آواز کو کے۔ وژ۔ کنش۔ بری۔ ونگٹ کہتے ہیں یہ آواز سٹل کی بیماری کے تیسرے درجہ میں سنائی دیتی ہے کہ جب شش میں غاریا ہو جاتا ہے لیکن یاد رہے کہ کے۔ وژ۔ کنش۔ بری۔ ونگٹ کے پیدا ہونے کے لئے اس غار کے اندر نہ تو کسی طوبت اور نہ کسی موجد خیر کا ہونا چاہئے۔ کیونکہ جب اس غار کے اندر کوئی رطوبت ہوتی ہے اور اس طوبت کی سطح کے نیچے کوئی ہوا کی نالی لگھتی ہے تب جو آواز پیدا ہوتی ہے اسکو کے۔ وژ۔ کنش۔ رائکس کہتے ہیں جب شش میں کوئی بڑا سا غار ہوتا ہے اور دیوار میں سکمی، نیز ہوتی ہیں اور وہ خالی ہی ہوتا ہے تب بہ نسبت کے۔ وژ۔ کنش۔ رائکس کے ایک تیز تر آواز سنائی دیتی ہے جسکو ام۔ فار۔ ریکٹ رس۔ پے۔ ریشن کہتے ہیں۔

دوم تنفس کے آواز کے ساتھ غیر معمولی آواز کا پیدا ہونا۔ ان غیر معمولی آوازوں اور حالت مرض کے تنفس کے متغیر آوازیں میں کوئی خاص ذکر اور پر کیا گیا ہے یہ فرق ہے

کہ اینہیں حالت صحت کے تنفس کے آواز صرف بدل جاتی ہے لیکن غیر معمولی آوازوں میں تو درحقیقت نئے نئے قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں ۔

دافع ہو کہ غیر معمولی آوازیں یا تو ہوا کی نالیوں میں پیدا ہو سکتی ہیں یا غوطہ پٹری کی خست میں یا پردہ پلورہ کی تہلی کے اندر ۔ ان غیر معمولی آوازوں کو اصطلاح رائکس یا رال کہتے ہیں ۔ تقریباً رائکس یہ ہے کہ یہ ایک غیر معمولی آواز ہے جو حالت مرض میں یا تو صرف دم کشی یا برآمدگی میں یا دونوں حرکتوں کے مابین سُنائی دیتی ہے اور صحت کے تنفس کے آوازوں کو کم و بیش یا بالکل نابود کر دیتی ہے یہ آواز یا تو خشک یا تر ہوتی ہے اور یا تو برابر یکساں ہوتی ہے یا کبھی سُنائی دیتی ہے اور کبھی موقوف ہو جاتی ہے اور یا شیش کے کیسوں میں یا ہوا کی نالیوں میں یا ٹریکیا یا لارنکس میں شیش کے غاروں میں پیدا ہوتی ہے ۔ یہ رائکس آواز اسطور پر پیدا ہوتی ہے کہ جب ہوا کی نالی بسبب مرض کے یا تو تنگ یا فراج ہو جاتی ہے ۔ غرض اسوقت ان نالیوں کے اندر تنفس کی ہوا کے گزرنے سے رائکس کی آواز پیدا ہو سکتی ہے اور اسطور سے بھی پیدا ہوتی ہے کہ جب ان نالیوں کے اندر رطوبت ہوتی ہے اور اس طوبت کے اندر سے ہوا کا گزر ہوتا ہے تب رائکس کے بجائے پیدا ہوتے ہیں یا جب نالی مذکور کے اندر کوئی گاڑا مادہ بسبب مرض کے جمع ہو جاتا ہے تب ہوا کے گزرنے سے رائکس کی آواز پیدا ہو سکتی ہے اور جو پردہ ہوا کی نالیوں کے اندر بطور تہر چسپان ہے اُسکے اوپچے اوپچے شکن پر جب تنفس کی ہوا کی ٹکر لگتی ہے تب بھی رائکس کی آواز پیدا ہوتی ہے ۔

بیان مختلف قسم کی رائکس کی آوازوں کا

اول سی۔ بے۔ لنٹ رائکس ۔ یہ آواز بار یک تیز اور خشک ہوتی ہے اور تنفس کی دونوں حرکتوں کے ساتھ سُنائی دیتی ہے ۔ جب ہوا کی نالی کے اندر کوئی

گاڑھی طوبت جس ہو جاتی ہے اسوقت یا جب ہوا کی نالی تنگ یا سبب تشنج کے
 کچ جاتی ہے جیسے دم کی بیماری میں ہوا کرتی ہے اسوقت یہ آواز پیدا ہوتی ہے
 دوم سو۔ نو۔ رس رائگس۔ یہ آواز بہار ہی اور خشک ہوتی ہے اور تھڑکے
 دونوں حرکتوں کے ساتھ سنائی دے سکتی ہے۔ یہ آواز کئی قسم کی ہوتی ہے یعنی غضبہ
 ایسی کہ جیسے اب مین خراٹے کی آواز ہوتی ہے یا جیسی فاختہ کی آواز ہو اگر تہی ہے اسوقت
 اسکو کو رائگ رائگس کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ سے۔ بے۔ ٹنٹ رائگس اکثر باریک
 برا ٹیکل۔ ٹوب مین سنائی دیتی ہے لیکن جب بڑی برا ٹیکل۔ ٹوب کا منفذ سبب
 مرض کے تنگ ہو جاتا ہے تب بھی سے۔ بے۔ ٹنٹ رائگس کی آواز پیدا ہوتی ہے
 سوم کرے۔ بے۔ ٹنٹ رائگس حکما اس آواز کی تسبیح اسطور فرمیتے
 ہیں کہ جب کوئی شخص ایک گچھا اپنے بالوں کا اپنے کان کے پاس ٹیکلیوں سے رگڑتا
 ہے اسوقت جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ کرے۔ بے۔ ٹنٹ رائگس کے آواز کی مشابہت
 رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ آواز خشک اور اکثر دم کشی کی حرکت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے
 اور اکثر مرض نو۔ مو۔ نیا کے درجہ اول میں سنائی دیتی ہے کہ جب تشنج کی ساخت
 میں نتیجہ انفلا میشن کا ملف پیدا ہو جاتا ہے، ترکیب کے پیدا ہونے کی یہ ہے کہ جب
 تشنج میں انفلا میشن ہوتا ہے تو اسکی ساخت میں ملف بھی پیدا ہوتا ہے جس سے
 ہوا کے کیسے بھر جاتے ہیں۔ اس جوقت مریض دم کہنیتا ہے اور دم کشی کی ہوا تشنج
 کے کیون کے اندر داخل ہوتی ہے اسوقت کیسے مذکور پہلے ہیں اور انکی پہلے سے
 اس کیسید ملف کے ریشے کہ جس سے کیسے بھر جاتے ہیں ٹوٹنے لگتے ہیں غرض ملف
 کے ریشوں کے ٹوٹنے کی آواز کو کرے۔ بے۔ ٹنٹ رائگس کہتے ہیں *
 چہام کرانک۔ رائگ رائگس۔ یہ آواز یا تو خشک یا تر ہوتی ہے *
 ڈرائے لینے خشک کرانک۔ رائگ رائگس کی آواز تر خشک اور جلد گزر جاتی ہے

اور ہمیشہ دم کشی کی حرکت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور ہر ایک حرکت مذکورہ کے ساتھ صرف تین یا چار دفعہ سُنائی دیتی ہے اس آواز کی تشبیہ بہت مشکل ہے اور اگر یہ کیس قدر مشابہت رکھتی ہے تو اس آواز سے رکھتی ہے کہ جو چھلی یا گوشت کو آگ پر بہنٹے وقت پیدا ہوتی ہے یہ آواز اکثر دم کشی کے وقت سُنائی دیتی ہے اور مرض سُل کے پہلے درجہ کے اخیر میں کہ جب مادہ ٹیو۔ بر۔ کل گنا شروع ہوتا ہے اُس وقت سموع ہوتی ہے اور منہلی کی ہڈی کے نیچے اور سنجو ان کیف کے اوپر کے حصہ پر خوب سُنائی دیتی ہے، تریغے موئیٹ کراک۔ لنگ یہ آواز مرطوب ہوتی ہے اور سُل کی چار کے دوسرے درجہ میں کہ جب مادہ ٹیو۔ بر۔ کل گنا ہے اُس وقت سُنائی دیتی ہے۔

پنجم۔ سب۔ کرے۔ پے۔ ٹنٹ۔ رائکس۔ اسکے بلبل بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور نہایت باریک برانکیل۔ ٹیوب (قصبۃ الریہ) میں جب تلغم ہوتا ہے اور اُس تلغم کے اندر سے ہوا کی آمد و رفت ہوتی ہے اُس وقت اس سُل کے بلبل پیدا ہوتے ہیں لیکن اس سُل کی آواز کے۔ پے۔ لری۔ برانکائی۔ ٹس کی بیماری میں سُنائی دیتی ہے لیکن یاد رہے کہ جب یہ آواز ٹنٹ پر دو نو شش کے پنیہ سے کے برابر سُنائی دے تب اس سے کے۔ پے۔ لری۔ برانکائی ٹس کی بیماری ثابت ہوتی ہے لیکن جب شش کی نوک پر سموع ہوتی ہے تب اس سے مرض سُل کا گمان ہوتا ہے۔

ششم۔ میو۔ گس۔ رائکس۔ اسکے بلبل نسبت تم نیم کے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے برانکیل۔ ٹیوب میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ آواز برانکائی ٹس اور ہے۔ ماب۔ لٹے۔ پش (نفث الدم) اور نیو۔ مو۔ نیا (ذات الریہ) کے تیسرے درجہ میں کہ جب پیٹر اکلمبا تا اور اسپین پیپ پڑ جاتی ہے سُنائی دیتی ہے۔

ہفتم۔ کے۔ وژ۔ نش یا کرگ۔ لنگ۔ رائکس۔ جب پیٹرے میں غام پیدا ہو جاتا ہے جیسے سُل کی بیماری کے تیسرے درجہ میں ہوا کرتا ہے اور اسپین

پسپ ہوتی ہے تو اس پسپ کے اندر نفس کی ہوا کے گزرنے سے بڑے بڑے بلبلے پیدا ہوتے ہیں جیسے حقہ کے پیتے وقت آواز نکلتی ہے ۔
 پردہ پلو۔ رابین انفلامیشن ہوتا ہے (پلو۔ رمی۔ سی) تب اس کے دونوں سطح کے اسپینز رگڑنے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے جسکو فک۔ شن ساؤنڈ کہتے ہیں ۔

تکلم کی آواز حالتِ صحت میں

کسی تندرست آدمی کے ٹریکیا (جنوہ) پر سینہ میں لگا کر اس وقت سینہ کو جب وہ شخص باتیں کرتا ہو تو اس کے تکلم کی آواز اس نور سے شنائی دیگی کہ سننے والے کو درد معلوم ہوگا اور یہی بات گلو کے دونوں طرف اور فقرات پشت پر پیدا ہوگی۔ اور سینہ کی ٹڈھی کے اوپر کے حصہ کے بچو پیچ آواز مذکور بہت کم و شنائی دیتی ہے اور استخوان مذکور کے دونوں کناروں پر تکلم کی آواز زیادہ تر کم زور ہو جاتی ہے اس آواز کو برا نکا۔ نو۔ نے کہتے ہیں اور یہی آواز پشت پر بھی کہ جہاں ٹریکیا دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے شنائی دیگی اور دونوں استخوان کتف کے پیچ کی نوکوں کے مابین کی جگہ پر بھی سموع ہوتی ہے ۔ علاوہ ان مقامات کے جتنا ذکر اوپر کیا گیا ہے سینہ کے اور حصوں میں تکلم کی آواز ایک خفیف ہیں بہن کی آواز کے طور پر شنائی دیتی ہے اور بہت سے لوگوں میں یہ بھی بہن سموع ہوتی ۔

تکلم کی آواز حالتِ مرض میں

حالتِ صحت کے تکلم کی آواز مرض کی حالت میں یا تو کم یا تیز ہو جاسکتی ہے مثلاً جب پردہ پلو۔ را کی تہلی میں پانی یا ہوا بھر جاتی ہے تو سینہ کے ان حصوں میں کہ جہاں حالتِ صحت میں تکلم کی آواز شنائی تھی ہے کم یا بالکل سموع بہن ہوتی اور مرض ام۔ فامی۔ سی۔ ما

(لفح الریہ) اور نیو-مو-تہو-را-کس (سینہ کے اندر ہوا کا ہر جان) میں بھی کلم کی آواز

بالکل ہین سنائی دیتی ہے۔

جب کلم کی آواز تیز سنائی دیتی ہے تب اسکو برانکا-فو-نے اور پکٹا-مار-ری-لوک-وی کہتے ہیں۔ یہ دونوں آوازیں تیز ہوتی ہیں لیکن دوسری آواز بہ نسبت اول کے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اور جب پہلے سخت یا جب ہوا کی نالیان پہلجاتی ہیں اور انکی ساخت موٹی ہو جاتی ہے اور جب پہلے مین غار پڑ جاتا ہے تب برانکا-فو-نے سنائی دیتی ہے کلم کی آواز جب اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ جسکے نئے سے کان کو تکلیف ہو تب اصطلاح میں اسکو پک-ٹو-ری-لوک-وی کہتے ہیں۔ یہ آواز اکثر شش کے غار پر پیدا ہوتی ہے لیکن اس غار کو چھوٹا ہونا چاہئے اور اس کے اندر کی سطح سخت اور ہموار ہو اور غار بند کور کی دیوار جو سینہ کے دیوار کی طرف ہو اسکو سخت اور باریک ہونا چاہئے مزید بریں اس غار میں جہ ہوا کی نالی آتی ہے اسکو خوب گہلی ہونی چاہئے۔

اسی-گا-فو-نے۔ اس لفظ کے معنی ہین بکری کے میاں کی آواز کے جب پلو-راکی تہیلی مین ایک باریک طبق پانی کا ہوتا ہے اسوقت مریض کے کلم کی آواز اس طبق پانی کے اندر سے ہمارا کان کو ایسی سنائی دیتی ہے جیسے بکری میاں ہی ہے لیکن جب پانی زیادہ پیدا ہوتا ہے تب یہ آواز ہین سنائی دیتی ہے۔

ایک آواز آواز پانی کے ٹپکنے کی سنائی دیتی ہے جسکو سکٹ-کشن-ساؤنڈ کہتے ہیں چنانچہ یہ آواز اسوقت سنائی دیتی ہے کہ جب سینہ کے اندر رطوبت اور ہوا ہوتی ہے جیسے مرض ٹیڈرو-نیو-مو-تہو-را-کس مین ترکیب اسکے نئے کی یہ ہے کہ بیمار کے کوٹھے کی ہڈی کا کٹا را پکڑ کر سینہ کو آہستہ آہستہ ہلا دین اور ہلاتے وقت سینہ مین کو گونگا کر سنیں۔ اسی بیماری مین ایک اور آواز سنائی دیتی ہے جسکو ٹ-ٹا-پکٹ ٹینٹ-لنگ کہتے ہیں۔ پردہ پلو-را کے جوف کے اوپر کے حصہ سے جب آب خون

کے قطرات پیچھے پانی میں ٹپکتے ہیں تب یہ آواز پیدا ہوتی ہے ۔

مقالہ دوم

چند سلامتیہ جمع سینہ کی کثیراریوں میں پائی جاتی ہیں

اول دست - نیا

یعنی

سنگی نفس کی

یہ ایک علامت ہے جو کئی سببوں سے پیدا ہو سکتی ہے۔ ان سببوں کو چھٹی طرح دریافت کرنا چاہئے تاکہ علاج میں غلطی نہ ہونے پاوے اور یہ باور ہے کہ سنگی نفس کی صرف دم لینے کے اعضا کی خرابی سے نہیں پیدا ہوتی بلکہ اور بہتیرے سببوں سے بیمار دم اچھے طور پر نہیں لے سکتا پس مثلاً ہو کہ نالیوں میں کسی اندرونی روک کے سبب سے یا ان نالیوں کا منفذ ٹکڑ کر تنگ ہو جانے سے یا جب ان نالیوں کو باہر سے کوئی شے دباتی ہو تو ہو کہ کی آمد و رفت میں مزاحمت ہوتی ہے اور مریض چھٹی طرح دم نہیں لے سکتا اور یہ سینہ کسی طرح دب جاتا اور ٹکڑنے اور پھیلنے نہیں پاتا تب بھی م تکلیف سے لیا جاتا ہے ۔ سبب یہ ہے ۔ را۔ لے سبب یا تشنج کے جب سینہ پھیل نہیں سکتا ہے جب تشنج کے پھیلنے اور ٹکڑنے کے لچک جاتی رہتی ہے اور سینہ سخت ہو جاتا ہے تب بیمار کو ہلکا دم چھوڑ نہیں سکتا ۔ پہلے کی ساخت جب کھجائی ہے یا سخت ہو جاتی ہے اور جب ہوا کے

کیون یا باریک ہو اکی نالیون میں رطوبت جمع ہو جاتی ہے اور جب پھیلاؤ بڑھ جائے اسکا طبع
 ہے اور جب پٹھو۔ نرمی عروق شیعہ یہ نیت و نابود ہو جاتی ہیں تب بھی دم تکلیف سے
 لیا جاتا ہے۔ سینہ اور شکم کی ان بیماریوں کے سبب بھی تنگی انہس کی ہو جاتی ہے جن
 بیمار کو دم لینے میں درد ہوتا ہے۔ فاسد ہوا میں دم لینے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔
 مثلاً جب ہوا بہت ہی لطیف ہوتی ہے یا جب اس میں مضر گیس ہوا میں مل جاتی ہیں
 دل کی ساخت یا خرابی فعل کے سبب شش کی رگوں میں دوران خون کی فراہمیت
 کے سبب سے یا خون کے نکل جانے کے سبب حد سے زیادہ مشقت کے سبب سے
 جب شش میں خون کی زیادتی یا جب بہت کمی ہو جاتی ہے۔ جب انے۔ میل کے سبب
 یا خون اچھی طرح صاف نہ ہونے کے سبب یا بخاروں میں اور گردوں کی بیماریوں میں
 اور پانی۔ میا اور دیگر امراض میں خون کے اندر زہریلے اجزاء کے مل جانے سے جب خون
 کی حالت بگڑ جاتی ہے تب بھی دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔
 ہس۔ ٹے۔ ریا کی بیماری کے سبب یا رنج و غم و ترو و کے سبب یا دماغ کی بیماری
 کے سبب وی۔ گس۔ ٹرو یا ان کی شاخوں کے دب جانے سے یا کسی اور بیماری کے
 منعکس اثر کے سبب سے جب نظام عصبی میں خرابی پڑ جاتی ہے تب بھی دم لینے میں
 تکلیف ہوتی ہے۔

جب تمہارا بیمار تکلیف سے دلمیتا ہو تب ان باتوں پر توجہ کرنی چاہئے مثلاً دیکھو کہ
 دم لینے کے لئے بیمار کو ہوا کم ملتی ہے یا نہیں اور ہوا کی کمی ہو تو دیکھو کہ وہ کمی اس قدر ہے
 کہ جس سے دم بند ہو کر اس کے فوراً مرجانے کا خطرہ ہے۔ دیکھو بیمار کتنی جلد دم لیتا ہے
 دیکھو سانس گہری اور دزد دے لیتا ہے یا اسکا خلاف۔ ملاحظہ کرو کہ دم کشی اور برآمدگی
 دم کی حرکتوں اور ان دونوں حرکتوں کے مابین کے وقفوں میں کس قدر کمی ہوتی ہے۔ بیمار
 کھڑا ہو یا لیٹا ہو دیکھو کہ ان حالتوں کے اندر دم لینے میں مریض کو کس قدر تکلیف ہے

اور یہ بھی ملاحظہ کرو کہ دم لینے وقت ان عضلات کو سکندہ حرکت ہوتی ہے جو دم لینے کے
 مددگار عضلے کہلاتے ہیں (اک - سی - سری - مسلس - اف - رس - پے - سری - رشن) انہیں
 کی تکلیف کے سبب سے ناک کے تنہے پہلیے اور پھولتے ہیں یا نہیں اور بیمار کچھ عرصہ
 تک دم بند کر سکتا ہے یا بات چیت کر سکتا ہے یا نہیں * دیکھو دم لینے کی حرکتوں کے
 ساتھ کوئی آواز خراٹے کی یا گھر گھر ہٹ کی پیدا ہوتی ہے یا نہیں * یہاں پہلے میں کہنے
 طور پر جاتی ہے یا نہیں - جب شش کے اندر ہوا پہنچتی ہے تب سینہ کا حصہ زمین اور
 فم معہ کا مقام (اچھے - گس - ٹری - ام) اور اسٹرنم مڈی کے اوپر کا نشیب دم کھینچنے
 کے وقت تھوڑا بہت دب جاتا ہے * دیکھنا چاہئے خون اچھے طور پر صاف ہوتا ہے
 یا نہیں * ملاحظہ کرو کہ تنگی نفس کی علی الاصلہ ہوتی رہتی ہے یا نوبت بنوبت یا کبھی
 شدت پکڑ جاتی ہے اور جو نوبت بنوبت ہوتی ہے تو اسکا سبب دریافت کرو -
 زیادہ محنت کے سبب سے ہے یا فکر و تردد کے سبب یا کھانا کھانے کے باعث یا دوسرے
 میں دم لینے کے سبب سے دم لینے کی تکلیف کی نوبتیں پیدا ہوتی ہیں *

علامات جو تکلیف سے دم لینے میں پیدا ہوتی ہیں - یاد رہے کہ تکلیف
 سے دم اسوقت لیا جاتا ہے کہ جب جسم کی کل وریدوں میں خون ٹھہر کر دورہ کرتا ہے اور
 اس باعث وریدوں کو خون سے پُر ہو جاتی ہیں اور جسم کی شرائین میں خون کم پہنچتا ہے
 مگر پُر اپہا رہی سبب یہ ہے کہ جب خون اچھے طور پر صاف نہیں ہوتا ہے تب اس میں دھانی
 مادہ کی زیادتی ہو جاتی ہے (کار - بانک - اسٹ) اور وہ خون زہر ملا ہو جاتا ہے جب
 زہر ملا خون نظام عصبی میں دورہ کرتا ہے تب اس نظامت کے کاروبار میں فتور
 پڑ جاتا ہے * تنگی نفس کی حالت میں ابتدا کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ سبب کے
 قوی یا خفیف ہونے کے بموجب بیمار دم لینے میں کم و بیش زور لگاتا ہے بعد ازاں ایسا
 ہوتا ہے کہ نظام عصبی کے احوال چون چون بگڑتے جاتے ہیں بیمار کے دم لینے کی کوششیں

تبدیل کم ہوتے ہوئے آخر کار موقوف ہو جاتی ہیں + پہلے تو رنگوں کے پُر ہو جانے سے چہرہ سرخ لعلہ از ان جلد اودا ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں چہرہ نیلا یا چمکنا ہو جاتا ہے مگر بیون کے گرد اور ناک اور آنکھوں کا حلقہ اودا ہو جاتا ہے علاوہ ازیں جسم کے اور حصے بھی اودے یا پیلے ہو جاتے ہیں جیسے ناخن اور وہ حصص جسم کے جو دل کے مقام سے دور واقع ہیں۔ وریدیں پُر نظر آتی ہیں آنکھیں ابھری ہوئی اور پُر آب جسم کی حرارت غریزی کم ہو جاتی ہے اور ٹہنڈے پسینہ سے جسم چھپا ہو جاتا ہے اب عصبی علامتیں جلد ظاہر ہو پڑتی ہیں یعنی پہلے تو سر گھومتا ہے جو اس حملہ میں فتور پڑ جاتا ہے۔ ہوش و حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ ماتہ پاؤں میں لرزہ اور شنج ہونے لگتا ہے۔ اب غشی طاری ہو کر بیمار بالکل بیہوش ہو جاتا ہے (کو۔ ما) اور سارے بدن میں تشنج ہو کر عضلات ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ نبض کمزور۔ سرخ۔ اور خون سے خالی ہوتی ہے۔ لیکن دم بند ہونے کے بعد بھی نبض چلتی رہتی ہے اور نبض جب محسوس نہیں ہوتی ہے تب بھی ل حرکت کر سکتا ہے آخر کار تنگی نفس کا نتیجہ جب موت ہوتا ہے تب بھی حرکت کرنے سے رہ جاتا ہے +

صورتحال تشریحی بعد وفات۔ بعد موت کے نفس کا امتحان کرین تو دل کے دہنے خانے اور وریدیں خون سیاہ سے پُر پائے جائینگے اور جسم کی کل وریدوں میں اجتماع خون کا پایا جائیگا (رکن جش۔ چن) اور اس سبب جسم کے کل اعضا اور ساخت خون سے پُر نظر آئینگے +

علاج۔ ڈرپ۔ نیا کے مختلف سببوں کے علاج کے مطالب یہ ہیں چنانچہ ممکن ہو تو سب کو رفع کرین + بیمار کو ایسی کمر ڈ پر رکھین جس میں م آسانی سے لے سکے + ہر قسم کی محنت سے باز رکھین + اور ان باتوں سے باز رکھین جن سے سانس کی تکلیف زیادہ ہو + دیکھین کہ نرسی اور صاف ہوا بیمار کو دم لینے کے لئے کافی معتدین ملتی ہو کہ

بعض حالات میں مناسب جھین تو قصداً جو کون کے ذریعہ خون لینا۔ پس دواؤں کا استعمال نہ کر لیں
 مثلاً گھانے یا پچکا رہی کے کرین یا پادین جن سے دم کی تکلیف رفع ہو جیسے ادویات
 ڈپٹ۔ رمی۔ سینٹ یا اراق۔ ٹس۔ پاز۔ موٹوکٹ یا اسٹی۔ میو۔ لنٹ۔ سینہ پر ایسی
 پتھرین لگا دین جیسے راعی کی پٹی۔ مختلف قسم کی تمکید۔ یا خشک گلاس۔ تاکہ دم
 بند ہو کر بیمار مرنے جائے سارے سینہ یا جسم کے دیگر مقامات پر خوب بڑی سی ساتی
 کی پٹی لگا دین۔ مریض کو آب گرم میں بٹھا کر اس کے سر اور شانوں پر خوب طرح آب سرد
 پھونک دین۔ سینہ پر بیگیے رومال سے نوردیر و مارین۔ مصنوعی ترکیب سے نفخ کو قائم
 کرین۔ دسی۔ کس۔ نرؤ پڑتا بجلی لگا دین۔ مناسب جھین تو عمل لے۔ رنگا۔ نئی یا
 رے۔ کیا ٹی کرین۔

کاف عینہ کھانسی

کہا نسی پتھیری حالتوں میں پیدا ہوتی ہے اور اس کو ایک صفت شمار کرتے ہیں مثلاً جب
 ہوا کی آمد و رفت کے منفذوں میں خاصہ گلو اور لے۔ رنگس کے میو۔ کس پر وہ میں کمی
 قسم کی خراش موجود ہوتی ہے تب کہا نسی اُٹھتی ہے۔ پر وہ مذکور کی یہ حالت انفلیمیشن
 کے سبب سے پیدا ہوتی ہے جب گلو اور لے۔ رنگس اور ٹریکیا یا براکیئل۔ میو۔ ب میں
 کوئی خاص شے خراش پیدا کر نیوالی لگ جاتی ہے یا جب اُن مقامات میں کسی قسم
 کی خرابی برپا ہو جاتی ہے تب بھی کہا نسی اُٹھتی ہے مثلاً یہ باتیں اس صورت میں ہوتی
 ہیں کہ ٹو۔ ٹو۔ لا (منہ کا کوا) ٹان۔ برن گانڈر لوزیتن) یا اے۔ گلا۔ ٹسٹن یا
 ڈو۔ کل کارڈس کی ساخت میں کسی قسم کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے یا جب دم
 کشی کے ساتھ خراش پیدا کر نیوالی اخرا یا کوئی شے غیر عینہ داخل ہو جاتی ہے یا جب
 خاص قسم کی ہوا میں م لیا جاتا ہے مثلاً ہنا پت سر ہو یا جب اس قسم کی ہوا میں

سائنس لیجاتی ہے کہ جسمین تیز گیس ہوا اینٹلی ہوئی ہوتی ہیں یا جب ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں جیسے سرم یعنی آب خون یا میوہ۔ کس یعنی ہلیم یا پس یعنی پیپ یا بلڈ یعنی خون یا کروپ اور ڈوف۔ تھے۔ ریا کے کاذب پردہ ایک اور قسم کی کہاںسی ہوتی ہے جبکہ رلیف۔ لکٹس کاف کہتے ہیں۔ جب کسی دردورار کے عضو میں خراش ہوتی ہے تب اس خراش کا اثر منفس کے آلات میں منعکس ہو کر کہاںسی پیدا کرتا ہے اسکو رلیف۔ لکٹس یعنی منعکس کہاںسی کہتے ہیں مثلاً جب شش یا پردہ پلو یا میز خراش ہوتی ہے یا دل یا پردہ پے۔ رمی۔ کار۔ ڈی۔ ام میں یا ہضمی یا دانت خراش کی تکلیف یا شکم میں کرم کے باعث رو دون میں خراش ہوتی ہے یا جگر یا پردہ پے۔ رمی۔ ٹو۔ نی۔ ام یا کان میں یا عورتوں کے اعضا سے تو الہ اور ناسل ہیز یا جلد پر خراش ہوتی ہے تب منعکس کہاںسی پیدا ہوتی ہے *

خون کی حالت جب بگڑ جاتی ہے جیسے گاؤٹ یا رورما۔ ٹیڑم میں ہوا کرتی ہے تب نظام عصبی پر اسکا اثر پیدا ہوتا ہے اور اعصاب کے وسیلہ سے وہ اثر منعکس ہو کر رلیف۔ لکٹس کاف پیدا ہوتی ہے۔ جب خود اعصاب میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے جیسے ہسٹیریا اور دماغ کی بیماریوں میں یا خود آلات منفس کے اعصاب میں وہ خرابی پیدا ہوتی ہے تب بھی اس قسم کی کہاںسی پیدا ہو سکتی ہے *

کہاںسی کی خاصیتیں۔ مثلاً دیکھنا چاہئے کہ کہاںسی کتنی کتنی دیر بعد ہوا کرتی ہے آیا برابر ہوتی رہتی ہے یا نوبت بنوبت ہوا کرتی ہے۔ اگر نوبت بنوبت ہوتی ہے تب یہ کہیں کہ نوبتیں شدید ہیں یا خفیف اور کتنی دیر تک ہتی ہیں ملاحظہ کریں کہ کہاںسی کس طور سے شروع ہوتی ہے یعنی بیمار خود کہانتا ہے یا کہاںسی خود بخود اُٹھتی ہے یا بے اختیار ہوتی رہتی ہے اور اُسکے اُٹھنے سے پہلے جسم کے کسی حصہ میں خراش معلوم ہوتی ہے یا محنت کرنے سے یا کروٹ بد لٹنے سے یا سرد ہوا میں دم لینے سے کہانتی

اٹھتی ہے۔ دیکھیں کہ وہ کہاں کسی خاص قسم کی ہے اور دم کھینچے اور جوڑنے کے وقت اس کہاں کے سبب کوئی آواز بھی پیدا ہوتی ہے یا نہیں۔ دیکھو کہاں خشک ہوتی ہے یا ساتھ اس کے بلغم بھی آتا ہے اور جو آتا ہے تو آسانی سے خارج ہوتا ہے یا وقت سے اس بلغم کی مقدار کو رگت اور بوکو دیکھنا چاہئے۔ ایک غلفہ بن کر نکلتا ہے یا کئی غلفے خارج ہوتے ہیں ان غلفوں کی مقدار اور شکل کو دریافت کریں آیا وہ شفاف ہیں یا مکدر۔ کف دار ہیں یا نہیں۔ گاڑے ہیں یا پتے اور کس قدر لیسیدار ہیں۔ انہیں کوئی چیز ملی ہوئی دکھائی دیتی ہے یا نہیں جیسے خون یا بلغم کے سانچے یا چونہ کے ذرات یہ بھی ملاحظہ کریں کہ کہاں کے بعد تھے ہو جا یا کرتی ہے یا نہیں اور یہ کہ اس کہاں کے بعد سانس کی تکلیفیں رفع ہوتی ہیں یا نہیں۔

علاج۔ اس سلامت کا علاج سینہ کی مختلف بیماریوں کے ساتھ بیان کیا جائیگا۔

سوم ہے۔ ماپ۔ لے۔ پس

عربی میں اس بیماری کو نفث الدم اور ہندی میں خون ہو کہا بولتے ہیں۔
علامات۔ قبل از ہو کئے خون کے بیمار کی چھاتی میں بوجہ اور تکلیف معلوم ہوتی ہے اور ساتھ اس کے خفیف بخار بھی ہوتا ہے۔ نبض سہلے اور تیز جاتی ہے۔ دم لینے میں کس قدر تکلیف اور خشک کہاں ہوتی ہے۔ بعض حالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بخیر کہاں یا گلو میں غراش ہونے کے دسمہ منہ میں خون کی ٹکلیاں آتی ہیں اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خون خالص یا بلغم کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ بیمار کے دہن کا ذائقہ اکثر نکلیم ہو جاتا ہے یا سینہ کی علامتیں یہ ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ سینہ کے ٹوٹنے سے آواز صاف نکلتی ہے اور کس قدر میوہ کس راگس سنائی دیتی ہے اور بعض اوقات

سینہ کے کسی محدود مقام پر پڑھتے سے آواز ٹھوس نکلتی ہے اور باریک کرے۔ لے ٹیٹا
 رانکس بھی سنائی دیتی ہے۔ پہلی حالت کا خون قصبہ الریہ (برانکیئل - ٹیوب) سے آتا
 ہے۔ اور دوسری حالت میں شش کی ساخت کے اندر خون تراوش پایا ہے اور جب
 سل کی بیماری میں مُنہ سے خون آتا ہے تب اس مرض کی خاص آواز میں مدوع ہوتی ہیں
اسباب - پری ڈسپنہ - زنگ جوفی سے لیکر ۵۰ سال کی عمر - دسوی مزاج -

جسم میں خون کا زیادہ ہونا - تنگ سینہ - پہلی ہی کہی خون کا آنا -
 اکہ اسٹنگ - شدت گرمی - کثرت ورزش - اُٹھانا - بیماریاں جو کازور سے گانا -
 یا کلام کرنا - لیکن عام سبب خون تھوکنے کا سل کی بیماری ہے۔ اور جب خون حیض
 معمولی راہ سے نہیں آتا ہے تب ماہِ جاہِ مریضہ خون تھوکتی ہے۔ اور قلب کی بیماری
 یا رینو - ریزم کے پھوٹنے سے بھی مُنہ سے خون آسکتا ہے اور شاذ و نادر پر الٹا سیٹس
 کی بیماری میں بھی خون تھوکتا ہے اور مرضِ نیو - مو - نیا اور آسٹیمیا میں بھی مُنہ کے
 راہ خون آسکتا ہے ۔

تشخیص - اس مرض کی تشخیص کے وقت حلقِ مسوڑے - اور ناک کو پہلے خوب طرح
 دیکھ لیں کہ مبادا ان سے خون آتا ہو ۔ اس مرض میں سُرخ خون خالص یا میراہ کفرا
 بلفم کے تھوڑے تھوڑے یا زیادہ زیادہ کھانسی کے ہمراہ آتا ہے اور جب سُرخ خون کثرت سے
 آتا ہے تب ایسا گمان کرنا چاہئے کہ ہپٹرے کی کوئی رگ پھٹ گئی ہے اور اس سے خون
 بہ کر ہوا کی ٹالیوں میں آتا ہے ۔ تے الدم اور اس مرض میں جو فرق ہے اس کو ہم اس
 وقت بتا سکتے ہیں جب تے الدم کی علامتوں کا بیان کر چکے ۔

علاج - مریض کو آرام سے ایسی جگہ رکھیں جو سرد ہو اور حسین تازہ اور صاف ہوا
 کی آمد و رفت اچھی ہو۔ آبِ برف یا برف کے ٹکڑے کھا دیں یا نیبویا املی کا آبِ شورہ
 پلا دیں۔ پیار کے سر کو اونچا رکھیں اور کلام نہ کرنے دیں جب خون کی تیزی کم اور

علا مات بخار کی رفع ہو جاوین یا ابتدا ہی سے اگر اجتماع خون
سے علاج کرنا چاہئے مثلاً۔

نسخہ۔ ڈائیلوٹ۔ سیفیووک اسڈ ۲۰ قطرے

۳۔ آونس ۳۰ سبکو ملا کر تین تین یا چار چار گنتہ

نسخہ۔ روغن تارپین ۵ ایا ۲۰ بوند ۱۰ لعاب صمغ

آونس ۳۰ سبکو ملا کر تین تین یا چار چار گنتہ بعد پلاوی

نسخہ۔ پیکری اگرین ۱۰ ڈائیلوٹ۔ سیفیووک اسڈ ۲۰

عرق گلاب ۲۰ آونس ۳۰ سبکو ملا کر تین تین یا چار چار

گیا لک اسڈ اور ٹانک اسڈ اور شوگراف لڈ ۵

نسخہ۔ گیا لک اسڈ ۵ سے ۵۰ اگرین تک

۲۰ بوند تک ۳۰ پیکری آف سے۔ نے مرہ

ملا لین اور جب تک خون بند نہ ہو دو دو گ

نسخہ۔ شوگراف لڈ ۵ سے ۱۰ اگرین تک

تک ۳۰ کلغند حسب ضرورت ۳۰ سبکو ملا کر

یا تین تین گنتہ بعد کہلادین ۳۰

نسخہ عرق کا۔ ڈائیلوٹ اسڈ ۲۰

عرق دال چینی ۶۰ درام ۳۰ ملا لین

ہستیاہ سے پشت اور دل کے

اور کھانے کا نمک ایک یا دو

۳۰

حارم کٹا ریا کو۔ راسی۔ زرا

یعنی

کام

بہت سردی ہی کے سبب ہین بلکہ ہوا میں دفعتاً
- اور آدمی جب ہکا ہوا ہوتا ہے اور ہیگ جاتا ہے
بھی زکام ہو جاتا ہے *

نے سے طبیعت سُست ہو جاتی ہے۔ اعضا شکنی ہوتی
- بعد از اس ناک اور آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگتا ہے۔

لگتا ہے زبان میلی ہو جاتی ہے تھوڑا بہت تھما
- رہتی ہے۔ نبض تیز ہو جاتی ہے اور

ماہر روز کے بعد یہ علامتیں رفع ہونے
- سی۔ - لاشی۔ ٹس یا نیو۔ مو۔ نیا

یو۔ کس پردہ کو چھوڑ کر ٹرے۔ کیا یا
- یا ہے اور بار بار کھانسی ہونے لگتی ہے

سیٹھ جاتی ہے *

نہی تو گرم گرم چاہی کہ سر مُنہ
- کوئی گیا گھاس (لے) ہین۔ گراس

بزدلے ایسے ہی ہوتے ہین کہ
- کر تے ہین *

س۔ پاؤڈر۔ ہ گرین * دودھ کو

ملاکا جا رہا چار گنٹھ بعد کھلتے ہیں۔ بخار کی شدت ہو تو فیوریکسچر یا فیورہ پاؤڈر کا استعمال کرتے ہیں (دیکھو پیچھے)۔

ادعا کثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ سوتے وقت ایک پیالہ آب مسرہ کا پینے سے یہ بیماری رفع ہو جاتی ہے لیکن بخار کی شدت ہو تو ٹارٹار امٹک تھوڑے تھوڑے عرصہ بعد اس مقدار میں استعمال کریں کہ جس سے تھے ہیو آنکھوں میں درد اور ان سے آشوب جاری ہو تو آب گرم کی کمید کریں۔ بعض دفعہ آیتو ٹوین کے بخار کے سونگھنے سے یہ مرض رفع ہو جاتا ہے جبکہ ترکیب یہ ہے کہ ہاتھوں کو گرم کر کے ٹنکیر لکشیسی پکڑ کر دو دو یا تین تین منٹ بعد ایک گنٹھ تک برابر سونگھتے رہیں اور ہر ایک دفعہ شیشی کو صرف ایک منٹ تک ناک کے پاس پہنچے دیں۔

حال کے تجربہ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سا۔ لے۔ سے۔ لٹ آف سو۔ ڈیٹیم جیسے ٹان۔ سی۔ لائی۔ ٹس میں مفید ہے ویسے ہی کٹار یعنی زکام میں بھی فائدہ مند ہے۔ چنانچہ زکام میں اسکیو اسطر جبر استعمال میں لانا چاہئے۔

لشخ۔ سے۔ لی۔ سے۔ لٹ آف سو۔ ڈیٹیم آؤنس۔ شربت نارنج۔ نصف آؤنس۔ عرق یودینہ۔ آنا جھنے میں گل عرق چار آؤنس ہو جاوے۔

مقدار خوراک۔ دو آرام تین تین یا چار چار گنٹھ بعد پانچ دن جب تک خاص اثر سے۔ لی۔ سے۔ لٹ آف سو۔ ڈیٹیم کا پیدا ہو جائے۔ یعنی جب تک کانون میں جہز جہن کی سی آواز پیدا نہ ہو۔ اسکے استعمال سے زکام میں جو ابرو پر اور آنکھوں اور ناک میں درد ہوتا ہے وہ موقوف ہو جاتا ہے اور چیکین اور ناک کا بہنا بھی روک جاتا ہے اور چند روز میں بالکل آرام آ جاتا ہے یہاں تک کہ کہانسی بھی نہیں ہوتی جو زکام کے رفع ہونے کے بعد اکثر رہا کرتی ہے اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ناک کا انفلاشن ہوا کی نالیوں تک پہنچ گیا ہے۔

پنجم اور زینا

منخرین کے کرائنگ انفلامیشن کو اصطلاح میں آد-زینا کہتے ہیں ۔

اسباب۔ جب نہتون میں بار بار اکیوٹ انفلامیشن ہو جاتا ہے یا جب کسی کو بار بار زکام ہوتا ہے خاصکر ایسوں کو جو نازک مزاج ہوتے ہیں تب یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور جب نازک مزاج اسکر۔ فیو۔ کس ہوتا ہے یا جنگلی طبیعت میں مرض گاؤٹ یا آتشک کا ماؤ ہوتا ہے انکو بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے ۔

تشخیص۔ اس بیماری کو پہچاننے کے لئے ناک کے اندر آکھاپسے۔ کیو۔ لم اور سلامی ڈھل کر کے منخرین کا امتحان کرنا چاہئے کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شے غیر فطری مثلاً مٹر یا لوپتہ یا کوئی ٹکڑا پڑی کا یا پا۔ لے۔ پس منخرین کو بند کر دیتی ہے تب ناک کی بطوبت خارج ہونے نہیں پاتی۔ ناک ہی کے اندر رکھ متفن ہو جاتی ہے جس سے انفلامیشن پیدا ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناک کے اندر فاس۔ فٹ اور کار۔ بونٹ اف لایم اور گنے۔ شیا کی پتھری بھی جم جاتی ہے اور انفلامیشن ہو جاتا ہے اور ناک میں ڈنبل کے پیدا ہونے سے بھی پیپ جاری ہوتی ہے ۔

علامات۔ یہ بیماری اکثر زکام کی علامتوں سے شروع ہوتی ہے ناک کا میوکس پردہ چونکہ موٹا ہو جاتا ہے اس واسطے ناک بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے اور دم لینے میں بھی اس واسطے تکلیف ہوتی ہے۔ ماہتا درو کرتا ہے۔ کہانیسی ہوتی ہے۔ بیمار کمر و داہرست ہمت ہو جاتا ہے اور ناک سے پیپ آمیز بلغم نہایت بدبودار جاری رہتا ہے اور میوکس پردہ میں کوئی زخم ہو تو اس متعفن رطوبت کے ساتھ خون بھی آتا ہے اور ناک سے گاہے گاہے بلغم کے سخت منجھڑے نکلا کرتے ہیں جنکو پنجابی میں چوڈے کہتے ہیں۔ ان میں اسفہ ربدو ہوتی ہے کہ جیار کسی مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا اور خود کو بھی استفادہ

نفرت ہو جاتی ہے کہ اگر علاج لمبے فائدہ نہ ہو تو مریض زندگی سے نزار ہو جاتا ہے اور جب ناک میں کیڑے پڑ جاتے ہیں تب یہ بیماری جھلک ہو جاتی ہے۔ بہک جاتی رہتی ہے بیمار کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے اور انہی راتیں قیامت کی کشتی میں جب یہ بیماری عرصہ دراز تک جاری رہتی ہے تو انتہیوں تک پہنچ کر دیوار زخمی ہو جاتی ہے۔ اور جب یہاں بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں تب یا تو مزار پر جاتی ہیں یا زخمی ہو جاتی ہیں۔ باتیں خاص کر اس وقت ہوتی ہیں کہ جب جسم میں آتش کا زہر ہوتا ہے، لگا بے لگا ہے اس مرض کی علامتیں خفیف بھی ہوتی ہیں پھر ایسی کہ جب بیمار سکتا ہے تو اُس کے رد مال میں پتلا بلغم خون آمیز آتا ہے *

علاج۔ اس مرض کا علاج داخل اور خارجی دونوں طریقوں پر ہونا چاہئے چونکہ جب ناک میں بلغم جمع ہو کر متعفن ہو جاتا ہے تب چونکہ بد بو پیدا ہوتی ہے اس واسطے ناک کو نشہ آب گرم سے خوب طرح صاف کرنا چاہئے اور تب ان پچکاروں کا استعمال کرنا چاہئے یعنی پچکاری یا زنگ کے یا پر۔ منگے۔ نیٹ ان پو ماش گرین سے۔ اگر گھاس لیکر ایک پائینٹ پانی میں حل کر کے پچکاری کرین اور اس عرق کی پچکاری۔

اکثر فائدہ ہوتا ہے کہ اگرین کلورائیڈ آف زنگ ۱۶۔ آؤلس پانی میں حل مطبوعہ کم کرنے کے لئے سفید فوسٹرن۔ آئینٹ۔ منٹ کا ایک حصہ لیکر چھ حصہ سفید مرہم میں ملا کر ہر رات ناک کے اندر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے یا تاں گلائی سی۔ برین اف کار۔ با۔ لک۔ اسٹنگا دین *

جب اس بیماری میں دوا کم بھی شامل ہو جاتا ہے تب بیمار کو مقویات سے ہے۔ اور جب یہ مرض سکڑا۔ فیولس مزاج آدمی کو ہوتا ہے تب آئیوڈائیڈ آف اور کاڈو۔ لیوڈ۔ آئینٹ سے فائدہ ہوتا ہے اور آتشک کے سبب سے ہوتا ہے مناسب طور پر کریمن *

سوم ایسٹن ٹیکسیس

یونی کس

لڑکپن میں ناک سے اکثر خون آجاتا ہے اور وہ خود بخود بند ہی ہو جاتا ہے اگر نیکس کسی خاص مرض کے سبب جاری نہ ہو جیسے ہو۔ پیگ، کافا اور بخار اور انے۔ میا وغیرہ میں تو اندیشہ ناک نہیں ہے لیکن جب نکیس ٹوڑ پائے میں پہنچتی ہے تب اس میں بڑا اندیشہ ہوتا ہے جب نکسی طبیعت اچھی ہو۔ پلو۔ پلو کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تب نکیس کے ہونٹوں سے تھوڑے عرصہ تک اس کو فائدہ رہ سکتا ہے لیکن ان صورتوں میں بھی ٹوڑ پائے میں نکیس کا ہونا حالی اندیشہ نہیں ہے کیونکہ اس سے ایسا ہو سکتا ہے کہ جسم کے مختلف حصوں کے خون ناک کی رگوں کے پردوں میں بیماری ثابت ہو سکتی ہے جس سے کسی عضو مذرونی میرم خون راجا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں جب نکیس ان مضمونین پہنچتی ہے جن میں خون ناک سے تھوڑے عرصہ تک اس سے کسی طرح کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جیسے گردہ جگر اور طحال وغیرہ اور بخار اور اس کے۔ وی۔ پیو۔ پیو۔ وغیرہ میں جب شدت کی اینٹیا مال سے بکثرت خون آتا ہے تب بیمار کے مرجانے کا اندیشہ ہوتا ہے + دونوں ہونڈوں ایک ہی دفعہ خون کم جاری ہوتا ہے۔ کبھی تو نکیس تھوڑے عرصہ تک جاری رہتی ہے پھر برپا آتی رہتی ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ جب جا ہے تب ناک سے خون آ سکتا ہے مرنو بت بنو بت پہنچتی رہتی ہے اور خون یا تو قطرہ قطرہ پکیتا ہے یا دھار بہتا رہتا ہے اور بعض دفعہ صرف نہنوں ہی کے سامنے سے نہیں بلکہ بھی خون جاری ہو کر دھن اور حلق میں راجا سکتا ہے۔ جب نکیس جوانی میں پہنچتی ہے مردوں کو بے نسبتہ عورتوں کے زیادہ آتی ہے اور سبب نکیس کا یا تو غریب ہوتا ہے یا یہ خون ان سببوں سے آ سکتا ہے کہ جن سے مردان خون یا تو

پیشہ کی طرف توجہ دینا

رک جاتا یا بہت تیز ہو جاتا ہے اور خون بکرجانے سے یا متصل کے اعضا کے خون سے
 پڑ ہو جانے سے بھی نکیس ہوٹ سکتی ہے اور جب کوئی عادت رطوبت کا بہنا بند
 ہو جاتا ہے یا جب ناک میں کوئی زخم ہو جاتا ہے یا جب ناک کی ٹیڈیوں میں زخم تیار
 یا جب ناک میں پا۔ لے۔ پس پیدا ہوتا ہے تب بھی نکیس ہوٹ سکتی ہے۔
 علاج جب اس مرض کا علاج کریں تب اس بات کا ضرور لحاظ رکھیں کہ اس شخص کو
 بند کرنا چاہئے یا نہ چاہئے لیکن فرض کیجئے کہ خون کو بند کرنا ضرور چاہئے تو ایسا کریں کہ
 بیمار کو ایک سرد مکان میں سیدھا بٹھا کر اس کے گونبند اور گونڈیوں کو کھولیں اور بیمار
 کو کھین کر اپنے ماتھوں کو سر پر رکھ کر تھوڑے عرصہ تک بیٹھا رہے۔ اکثر اس ترکیب
 سے خون بند ہو جاتا ہے۔ اس سے بند نہ ہو تو مریض کی گردن اور پشت پر آب سرد
 لگا دیں۔ بعض دفعہ تھنوں کو انگلیوں سے بند کر دینے سے خون ہی بند ہو جاتا ہے
 کیونکہ اس ترکیب سے ناک کے اندر خون منجمد ہو جاتا ہے اور پھر کلورائیڈ ان ائرن کا
 عرق لگانے سے بھی خون بند ہو جاتا ہے اور الفیوٹرون اف مے۔ لے کو اور پیشگی
 اور پانی اور منچر اف اسٹیل اور پانی کی بیکاری سے بھی غائدہ ہوتا ہے لڑت کسی فالفر
 اور حابس عرق میں ترکیب کے منخرین میں داخل کر کے بند کر دینے سے بھی اکثر غائدہ ہوتا
 ہے اور ٹانگ اسٹڈ اور پیشگی ملا کر اس سفوف کا سوار لینے سے بھی خون بند ہو جاتا
 ہے۔ جب ان ترکیبوں سے خون بند نہ ہو تو ناک کے پیچھے کے سوراخوں کو بند کرنا چاہئے
 (ملا۔ گنگ) جسکی ترکیب یہ ہے کہ ایک گم۔ ایلاس ٹیکٹ کے۔ تھے۔ ٹریکڈ اسکے
 اندر ایک ٹکڑا ڈوگا جپر موم ملا ہوا ہو داخل کریں۔ جب اس ڈوگا کا سر اسلامی کے سوراخ
 سے باہر نکل آوے تب اس اسلامی کو تھپنے کے اندر داخل کریں اور جب ٹوک اس کی
 حلق کے اندر دھکائی دے تب اس ڈوگر کے نکلے ہوئے سرے کو کسی لمبی خار سپس
 سے پکڑ کر منہ کے راستہ باہر کھینچ لادیں اور اس میں ایک ٹکڑا اسفنج کا مضبوط باندھ کر

اب اس سلامتی کو ناک کے اندر سے باہر کو کینچ لین اور جو سر ڈور کا اسکے اندر ہوتا ہے اسکو بھی کینچ لین اسکے کرنے سے وہ سفنج جو ڈور کے دوسرے سرے پر بندھا ہوا ہوتا ہے ناک کے پچھلے سوراخ میں پھنس جائیگا۔ اور اسکو خوب طرح بند کر لیگا۔ اور سفنج کو ہم گنہہ تک سیٹور پر رہنے دینا چاہئے۔ اس بیمار کی داخلی علاج مریض کی حالت پر منحصر ہے۔ یعنی بعضہ فوہ گیا۔ لکٹ اسٹد سے اور کبھی بارک اور معدنی تیزاب سے اور ٹنگر آف اسٹیل سے اور روغن تارپین سے فائدہ ہوتا ہے۔ غذا بیمار کو ہلکی اور مقوی دیوین۔ اس ترکیب سے ہی خون بند ہو جاتا ہے کہ مریض کے ماتہہ پاؤں کو استقدر گرم پانی میں ڈبو دین کہ جقدر کی اسکو بڑا شت ہو۔

ہفتم ان فسلو۔ ان۔ زہا

علا مات۔ یہ ایک وبا نامی مرض ہے جسکی علامتیں مثل زکام کے ہوتی ہیں لیکن اس وبا نامی بیماری میں مریض دفعتاً نہایت نڈھال اور پست ہمت ہو جاتا ہے اسکے بیمار کی سلامتیں کنفریری۔ ٹرٹہ قسم کی ہوتی ہیں۔ لیکن بخار مذکور شدہ نہیں ہوتا اور نہ اس میں زہن ہوتی ہے بعضہ فوہ اس بیماری میں زکام کی علامتیں نہایت خفیف ہوتی ہیں لیکن یہ صورت میں کمزوری اور جہ اتم پر ہوتی ہے۔

تساج اور ترکیبیں۔ اس بیماری میں امراض منو۔ نیاٹان۔ سی۔ لاجی۔ ٹنس۔ برانکائیٹس اور پلوریسی اکثر پیدا ہو جاتی ہیں اور تساج اس بیماری کے یہ ہیں۔

رو۔ ماٹینم۔ اسپہال۔ پچیش۔ ابری۔ پلس اور کنٹی۔ نیوڈ فیور۔

اسباب۔ پیری ٹوسپو۔ زکام۔ ہر دکا ہونا۔ بڑھاپا۔ بچے اور مرطوب جگہ۔

اکسائٹنگ کا۔ ایک خاص کیفیت ہوا کی۔

تشخیص۔ زکام سے اس مرض کو اسطور پر فرق کرتے ہیں کہ یہ بیماری دفعتاً ظاہر

ہو کہ بہت پہلے پڑتی ہے۔ اور اسمین کمال کم طاقتی ہوتی ہے اور یہ مرض ہر موسم میں پیدا ہوتا ہے *

علاج۔ مرض خفیف ہو تو روز کام کا علاج کریں اور شدید ہو یا سن آدھینو تک ہو جائے تو اس نسخہ کا استعمال کریں۔

لشخہ۔ درینم۔ اپنے۔ کاک۔ رووندہ۔ کیاوندہ۔ شکر۔ آف۔ کفر۔ م۔ بوندہ۔ اور۔ مالک۔ پشہ۔
اف۔ ایو۔ سیا۔ م۔ بوندہ۔ پانی۔ ڈیڑھ۔ آونس۔ سبکو ملا کر تین عین یا چار چار گنہٹ بعد ملاوین
غذا مقوی عین اور حمر کا استعمال کریں۔ اگر اس مرض کے ساتھ کوئی اور بیماری شامل
ہو جائے تو کم طاقتی اور پست ہمتی کا لحاظ رکھ کر اسکا علاج مناسب کریں اور جوت علامت
شدید اس مرض کی منع ہو جائیں مرضیکہ فوراً تبدیل آب و ہوا کرادیں *

ہشتم گکان۔ ڈرس

اور

فار۔ سی

یہ بیماریاں گھوڑوں گدھوں اور بچہ زینین باہی جاتی ہیں۔ مگر حیوت سے انسان کو بھی
ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک جدید قسم کا متعدی بیمار ہے۔ دونو بیماریاں ہم شکل ہیں کیونکہ
دونو کا زہر یکساں ہے مگر اتنا فرق ہے کہ جب ہر انپا اثر مخربین میں پکرتا ہے تب اس
مرض کو گکان۔ ڈرس کہتے ہیں اور جب عروق جاؤ بہ (لم۔ فاکس) اسمین مبتلا ہو
ہیں تب اس بیماری کو فار۔ سی کہتے ہیں *

گھوڑوں کو جب گکان۔ ڈرس ہو جاتا ہے تب انہوں سے برابر پانی جاری ہوتا رہتا
ہے مرض کے دوسرے درجہ میں رطوبت مذکور کا ڈھی اور چھبی ہو جاتی ہے اور تب
پسپ کی شکل پکڑ لیتی ہے اس پاس کے غدود خاص کر جڑے کے پچھے کے پڑ پڑ لگتے

ہین۔ ناک کے اندر زخم پیدا ہو جاتے اور جانور لاغر اور کمزور ہونے لگتا ہے + چشم چڑھنے لگتی۔ بھوک جاتی رہتی اور اب تھوڑی بہت کھانسی بھی ہوتی رہتی ہے۔ جون جون بیماری بڑھتی جاتی ہے زخم بھی پھیلتے جاتے ہین اور ان سے بدبو دار خون آمیز رطوبت جاری ہونے لگتی ہے + اب نوان۔ ٹلن سائینس کے اندر کے پردہ میں انفلامیشن ہو کر زخم پیدا ہو جاتے ہین + پیشانی میں درد ہونے لگتا ہے۔ آنکھ کا پردہ کن جنک ڈاکٹروں سے سوجھاتا اور اس میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ چہرہ پر چھوٹی چھوٹی رسولیان پیدا ہو کر زخمی ہو جاتی ہین لینے اب فار۔ سی کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے + اور مرض نہایت جلد بڑھنے لگتا ہے اور اس میں جسم کے اندر کے لم۔ فائٹکس مبتلا ہو جاتے ہین تب بچھلی ایک یا دو نوٹا نگین سوج جاتی ہین اور اب نہایت متعفن رطوبت کثرت سے بہتی رہتی ہے اور جانور ڈھال ہو کر تلف ہو جاتا ہے +

گھوڑوں کو جب فار۔ سی کی بیماری ہو جاتی ہے تب ایسا ہوتا ہے کہ لم۔ فائٹکس غدودوں میں انفلامیشن ہو کر چھوٹی چھوٹی رسولیان پیدا ہو جاتی ہین اور زخم رفتہ رفتہ ان میں پیپ پڑ جاتی ہے اور اسی قسم کے زخم پیدا ہو جاتے ہین جیسے گھان۔ ڈوس کی بیماری میں ناک کے اندر ہوا کرتے ہین اور اس کا بھی نہر گھان۔ ڈوس کے نہر کے طور پر نہایت درجہ کا متعدی ہوتا ہے + متبدل بچ فار۔ سی کا نہر سامے جسم میں پیرا کر جاتا ہے جس سبب جسم کی کل عروق جاؤد میں انفلامیشن ہو جاتا ہے۔ ٹانگیں اور سر نہایت سوج جاتے ہین آخر کار بیماری ٹھکاک ہو جاتی ہے +

انسان کے جسم میں جب ان بیماریوں کا نہر ملرت کر جاتا ہے تب گھان۔ ڈوس یا فار۔ سی کی علامتیں اکیوٹ یا کرائمک قسم کی ظاہر ہوتی ہین +

اکیوٹ گھان۔ ڈوس کی علامتیں قریب محیطہ کی ہوتی ہین جیسی گھوڑوں میں باچی جاتی ہین چنانچہ نجا رہتا ہے۔ کمال ضعف ہوتا ہے۔ تاہم پاؤں میں وجہ مفاصل کے

طور کا درد ہونے لگتا ہے۔ ناک سے بدبودار رطوبت بکثرت بہنے لگتی ہے اور جسم کے جا بجا پھنسیاں یا رسولیان پیدا ہو جاتی ہیں اور پیپ پڑ کر گھنے گنتی ہیں۔ مرض کے بارہویں دن یہ پھنسیاں پیدا ہوتی ہیں اسوقت کثرت سے بدبودار پسینہ آتا ہے اور بعض دفعہ سیاہ رنگ کے چوڑے چوڑے چھالے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جوڑون کے اوپر اوپر نسل پیدا ہو جاتے ہیں۔ چہرہ ناک اور پیپ کے سوج جاتے ہیں اور اس میں زخم بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ پٹیاں مین الیو مین اور کثرت سے گردہ کے سانچے ہوتے ہیں۔ بیماریاں کمزور ہو جاتے ہیں اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ مین میناں ہی بننے لگتا ہے اور بیویں دن سے پہلے بیمار تلف ہو جاتا ہے۔

بعد وفات کے لاش کا امتحان کریں تو ناک کے اندر یا تو بے حساب چوڑے چوڑے دانے پائے جائیں گے یا ناک گلی ہوئی ہوگی۔

بہ نسبت کہ ناک کے اکیوٹ گلکان ڈرنس اکثر ہو جاتا ہے اور یہ سائیں اور کوجا نون کی اکثر ہو جایا کرتا ہے۔ اس بیماری کا ہر جسم کے اندر دو سے آٹھ دن تک بیکار رہتا ہے اور تب بیماری ظاہر ہوتی ہے۔

کہ ناک گلکان ڈرنس۔ اس قسم کی بیماری بتدیج بڑے کر اپنے بیمار کو ہلاک کر دالتی ہے۔ اور کئی چھینے یا ایک دو سال تک جاری رہتی ہے۔

علامات۔ خاص سلامتین اس میں یہ پیدا ہوتی ہیں کہ ناک بڑے بڑے ہوتی ہے۔ بدبودار پسینہ آتا ہے۔ بڑے بڑے جوڑون کے قربے جو امین و نسل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بیمار بتدیج لاغر اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ آخر کار دست دھرتے شروع ہو جاتے ہیں۔

اکیوٹ فارہ سی۔ زخم کے مقام سے جو عروق جلد بہ شروع ہوتی ہیں ان میں انفامیشن ہو جاتا ہے جس سبب غدد و سوج جاتے ہیں اور جلد کے نیچے کی حرکت

میں سپ بڑجاتی ہے تب بیمار نہایت جلد نڈھال ہو جاتا ہے۔ اس حالت سے بیمار بچ ہی جاسکتا ہے لیکن پھنسیاں پیدا ہو کر دروازہ بڑھا دیں اور ٹناک سے نکالیں۔ ڈرنش کی رطوبت بھی جاری ہے تو امید نہ تھا کی ہین ہوتی *

کر اٹناک فارسی۔ فرض کرو کہ کسی سائیس کی انگلی پر کوئی خفیف زخم ہو یا درہی جہلی ہوئی کوئی جگہ ہو اور سین نکالیں۔ ڈرنش کے بیمار گھوڑے کی رطوبت لگجائے تو چند روز کے بعد اس مقام پر ایک دردناک زخم پیدا ہو جائیگا۔ کہ نڈھال علیحدہ کیا جاوے تو اس کے نیچے گہرا خبیث شتم کا زخم نظر آوے گا۔ اسی شتم کے زخم سر اور بازو اور عروق جاوے جہاں جہاں سے گرتے ہیں ان مقاموں پر اور لکڑیوں میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں اب بیمار کی صحت میں فرق پڑنے لگتا ہے۔ دوا یا غذا معوی سے طاقت کم ہو جائے۔ یا مریض تبدیل آئے ہو انہ کرے تو ایکوٹ نکالیں۔ ڈرنش کی علامتیں پیدا ہو کر بڑھیں ہلاک کر ڈالتی ہیں *

علاج۔ ایکوٹ نکالنا ڈرنش کی بیماری لا علاج ہے کہتے ہیں کہ سلفا ف سڈا سے اس بیماری کو فائدہ ہو سکتا ہے چنانچہ

نسجہ سلفاٹ اف سوڈا ۱۰۰ سے ۲۰۰ گریں، الفیوژن اف کوہیشیا ڈیوڈ آؤنس، دونوں کو ملا کر ایک خوراک کریں اور دین تین دفعہ بلا دین *

کر اٹناک فارسی میں آیوڈائیڈ اف پوٹاشیم ہمراہ بارک کے یا سنکھیا ہمراہ اسٹرک۔ نیا کے مفید پڑتا ہے، اچھی غذا اور اچھی آب دہو اور حالت میں کا مدد مند ہے۔ موبیلون کو نشتر سے کہو دین، منخرین اور نمون کی کلو۔ رائیڈ اف زناک یا پر۔ منگے۔ نٹ اف پوٹاش یا کسی اور عرق و ان عفوئت سے خوب طرح دہو ڈالاکر

اور کار۔ با۔ لکٹ اسٹک کا پلانا اور لگانا بھی مفید ہے، حفظ ماقدم اس بیماری کا اسطو پر کریں کہ جس مقام پر نہ ہر لگا ہوا ہو اسکو خوب طرح بلا دین اور سلفا ف سڈا

مقالہ سوم

لے۔ زنگس اور ٹریکیا کی بیماریاں

اول لے۔ رنجائی۔ ٹس

یہ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے۔ اول اکیوٹ دوم کروئک

اول اکیوٹ لے۔ رنجائی۔ ٹس

علامات :- یہ بیماری اسطور سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے مریض کو جاڑا معلوم ہوتا ہے بعد ازاں بخار ہوتا ہے اور اکثر ٹانسل گلائڈ میں بھی سیہ قد رانفلما میشن ہو جاتا ہے آواز بیٹھ جاتی ہے سر خشک کہانی ہوتی ہے لے۔ زنگس کے مقام پر درد اور تنگی محسوس ہوتی ہے تنفس مشکل سے لیا جاتا ہے اور اس سے ایک نیز آواز پیدا ہوتی ہے گھٹنا شکل سے ہوتا ہے اور نکلنے وقت سبب اس کے گھٹنا۔ ٹس اچھے طور پر بند نہیں ہو سکتا غذا کی اخراج اور پانی کا قطرہ گھا۔ ٹس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں جس سے کہانی پیدا ہوتی ہے اور دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ حلق بیمار کا صریح اور ہوا ہوتا ہے اور اچھے۔ گھا۔ ٹس موٹا سوج اور کھڑا رہتا ہے۔ علامات انفلما مٹری فیور کی موجود ہوتی ہیں چنانچہ آنکھیں سرخ۔ نبض پُر اور سخت اور جسم گرم۔ کچھ عرصہ بعد مریض کا چہرہ پیریکا اور منہ ہو جاتا ہے۔ لین نیلی آنکھیں پھری ہوئی۔ نتھنے پھیلے ہوئے غفر سوج کمر اور بے قاعدہ آواز بالکل مٹھ جاتی ہے۔ اور گھا اکثر سوج جاتا ہے جینی کمال

ہوتی ہے اور دم بند ہو جانیکا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب مریض سے لیٹا نہیں جاتا بلکہ
بیچارہ بیٹھا رہتا اور سو جائے تو نہایت گہرا کر اٹھ بیٹھتا ہے رفتہ رفتہ ہڈیاں اور
ہیپوشی طاری ہو کر ہمدردن کے اندر بیمار ملک عدم کو رحلت کر جاتا ہے مگر اس
سے پیشتر بھی مریض دم بند ہو کر مر جا سکتا ہے ۔

اس مرض میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میوہ کس پردہ کی نیچے کی سی لیوٹر لے شیو
میں اڈیا (نیچے ہینچ) ہو جاتا ہے تب اس بیماری کو اڈی - مے - ٹس - لے - رنجائش
کہتے ہیں۔ علاج ایسا تو نہ کیا جاوے تو بیمار دم بند ہو کر مر جا سکتا ہے دو دیکھو آگے
مرض اڈی - ما - گلا - لے - ڈس -

علامات تشریحی بعد وفات - لے - رنگس کا میوہ کس ممبرین منج اور
پہو لکھوٹا ہو جاتا ہے اُسکے نیچے کی ساخت اور اوپر اُدھر کی ساخت بھی پھول جاتی
ہیں گلا - ٹس اور اُپے - گلا - ٹس منج ہو کر پھولے ہوئے چائے جاتے ہیں اور انہیں
سیرم یا سیپ پڑ جاتی ہے ۔

انجام - دم لینے کی تکلیف بہت ہو - چہرہ سیلا - دوران خون سست اور ہوش
حواس میں فرق پڑ جاوے تو انجام بد ہوتا ہے لیکن تنگی نفس کی کم ہوتی جاوے
بلغم آسانی سے آتا رہے - چہرہ بہتر معلوم ہوا اور نکلنے میں تکلیف نہ تو یہ علامتیں
انجام نیک کی ہیں ۔

اسباب - پیری - ٹوسپو - زہک - سابق میں گلے کا آنا - زور سے گانا ۔
ماکسیائٹنگ کا ز - سردی کا لگنا یا بارش میں بیگنا - ٹانسل - گلاڈ کے
انفلیمیشن کا بڑھ کر پھیل جانا - نکلنا تیز یا گرم خیرون کا - سوکھنا تیز یا گرم ہوا کا -
اے - ری - سپلس اور اسکار - لے - ٹے - ٹا اور سال - پاکس اور مے - زلس اور
وٹف - تھے - ریا کے انفلیمیشن کا پھیل جانا ۔

علاج - بیمار کو ایسے مکان میں رکھیں جو گرم ہو اور اسکے اندر کی ہوا کو نہ دیکھ پانی کی بہانپ کے مرطوب کمین اور بیمار کو گرم پانی کا بہانپ سنگھار دین - لگو کو تر یا خشک فرم - ٹے رشن سے خوب طرح سیکیں - انفلامیشن بڑھتا جاوے تو بذریعہ برش کے نامی - ٹریٹ اف سلورنگا دین - بیماری بہت شدید ہو تو شروع میں مار - مار اے ٹیکٹ سے تفر کر دین - کچا ہے گا ہے اسٹرنم پٹی کے اوپر کے حصہ پر چند جو کون کے لگانے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے تاکہ لف اور سرم پیدا نہ ہونا پاوے اس نسخہ کا استعمال کرنا چاہئے -

نسخہ کیا - بو - مل ایک گرین - مار - مار اے ٹیک ایک گرین کا چوتھا یا چھٹا حصہ ایون ایک گرین کی تہائی یا نصف - سبکو ملا کر ایک پڑیہ بنا دین اور دو دو یا تین گنٹے بعد کھلا دین + جب لف پیدا ہو جاوے تو لگو پر پلٹر لگا دین اور سیجا کا استعمال تینک جاری رکھیں جب تک منہ نہ آئے + کسی اور مرض کے ہونے میں یہ بیماری بھی لاحق ہو جاوے تو مرض اول کا خیال اور بیمار کی طاقت کی رعایت کہہ کر اس مرض لاحقہ کا علاج کرنا چاہئے + بیمار کو گفتگو سے باز رکھیں - علاج سے بیماری اگر نہ رکے بلکہ تنگی نفس کی سرآن زیادہ ہوتی جاوے اور دم بند ہو کر بیمار کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو تو فوراً عمل ٹرے - کیا سٹی سے گلے کو چید دین +

دوم کرائنک لے - رنجائی - طس

علامات - مریض کی آواز بیٹھ جاتی یا بالکل بند ہو جاتی ہے - خشک کھانسی ہوتی رہتی ہے لے - رنگس میں درو ہوتا ہے نہ اسی محنت یا سرد ہوا کے لگنے سے کھانسی چڑھ جاتی ہے اور ابتدا مرض میں کس قدر بلیغ ہی اخراج پاتا ہے - جب مرض کو ترقی ہوتی ہے تب حلق کے اندر زخم پڑ جاتے ہیں اور پیپ یا خون آمیز بلیغ اخراج پاتا ہے جب

یہ بیمار ہی عرصہ کی ہو جاتی ہے تب نوبت نبوت ضیق کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں لیکن آخر الامر تنگی نفس کی اس قدر جلد بڑھ جاتی ہے کہ نوبتوں کی ہر وقت بیمار کو بستر پر بیٹھے رہنا پڑتا ہے۔ اور دقون کے درمیان تنفس کی آواز تیز رہ جاتی ہے اور پھر اکثر دم بند ہو کر مر جاتا ہے۔

اسباب۔ مثل قسم حاد کے اس بیمار ہی کی یہ فزمن قسم بھی ایسی ہیالین دم لینے سے پیدا ہو جاتی ہے جس میں خاک ہول یا سنگ ریزے یا کسی اور قسم کے تیز اجزا ہوتے ہیں اور یہ بیمار می اکثر آشک کے سبب یا بکثرت سہاگے استعمال کرنے سے یا مادہ ٹیو۔ بر۔ کل کے باعث سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

علاج۔ حلق کے اوپر کے حصہ پر متواتر یا تو چند جاکین لگا دیں یا لمبر یا مسٹر پوٹر یا آئیو۔ ڈین آئیٹ منٹ کی مالش کریں اور بیمار کو گفتگو نہ کرنے دیں سبب اس مرض کا آشک۔ ہو تو سیاب یا آئیو ڈائیڈ اف پو۔ ٹامسکام استعمال کریں لے۔ رنگس کامیو۔ کس مجسین ڈیسیلا ہو جاوے تو کروڈوٹ یا کافور روغن تارین میں حل کر کے اسکا بخار سنگہاٹن یا مقام مرض پر ٹیٹریٹ آف سلور یا سلفٹ اف کاپر شک یا پانی میں حل کر کے لگا دیں لیکن تیز عرق ٹیٹریٹ اف سلور کا لگانا ہی بہتر ہے چنانچہ عرق مذکور میں آلہ پروینگ کی ٹوک ترک کر کے اپنے گلا۔ ٹس اور لے۔ رنگس کے اوپر کے حصہ پر رنگا دیں اور خشک چیزوں کا لگانا منظور ہو تو نہایت باریک پیکر کسی نالی کے ذریعہ لے۔ رنگس کے اندر بیمار کو گھینچنا کہیں چنانچہ وہ خشک دو آئین یہ ہیں یا تو صرف ٹیٹریٹ اف مسیتہ یا ایک حصہ کیا۔ لو۔ مل۔ بارہ حصہ شکہ۔ ریڈ۔ پری۔ سی۔ لے۔ ٹنٹ یا سلفٹ اف زنک یا سلفٹ اف کاپر ایک حصہ اور شکہ ۳۶ حصے۔ ہشکری ایک حصہ۔ شکہ دو حصے۔ اسے۔ ٹنٹ اف لڈ ایک حصہ۔ شکہ حصہ۔ تکلیف تنفس یا خشک کہانسی کے رفع کرنے کے واسطے افیون ایتھر کافور پلاوونا یا اسٹرنو

سنگہاؤین (اس - ٹیم - ان - ہے - لے - شن) بعض طبیب اس آب گرم میں پتھر اف
 بن - ذرا - ان یا ٹاپ یا کو - نا - ائم - جس ملانا بتلاتے ہیں اور اس پانی میں گاجو لگا ہے
 چند قطرے کلو - را - فارم کے بھی ملا دئے جاویں تو لے - رنگس کا تشنج رفع ہو جاتا ہی
 گلو پر آب گرم کی تکید کریں مگر بعض طبیب اس آب سرد لگانا بتلاتے ہیں - حلق کے اندر
 ٹائٹریٹ اف سلور لگانا مفید ہے - جب یہ بیماری سخت ہوتی ہے تب مٹی دواؤں
 کا استعمال مفید پڑتا ہے جیسے ٹار - ٹار - امے - ٹمک یا سلفٹ اف زنک اور ہسٹرنم
 پر چند جوکین بھی لگانے سے فائدہ ہوتا ہے - قبض ہو تو رنغ کریں - اور ٹمکین معوقات
 کا استعمال بھی کرنا چاہئے - لیکن امے - ٹمک دوا سے اس مرض کو بہت ہی فائدہ
 ہوتا ہے - برف کے ٹکڑے جو سنے کو دین اور اچھی طرح پچھنا لگا دین - ضرورت ہو تو
 ٹرے - کے - آٹمی کا عمل بھی کر سکتے ہیں *

سوم کروپ

اس مرض کو سائی - نن - کی - ٹری - کہتے - لیں اور سائی - نن - کی - لے - رن - جیا بھی
 کہتے ہیں اور اسکا نام ٹرو - کروپ بھی ہے * یہ بیماری اکثر بچوں ہی کو ہو جاتی ہے -
 کیونکہ عہد طفلی کے دوسرے تیسرے اور چوتھے سال ہی پیدا ہوتا ہے اور بعض بچوں
 کے بچوں کی طبیعت اس مرض میں مبتلا ہونے کے لئے مائل رہتی ہے لڑکوں کو نسبت
 لڑکیوں کے یہ بیماری زیادہ تر ہوتی ہے - بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بچہ
 اس مرض میں ایک دفعہ مبتلا ہوتا ہے تو کبھی نہ کبھی یہ بیماری پہر ہو جاسکتی ہے * اور
 اس مرض میں اکثر برا نکائی - ٹش یا نیو - مو - نیا بھی ہو جاتا ہے *

ماہیت - اس بیماری میں یا تو صرف ٹرے - کیا یا صرف لے - رنگس یا ٹرے - کیا
 اور لے - رنگس دو نو مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ان مقاموں میں نہایت

شدت کا انقباض پیش ہو جاتا ہے جسکے سبب لف پیدا ہو کر چھلی کے طور پر ایک کاذب پردہ سا بن جاتا ہے اور ہوا کی نالی کے خول میں چپان ہو جاتا ہے جس سبب سے نالی مذکور کا منفذ تنگ ہو جاتا ہے اور بیمار کہل کر سانس نہیں لے سکتا نتیجہ جھکایہ ہوتا ہے کہ خون اچھے طور پر صاف نہیں ہونا پاتا +

علامات - بعض دفعہ تو یہ بیماری وقتاً پیدا ہو کر صرف چند گھنٹہ کے اندر مہلک ہو جاتی ہے پر اکثر یہ مرض بتدریج شروع ہوتا ہے اسوقت اسکی علامتوں کو تین درجہ میں تقسیم کر سکتے ہیں چنانچہ درجہ اول میں بخار غنودگی اور آنکھوں اور ناک سے رطوبت جاری رہتی ہے۔ دم لینے میں چندان تکلیف نہیں ہوتی اگرچہ کہانسی بار بار آتی ہے پر اس میں کوئی بات خاص نہیں پائی جاتی رفتہ رفتہ پر اکثر ۳۶ گھنٹہ کے اندر ہی علامات دوسرے درجہ کی ظاہر ہو جاتی ہیں اسوقت ایک عجیب آواز کے ساتھ کہانسی ہوتی ہے جسکا بیان کرنا مشکل ہے لیکن وہ آواز ایسی ہوتی ہے جیسے کسی مائت کے طرف میں ٹھونکنے سے ٹھن ٹھن کی آواز پیدا ہوتی ہے اور سانس کے ساتھ خراٹے کی آواز لگتی ہے۔ رات کیوقت ان علامتوں کو شدت ہوتی جو پر جون جون صبح ہوتی جاتی ہے انہیں بھی تخفیف ہوتی جاتی ہے لیکن چند گھنٹہ بعد ہی بخار کی شدت اور دم لینے میں بھی زیادہ تر تکلیف ہونے لگتی ہے۔ جلد گرم اور خشک۔ چہرہ سرخ۔ تکلیف نفس کہانسی متواتر۔ نبض پُر اور سریع اور پچھست اور چڑھا ہوا جاتا ہے اسحالت میں بھی چند منٹ تک مریض خوش ہو کر اپنی کپیل کی طرف مائل ہو سکتا ہے اور نفس کی تکلیف بھی کس قدر رفع ہو سکتی ہے لیکن دم کے ساتھ خراٹا بدستور جاری رہ سکتا ہے پر فوراً بچہ بچہ دم ہو جاتا ہے۔ دم کشی کیوقت خراٹے کی آواز زیادہ تر سناٹی قتی ہے اسوقت مریض عرق عرق ہو جاتا ہے چہرہ اور گلو کی رنگین خون سے پُر ہو جاتی ہیں بعد ازاں بیمار تکلیف سے دم ہو کر

لگتا ہے۔ یہ حالت صنفق کی چند منٹ تک رہ کر بچہ کو کسب قدر افاقہ ہو جاتا ہے اس وقت
 تھک کر اکثر سو جاتا ہے پر سوتے وقت خراٹے کی آواز نہ زیادہ تر سنائی دیتی ہے لیکن
 بعد چند منٹ کے خوف کہا کر چونک پڑتا ہے اور پہرا لگے طور پر مگر اس سے زیادہ شدید
 ایک آواز نویت شروع ہو جاتی ہے۔ مگر مرض کے بڑھنے کے ساتھ کہا لسی کی شدت زیادہ
 ہنن ہوتی اور نہ اس کے ہمراہ بلغم آتا ہے اور آتا ہے بھی ہے تو نہایت تھوڑا سا کہ جس کے
 نکلنے سے کچھ ہی افاقہ ہنن ہوتا۔ اس مرض کے ابتداء ہی سے لینے جب اس کی خاص
 علامتین ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ بچہ کی آواز بیٹھ جاتی ہے اور چھوٹے بچوں میں بالیقہ
 بالکل پیدا ہی ہنن ہوتی اور جو ہوتی بھی ہے تو بچہ کو گفتگو سے استغناء تکلیف ہوتی
 ہے کہ اس سے کوئی بات پوچھی جاوے تو جواب اشاروں سے دیتا ہے تنگی ہمیشہ
 زیادہ رہتی ہے مگر نکلنے میں تکلیف ہنن ہوتی حلق اکثر سرخ ہوتا ہے اور لا۔ زنگر کچ
 دبانے سے بچہ درد محسوس کرتا ہے۔ زبان کی نوک اور کنارے سرخ ہوتے ہیں لیکن
 درمیانہ اور پچھلے حصہ پر ایک گاڑھی اور سفید رطوبت چھٹی رہتی ہے باخانہ کسبیتہ
 قبض اور ہوا ناکل مر جاتی ہے۔ تیسرے اور چارے دن میں جو مرض کی سقد
 جلد جلد ہونے لگتی ہے کہ بچہ کو دم لینے ہنن دیتی۔ اس حالت میں بعض دفعہ کہا لسی
 بالکل موقوف ہو جاتی ہے اور بعض خراٹے کے اب دم لینے کے ساتھ چنچے کی
 آواز سنائی دیتی ہے۔ چہرہ ہمارے اور غم مند ہو جاتا ہے سر پیچھے کو کچ جاتا ہے
 ہا کہین سست اور بیدین نیلگوں جسم خشک اور ماتہ پاؤں سرد یا جسم سرد پسینہ سے
 معرق ہو جاتا ہے۔ دم جلد جلد اور بے قاعدہ لیا جاتا ہے۔ نبض نہایت جلد اور نہایت
 کمزور چلتی ہے۔ اس درجہ میں اگرچہ وقفہ ہنن پایا جاتا مگر سانس کی تکلیف ہر آن
 زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اب بچہ بے چین ہو کر ترپنے لگتا ہے اور اپنے حلق کے اندر
 ماتہ ڈاکہ اس کو چیرنا چاہتا ہے تاکہ ہوا کی آمد و رفت کا روک رفع ہو جاوے۔ عرض

ان نگلیفون کے اندر سچے کوکولیشن ہو جاتا ہے تب ٹرپ ٹرپ کر مریخ روح اسکا
تغصن غصری سے پرواز کر جاتا ہے ۔

اسباب - سرد اور مرطوب آبے ہو اور دفعتاً سردی کا لگنا یا بو عث اس مرض
کے مین اور بعض مقاموں میں یہ مرض انڈی - بک بھی ہے ۔

صورتحال تشریحی بدوفات - مرگ کے بدنش کو چیرنے سے لائیکر
اور ٹرے - کیا اور ہوا کی نالیوں نکائیو - کس جمرین شریخ اور موٹا اور بعض دفعہ چمکا ہوا
اور زخمی بھی پایا جاتا ہے ۔ اسپر اکثر ایک کا ذب پر وہ چمٹا ہوا ہوتا ہے یہ پر وہ
بہ نسبت ہوا کے نالیوں کے آؤ حصوں کے لئے - رنگس اور ٹرے - کیا مین
زیادہ تر پایا جاتا ہے ۔

امتداد مرض - علامات پیشرو سے شمار نہ کریں تو یہ مرض ۸۰ گھنٹہ سے ۷۰
گھنٹہ کے اندر مہلک ہو جاتا ہے اور حساب میں ان علامتوں کو بھی شامل کریں تو
۴۰ دن سے ۶۰ دن کے اندر بیمار ہو جاتا ہے ۔

نتائج - انجام اس مرض کا اکثر بُرا ہوتا ہے لیکن عین ابتدا سے علاج کیا جاوے
تو نتیجہ نیک بھی نکل سکتا ہے ۔

علاج - اس مرض کا علاج عین شروع میں کرنا چاہئے ورنہ دوا سے کچھ
فائدہ نہ ہوگا جو وقت دیکھیں کہ سچے مین نہ کام کی علامتیں پائی جاتی ہیں اور
کہانسی کی ٹہن ٹہن کی بہا رہی ورنہ بھی سیتھہ سٹائی دیتی ہے اسوقت
اسکو آب گرم میں بٹھا دیں اور باہر نہ نکلنے دیں غذا اسکی کم کر دیں اور پائے کے کٹاؤ
اور ٹار - ٹار - اے - جھک سے تھے کہ اوہین بعد از ان دو سال کے بچہ کو اس شخص
کا دو ڈرام تین تین یا چار چار گھنٹہ بعد بلا دیں -

نسخہ - پانی - کار - بونٹ اف - پوٹاش - ۴ گرین - سائیکر - اسٹہ ۲۰ گرین

انٹی۔ موئیل وائین۔ ڈیڑھ ڈرام۔ اپے۔ کے۔ کوانا وائین ۱۰۰ بوند۔
 سرپ اف لمن اڑٹائی ڈرام۔ پانی اڑٹائی آونس۔ سبکو مالین۔
 جس مکان میں بچہ ہو اسکی ہو اگر کم اور پانی کی بہانپ کے ذریعہ اس ہو اکو مرطوب
 ہونا چاہئے ان ترکیبون سے مرض کا حذر رک جا سکتا ہے لیکن مرض نہایت شدت
 سے شروع ہو گیا ہو یا بیمار اسوقت ہمارے علاج میں آوے کہ حیوت مرض بخوبی
 پیدا ہو گیا ہو تو اس سے زیادہ تیز علاج کی ضرورت ہوتی ہے اسوقت فصد اور
 ٹار۔ مار۔ اے۔ ٹمک یہ دو تدریریں ہیں کہ جیڑا عطا دکیا جا سکتا ہے پس اس حالت
 میں کہ مرض جب نہایت شدت سے شروع ہو اور چہرہ اور لبین نیلگون نہوتی
 ہوں اور نبض کمزور نہ ہو گئی ہو اور دم لینے میں نہایت تکلیف ہو تو اچھی طرح
 جوگو۔ کروین سے فصد لین۔ اور ٹار۔ مار۔ اے۔ ٹمک کا استعمال ہی خوب کریں کیونکہ
 تین سال کی عمر کے بچوں کا خون بازو کی مین سے بخوبی ہنیں آتا ہے فصد کا قاعدہ یہ ہے
 کہ بچہ کی عمر اگر ایک سال سے دو سال تک کی ہو تو ۳۔ آونس تک خون نکالنا چاہئے
 اور ۸ سال سے ۱۰ سال تک ۶۔ آونس نکالنا چاہئے اور فصد کا اسقدر فوراً ظاہر
 ہوتا ہے کہ جون جون خون بہتا جاتا ہے سانس لینے کی تکلیف بھی رفع ہوتی جاتی
 ہے لیکن اگرچہ فصد سے بڑا فائدہ ہوتا ہے پہر ہی بعد فصد کے کسی اور دوا کا
 استعمال نہ کیا جاوے تو وہ فائدہ بہت دیر تک قائم نہیں رہتا اور ہم یا
 ۶ گنہتہ بعد علامتوں کو پھر شدت ہو جاتی ہے فصد سے فائدہ نہو یا یہ بیاری
 کسی کمزور بچہ کو ہو جائے تو بچوں میں فصد کے ٹری۔ کیا پر جو کین لگا دیں اور جب تک
 تھے ہو ٹار۔ مار۔ اے۔ ٹمک ایک گرین کا آٹھواں حصہ یا چوتھائی گرین یا آدھا گرین
 دس دس منٹ بعد کہلاتے جاوین اور بعد تھے کے بھی اسی مقدار کو آدہ آدہ
 گنہتہ بعد کہلاتے جاوین جب تک مرض کو بخوبی تخفیف نہو جاوے جس مقدار

سے تھے ہوتی ہے اس کے چند مرتبہ کہلانے سے دوا کا وہ اثر ہوتا رہتا ہے پس
 اس صورت میں مقدار دوا کی بڑھانی چاہئے کیونکہ مار مار اسے ٹمکے فائدہ تب
 ہی ہوتا ہے جب نئے آتی ہے۔ اس دوا کی ناشتے۔ ٹنگ مقدار سے اس قدر
 فائدہ نہیں ہوتا بلکہ مریض اس سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ بعد ہر یا گھنٹہ کے
 مار مار اے۔ ٹمک سے اچھا فائدہ ظہور میں نہ آوے تو پھر جو کین لگا دیں یا
 اگر مناسب سمجھیں تو پھر مضد لین اور مار مار۔ ٹمک کے استعمال سے مرض کو تخفیف
 ہو جاوے تو اس دوا کو دیر دیر بعد کہلا دیں۔ لیکن اس کی مقدار کم نہ کریں بلکہ پوری خوراک
 تھے لانے والی بوجھ آدہ گھنٹہ کے ایک ایک یا دو دو گھنٹہ بعد کہلا دیں۔ مرض کو
 افاقہ ہو جاوے تو تین یا چار یا چھ چھ گھنٹہ بعد کہلا دیں مار مار۔ اے۔ ٹمک کے
 استعمال سے شدت مرض کی کم ہو جاوے تو کیا۔ لو۔ مل کا استعمال شروع کریں
 لیکن مرض کے شروع ہی سے مرکب۔ ریٹل آئینٹ۔ منٹ کی مالش کر سکتے ہیں
 یا فالین کے بیٹج پیرو ڈرام مر۔ کیو۔ ریٹل آئینٹ۔ منٹ بچھا کر بطور سیٹی کے
 بچے کے شکم پر باندھ دیں۔ پیریلو در ہے کہ یہ بیماری اس قدر مہلک ہو جاتی ہے کہ پیرا
 جس کا اثر بہت دیر سے پیدا ہوتا ہے ابتدا مرض میں معیند ہنیں پڑ سکتا لیکن جب
 بیماری کی شدت رنج ہو جاتی ہے تب کیا۔ لو۔ مل کے استعمال کرنے سے دوا فائدہ
 متصور ہیں ایک تو یہ کہ اسکے کہانے سے ہوا کی نالیوں میں پردہ کا ذب ہنیں بنا
 پاتا اور دوسرے یہ کہ پیٹ کے کانفلامیشن جو اس مرض میں پیدا ہو کر اکثر مہلک ہو جاتا
 ہے کیا۔ لو۔ مل کے کہانے سے ہنیں ہونے پاتا ۲ برس سے ۵ برس کے بچہ کو آدھی
 گرین سے ایک گرین کیا۔ لو۔ مل ہمراہ تھوڑے اے۔ کے۔ کو نا کے گھنٹہ یا دو دو
 گھنٹہ بعد کہلانا چاہئے کبھی کبھی اسکے درمیان میں مار مار۔ اے۔ ٹمک سے تھے
 کرانی چاہئے۔ پیریلو در ہے کہ اگر کوپ کی علامتوں میں شدت ہو جاوے یا دوا

پہلوٹ پھین تو کیا۔ لو۔ مل فوراً موقوف کر دین اُسکے عرصہ ٹار۔ ٹار اے۔ ٹاکٹ
 نئے لانے کی مقدار میں استعمال کریں۔ ایک بڑی بیماریات شدید کم کر دین
 کے علاج میں قابل یاد رکھنے کے یہ ہے کہ ایک ہی بیمار میں کبھی تو یہ مرض نہایت
 شدت پکڑ جاتا ہے اور کبھی خفیف ہو جاتا ہے پس بیمار کو عرصہ تک تخفیف ہے
 اور پھر دم لینے میں تکلیف ہو جائے تو اس سے ہرگز ایسا قیاس نہ کرنا چاہئے کہ بچہ کی
 حالت ابتر ہو گئی ہے۔ عیس علاج زیادہ تیزی سے کرنا چاہئے کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ
 شاید وہ تنگی نفس کی تشنج کے باعث پیدا ہوئی ہو کہ جو بلا کسی تیز علاج کے بچہ کو
 حرف آب گرم میں غوطہ دلانے سے فوراً رفع ہو سکتی ہے۔

ہر مریض میں کیا۔ لو۔ مل کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ عین ابتدائے میں اس
 بیماری کا علاج مناسب طور پر تیزی سے کیا جائے تو چن گنڈہ میں اسکی ساری علامتیں
 رفع ہو جاسکتی ہیں ان صورتوں میں کہ جب لا۔ رنگس کے ساری علامات خوفناک رفع
 ہو جائیں اور تبسوی بچہ سیدھ پر دم لیتا رہے کہ جب پیر پر مرض کے ہونے سے لیتا تھا
 اور تھوڑا بہت کہاں تھا ہی ہو تو اس حالت میں مطلق پرنیکر آف آئیو۔ ٹین لگا کر نہایت فائدہ
 ہوتا ہے لیکن فرض کرو کہ بیمار ہمارے علاج میں اسوقت آدے کہ جب بیماری مٹ گئی
 ہو تو اس حالت میں وہ علاج رہست نہیں آسکتا جو ابتدا میں مفعید پڑتا ہے مثلاً
 جب کہ میں کہ ٹار۔ ٹار اے۔ ٹاکٹ کے کہانے سے تھے نہیں ہوتی یا کہلاتے ہی ملا کو
 کے یہ دوا خارج ہو جاتی ہے اور جو شے بچہ اسوقت اگلے فے اسین اگر بلغم یا پردہ کا ذیہ
 کے مگرے ہو جو دھون اور جسم کی حرارت غریزی کم ہوتی جاوے۔ بلین زیادہ تر نیلگون
 ہو جائیں نبض کمزور اور جلد جلد چلنے لگے اور نوبت غریق کی بدستور شدید ہے اور تر نفس
 کی آواز خرمے کی نہ ہو بلکہ باریک پنخنے کی آواز کے طور پر تو ان علامتوں سے یہ
 معلوم کرنا چاہئے کہ آب۔ ٹار۔ ٹار اے۔ ٹاکٹ کے استعمال کرنے کا موقع گزر گیا

اس وقت سلاج کو فوراً بدل دینا چاہئے اگرچہ مریض کی زیریت کی امید اس حالت میں بہت کم ہوتی ہے پہرہ بھی آب گرم میں رات ہی ملا کر آسین چند منٹ بچہ کو رکھیں اور فوراً سلفٹ اف کا پیکٹ کر کے کراویں کیونکہ یہ دوائے کی نہایت سہل تاثیر ہے یا بعض اسکے شہد یا شیرہ میں زیادہ مقدار پھنکری کی ملا کر دیا یا اسٹ بعد جب تک کہ مکر تے ہوئے پلاتے جاویں سلفٹ اف کا پیر سے فٹے کرانی منظور ہو تو جو تہائی یا آدھی گرین پانی میں حل کر کے باؤ پاؤ گھنٹہ بعد پلاتے جاویں جب دیکھیں کہ فٹے نہیں ہوتی اور بچہ نڈ ٹال ہوا جاتا ہے تو پھر فٹے کی دوا نہ دینی چاہئے بلکہ اس حالت میں نسخہ ذیل کا استعمال بعد دو دو گھنٹہ کے کرتے جاویں :-

نسخہ - ڈی - کاکشن - سی - ٹیکام - آؤش ۵ ڈرام - کاربونیٹ اف ایمو - نیا - گرین - ٹینکچر اف اسکویئل - ۱۶ بوند - سرپ ان ٹو - لوس ڈرام - سیکو ملینٹ - خوراک - ۳ ڈرام - یہ نسخہ ۴ برس سے ۳ برس کے بچہ کے لئے موزوں ہے -

علامہ اس دوا کے بچہ کی طاقت غذا مقوی سے قائم رکھیں - جب مرض اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے تب اگرچہ امید نسبت کی بہت ہی کم ہوتی ہے پہرہ بھی ایک اور دوا کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کیا - لو - مل مثلاً دو برس سے تین برس تک کے بچہ کو اگر اسہال سبب کا مانع ہو ایک گرین کیا - لو - مل گھنٹہ گھنٹہ بعد کھلاویں اور انٹروڈو گھنٹہ بعد ایک ڈرام تیز کر - کیو - ریل - اینٹ - منٹ کی مالش کریں - اسہال موجود ہو تو کم یا بالکل نہ کھلاویں - اس بیماری میں ادویات کاؤنٹر - اری - ٹے - شن کے استعمال کرنے کا یہ قاعدہ ہے کہ جب شدت اس مرض کی انٹی - غلو جس - ٹک دوا سے ٹک جاوے اس وقت اسٹرم ٹی کے اوپر بلٹر لگانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے لیکن جب مرض بڑھ جاوے اور کچیلے علامات سے نہ ٹک سکے اس وقت اسٹرم ٹی پر بلٹر لگانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس صورت میں ایک بڑا سا بلٹر سارے گلوبہ رکھا دینا سے

صیق النفس کی باری کو اکثر تخفیف ہو جاتی ہے۔ اور بچہ دم آسانی سے لیتا ہے۔ اور کہانی کے ہمراہ بلغم ہی اخراج پاتا ہے کہ جو بات پہلے ہنہیں ہوئی تھی لیں سبات کو یاد رکھیں کہ جب نصد کے لینے یا جو کون کے لگانے یا مار۔ مار امٹک کے کہانے سے گھٹسہ کے اندر صورت افاقہ کی نظر نہ آوے تب گلو پریشک بلشر لگا سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ کہیں کہ کئی علاج سے فائدہ ہنہیں ہوتا اور دم لینے میں نہایت تکلیف ہوتی ہے اس وقت ٹری۔ کیا۔ ٹی کا اپریشن کر سکتے ہیں کہ جسکے کرنے کی ترکیب علم جراحی کے درسون میں بتلائی جاتی ہے +

اشارہ - بعض طبیب اس مرض میں نصد لینے اور جو کین لگانے اور مار۔ مار امٹک اور کیا۔ لو۔ مل کا استعمال کرنا بالکل منع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس علاج سے ضعف پیدا ہوتا ہے اور بچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ میرا تجربہ انکی اسے کے خلاف ہے۔ فرض کیا کہ اوپر کی تدبیر سے ضعف پیدا ہوتا ہے۔ پہر کیا۔ جب ہم جانتے ہیں کہ یہ بیماری اشد وجہ کی دھماکے تو ہم ضعف کا خیال کہیں کہ مریض کی جان کا۔ کیونکہ بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ اوپر کے طریقہ علاج سے اگر ابتدا سے ساتھ تذبذب ہی کے کیا جاوے تو اکثر فائدہ ہوتا ہے۔ ضعف کا تذکرہ آسان ہے۔ پیچھے بھی کیا جاسکتا ہے لیکن ہوا کی نالی کا خول جو ملف کے پردہ کا ذب سے تنگ ہو گیا ہے اور سانس کے لینے اور چھوڑنے میں مزاحمت کرتا ہے اسکو کہولنا مقدم سمجھنا چاہئے۔ یہ بیماری ایسی جلد ٹھنک ہو جاتی ہے کہ طبیب کو اگر مگر کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ فوراً ایسا علاج کرنا چاہئے جس سے انفلا میشن تیرہ پتہ بناوے اور ملف پیدا ہونا پاوے جس سے ہوا کی نالی کا منفذ تنگ ہو جاتا ہے اور بیماری فوراً دم بند ہو کر جاتا ہے + ہاں اتنا ہم کہتے ہیں کہ ہر موقع میں نصد نہ لینا چاہئے۔ جو کین لگانے کا فی ہنہیں۔ لیکن مار۔ مار امٹک کا استعمال ضرور کرنا چاہئے جس ترکیب سے اوپر بتلایا گیا ہے اس سے انفلا میشن کو

تخفیف ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ تپ بھی ہوتی ہے تو بذریعہ تپ کے لطف کا کاذب
پردہ کھڑے ہو کر خارج ہو جاتا ہے اور مریض سانس کھل کر لیتا ہے۔

بیمار لے۔ رن جس میں اسٹری۔ ڈیولس

اس بیماری کو فاس (یعنی کاذب) کر وہ بھی کہتے ہیں بمقابلہ ٹرو۔ کر وہ کے جس کا
بیان اوپر ہو لیا ہے۔

علامات۔ دم کشی کی آواز ناع کے چھینے کی سی ہوتی ہے کہ جو دفعتاً اور اکثر
خواب سے جا گئے کے بعد ظاہر ہوتی ہے اس میں کہاںسی ہین ہوتی۔ تھوڑے عرصہ کے
لئے بچہ کو دم لینے کی تکلیف اور کمال بے چینی ہوتی ہے آخر کار رفع ہو جاتی ہے
اس وقت مریض کی سانس کے ساتھ ناع کے چھینے کی آواز کے طور پر ایک آواز نکلتی ہے
جب گلے کا تشنج کم ہو جاتا ہے تب بیمار جلد جلد اور تکلیف سے دم لیتا ہے اور ہر
دم کشی کی وقت ناع کے چھینے کی سی آواز نکلتی ہے۔ اور جو وقت بیمار دم کینچتا ہے
اس وقت سینہ کی ہڈی جم کہا کر وہ جاتی ہے اور دم چھوڑنے کی وقت اٹھ آتی ہے
بیمار کا نیلگیں اور ہلکیاں پتھر جاتی ہیں بعد ازاں کن وشن ہوتا ہے۔ مائتہ کے
انگوٹھے ہتھیلی کی طرف مڑ جاتے ہیں اور مائتہ اور باؤن کی انگلیاں بھی مڑ جاتی ہیں
اور کلائی اور ٹخنے کا جو زرد سے خم کہا جاتا ہے جب بیمار حیالتِ ردی کو پہنچ جاتی ہے
تب مریض دم بند ہو کر مڑ جاتا ہے یا بچہ تھک کر اپنی دائی کے آغوش میں گر پڑتا
ہے۔

طبعیت۔ جب خم معدہ یا اعصاب خراش ہوتی ہے تو اثر اس خراش کا بذریعہ
انفقریردی۔ گزٹ۔ لے۔ رن۔ جی۔ ال۔ نزد کے لے۔ رنگس کے عضنون پر
ہوتا ہے یا جب براکیئل اور ہسروائی۔ کل۔ گٹنڈین بیماری ہوتی ہے تب

ہمبو۔ گیارٹرک نرویا اسکے ریگٹریٹ سے۔ رن۔ جی۔ ال شاخون مین خراش ہوتی ہے۔

اسباب پیری۔ ڈسپیو۔ نوٹک۔ عہد طفلی۔ پیدائش سے لیکر تین برس کی عمر اسکر۔ فینو۔ لس مزاج۔

اکسائیٹنک کاؤ۔ خراش اٹھا۔ شکم میں کرم کا ہونا لگوار یا ریگنیکل غدودوں کا بڑھ جانا۔

تشخیص۔ اس مرض کو ٹرو۔ کروپ کی بیماری سے فرق کرنا چاہئے چنانچہ اس بیماری میں ایسا ہوتا ہے کہ مرض کی نوبت دفعتاً پیدا ہو کر فوراً رفع ہو جاتی ہے اور مابین نوبتوں کے دم آسانی سے لیا جاتا ہے اس مرض میں نتوینجا اور نہ زکام کے علامتیں پیدا ہوتی ہیں جیسے اصل کروپ میں ہوا کرتا ہے۔ یہ مرض تشنجی ہے۔ ٹرو۔ کروپ انفلمیشن کی بیماری ہے۔

علاج نوبت کی وقت کا۔ سیاہ کو آب گرم میں بٹھاوین۔ سرور چہرہ پر آب سرد چڑھ کرین۔ ایو۔ نیا کی ہوٹنگھاوین۔ مریض کو کھلی ہوا میں رکھیں جب کسی سے کچھ نہ ہو تب ال ٹری۔ کیا۔ ٹی کا کرین۔

علاج وقفہ کے ایام کا۔ اس وقت علاج مسہلات مقویات و روانہ تشنج ادویات سے کرتے ہیں مثلاً مریض کو کاؤ۔ لیور۔ اسٹیل پلاوین۔ مرکبات فولاد کا استعمال کرین یا اس نسخہ کو کام میں لاوین۔

نسخہ۔ اکثر اٹ اف بلا۔ ڈو۔ نا پ گریں۔ برو۔ مائیڈ اف پوٹا۔ سیم۔ م۔ گریں۔ پانی م ڈرام۔ سب کو ملا کر ایک خوراک کرین اور دین تین یا چار دفعہ پلاوین۔ تبدیل آب دہوا کر اوین اور غدا میلج الہضم دین۔

مقالہ چھپا رم

برانکیل ٹیوب اور یا سلس کے بن

اول برانکائیٹس

برانکیل ٹیوب کے میو۔ کس ممبرین کے انفلمیشن کو برانکائیٹس کہتے ہیں بیماری دوستم کی ہوتی ہے۔ ایک اکیوٹ یعنی حادہ دوسری کرایہک یعنی مزمن۔

اول اکیوٹ برانکائیٹس

اسباب۔ پری۔ ڈسپو۔ زہک۔ کانہ۔ چھوٹی اور بڑی عمر و عادت جن سے کمزوری پیدا ہو۔ کمزوری چاہے کسی اور سبب سے پیدا ہو۔ ان امراض کا ہونا جیسے رمی۔ کٹش۔ گاؤٹ۔ مزمن شش کی بیماریاں اور پہلے کبھی برانکائیٹس کا ہونا۔ دل کی بیماریاں یا کوئی اور حالتیں جنہیں ہوا کی نالیوں کی رنگین خون سے پر ہو جائیں۔ سردی یا مطلب آج ہوا موسم۔ ایسے پیشے جنہیں خواہ مخواہ سردی میں باہر جانا پڑتا ہے۔ ایسی ہوا میں دم لینا جس میں خراش پیدا کر دینا لے اجزا موجود ہوں۔ ہڑے شہر زن کے ایسے گلی کوچوں میں بود و باش کرنا جو بلحاظ صحت کے خراب ہوں۔

اکسائیٹنگ۔ کانہ۔ کی طرح جب سوزی لگ جاتی ہے تب یہ بیماری اکثر پیدا ہوتی ہے مثلاً بادش میں ہسینے یا سردی میں باہر نکل جانے سے یا سینہ کی حالت میں سرد ہوا کے لگ جانے سے ہینگے کپڑوں کے پہننے یا سیلی ہوئی جگہ پر سونے سے۔ ہوا کی نالیوں کے خاص میو۔ کس پردہ پر جب کسی قسم کی خراش کا اثر ہوتا ہے تب ہی

یہ بیماری ہو جاتی ہے مثلاً گرم یا سرد ہوا کا سونکھنا یا تیز گیس ہواؤں میں دم لینا یا جس ہوا میں خاک دو ہول یا دھوئی یا پشم کے ریشے ہوں یا لوٹا یا پیتل کے قورات ہوں یا سین دم لینا۔ ان نالیوں میں خون یا پیپ یا ٹیو۔ بر۔ کل یا کنسر کا ہونا۔ خون جب متعدی بخاروں میں نہر ملا ہو جاتا ہے تب بھی برانکائی۔ ٹس کی بجائی ہو جاتی ہے خاصکر ٹائی۔ فائبرڈ فیور اور مے۔ زلس میں اور گاؤٹ یا رو۔ مائیٹزم اور آتشک میں اور جب کوئی جلدی بیماری فتنی کٹن ہو جاتی ہے اور جب کوئی رطوبت عرصہ سے جاری ہو اور وہ بند ہو جاوے۔ بعض دواؤں کے استعمال کے انہیں بھی یہ مرض ہو جاتا ہے جیسے آیو۔ ڈین۔ بعض دفعہ برانکائی۔ ٹس کی بیماری مائی بھی ہو جاتی ہے جیسے ان۔ فلو۔ ان۔ زائین ہو کرتا ہے۔

ماپلیٹ۔ ہوا کی نالیوں کے اندر کامیو۔ کس پردہ منخ ہو جاتا ہے اور پھوکر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پردہ نہ کور پہلے تو خشک ہوتا ہے مگر توڑ پھوٹا ہو جاتا ہے بعد اس سے بکثرت بلم پیدا ہونے لگتا ہے اور چون چون بیماری کا دور جاری ہوتا ہے بلم مذکور کی خاصیت بدلتی جاتی ہے۔ مثلاً ابتدائیں صاف کھڑا بلم خارج ہوتا ہے لیکن کچھ عرصہ بعد بلم مذکور مکرر ایسا یا پیپ کی شکل کا نکلتا ہے۔ میو۔ کس پردہ اکثر چھلکا ہوا اور بعض اوقات اس میں خفیف خم بھی پڑ جاتا ہے اور گاہے گاہے ہوا کی نالیوں میں خون بھی پایا جاتا ہے۔

عارضیات۔ برانکائی۔ ٹس کی بیماری میں نشش میں اجتماع خون کا پایا جاسکتا ہے یا نشش میں اڈی۔ ما ہو جاسکتا ہے اور نشش کا کوئی خاص حصہ یا بہت سا حصہ کھڑا ہو جاسکتا ہے۔ ام۔ فائی۔ سی۔ مائی بیماری ہو سکتی ہے گاہے گاہے نو۔ مونیہ کا مرض بھی لاحق ہو جاسکتا ہے اور پلو۔ سی۔ سی بھی ہو جاسکتی ہے اس بیماری میں دریدین خون سیاہ سے تر بھی ہو جاسکتی ہیں۔

علامات - اکیوٹ برانکائی - ٹش کی بیماری کی علامتین دو حقین بین
 منقسم ہو سکتی ہیں۔ اول علامتین اس قسم کے مرض کی جو بڑی بڑی اور متدرجہ مقدار
 کی ہو اکی نالیون میں ہو جاتا ہے۔ دوم یہ کہ جب یہ مرض نہایت باریک باریک
 ہو اکی نالیون میں ہو جاتا ہے اور جبکہ اصطلاح میں کہے - بے - بے - رسی برانکائی ٹش
 کہتے ہیں - پس -
اول علامات اس قسم کی اکیوٹ برانکائی ٹش کی جو بڑی بڑی اور متوسط
مقدار کی ہو اکی نالیون میں ہو جاتا ہے - جب یہ مرض سردی کے سبب
 ہو جاتا ہے تب سین زکام کی علامتین پائی جاتی ہیں - گلا دکھتا ہے اور آواز بھی
 کیستہ رہتا ہے اور سردی لگتی اور کبھی بدن گرم ہو جاتا ہے - ساما
 بدن ٹوٹنے لگتا ہے اور کمری معلوم ہوتی ہے - زبان میلج ہو کر جاتی رہتی ہے اور
 قبض ہو جاتا ہے - گاہے گاہے قدرے ہذیان بھی ہو جاتا ہے اور جب یہ مرض نہایت
 خفہ یا کمزور ہو چکا ہو جاتا ہے تب کن - دل - شن بھی ہو جاسکتا ہے - ایک علامت غلہ
 (لوکل سم - ٹم) دوسری علامات عامہ (جے - نے - رل - سم - ٹم) +
اول علامات خاصہ - سین کے سامنے مگر خاصہ اسٹرنم بڑی کے اوپر کے حصہ
 کے پیچھے ادرے - نیو - بری - ام کے اوپر کے نشیب میں گرمی ملن خواش اور خارش
 محسوس ہوتی ہے یا توڑا بہت درد معلوم ہوتا ہے - ان علامتوں کو دم کینچ وقت
 شدت ہوتی ہے - کہانستے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سینہ چرایا جاتا ہے - کہانسنے
 کے سبب عضلات میں خاصہ سینہ کی دونوں جانب اور پیچے درد ہوتا ہے اور اگرچہ
 دم لینے میں کیستہ رکھنا معلوم ہوتی ہے مگر فیض نہیں ہوتی + کہانسی ہوتی ہے
 بعضہ فہ نوبت بنوبت مگر اکثر خاصہ سوتے وقت یا صبح کو اٹھتے وقت کہانسی
 ارشادت سے چڑتی ہے کہ بے ہوشی ہوتی رہتی ہے - اب بغیر حلیہ خارج ہونے

جب یہ بیماری جو طویل عرصہ تک رہتی ہے تب دوسری علامتین ظاہر ہوتی ہیں

لگتا ہے مثلاً پہلے تو صاف رقیق اور کفدار بلغم آتا ہے بعد ازاں مقدار میں کمی زیادہ ہو جاتی ہے اور شکل میں کمی کے سوا اور تھوڑا بہت مکثہ را در لیسہ اور اس میں کف نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ بلغم استقد رلیسہ را در چھپا ہوتا ہے کہ اس کی تار بندہ جاتی ہے اور بعضہ دفعہ بلغم کے غلفے بھی خارج ہوتے ہیں۔ گاہے گاہے بلغم میں خون کی دھاریاں بھی ہوتی ہیں۔

علامات عامہ - برانکائی - ٹس کی بیماری کچھ بھی وسیع ہو تو کیتقد ر بخار ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں۔ بیمار اکثر کمزور اور پرمردہ ہو جاتا ہے۔

دوم علامات کے پلے۔ لے۔ ری برانکائی۔ ٹس کے

اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرض بڑی بڑی ہوا کی نالیوں کے پلے۔ لے۔ ری برانکسل۔ ٹوب میں گزر جاتا ہے اور گاہے دونوں قسم کی نالیوں میں بیماری ایک ہی دفعہ شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات پہلے ہی کے پلے۔ لے۔ ری برانکسل ٹوب میں یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے اس وقت ابتدائیں لوزہ ہو کر درد مہر ہوتا ہے اور تے ہونے لگتی ہے۔ اس قسم کے مرض میں کچھ کہانسی کے سبب گوشت میں درد ہونے کے جو اکثر شدید ہوتا ہے کوئی اور درد بہت کم یا بالکل نہیں ہوتا۔ دم اکثر تکلیف سے لیا جاتا ہے اور اس قدر جلد جلد کہ عرصہ ایک منٹ کے اندر پچاس بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ دم لیا جاتا ہے اس سانس کی حرکت سے دسی۔ ڈنگ کی آواز آتی ہے جب بیماری شدید ہوتی ہے تب خفق کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یا تو نوبت بختو یا بار بار ہوتی رہتی ہے۔ کہانسی بار بار اور نہایت شدت سے ہوتی ہے یہاں تک کہ کہانتے وقت بیمار اٹھ بیٹھتا ہے یا اپنے کوسا منے کی طرف چھکا دیتا ہے اور پسلیوں کو کچر کر در در سے کہانتا ہے۔ بلغم شکل سے خارج ہوتا ہے مگر جب

آتا ہے تب بکثرت اور لیسدار اور چھپا آتا ہے * اس قسم کے مرض میں علامات عامہ بشت پیدا ہوتی ہیں چنانچہ بخار شدت سے ہوتا ہے اور جسم کی حرارت ۱۰۳ یا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بیمار تھک کر نہایت کمزور ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں بعض دفعہ قدرے ایلیو میں اور برائے نام شکر ہی پائی جاتی ہے بہون چون بڑی بڑھتی جاتی ہے دم لینے کی تکلیف زیادہ ہوتی جاتی ہے اور وریدوں میں اجتماع خون کا ہوتا جاتا ہے۔ کہانسی کم ہوتی جاتی ہے۔ دم گہرا نہیں لیا جاسکتا اور دم چھڑنے کی ہوا سرد نکلتی ہے اور بعض دفعہ علامات ردیہ ظاہر ہو جاتی ہیں *
 وارض ہو کہ برانکائی۔ ٹس کی بیماری گو کیسی ہی خفیف ہو خون کے ناقص طور پر صاف ہونے سے جو جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بہون میں خاص کر حسب وہ کمزور اور اسکا ایفو۔ لس کے مزاج کے ہوتے ہیں نہایت جلد پیدا ہوتی ہیں کیونکہ بچہ کما شکر بطن خارج نہیں کر سکتے بلکہ نگل جاتے ہیں۔ جوان تندرست آدمی جب اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تب اسکو بہت تکلیف نہیں ہوتی * مگر بڑے بچے میں جب یہ مرض ہو جاتا ہے یا ایلیوں کو جو چاہے کسی سبب سے کمزور ہو جائیں تب گہرا نکائی۔ ٹسز کی بیماری بہت وسیع نہ بھی ہو بخار ردی قسم کا ہو جاتا ہے *
 فنی۔ زمی۔ کل۔ سائینس۔ شش میں ہوا کے بہ جانے سے سینہ کیقدہر ہو لاہو نظر آتا ہے۔ سانس کی حرکتیں جلد جلد اور گہری ہوتی ہیں اور دم چوڑنے کی حرکت بعض دفعہ لمبی * اس مرض میں شش کے اندر جو ٹکڑا ہوا زیادہ ہوتی ہے تو ہونٹوں کی آواز حد سے زیادہ صاف پیدا ہوتی ہے یا لگا ہی لگا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ سینہ کے پئیدے میں بسبب اسکے کہ دمان بطن جمع ہو جاتا ہے یا اجتماع خون کا ہو جاتا ہے یا وہ حصہ بہتر و نکا سگر جاتا ہے ہونٹوں کی آواز کیقدہر ہو س پیدا ہوتی ہے شش کے ان حصوں سے جہاں پر ہوا کی مالیونکا متفقہ کہلا ہوتا ہے دم لینے اور چھڑنے

کی آوازیں بلند اور تیز ہوتی ہیں لیکن جن حصوں کی ہوا کی نالیان بلغم سے پُر ہوتی ہیں وہاں سانس کی آواز یا تو کمزور یا بالکل سُناٹی ہوتی ہیں ۔ اس مرض میں مختلف قسم کی رائگس کی آوازیں بھی سُناٹی دیتی ہیں ۔ رائگس پیدا ہونا کئی باتوں پر منحصر ہے چنانچہ ہوا کی نالیوں کے مسکڑ جانے پر ۔ رائگے خشک ہونے یا رائگے اندر جو بلغم ہوتا ہے اُسکی مقدار پر ۔ غرض جو بحث مذکورہ بالا کے سبب ان نشیمن کی رائگس کی آوازیں سموع ہو سکتی ہیں مثلاً سو ۔ نو ۔ رُش ۔ سے ۔ بے ۔ لٹ ۔ میو ۔ کس اور سب ۔ کرنی ۔ پے ۔ ٹٹ ۔ یہ آوازیں سینہ کے مختلف حصوں میں سُناٹی دیتی ہیں ۔ پہلے پہل تو رائگس کی خشک آوازیں خاص کر سُناٹی دیتی ہیں پھر طو آوازیں آ جھسک شش کے پینہ دون پر سموع ہوتی ہیں ۔ مگر جب ہوا کی نالیوں میں بلغم بکثرت جمع ہو جاتا ہے اُسوقت رائگس کی آوازیں ایسی بلند ہوتی ہیں کہ دور سے سُناٹی دیتی ہیں ۔ رائگس کے آوازوں کا بیان اس فصل کے ابتدا میں کیا گیا ہے جسکو دیکھو مَدَّت مرض کی ۔ مرض کی شدت کے بموجب برا نکائی ۔ ٹس کی بیماری تین یا چار دن تک رہتی ہے مگر کبھی دو دو اور تین تین منہتوں بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ تک جاری رہتی ہے ۔ کے ۔ پے ۔ لے ۔ ری ۔ برا نکائی ۔ ٹس اکثر چھپے سے بارہویں دن کے اندر ٹھہک ہو جاتی ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ نسبت جوانوں کے بچے جلد مر جاتے ہیں ۔ اسی بیماری میں اس بات کا ہمیشہ اندیشہ ہوتا ہے کہ انفلامیشن پھر عود نہ کر جائے اور پھل بھی نہ جائے ۔

انجرام ۔ اس مرض سے یا تو شفا ہو جاتی ہے یا کہ انسی عرصہ تک جاری رہ سکتی ہے اور بیمار دم بند ہو کر یا کمزور ہو کر مر بھی جاسکتا ہے ۔ گاہے گاہے یہ مرض فرمن بھی ہو جاتا ہے ۔

نساج ۔ ام ۔ فاجی ۔ سی ۔ مکی بیماری ۔ شش کا بگڑ جانا ۔ بچوں کے سینہ کا

بدقول ہو جانا * ایکوٹ یا کرائیک تہائی - سس *

علاج - اس مرض کا علاج عین ابتدا سے کرنا چاہئے خاص کر جبکہ اس میں مبتلا ہوں - سرخی سے بچنا چاہئے - بارش میں نہ بیگنا جائے - دم لینے کی تکلیف زیادہ ہو تو آب گرم کا بخار سنگھائیں اور عرق لانے کے لئے نسخہ کام میں لادیں -
 نسخہ - موٹی - ال پاؤڈر ۴ گرین * دو - ویش پاؤڈر ۴ - گرین * ٹائیٹر ۵ - گرین * سبکو ملا کر ایک پڑیہ بنا دیں اور تین تین گھنٹہ بعد کھلا دیں * مناسب سمجھیں تو عین شروع مرض میں تھے کو دیں * سینہ پر رانی کی پٹی لگا دیں *
 ان تدبیروں سے بیماری رفع ہو تو مطالب علاج کے یہ ہونے چاہئیں کہ جبکہ رطلد ہو سکے انفلامیشن کو روکیں - ہو اکی مالیان بلغم سے پڑ ہوں تو ایسی تدبیر کریں جس سے بلغم خارج ہو - اور بلغم اگر زیادہ خارج ہو تو اسکو کم کریں - کہانسی کو روکیں - ہو اکی مالیونین ششخ ہو تو اسکو روکیں - مریض کے جسمی حالات کا تدارک کریں - کمزور ہو گیا ہو تو اسکی طاقت قائم کریں - دم لینے کی تکلیف ہو یا بخار زیادہ ہو تو اسکا علاج کریں - دیگر بیماریاں عارض ہو جا دیں تو انکا تدارک کریں * پس تاکہ انفلامیشن رفع ہو سینہ پر جو بکین لگا دیں اور مار - مار امٹک کا استعمال کریں اور اکو - ٹائیٹ اور ڈی - جے - لے - یس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں - برا نکائی - ٹس بہت شدید ہو اور مریض طاقتور اور بہت بڑھا ہو تو مرض کے ابتدائیں مار - مار امٹک کا استعمال نہایت مناسب ہو * دوسرے تین مطالب کے حاصل کرنے کے لئے ادویات

بکس - پک - ٹو - رنٹ کام میں لادیں * چنانچہ
 نسخہ - وائیم - پے - گن ۵ قطرے * وائیم - انٹے - مو - نیائی ۱۰ قطرے *
 کیا وائیٹنگر آف کمفر ۲ قطرے * عرق سولف - ایک آونس * سبکو ملا کر چار گھنٹہ بعد لادیں * بعد کچھ عرصہ کے اس نسخہ کا استعمال کریں -

لشخہ - کار - بوٹ آف ایمو - نیا ہر گرین * اسپرٹ آف ایہر ۳ - ڈرام *
 ٹینکیر آف اسکویئل - ۲ ڈرام * کپناؤنڈ ٹینکیر آف کفرم سے ۴ ڈرام تک *
 کپناؤنڈ ٹینکیر آف لاؤنڈر - ۴ ڈرام * ایفیوژن آف سے - نی - گا - ۸ آؤش *
 سکو ملا کر مقبادہ ایک آؤش کے چار چار گنٹھ بعد پلاوین * اور یہ نسخہ بچن کی براکنکامیٹر
 میں کجب بیماری کچھ عرصہ کی ہو جاوے مفید ہے لینے

لشخہ - کار - بوٹ آف ایمو - نیا ۲ اگرین * واینم - ۱ پے - گٹ ۱۰ قطرے *
 ٹینکیر آف سے - نی - گا - ۲ ڈرام * سرپ آف ٹو - ۳ ڈرام * پانی ۳ آؤش *
 سکو ملا کر مقبادہ دو ڈرام کے دو دو یا تین تین گنٹھ بعد پلاوین * بدھون کی براکنکامیٹر
 میں لینے اچھا ہے -

لشخہ - ٹینکیر آف اسکویئل - ۲ ڈرام * لی - کوئڈ اسٹراکٹ اف او - پیم ۲۰ سے
 ۳۰ قطرے تک * سرپ آف ٹو - ۱۰ ڈرام * امونامیک کسچر ۶ آؤش *
 سکو ملا کر اس ق کا چٹا حصہ وین تین دنہ پلاوین * ہوا کی نالیوں کے تشنج کے
 سبب دم لینے میں تکلیف ہو تو بطور اٹ - ٹس - پاز - موٹ - وک لینے مفید ہے -

لشخہ - ایتر ایٹل ٹینکیر آف لو - بے - لیا ۳ ڈرام * سرپ آف پا - پیر ۶ ڈرام *
 ٹینکیر آف پیم - لاک فروٹ ۲ سے ۴ ڈرام تک * آمند کسچر ۶ - آؤش *
 سکو ملا کر اس کا چٹا حصہ چار چار گنٹھ بعد پلاوین * ہوا کی نالیوں میں بلغم سے پُر ہون اور بلغم خارج
 نہوتا ہو تو ادویات مار - کاٹک خاصکرافینون نہ دینی چاہئے - بیمار کو اس ڈبے سے لٹا دینا
 کہ مہر اسکا اونچا رہے بار بار کہانسنے کی تاکید کریں * اور کسی ایک وقت میں عرصہ مار
 تک سونے نہ دین خاصکریچون میں ان باتوں کی تاکید ضرور کرنی چاہئے * یہ معلوم
 ہو جائے کہ ہوا کی نالیوں میں بلغم بہا ہوا ہے تو فوراً قے کرا دین چنانچہ یہ ۷۰ - ۸۰ مک نسخہ
 مفید ہیں -

لشجہ مار مار اسے ٹکٹ ایک گرین پے ایسے۔ ٹکٹ پاؤڈر ۲ گرین ۱ ایک
 پٹریہ بنا کر بیمار کو کھلاوین + بچہ ہو تو دایم ایسے۔ ٹکٹ ایک ڈرام کسی شربت میں ملا کر
 مایند رو سکورٹ اف ۱۔ پو۔ مار۔ فیہ ایک گرین کا چٹا حصہ کھلاوین یا ایک گرین
 کے وسین حصہ کی بچکاری جلد کے اندر گرین۔ اس سے بہت جلد تھے آجاتی ہے
 اور سلفٹ اف کا پڑا گرین ۳ تین آؤنس پانی میں حل کر کے یا سلفٹ اف زنک
 ۴ سے ۴ گرین تک ۳ آؤنس پانی میں حل کر کے پانے سے بھی کھل کرتے آجاتی ہے
 اس بیماری میں علاج خارجی کی بھی اکثر ضرورت پڑتی ہے مثلاً سینہ پر رسی
 کی پٹیاں بار بار لگاوین یا ٹریپن۔ ٹائپن۔ فورمن۔ ٹے۔ شن کرین یا گرم گرم
 ریشید پولیس لگاوین + بعد زخم ہو جانے شدید سلامتون کے سینہ پر پٹریہ بھی
 لگا سکتے ہیں + تنگی نفس کی زیادہ ہو یا سینہ کھٹا ہو معلوم ہو تو خوب طرح خشک
 کیننگ کرین + بیمار کمزور ہو یا اسکے جسم میں رسی۔ کٹش یا اسکر۔ فو۔ لاکا مادہ یا
 کاکوٹ موجود ہو تو ایسا علاج ہرگز نہ کرین جس سے بیمار کمزور ہو جائے +
 برانکائی۔ ٹش کی بیماری میں بچوں کو ایسے۔ ٹکٹ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور بڑوں
 کو کار۔ پونٹ اف ایمو۔ نیا سے +

دوم کرانک برانکائی۔ ٹش

اسباب۔ اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اکیوٹ برانکائی۔ ٹش کے بعد کرانک
 برانکائی۔ ٹش ہو جاتا ہے مگر گاہے گاہے ابتداء ہی سے کرانک برانکائی۔ ٹش شروع
 ہو جاتا ہے + اور اکثر اوقات کرانک برانکائی۔ ٹش گاؤٹ کی بیماری میں بھی ہو سکتا
 ہے اور پٹریوں کی فرمن بیماریوں میں اور دل کی ان بیماریوں میں بھی شامل ہو جاتی
 ہے جنہیں شش کے اندر اجتماع خون کا ہو جاتا ہے اور خزانہ شریوں کو یہی بیماری

اکثر ہو جاتی ہے اور تیرا شیا کے سونگھنے سے ہی یہ مرض ہو جاتا ہے ۔ اگرچہ یہ مرض
 بڑھوں کو اکثر ہو جاتا ہے مگر گاہے گاہے بچے بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں ۔
ماہیت تشنجی - جب یہ مرض عرصہ کا ہو جاتا ہے تب ہوا کی نالیوں میں نہایت
 درجہ کے تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں چنانچہ ان کے اندر کے میوہ کس پردہ کا رنگ سیاہی مائل
 ہو جاتا ہے اور اسکی عروق شر یہ پھیل پھول کر مثل کچھوے کے بدل رہ جاتے ہیں ۔
 یہ روہ مذکور کی ساخت مولیٰ ہو کر سخت ہو جاتی ہے ۔ نالیان سُکڑ جاتی ہیں ۔ انکی لچک
 جاتی رہتی ہے ۔ اور ان کے اندر گوشت کے ریشہ بڑھ کر موٹے ہو جاتے ہیں
 (رامی - پر - ٹرو - فی) اخیر میں لُجی کر یا ن لُت بتری میں (ڈی - جی - نے - ریشہ)
 اگرچہ نہ کہ مادہ میں بدل جاسکتے ہیں ۔ چھوٹی چھوٹی ہوا کی نالیوں کا منفذ تنگ ہو جاتا
 یا مسدود ہو جاتا ہے اور بڑی نالیان اکثر پھیل جاتی ہیں ۔ میوہ کس پردہ کی سطح اوپچی
 بن جی اور اکثر چھلی ہوئی ہوتی ہے اور بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے زخم بھی پائے جاتے ہیں ۔
اول کرانک برا نکائی تشنج عام طور پر کچھ عرصے میں آتی ہے ۔ اس قسم کی
 بیماری سرور کے دنوں میں اکثر ہو جایا کرتی ہے تب اسکو دن - ٹرکاف کہتے ہیں لیکن
 کچھ عرصہ بعد قفل طور پر تشنج ہو جاتی ہے اور زمان اور بارش کے موسم میں شدت
 بکڑتی ہے ۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سینہ کی ہڈی کے پیچھے کی قدر خواش یا بے چینی معلوم
 ہوتی ہے اور کہانتے وقت ان دونوں علامتوں کو شدت ہو جاتی ہے ۔ جب بیماری
 سخت ہوتی ہے تب سینہ میں بستی اور حرکت کرنے سے تنگی نفس کی ہو جاتی ہے ۔
 بیمار عی سلامت اس بیماری میں کہانتی کی ہے چنانچہ کہانتی نوبت بنوبت بار بار
 اور نہایت شدت سے اُٹھتی ہے اور نوبتیں خاص کر سوتے وقت اور صبح اُٹھتے
 وقت زیادہ ستمانی ہیں ۔ کہانتی کے ساتھ ٹرمی یا نرمی مائل یا سبزی مائل
 لیسندہ بلغم کبھی اسکا ایک بڑا سا غلفہ اور بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے غلفے بکثرت خارج

اکثرانک برا نکائی تشنج میں صدمہ کا ہوتا ہے

ہوتے رہتے ہیں۔ گاہے گاہے رِغین خون کی دھاریاں بھی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ بلغم نہایت متعفن ہوتا ہے اور اس سے مُردار کی سی مٹری پڑتی ہے۔ جب کرائمک برانکائی۔ ٹس کی بیماری سخت ہوتی ہے تب بیمار نہایت لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے شام کیوقت قدرے قلیل بخار بھی ہوتا ہے اور رات کیوقت بکثرت پسینہ آتا ہے۔ یاد رہے کہ جب یہ علامتیں پیدا ہوتی ہیں تو دلین تھائی۔ سس کا شک پڑنا چاہئے۔ دوسرے قسم اس بیماری کی وہ ہے جسکو کہتے ہیں۔

ڈراسکے۔ کٹمار۔ ہر قسم بکائین مگر خاصکر گاؤٹ اور ام۔ فائی۔ سی۔ ماکے مرضوں میں پائی جاتی ہے یا تیز چیزوں کے سونگھنے سے۔ اس میں تھوڑی بہت تنگی نفس کہ ہوتی ہے پسینہ میں تنگی اور سنگینی معلوم ہوتی ہے اور کہانسی خشک یا اس کے ساتھ تھوڑا سا سفید رنگ کا سخت بلغم ہوتا ہے کہانسی نوبت نوبت بار بار ہوتی رہتی ہے۔

قسم سوم ہرائنکو۔ ریاء۔ بڑھون کو اس قسم کی بیماری اکثر ہوجاتی ہے جسکو ہر کو جلد کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس میں بلغم اس کثرت سے آتا ہے کہ ایک شہانہ روز کے اندر چار بلکہ پانچ پائینٹ تک خارج ہوتا ہے۔ بلغم رقیق مثل مانی کے اور شفاف ہوتا ہے یا کسیقد لیسدار۔ کہانسی کی نوبت کے بعد تنگی نفس اور دیگر تکلیفوں کو تخفیف ہوجاتی ہے۔

پیراگ۔ نو۔ سس۔ جب کرائمک برانکائی۔ ٹس اچھی طرح مستحکم ہو جاتا ہے تب شاذ ہی رفع ہوتا ہے۔ اس مرض کے بیماروں کی عمر اکثر بہت دراز ہوتی ہے مگر انکی زندگی بے حظ ہوتی ہے۔ اس مرض کے اشار میں سل اور ام۔ فائی۔ سی کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔

تشخیص اول۔ جب اکیوت برانکائی۔ ٹس کی بیماری بڑی بڑی مہلکی مہلکی

مین ہو جاتی ہے تب آسانی سے پہچانی جاسکتی ہے کیونکہ اس مین رانکس کی آواز میں پہلے
 تو خشک بعد ازاں مرطوب ہو جاتی ہیں۔ سینہ کی بڑھی کے پیچھے خواش ہوتی ہے بلغم
 کہ جسمین خون نہیں ہوتا ہے پہلے تو صاف اور تب پیپ کی شکل کا آتا ہے اور سیتھ
 بخار بھی ہوتا ہے + جب جوان آدمی کو کے۔ پے۔ لے۔ رمی برا نکائی۔ ٹس ہو جاتا ہے
 تب اسکو وسیع نیو۔ مو۔ نیاسے فرق کرنا خیلے مشکل ہوتا ہے۔ مگر ان چند علامات نظر
 پر تو ج کچلے تو ان دونو بیماریوں میں فرق کرنا چند مشکل نہیں ہے چنانچہ برا نکائی ٹس
 مین پر کشن کی آواز یا تو صحت کی طرح صاف یا قدرے زیادہ صاف پیدا ہوتی ہے
 مگر نیو۔ مو۔ نیامین ٹیوس + برا نکائی۔ ٹس مین رس۔ ٹے۔ اس۔ پیو۔ ٹم نہیں خارج
 ہوتا اور نہ ٹیو۔ پیو۔ لہ۔ بری۔ ونگ کی آواز سمع ہوتی ہے + برا نکائی۔ ٹس مین
 جلد بقدر گرم نہیں ہوتی حقیقت رینو۔ مو۔ نیامین ہوتی ہے۔ اور بہ نسبت نیو۔ مو۔ نیامین
 کی اس بیماری میں دم کی تکلیف زیادہ تر ہوتی ہے جب یہ مرض شروع ہوتا ہے تب
 اس مین بقدر لرزہ نہیں ہوتا ہے کہ حقد رینو۔ مو۔ نیامین ہوتا ہے فریدرین اس
 مرض میں رس۔ پے۔ اسپو۔ ٹم نہیں پیدا ہوتا + اس بیماری اور سل کے مرض میں
 جو فرق ہے اسکا ذکر پہلی بیماری کے ساتھ کیا جاویگا +

دوم۔ کرائنگ برا نکائی۔ ٹس کو نیو۔ مو۔ نیامین اور پلو۔ رمی۔ سی سے فرق کرنا چاہئے
 چنانچہ کرائنگ برا نکائی۔ ٹس مین بیمار کے کھلم کی آواز مانتوں کو محسوس ہوتی ہے
 ڈوڈکل فری۔ مے۔ ٹس (گرو پلو۔ رمی۔ سی مین جب پانی پیدا ہو جاتا ہے تب
 یہ بات نہیں ہوتی ہے اور نیو۔ مو۔ نیامین مینو۔ پیو۔ لہ۔ بری۔ ونگ کی آواز نکائی
 دیتی ہے مگر اس بیماری میں نہیں اور جیسے نیو۔ مو۔ نیامین جلد بہت گرم ہوتی ہے
 اور رس۔ ٹے۔ اسپو۔ ٹم پیدا ہوتا ہے ایسے اس مرض میں نہیں ہوتا +
 سوم۔ اس قسم کی کرائنگ برا نکائی۔ ٹس کی بیماری میں کہ جسمین ہوا کی نالیہاں پسینہ

یزین اور سئل کے مرض میں یہ فرق ہے کہ سئل کی بیماری میں پرکشن کی ہڈی
 آواز اکثر ہنسی کی ہڈی کے اوپر پیدا ہوتی ہے اور اس مرض میں ہنہن مگر یہ
 آواز پرکشن کی سئل کی بیماری میں ہنسی کی ہڈی کے نیچے تک بھی اکثر پہنچاتی ہے
 لیکن اس مرض میں ہنہن سئل کی بیماری میں جب غار پیدا ہوجاتی ہیں تو انکی
 علامتیں اکثر شمش کی نوک پر سنائی دیتی ہیں لیکن پہلی ہوئی ہوا کی نالیوں کی
 علامتیں اکثر نیچے پیدا ہوتی ہیں۔ جب مادہ ٹپو۔ برکل بھجی تا ہے اور دماغ غار
 پڑنیوالا ہوتا ہے تب ہنسی کی ہڈی کے نیچے کا اعلیم اکثر ب جاتا ہے مگر اس مرض میں
 یہ بات کم پائی جاتی ہے۔ سئل کی بیماری میں مریض اکثر خون ہوکتا ہے اس مرض میں
 ہنہن کمال لاغری۔ رتوں کو کثرت سے پسینہ کا آنا۔ اسہال کا کثرت سے
 جاری ہونا۔ یہ سب علامتیں سئل کی بیماری کی ہیں اور اس مرض کی ہنہن
علاج۔ کرانک برانکائی۔ ٹس کے علاج میں ان باتوں کا لحاظ ضرور کرنا
 چاہئے یعنی دل اور معدہ اور رودون کی حالت کا اور بیمار کی صحت بدنی کا بھی لحاظ
 رکھنا چاہئے۔ پس دل کی کوئی بیماری ہو تو ڈی۔ جی۔ نے ٹریس کے پتو کا انفیوژن
 یا ٹیکہ بہت فائدہ کرتا ہے۔ مریض کا دماغ درست رکھیں اور قبض خونی وین
 گاؤٹ یا روم۔ مائیزم یا تہائی۔ سس کی بیماری شامل ہو تو اسکا تدارک کریں
 بیماری زیادتی یا کمی خون کی پائی جاوے تو اسکا مناسب طور پر علاج کریں
 کرانک برانکائی۔ ٹس کے اکثر مریضوں کو اعذہ اور ادویہ معوی سے بڑا فائدہ ہوتا
 ہے مثلاً کوئین اور اسٹرک۔ نیا۔ مرکبات فولاد۔ ہائی۔ پو۔ خاص۔ ٹائیٹ ان لیم
 اور کاؤ۔ لیور۔ آبل اور بعض صورتوں میں نر۔ وائین نامک دواؤں سے فائدہ ہوتا
 ہے جیسے سلفٹ یا اکسائیڈ اف زنک۔ کرانک برانکائی۔ ٹس کے علاج
 کے مطالب یہ ہونے چاہئیں کہ بلغم کثرت جاری ہونا پائے۔ بلغم بدقت علاج

ہو تو ایسی دوا تجویز کریں جس سے آسانی سے نکلتا رہے * کہانسی کو روکیں اور
براکیسل - ٹیوب کے گوشت کے ریشوں کا شنج رفع کریں *

علاج کا پہلا مطلب کلورائیڈ آف ایمو - نیم کے استعمال سے حاصل ہو سکتا ہے
یا بال - سم آف کو - پی - وا اور امونائی - کم اور گیال - بے - نم - سے یا فوٹو
کے قابض مرکبات سے اور شو - گراف لڈ اور ٹانک اور گیا - کٹ اسٹ سے بھی
یا آب گرم کی بہانپ میں مار یا کریو - زوٹ یا کار - بالک اسٹ ملا کر نگہانے سے
اور باقی کے جو مطالب ہیں ان نسخوں کے استعمال سے حاصل ہو سکتے ہیں جنکا ذکر اکیوٹ
براکنائی - ٹس کے علاج میں اوپر کیا گیا ہے *

ہوا کی نالیوں میں بلغم بکثرت جمع ہو تو مار - کالک دواؤں خاص کر انیون کے استعمال
میں وہی احتیاطیں جائزین جنکا ذکر اکیوٹ براکنائی - ٹس کی بیماری میں کیا گیا ہے
اگر بلغم نہایت لیسلر آوے تو کار - لوٹ آف سوڈا یا بائی - کار - بوٹ آف
بوٹاش یا لائی - کوآر - بوٹاسکی استعمال کرنا چاہئے * ہوا کی نالیوں میں شنج بہت
ہو تو سیکر آف ہمپ کا استعمال مناسب ہے - کہانسی متواتر ہوتی ہو اور بلغم
نہایت وقت سے خارج ہوتا ہو تو یہ نسخہ فائدہ کرتا ہے -

نسخہ - پری پیارڈ مار ۱۵ - گرین * ڈور ورنس باؤڈر ۲۲ - گرین * بین - رائین
حب ضرورت * سکو ملا کر ۲ گولیوں میں تقسیم کر کے ایک ایک گولی دن میں کئی
مرتبہ کھاسکتے ہیں *

علاج خارجی - سینہ پڑھائی - کنگ کریں - رای کی ٹپی لگا دیں - ہسٹیریا
یعنی منٹ آف ٹرین ٹامین یا لینی - منٹ آف کروٹن آیل یا لینی - منٹ آف
کلورا - فارم کی مالش کریں * گرم اور خشک آب ہو امین اس مرض کو فائدہ دیتا ہے *

دوم آسا

ہندی میں اس بیماری کو دمر اور عربی میں ضیق النفس بولتے ہیں ۔
 ماہیت - فی الحقیقت یہ بیماری نظامِ عصبی سے تعلق رکھتی ہے اور جو علمائے
 اس میں پیدا ہوتی ہیں وہ ہوا کی نالیوں کے مدد و عضلاتی ریشوں کے سگر جانے سے
 ظاہر ہوتی ہیں اور نوبت اسکی یا توسید ہی یا منعکس ترکیب سے پیدا کی جاسکتی ہے۔
 یعنی وہ تحریک جس سے عضلات مذکورہ بالاسکڑتے ہیں یا تو مے - ڈلو - لا
 اب - لاٹک - گے - ٹامین ہو سکتی ہے یا نیو - مو - گش ٹرک - ٹرو کے اس حصہ میں
 ہو سکتی ہے جو شش یا معدہ میں ہوتا ہے یا تحریک مذکورہ اسو اعصاب مذکورہ بالا کے
 نظامِ عصبی کے اور حصہ میں موجود ہو سکتی ہے جہاں سے - مے - ڈلو لا اب لاٹک گے
 میں گزر جاتی ہے اور تب اعصاب محرک کے وسیلہ منعکس ہو کر ہوا کی نالیوں کے عضلاتی
 ریشوں کو سکڑ کر مے سکتی ہے ۔

علامہ - نوبت سے پہلے یا تو بیمار کو درد سر ہوتا ہے اور اونگھاتی ہے یا
 ہاضمہ میں فرق پڑ جاتا ہے یا کوئی اور قسم کی تکلیف ہو سکتی ہے اور تب نوبت دمر کی
 شروع ہو جاتی ہے ۔ بعض دفعہ بلا کسی سلامت مندرہ کے یہ مرض دفعہً ظاہر ہو جاتا
 ہے ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پچھلے کو بیمار کا دم بند ہونے لگتا ہے اور سینہ پر بند ہونے
 معلوم ہوتا ہے تکلیف مے لینے کی بعد ریج بڑھتے بڑھتے اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے
 کہ بیمار نہایت گہرا جاتا ہے اور تاکہ دم آسانی سے لے سکے مریض طرح طرح پر کڑھتا
 بدلتا رہتا ہے چنانچہ کبھی تو کھڑا ہو جاتا ہے یا اپنے سر کو ماتھوں پر بکھیر چک جاتا
 ہے یا درجہ سے باہر نکلا کر گتھنوں کھڑا رہتا ہے تاکہ تازی ہوا میں دم آسانی سے
 لے سکے ۔ سینہ کو خوب ہی پھیلاتا ہے اور نہایت تکلیف سے دم چھڑتا اور لیتا ہے

کہ جس سے اسکو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہوا کے داخل ہونے اور نکلنے میں کوئی شے نہایت
مزا حمت کر رہی ہے۔ اس حالت میں بیمار کے سینہ پر کان لگا کر سنیں تو متغض کی
صیح آواز نہین سموع ہوگی۔ بلکہ سے۔ بے۔ لٹ۔ رائکس یا یوٹی۔ رنگ۔ رائکس
یا تیر سیٹی کی آواز سنائی دے گی وجہ اسکی یہ ہے کہ عضلین کے کچ جانے سے چونکہ
ہوا کی نالیوں کا منفذ کہین سے تھوڑا اور کہین سے بہت تنگ ہو جاتا ہے اس واسطے
آواز کسی مقام سے کم بار یک اور کسی مقام سے زیادہ بار یک پیدا ہوتی ہے۔ نبض
بیمار کی کمزور ہو جاتی ہے۔ آنکھیں پتھر جاتی ہیں اور چہرہ عکسند ہو جاتا ہے جسم بیمار
کا سبب اسکے کہ خون اچھے طور پر مشا نہین ہو سکتا چھپا اور سرد ہو جاتا ہے۔ حرارت
جلد کی ۸۲ درجہ تک گھٹ جاتی ہے اور بیمار کا چہرہ اس قدر تکلیف زدہ ہو جاتا ہے
کہ اسوقت کوئی خیر آدمی دیکھے تو یہی گمان کرے کہ اب مریض کوئی دم کا ہمارا ہے
مزاج بیمار کا سبب اس دیر با تکلیف کے یا تو چڑچڑاہٹا ہے یا مریض ان لوگوں کی سنت
سماعت کرتا ہے جو اسکے گرد بیٹھے ہیں کہ خدا کے واسطے مجھے اس عبد الب الیم سے نجات
بخشو۔ جب یہ حالت دو تین گھنٹہ یا ایک یا دو روز تک رہتی ہے تب صورت افاقہ
کی ظہور میں آتی ہے اسوقت مریض کو کہانی ہونے لگتی ہے اور ساتھ اس کہانی
کے بغم کے چوٹے چوٹے غلفے نکلتے ہیں اور تب مرض کی نوبت بھی ختم ہو جاتی ہے
اور بیمار سو جاتا ہے۔ جب کوئی نوبت زیادہ عرصہ تک رہتی ہے تب وہ عضل
جو تکلیف تنفس کی وقت مر دیتے ہیں اور وہ جو پسلیوں کے مابین لگے ہوئے ہوتے
ہیں نوبت کے رفع ہو جانے کے بعد بھی دو تین روز تک برابر درد کرتے رہتے ہیں
اور بیمار یہ کہتا ہے کہ میرا سارا بدن گویا چور ہو گیا ہے +

دو نوبتوں کے مابین جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بیمار اکثر نہایت معلوم ہوتا ہے متغض
یہی سانی سے لیتا ہے۔ لیکن اکثر بیمار اس مرض کے لاحق ہونے میں اور ان کے دونوں

شانے اور کو کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ چہرہ آنکا فکر مند ہوتا ہے حصارے دہ جاتے ہیں اور آواز بیٹھ جاتی ہے۔ اور ہمیشہ تھوڑی بہت کٹائی بھی ہوتی رہتی ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ برس میں ایک نوبت ہو جاتی ہے اور کبھی چھینے میں اور بعض دفعہ ہر دو گھنٹہ کسی وقت بیمار اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری ایسی متکون ہوتی ہے کہ کبھی نہایت صاف جگہ میں ظاہر ہو جاتی ہے اور میلی کچیلی جگہ میں بالکل ہوتی ہی نہیں اور کبھی خشک جگہ میں اپنے بیمار کو ستاتی ہے اور کبھی مرطوب جگہ میں بیمار کو آرام آ جاتا ہے ۛ

درمہ کی بیماری مردوں کو نسبت عورتوں کے زیادہ ستاتی ہے اور بعض دفعہ یہ مرض موروثی بھی ہوتا ہے اگرچہ کبھی کبھی یہ مرض ہو جا سکتا ہے تاہم جوانی ہی میں یہ بیماری اکثر پھرتی ہے اور یا تو اس مرض میں کوئی اور بیماری لاحق نہیں ہوتی لیکن دماغ شش قلب معدہ یا کوئی اور عضو شامل نہیں ہوتا یا یہ بیماری اصل ایسے مریضوں کی ایک علامت ہوتی ہے جیسے کہ انک بڑا نکائی۔ ٹس دل کی بیماری یا اور دوسرے۔ رسی یا رحم کی بیماری یا نظام عصبی وغیرہ کی کوئی خرابی ۛ

اس مرض کی قسم اول کو ای۔ ٹیو۔ پی۔ تھک یا اس۔ پا۔ ز۔ ما۔ ٹک۔ آسمان کہتے ہیں اور قسم دوم کو آر۔ گا۔ نک۔ آسمان کہتے ہیں ۛ

باب۔ احباب کا ذکر ہو چکا ہے کہ یہ مرض موروثی ہے لیکن بعض دفعہ ایسا نہیں بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ بیماری شش یا قلب کی ساخت کی کسی مرض کے سبب پیدا ہوتی ہے لیکن اکثر ایسا نہیں بھی ہوتا ہے ۛ بعض دفعہ نوبت اس بیماری کی کسی تیز خیر کے سونگھنے سے ہو جاتی ہے جیسے خاک دھول سرد ہوا بعض قسم کے تجارت جو گہاس پھوس وغیرہ سے پیدا ہوتے ہیں اور کبھی پے۔ کے۔ کوانا اور رانی کے سونگھنے سے بھی نوبت اسکی ظاہر ہو جاتی ہے اور بعض آدمیوں کو ایفون کے کسی مرکب کے گھٹنے سے

نوبت ہو جاتی ہے اور بغیر اس ہو اور سوک کا اثر جو اس مرض پر ہوتا ہے وہ عیاں ہے جب کوئی غذا خراب یا زیادہ کھائی جاتی ہے یا کبھی خاص وقت پر کھائی جاتی ہے تب یہی بعض دفعہ نوبت شروع ہو جاتی ہے اور بچہ غم غصہ و غضب اور بالوسی وغیرہ بھی بعض اوقات نوبت کو پیدا کر دیتے ہیں ۔

انجام۔ صرف اس۔ پازہ۔ موٹوک۔ آسمان کے سبب سے مریض کم مرتے ہیں اور اس مرض کے بہترینے بیمار طبعی کو پہنچ جاتے ہیں اگرچہ یہ مرض بعضہ دفعہ بالکل جا بارستا ہے لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جس کی کو اسکی ایک ہی نوبت ہو جاتی ہے تو وہ بار بار اس میں مبتلا ہوتا رہتا ہے نے الحقیقت یہ بیماری نہایت خطرناک ہے کیونکہ قطع نظر تکلیف کے اس مرض کے سبب شش اور دل میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے مثلاً بہر پیری میں یا تو اجتماع خون کا ہو جاتا ہے یا شش مرض ام۔ فاشی۔ سی۔ مامین مبتلا ہو جاتے ہیں اور دل کا دہنا خانہ موٹا ہو کر ہیلچا ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ دم کی بیماری کے اندر شش کی عروق شعریہ میں خون رک کر دورہ کرتا ہے جس سے دل کا دہنا خانہ کھلے طور پر حرکت نہیں کر سکتا غرض جب این میں کوئی بھی خرابی شکیم ہو جاتی ہے تب مریض کا بیجا دشوار ہو جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں کھانسی بہت آتی ہے بلغم کثرت سے آتا ہے تنگی نفس کی شدت ہوتی ہے۔ خون دریدی آگے کو مڑہ نہیں سکتا ہے اور وہی خون جسم میں دورہ کرتا ہے جس سبب سے پہلے تو مریض اور پگھلنے لگتا ہے اور تب بیہوش ہو کر تلف ہو جاتا ہے ۔

علاج۔ اس مرض کا علاج دو حصہ میں تقسیم ہو سکتا ہے یعنی ایک تو نوبت کے وقت کا اور دوسرا وقفہ کی وقت کا ۔

اول علاج نوبت کی وقت کا۔ نوبت کا سبب اگر مضمی ہو تو تے کر دین اور قبض ہو تو صفحہ کرن بعد از ان ایسی تدبیر کرن جس سے ہو کی نالیوں کا تشنج دفع ہو جائے

بیار کر ایک بڑی خوراک آئیوڈائیڈ آف پوٹاشیم کی کہکاس بجیے آئیوڈائیڈ آف پوٹاشیم
 ۱۰۔ گرین سے ۳۰ گرین تک ہمراہ ایدو۔ مائٹک اسپرٹ آف ایمونیا اور اسپرٹ آف
 ایتر اور ڈسکیو آف بلا۔ ڈو۔ مائی دین اس سے تشنج رفع ہو کر نوبت رک جاتی ہے یا ایسا
 کرین کہ ہموزن ایتر اور کلور۔ فارم ملا کر بیار کو سنگھان دین تاکہ بیہوش ہو جاوے اب یا
 تو صرف اٹ۔ رو۔ پیا اور مار۔ فیادو ملا کر جلد کے اندر بھکاری کرین لیکن جس صورت
 میں مایا کو مار۔ نیایا ایفون کے استعمال سے پہلے کہی نوبت رس کی ہوئی ہو تو مارینیا
 کی بھکاری کرین نسخہ مار۔ فیادو کی بھکاری کا یہ ہے۔

نسخہ اسے۔ ٹٹ آف مار۔ فیادو۔ گرین ۱۰ ڈیٹلڈ وائٹ ایک ڈرام حل کر لین +
 اس عرق کو چھ بونہین ایک گرین سے۔ ٹٹ آف مار۔ فیادو ملائے۔ پہلی دفعہ کی
 بھکاری سین اس عرق کا ڈیڑھ قطرہ استعمال کرین + اگر اسکے ہمراہ اٹ۔ رو۔ پیا
 ہی ملاں تو عرقی بالاکے دو قطرے اور فار۔ ماکو۔ پیا کے (دیکھو قرابادین جیہی)
 لایکوار۔ اٹ۔ رو۔ پی کے دو قطرے ملا کر بھکاری کرین۔ اس بھکاری سے اکثر نوبت
 رک جاتی ہے + اور بعض دفعہ دہتورے کے پڑٹ کے پینے سے بھی نوبت کو تخفیف
 ہو جاتی ہے اور قلمی شورہ کا دیوان سنگھانے سے بھی اکثر اوقات دمہ کی نوبت کو
 بڑا فائدہ ہوتا ہے اسکی ترکیب یہ ہے کہ بانی میں شورہ حل کر کے ایک گاڑھا عرق
 بنادین اور اسمین بلا۔ سنگ پے پر کر کے خشک کر لین ایک ٹھڑا اس کاغذ کا بیار
 کے ناک کے پاس جلاوین تاکہ جو دیوان اس سے پیدا ہو وہ سو نگہ لے۔ اور بعض دفعہ
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک نکاس برانڈی میں خوب گرم پانی ملا کر پانے سے نوبت مرض
 کی رک جاتی ہے +

دمہ کی نوبت کے وقت اس کاغذ کی دہنونی سنگھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نسخہ
 قلمی شورہ۔ ۱۰ حصہ + اکٹر اٹ آف اشر۔ مو۔ نیم ۱۰ حصہ + شکر ۲۰ حصہ +

آب گرم - ۱۰۰ حصہ - یانی مین خشک چیزوں کو حل کر کے چھان لین - اب اس عرق مین سفید جاذب کاغذ تر کر کے خشک کر لین اس کاغذ کے ٹکڑے کر کے آگ پر رکھ کر بیمار کے ناک کے پاس رکھ دین تاکہ اس کا دھواں ہونگاہے مین آ جاوے ۔

علاج وقفہ کے وقت کا - بیمار کی طاقت ادویات بمقوی سے قائم رکھیں غذا کا بندوبست ایسا کریں جس سے پیٹھی نہونے پاوے اور کھانا کھانے کا وقت ایسا مقرر کریں جس سے خواب کی وقت سے پہلے وہ غذا ہضم ہو جایا کرے ۔ ماضیہ بیمار کا خراب ہو تو ادویات مناسب اسکو درست کریں - ان صورتوں مین کہ جب سبب اس بیمار کی دریافت نہ ہو سکے آئیو - ڈائیڈاف - پوٹاسیم کاربائیڈ کا کرتا ہے لیکن اس دوا کے کاگر ہونے کے لئے اسکو کئی ہفتوں تک برابر استعمال کرنا چاہئے اور اس سے ایک یا دو مین بیمار کو باتسید تمام ملاحظہ کرنا چاہئے کیونکہ اس سے خون کے پتلا بڑ جانے کا اندیشہ ہے - غرض اس دوا کے عرصہ تک استعمال کرنے سے جب دیکھیں کہ خوراک کے دیتے بدن پر نمودار ہوئے ہیں تو چند روز تک موقوف کر کے کہ مین یا کسی اور بمقوی دوا کا استعمال شروع کریں - جب کبھی اتنا سے علاج مین بیمار کو قبض ہو جاوے تو ہلکے طبیعات سے رفع کریں ۔

ایک اور طریقہ اس مرض کے علاج کا یہ ہے کہ وہ مہ کی نوبت کی وقت اور مین نوبتوں کے بھی ملا - ڈونا - ڈونا اور کلو - رل مائیڈریٹ بہت فائدہ کرتا ہے مثلاً سب کس ملا - ڈونا ۱۵ سے ۲۰ منٹ تک اور کلو - رل مائیڈریٹ ۱۰ اگر مین ہمراہ ایک آونس یانی کے چار چائے کٹھنہ بعد پلا دین مگر بعض دفعہ نوبت کی وقت جب کبھی جاتی ہے تب اکثر فائدہ ہو جاتا ہے - بعض دفعہ جلد کے اندر مار - فائین اور اٹرو - مین کی پچکاری کرنے سے نوبت کب جاتی ہے اور بعض دفعہ مائیڈریٹ مین امیل اور مائے - ٹرو گھائی - سی - رین کے استعمال سے یہ بات حاصل ہو سکتی ہے ۔ جب مہ کی نوبت ہووے ہی عرصہ کے لئے چلتی ہے

اور ان صورتوں میں بھی کہ جب عجم کی تکلیف برابر ہوتی رہتی ہے تب بھی کلو۔ رل اور بلا۔ ڈو۔ نا کے اوپر کے نسخہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے * بعضہ فخر کی بیماری کی آیو۔ ڈو۔ فارم سے بہت فائدہ ہوتا ہے مثلاً ایک ایک گرین کی گولیاں دن میں تین دفعہ کھائیں اور دوسرے دس گرین کی مقدار میں آیو۔ ڈو۔ ایٹھ اف۔ پو۔ ٹا۔ سیم کے استعمال سے بھی اس بیماری کو اکثر فائدہ ہو جاتا ہے * بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دم کا مریض جب کہانے پینے میں بد پرہیزی کرتا ہے تب نوبت بیماری کی شروع ہو جاتی ہے۔ غرض اس صورت میں کسی سیرل الاثر حلاب کے دینے سے نوبت رفع ہو جاتی ہے * بعضہ فخر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثل مرگی کی نوبت کے دمہ کی نوبت بھی اچان چک بلا کسی ظاہری سبب کے پیدا ہو جاتی ہے۔ غرض ایسی صورت میں وہی اوپر کا نسخہ کلو۔ رل اور عرق بلا۔ ڈو۔ نا صبح و شام یا ہر روز رات کو سوتے وقت پلانے سے فائدہ ہوتا ہے * دمہ کی نوبت کے وقت نسخہ ذیل کا بخار سو نگھنا بہت فائدہ کرتا ہے۔

نسخہ۔ دھتورے کے پتے ۴ آونس * سبز چار کا چورن۔ یم آونس * لو۔ لے۔ لیا۔ ڈیڑھ آونس * سبکو ملا کر غلی شورہ کے گاڑھے عرق میں ترکیب۔ بعد از ان خوب طرح خشک کر کے بند شیشی میں رکھ کر چوڑین۔ نوبت کی وقت لیکر دیرام لیکر لگ کے کھا کر پھر رکھ دین۔ جو دھواں پیدا ہو بیمار کو سو نگھنا کہیں *

سوم ہے۔ آستہما

علامات اس بیماری کی مثل ہیو۔ مرل۔ آستہما کے ہیں۔ لیکن اس میں ناکام کی علامتوں کا غلبہ ہوتا ہے اور نوبت اس کی بچائی گہاں ہو جاتی ہے۔ اس کی بدبو سو نگھنے سے شروع ہو جاتی ہے اور علاج بھی اس کا مثل ہیو۔ مرل۔ آستہما کے ہے *

چهارم ام - فائی - سی - ما

ماہیت - یہ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے ایک کو دی - سی - کیکولر ام - فائی - سی کہتے ہیں - اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہوا کے کیسے پہلیاتے ہیں انکی دیار میں پتلی پڑ جاتی ہیں اور انپر جو باریک رگیں مثل حال کے پہلی ہوئی ہوتی ہیں ایلو - نری کے - پے - لے - ریڈر وہ نیست و نابود ہو جاتی ہیں - دوسری قسم اس بیماری کی وہ ہے جس میں باتو ہوا پپرے کے لائیول کے (چوٹے چوٹے گوشے) کانک ٹوٹے شیشو میں یا پورا پلو - نے - لے - ریش کے نیچے جو کانک ٹوٹے شیشو ہوتا ہے اس میں جمع ہو جاتی ہے اس واسطے اس قسم کے مرض کو اصطلاح میں انٹر - لائبر - ام - فائی - سی کہتے ہیں "ان دونو قسم کے مرض میں بیمار کو کوتاہ دمی رہتی ہے اور گاہے گاہے صیق النفس کی نوبت بھی ہو جایا کرتی ہے " اس مرض کے ہونے سے پتیری صفہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دل کے دہنے خاؤن میں بیمار پھیپھوں کے جسم کی کل دریدون میں اجتماع خون کا ہو جاتا ہے اور تب ڈراپ - سی کی بیماری ظاہر ہوتی ہے ۔

دی - سی - کیکولر ام - فائی - سی - ما ایک یا دونو پھیپھوں میں ہو جاسکتی ہے یا ایک کسی خاص حصہ میں جیسے کہ رن اور نوکون پر ۔

اس مرض میں ایسا ہوتا ہے کہ شش کے کیسے ہوا سے پُر ہو جاتے ہیں اور خون میں اینجین ہوا ہرتی جاتی ہے وہ پھیلتے جاتے ہیں - غرض چھانٹک اینجین دوست ہوتی ہے پھیلتے جاتے ہیں آخر کار ملتے پیچ کے پردے پہٹ جاتے ہیں تب دو باتیں با جاریا گئی کیونکہ جو ف ایک بنجاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے انڈون کی شکل میں کے پھیپھوں کی سطح سے باہر نکل پڑتے ہیں پھیپھوں کے کیسوں پر جو باریک رگن کا جال پہلیا ہوا ہوتا ہے اب اسکا حال سنو - ہوا کے رگ جانے سے خون جوش کے

کیسے پہلیتے جاتے ہیں وہ رگوں کا جال بھی پہلیتا جاتا ہے آخر کار جب پہلینے کی
دست ہین رہتی ہے تب بعض رگیں کیوں کی اور ہر کہک جاتی ہیں
بعض ہین خشک ہو جاتی ہیں اور بعض ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ غرض پہلیے ہوئے
کیونچر جو رقی شیر بہہ جاتی ہیں وہ نیست اور نابود ہو جاتی ہیں نتیجہ کیا یہ ہوتا ہے
کہ پلو۔ نرمی اور رگی کا خون جو دل کے دہنے بطن سے پھر رن میں صاف ہونے کے
لئے آتا ہے سارے کا سارا اب آہین سکتا جس سے دہنا بطن خون سے پڑ ہو جاتا
ہے اور تب دہنے اذن کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے اور جب دہنا بطن اور دہنا اذن دونوں
خون سے پڑ ہو گئے تب اس رن۔ ٹوٹا اور ٹوٹی۔ رن ٹوٹا دی بنا۔ کے۔ دہن
رک رک کر آنے لگتا یہ جس سے جسم کے کل دہنی نظامت میں اجتماع ٹوٹکا ہو جاتا
ہے اور تب ڈراپ۔ سی کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے ۔

علامات۔ سب سے پہلی علامت اس بیماری کی کوتاہ دمی ہے جو ذرہ
سی حرکت یا سردی کے لگ جانے سے بڑھ جاتی ہے۔ ٹھوڑی ہیبت کہاںسی ہی ہوتی
ہے۔ جیگہ اور بغم نہایت تکلیف سے خارج ہوتا ہے۔ بیمار کا چہرہ نیلگون ہو جاتا ہے
آواز کمزور ہو جاتی ہے۔ بیمار جیگہ کہہ چلتا ہے۔ لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ جسم کی
حرارت گہٹ جاتی ہے۔ قبض پتا ہے۔ نبض بطی اور کمزور ہو جاتی ہے۔ سینہ
میں بندہن سا معلوم ہوتا ہے۔ دم آہستہ آہستہ لپکا جاتا ہے ۔

فی۔ نرمی۔ کل۔ سائنس۔ اس بیماری کی یہ ہین کہ سینہ کو ٹھونچنے سے
آواز صحت کی نسبت زیادہ تر صاف پیدا ہوتی ہے اور اسکی حد دل اور جگر کے کناروں
تک پہنچ جاتی ہے۔ کان لگا کر نئے سے شش کی دونوں آوازیں ہیبت کم سنائی دیتی
ہیں۔ گاتے گاتے ایک مرطوب آواز جیسے برنگائی۔ رن کی بیماری میں پیدا ہوتی
ہے سنائی دیتی ہے ۔ دل کی آوازیں بھی نہایت کم سنائی دیتی ہیں اور دل

اپنی جگہ سے ہٹسک کر مائوف شش کی مخالف جانب پر آجاتا ہے۔ یا جب دولو شش میں یہ بیماری ہو جاتی ہے تب دل نیچے اور دہنی جانب کو ہٹسک کر آجاتا ہے۔ مائوف جانب کا سینہ بہ نسبت جانب تندرست کے چو لاور پہلایا ہوتا ہے اور اس جانب کی سیلیون کی پیچ کی جگہ ہی اونچی ہو جاتی ہے۔

علاج - رضعات - ام - فامی - سی - ماکے ساتھ یہ بیماریاں اکثر ہو جایا کرتی ہیں لیکن دہمہ جکی نوبت اکثر اوقات کیوقت نہایت تکلیف دیتی ہے۔ مگر بعض دفعہ بوجض نتیجہ کے مومد اس مرض کا سبب ہوتا ہے علیٰ ہذا القیاس اس بیماری میں برا نکائی - ٹس بھی ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ برا نکائی - ٹس کے سبب یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر اس صورت میں بلغم زیادہ پیدا ہو کر ہو انکی نالیوں میں جمع ہو جاتا ہے تب بیمار دم بند ہو کر مر جاتا ہے یا ایسا ہی ہوتا ہے کہ دل کے اندر یا اریار ٹایا پلمو - نری اور - ٹری کے دھانہ میں فامی - برین کے وٹے (ام - لو - لائی) بیجاتے ہیں اور بیمار کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اور اس بیماری میں دل کے خانے موٹے ہو کر اکثر ہیل ہی جاتے ہیں۔

علاج - یہ بیماری اکثر لا علاج ہوتی ہے۔ بجز تخفیف کے ہم سے کچھ اور ہو نہیں سکتا پس بیمار کو غذا اور دوا مقوی نبی چاہئے۔ سردی سے بچا دیں گرم کپڑے پہنا دیں اور اس بات کا خیال کریں کہ دھنمہ بگڑنے نہ پاوے گا ہے ٹھکے ہوئے ٹس میں ہلکا ہو کر دوا دینا استعمال کریں جیسے ایومینا ایتر مائیڈروسیا - ٹک - اسٹروسیل وغیرہ چنانچہ ان نسخوں میں سے کسیکا استعمال کریں -

نسخہ - اسپرٹ اف ایتریم بوند - لے - کوئیڈ اکٹرکٹ اف اوپیم پوند - ٹیکچر آف کسٹو - ریٹم ایک ڈرام - پے - پر - منٹ ڈاٹر ہاڈرام - سب کو ملا کر کوٹا دہنی کے وقت پلاویں۔

لشخہ اسپرٹ اف ایتر ۳ ڈرام ۴ اسپرٹ اف کلورہ فارم ۳ ڈرام ۴
 کنیا ونڈ ٹیکچر آف کار - ڈی - مم ۶ ڈرام ۴ پیے - پرہ منٹ وارڈ آونس ۴
 سب کو ملا کر جب کوتاہ دمی ہو ایک یا ڈیڑھ آونس کی مقدار میں پلاوین ۴
 لشخہ اسپرٹ اف ایتر ۹ بوند ۴ ارو - مائیک اسپرٹ اف ایمو - نیام ڈرام ۴
 ٹیکچر آف بلا - ڈو - نا ۳۰ بوند ۴ ٹیکچر آف - رکن - تے - ری - ٹوس ۱۰ بوند ۴
 کنیا ونڈ ٹیکچر آف کلورہ فارم ۳۰ بوند ۴ عرق کافور ۳ آونس ۴ سب کو ملا کر مقدار
 ایک آونس کے آدہ آدہ گنٹہ بعد جب تک کوتاہ دمی کو تخفیف نہ ملتا تے جاوین ۴
 لشخہ ارو - مائیک اسپرٹ اف ایمو - نیام ایک ڈرام ۴ ڈائیلوٹ - مائیڈ رو - سیانک
 اسٹد ۳ سے ۵ بوند تک ۴ پیے - پرہ منٹ وارڈ ۳ ڈرام ۴ سب کو ملا کر دین
 دو یا تین دفعہ پلاوین ۴

پنجم پرٹا - سس

اس مرض کو انگریزی میں ہو - پنگ کافی اور اردو میں کوک کہانیسی اور چربی میں
 کھلی کہانیسی کہتے ہیں ۴
 تعریف - یہ ایک متعدی مرض ہے جسکی چھوت ایک سے دوسرے کو لگ جاتی
 ہے - اس میں پہلے زکام ہوتا ہے بعد ازاں نوبت بنوبت تشنجی کہانیسی ہوتی ہے -
 مدت اس بیماری کی تین یا چار ہفتہ سے کئی مہینے تک کی ہوتی ہے - یہ بیمار مٹی مٹکر
 بچون ہی کو ہوا کرتی ہے ۴

علامات - یہ بیماری اسطور پر شروع ہوتی ہے کہ آہٹہ دس روز تک بچہ کو
 زکام رہتا ہے اور ہوا بڑی بہت کہانیسی ہی ہوتی رہتی ہے - رفتہ رفتہ زکام کمی
 علامتیں کم ہوتی جاتی ہیں مگر کہانیسی بدستور ہوتی رہتی ہے اور بتدریج

خاص مرض کی خاصیتیں پکڑتی جاتی جاتی جو یعنی اب کہاںسی نوبت بنو بت ہونے لگتی ہے اور نوبت کی وقت کہاںسی اس شدت سے ہونے لگتی ہے کہ بچہ کہانتے کہانتے بے دم ہو جاتا ہے اس وقت ایسی زور سے ایک لمبی سانس لینا پاتا ہے کہ جس سے ایک تیز آواز سیٹی کے طور کی پیدا ہوتی ہے جسکو ہنوپ کہتے ہیں اور جس سے نام اس مرض کا ہو۔ پیٹنگ کاف کہہ لیا گیا ہے بعض دفعہ تو کہاںسی کی نوبتیں دینیں دو یا تین مرتبہ ہوتی ہیں اور بعض اوقات گھنٹہ میں کئی دفعہ پیدا ہو جاتی ہیں لیکن کہاںسی اکثر رات ہی کے وقت زیادہ شدید ہو ا کرتی ہے۔ بعد کئی نوبتوں کے جب تھوڑا سا بلغم خارج ہو جاتا ہے یا تے ہو جاتی ہے تب بچہ کو آرام آ جاتا ہے اور اپنی معمولی کھیل کود میں مشغول ہو جاتا ہے اکثر اوقات نوبت کے رفع ہوتے ہیں کہانے کو مانگ بیٹھتا ہے۔ یاد رہے کہ بعض دفعہ کہاںسی کی شدت اس درجہ پر ہوتی ہے کہ چہرہ بچہ کا سرخ ہو جاتا ہے آنکھیں گویا نکلی پڑتی ہیں اور سرخ ہو جاتی ہیں۔ کن۔ جنک۔ ٹائی۔ واکی۔ گین۔ پٹ کر خون ٹپکنے لگتا ہے اور بعض دفعہ ناک اور کافوں سے بھی خون جاری ہو جاتا ہے اور نوبت کی حالت میں بعض اوقات کنولشز بھی ہو جاتا ہے نوبت کی وقت ہم نے پنیاہ اور پاخانہ بھی خطا ہو جاتے دیکھا ہے اور کبھی فتن کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ درد سر اور ڈس۔ لے۔ ریٹم بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے۔ جب ہو۔ پیٹنگ کاف کے ہمراہ کوئی اور بیماری نہیں ہوتی ہے تب نوبتوں کے مابین صحیح وسالم نظر آتا ہے۔ اسٹہنا بدستور رہتی ہے اور نیند بھی آ جاتی ہے۔

ہنوپ کی سلامت کے شروع ہونے کی تاریخ سے لیکر شدت اس مرض کی ہفتہ عشر تک خوب زور و شور پر رہتی ہے اور تب تخفیف ہونے لگتی ہے۔ اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ مات کی نوبتوں کی شدت کم ہو جاتی ہے اور دن کی نوبتوں کی شدت اور

تو اتر میں بھی فرق پڑ جاتا ہے اور بعض دفعہ کہا نشی کے ساتھ ہو پ کی علامت پیدا بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اس شخص کے وقت بچہ کو جب سردی لگ جاتی ہے یا اس کے شکم میں کسی طرح کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تب تو نو بیتین نہایت زور سے پھر ہونے لگتی ہیں۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ بیماری رفع ہو نیوالی ہوتی ہے تو کوئی دن پہلے سے بلا تشنج کے صرف سادی کہا نشی ہوتی رہتی ہے اور تب یہ مرض رفع ہو جاتا ہے۔

اوپر جو طریقہ اس بیماری کے شروع ہونے اور رفع ہو جانے کا بیان کیا گیا ہے وہ اس صورت میں مشاہدہ میں آتا ہے کہ جب اس مرض کے ساتھ کوئی اور بیماری عارض نہیں ہوتی لیکن جب یہ بات ہوتی ہے کہ ہو۔ پنگ۔ کاف کے مرض میں کوئی اور بیماری عرض کے طور پر پیدا ہو جاتی ہے تب اسکی علامات اور نو بتوں میں بڑا اختلاف پڑ جاتا ہے چنانچہ اب ہم ان بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہو۔ پنگ۔ کاف کے ساتھ عارض ہو جاتی ہیں۔

عارضیات - اول برا نکاحی - ٹس - ایسا تو اکثر ہوا کرتا ہے کہ بچہ کو پہلے برا نکاحی - ٹس ہو جاتی ہے اور تب ہو۔ پنگ۔ کاف شروع ہوتا ہے مگر اس صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ ہو۔ پنگ۔ کاف کے شروع ہونے سے برا نکاحی ٹس کی علامتیں رفع ہو جاتی ہیں لیکن جب اسکا خلاف واقعہ میں آتا ہے یعنی ہو۔ پنگ۔ کاف کے شروع ہو جانے کے بعد کچھ برا نکاحی ٹس باقی ہو۔ نیا ہو جاتا ہے تب البتہ یہ بات اندیشہ کی ہے۔

دوم - بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ برا نکاحی - ٹس کا انفلماشن بڑی تیزی سے ہوا کی تالیوں سے گزر کر چوٹی چوٹی تالیوں میں ادراں سے گزر کر ہوا کے کیوں میں اثر کر جاتا ہے تب بچہ کو نیو۔ مو۔ نیا کی بیماری ہو جاتی ہے۔

سوم - لیکن جب ہو - پنگ - کاف کا صدمہ نظام عصبی پر پہنچتا ہے تب حقیقت میں نہایت خوفناک علامتیں پیدا ہوتی ہیں چنانچہ اس صدمہ سے بعض دفعہ تو صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ دماغ میں اجتماع خون کا ہو جاتا ہے (کن - جش - جن) اور بچہ ادھکنے لگتا ہے بعد ازاں کن - دل - شن ہو کر تلف ہو جاتا ہے جب صدمہ اس بیماری کا شعلہ پر پہنچتا ہے تب بچہ کے ماتہ پاؤں کی انگلیاں مڑ جاتی ہیں اور حلق میں تشنج پیدا کر سارے جسم میں کن - دل - شن ہونے لگتا ہے ۔

جب کہی یہ بیماری عرصہ دراز تک جاری رہتی ہے تب بعض اکیوٹ مائیکرو ریف لیس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جب کہی ننھے بچہ یا انکو ہو جاتی ہے کہ جو دانت نکالتے ہیں تب بعضی علامتیں نہایت زور شور سے پیدا ہوتی ہیں یعنی ان صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس مرض کے شروع میں جو زکام ہوتا ہے وہ تھوڑے عرصہ تک رہ کر رفع ہو جاتا ہے اور کہانسی کی نوبتیں اگرچہ با برتور نہیں پیدا ہوتیں تاہم وہ نوبتیں اس قدر شدت سے پیدا ہوتی ہیں کہ بچہ کا دم بند ہو جاتا ہے - نوبت کہانسی کی تھوڑے ہی عرصہ تک رہتی ہے مگر ساتھ اس کے ٹھوہوپ کی علامت پیدا ہوتی ہے اور نہ نوبت کے رفع ہو جانے کے بعد سہولتی قے ہوتی ہے - مگر ان دو نوبتوں کے ہنوںے سے ایسا نہ سمجھنا کہ بچہ کو آرام آ جاتا ہے بلکہ یہ جان لینا چاہئے کہ مرض ایسی شدت کا ہے کہ بچہ سے اسکا صدمہ سہارا نہیں جاتا کیونکہ نوبتوں کے مابین بچہ کا چہرہ سرخ رہتا ہے آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبائی ہوئی ہوتی ہیں اور مرنیکا اس قدر غصہ دگی جاتی ہے کہ اس حالت سے اٹھنا نہیں چاہتا - اور چون کہانسی کی نوبتیں بے درجے ہوتی رہتی ہیں غنودگی کی حالت زیادہ بڑھتی جاتی ہے - اب بچہ کا چہرہ نیلگون ہو جاتا ہے پتلیاں آنکھوں کی پہلچاتی ہیں اور اسی وقت کن - دل - شن ہو کر بچہ بیہوش ہو جاتا ہے مگر یہ حالت تھوڑے ہی عرصہ تک طاری رہتی ہے کہ پھر

کن۔ ول۔ شن ہونے لگتا ہے اور اُسی حالت میں بچہ کا مرغِ روح تفسِ غصہ سے
 تڑپ تڑپ کر پرواز کر جاتا ہے * اگرچہ ایسی کوئی بھی خاص سلامت نہیں ہے کہ جز
 سے طبیب یہ سمجھ جائے کہ اب صدمہ ہو۔ پنگ۔ کاف کا دماغ پر پہنچنے والا ہے
 بہرہی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اثر اس بیماری کا دماغ پر ہو نیوالا ہوتا ہے تب
 شروع ہی سے صدمہ بچہ کا ایسا بگڑ جاتا ہے کہ اُس میں دانہ اور نہ پانی قرار پاتا ہے لیکن
 برابر تے ہوتی رہتی ہے پس اس تے کی علامت کو تبو لیا جائے لیکن یہ یاد رہے کہ اگر تہ
 کہانسی کی رفع ہو جاوے مگر تے رات دن جاری رہے اور ظاہر سبب اسکا دریافت
 نہ ہو سکے تو دماغ کے مبتلا ہونے کا اندیشہ پیدا ہونا چاہئے *

چہارم ڈا۔ یا۔ یا۔ اس مرض کے ساتھ سہال کا چلتا ہوا چہا نہیں گونہ مرے پر
 اس سے بچہ لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ کہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ابتداء سے زکام کے ساتھ
 ہی سوجھ کو دست ہی شروع ہو جاتے ہیں اور چون زکام رفع ہوتا جاتا ہے دستوں
 کو بھی تخفیف ہوتی جاتی ہے بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرض کے ابتدا سے لیکر
 انتہا تک رست آتے رہتے ہیں اگرچہ کہی کہی تہم ہی جاتے اور پھر جاری ہو جاتے
 ہیں مرض کی شدت کے وقت سہال جاری ہو جاوے تو بہر صورت اُسکو
 روکنا چاہئے *

پنجم۔ اس مرض میں کہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ صدمہ بگڑ جاتا ہے اور بچہ کو تے
 ہونے لگتی ہے *

ماہیت۔ کہتے ہیں کہ یہ بیماری ایک خاص قسم کے زہر سے پیدا ہوتی ہے اور ہوا
 کے ذریعہ پہنچتی ہے اور اثر اسکا ہوا کی مالیون پر ہوتا ہے۔ کہی کہی یہ بیماری باقی
 ہی ہو جاتی ہے *

علاج۔ زکام اور خفیف کہانسی کا علاج مثل کٹار اور برنگائی۔ ٹس کے کرنا چاہئے

جبکہ ذکر و تصحیح ہو گیا ہے ۔ جب خاص بیماری ہو ۔ چنگ ۔ کاف کی شروع ہو جاتی ہے
 تب تھے سے اسکو بہت فائدہ ہوتا ہے ۔ عام قاعدہ اپنے ۔ کے ۔ کو اناسے تھے کہ انکی
 ہے مگرین میں کو ہلکے پسینہ نہیں کرتا کہ اکثر اوقات خطا کہا جاتی ہے اور بعض دفعہ
 بھوض تھے کے اس سے دست آنے لگتے ہیں ۔ اس بیماری میں سلفٹ اف کا پرکا
 استعمال ہمیشہ اس ترکیب سے کرتا ہوں کہ ۵ یا ۱۰ اگرین لیکر ۳ آونس ٹریسٹلڈ واٹر میں
 حل کر کے ۴ ڈرام کی مقدار میں دس دس منٹ بعد یا جب تک کہ لکڑے نہیں ہو جاتی
 ہے پلائے جاتا ہوں یہ بیماری ایسی ہٹیلی ہے کہ بعض دفعہ غشی سلاح سے اسکو فائدہ
 نہیں ہوتا اور جب نفع ہو نیوالی ہوتی ہے تب خود بخود جاتی رہتی ہے ۔ اور چونکہ
 یہ ہٹیلی بیماری ہے اس واسطے طبیوں نے طرح طرح کے نسخے آزمائے ہیں جبکہ اگر ذکر و
 تو ایک دھڑبھجائے ۔ پس اس موقع پر صرف چند مشہور معروف طبیوں کے نسخوں کا ذکر
 کرتا ہوں ۔ چنانچہ فرانس کے ڈاکٹر ٹرو ۔ سا صاحب بلا ۔ ڈو ۔ ناکی ٹری تعریف
 کرتے ہیں اور اس ترکیب سے اسکو دینا بتاتے ہیں کہ بیمار اگر شیرخوار ہو تو لکڑے ۴
 بلا ۔ ڈو ۔ ناکی ایک اگرین کا دسواں حصہ اور ایک اگرین کا دسواں حصہ اسکے پتوں کے
 سفوف کا لیکر ایک گولی بنا دیں بچہ اگر بڑا ہو تو ہر ایک جزو کی ایک اگرین کا پانچواں
 حصہ لینا چاہئے ۔ بچے چونکہ گولیاں نہیں نگل سکتے تو شیرہ یا شہد میں حل کر کے پلانا
 چاہئے جسکی ترکیب یہ ہے ۔ کہ صبح کے وقت کہانے سے پہلے ایک گولی کہلا دیں
 اور اگلی صبح کو دوسری کہلا دیں ۔ مگر ان گولیوں کے کہلانے سے پہلے رات و دن کی
 نوبتوں کا شمار کریں یعنی اپنی یادداشت کی کتاب پر یہ کچھ لیں کہ دن کو کتنی اور رات
 کو کتنی نوبتیں ہوا کرتی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ گولیوں نے فائدہ کیا ہے یا نہیں اور
 بموجب اسکے فائدہ کے دوا کی مقدار کو بڑھانا چاہئے ۔
 ڈاکٹر فولر صاحب سلفٹ اف رنگ اور بلا ۔ ڈو ۔ ناکی ٹری تعریف کرتے ہیں چنانچہ

انکا نسخہ یہ ہے کہ

نسخہ - سلفٹ آف زنگ ۸ گرین * اکٹرکٹ آف پلا - دو - ۴ گرین * بانی
۴ - آونس * سکو ملا کر بمقدار نصف آونس کے دشین چار دفعہ بلانا چاہئے * یہ نسخہ تین
برس سے زیادہ عمر کے بچہ کے واسطے موزوں ہے - اس عرق کی طاقت کو ہر روز ایک
ایک خوراک کی مقدار تک بڑھا سکتے ہیں *

ڈاکٹر ہارلی صاحب برو - مائیڈ اف امونیا - ام کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ اسکا اثر
لے - رنگس اور نے - رنگس کے اعصاب پر ہوتا ہے * اس دوا کی خوراک شیر خوارہ کے
لئے دو دو گرین تین دفعہ دن کو اور بڑی عمر کے بچوں کے لئے ۱۱ - گرین تک * اور بعض
طبیبوں نے اس بیماری میں مائیڈرٹ آف کلو - رل کو مفید پایا ہے چنانچہ
چار یا پانچ برس کی عمر کے بچوں کو ۵ - گرین دن میں تین دفعہ دینا چاہئے *
ڈاکٹر ویسٹ صاحب ڈائیلیٹ مائیڈ روسیاٹک اسڈکا استعمال کرتے ہیں
چنانچہ انکا نسخہ یہ ہے -

نسخہ - ڈوئی - لوٹ مائیڈرو - سیا - نک اسڈم بوند * شیرہ - ایک ڈرام *
ڈیسلٹ وائرٹ ڈرام * سکو ملا کر بمقدار ایک ڈرام کے چھ چھ گھنٹہ بعد پلا دین - یہ نسخہ
نومہینے کے بچہ کے واسطے موزوں ہے *

رات کی وقت کھانسی کی شدت زیادہ ہو جائے تو سوتے وقت اس پڑیہ کو کھلا دین -
نسخہ - ڈو - وٹس پاؤ - ڈر نصف گرین * فضا شکرہ ۴ - گرین * اکٹرکٹ آف کو - نام
سفوف کیا ہوا - ایک گرین * سفوف وال جینی - ۴ گرین * سکو ملا کر ایک پڑیہ بنا دو
یہ نسخہ دو سال کے بچہ کے لئے موزوں ہے *

بیماری کچھ حالت میں غذا مقوی مگر سیرج الہضم دین جب مرض رفع ہو جائے تو کمزوری
کی رعایت رکھ کر مقویات مثلاً فلواد وغیرہ کا استعمال کریں * اس حالت میں

کاڑھ۔ لیور۔ آئیل بھی فائدہ کرتا ہے۔ سردی اور بارش میں ہینگینے سے بچاؤ میں اور مناسب ہو تو تبدیل آب دہوا کریں ۔

ہو۔ پنگ۔ کاف میں آئے۔ پائی۔ رین بھی بہت فائدہ مند دوا ہے۔ اسکے استعمال کی ترکیب یہ ہے کہ دوسری عمر کے بچہ کو اس دوا کا ایک گرین تین تین گنٹہ بعد دینا چاہئے اور چار سال کی عمر کے بچہ کو تین بلکہ چار گرین تک دینا چاہئے۔ چار مہینے کی عمر کے بچہ کا حال نکھارے کہ اسکو پون گرین آئے۔ پائی۔ رین تین تین گنٹہ بعد دیا گیا تھا مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بلکہ جب ایک گرین کی مقدار میں تین تین گنٹہ بعد کھلایا گیا تب اول روز تو دوا کا اثر کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوسرے روز نوبت بیماری کی ہوتی رہے مگر کم شدت سے لیکن اسی روز رات کے وقت کہانی کم ہونے لگی اور تیسرے روز نوبت بالکل نہیں ہوئی۔ پانچ دن تک دوا جاری تھی بیمار کو بالکل آرام آگیا ۔

ڈاکٹر گریفٹھ فرماتے ہیں کہ اس دوائے تیرہ ہی فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ جب تھوڑی تھوڑی مقدار میں کھلائی جاتی ہے۔ پس اچھری کی ترکیب سے اسکو دینا چاہئے ۔

برو۔ مو۔ فارم۔ یہ ایک سیال چیز ہے۔ ذالغہ اور بونوش۔ بے رنگ ۔ یہ دوا ہو۔ پنگ۔ کاف میں بہت فائدہ مند ہے۔ جینچہ ۳ سے ۴ برس تک کی عمر کے بچہ کو دو سے چار قطرے اور چار سے آٹھ سال کی عمر کے بچہ کو ۵ قطرے تین یا چار دفعہ دیکر جب اشتداد علامتوں کے پلانا چاہئے ۔ پانی میں ملا کر پلانے سے بہتر ہے ۔ تیسرے یا چوتھے روز تخفیف کی صورت نظر آ جاتی ہے ۔

ششم نیو۔ مو۔ نیا

مالیت۔ شش کے انفلامیشن کو نیو۔ مو۔ نیا یا نیو۔ مونا می۔ ٹر کہتے ہیں۔ یہ

مرض دوم قسم کا ہوتا ہے ایک اکیوٹ ۔ دوسرا کرائنک ۔ اکیوٹ بیماری کئی قسم کی ہوتی ہے مگر اکیوٹ مرض جب طاقتور یا جوان کو ہو جاتا ہے تب سارا پیڑا یا اس کے کسی گوشہ کا (لوب) ایک حصہ مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے ۔ یہ بیماری بہ نسبت نوک کے پیڑے کے پینڈے سے اکثر شروع ہوتی ہے اور بہ نسبت بائین کے دہنا پیڑا مرض میں اکثر مبتلا ہو جاتا ہے ۔ چونکہ اس مرض میں انفلامیشن کا مادہ ہوا کے کیسوں میں جمع ہو جاتا ہے اس واسطے اس کو لور پر نیو ۔ مو ۔ نیا یا البفر دفعہ کرو ۔ پس نیو ۔ مو ۔ نیا بھی کہتے ہیں ۔

اس مرض میں ایسا ہوتا ہے کہ پیڑے کی ساخت میں بسبب انفلامیشن زیادہ خون آ جاتا ہے ۔ انفلامیشن برف ہو جاوے تو بہتر ورنہ اس خون سے لطف پیدا ہو کر ایر ۔ سلس میں جمع ہو جاتا ہے تب پیڑے کی ساخت سخت مانند جگر کے ہو جاتی ہے اور اس میں ہوا داخل نہیں ہو سکتی ۔ اس حالت میں بھی اگر مرض دو بصحت لاوے تو وہ لطف جذب ہو کر رفتہ رفتہ شش حالت اصلی پر آ سکتا ہے ہین تو پیڑے کی ساخت اور انفلامیشن کے سبب جو مادہ ریا ر ۔ سلس میں پیدا ہوتا ہے وہ گھجاتا ہے ۔ پیپ بھی پڑ جاسکتی ہے زخم بھی پیدا ہو سکتے اور پیڑا مروا رہی پڑ جاسکتا ہے ۔ مگر یہ باتیں بہت کم ہوا کرتی ہیں ۔ پس بموجب اس ماہیت کے اس بیماری کو تین درجہ میں تقسیم کر سکتے ہیں چنانچہ درجہ اول میں کہ جبکہ اسٹیج ان انکارج منٹ کہتے ہیں پیڑے کی ساخت میں بہت سا خون جمع ہو جاتا ہے ۔ درجہ دوم میں کہ جبکہ اسٹیج ان ریڈ ہے ۔ پے ۔ ٹامی ۔ زی ۔ شن کہتے ہیں بسبب پیدا ہو جانے لطف کے پیڑے کی ساخت سخت مانند جگر کے ہو جاتی ہے ۔ اور تیسرا درجہ وہ ہے کہ جسم میں پیڑے کی ساخت گھجاتی ہے ۔ اس درجہ کو اصطلاح میں اسٹیج آف گری ہے ۔ پے ۔ ٹامی ۔ زی ۔ شن کہتے ہیں ۔

عملیات - بعضہ دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بیمار کو پہلے جائزہ معلوم ہوتا ہے اور
 تب بخار آ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات خاص مرض کی علامتیں پہلے ظاہر ہوتی
 ہیں۔ اس بیماری میں بخار تیز ہوتا ہے سارے جسم کی مگر خاص کر سینہ کی حرارت ۱۰۵
 درجہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور مرض کے کُل ایام تک قائم رہتی ہے
 یہ خاصہ اس مرض کی گرمی کا ہے اسکو بھولنا نہ چاہئے۔ چہرہ اور آنکھیں سرخ اور درد
 سر ہوتا ہے۔ نبض تیز چلتی ہے۔ تشنگی تیز ہوتی ہے۔ زبان میل اشتہا جاتی رہتی ہے
 اور مریض نہایت کھردرا ہوا ہوتا ہے۔ سینہ میں ایک دھماکہ اور پھیلا ہوا درد معلوم ہوتا
 ہے۔ مگر اس بیماری میں پردہ پلو۔ یا شامل نہ ہو تو درد تیز نہیں ہوتا۔ کہانسی کم اور خشک
 ہوتی ہے اور پہلے اسکے ہمراہ تو اس بلغم نکلتا ہے لیکن بعد ایک یا دو روز کے رنگ کے
 رنگ کا بلغم یا زرد سبزی نکل اُخرج پاتا ہے جو نہایت لیسہ ہوتا ہے اور جبکہ اصطلاح میں
 رس۔ ٹے۔ آس۔ ٹے۔ اس۔ سو۔ ٹم کہتے ہیں کہ جہاں کثرت سے کھورائڈ اف
 سو۔ ڈی۔ ام ہوتا ہے۔ اس بیماری میں پیشاب کم اور سرخ رنگ کا آتا ہے اور اس
 میں کثرت سے یوریا اور یورک اسڈ ہوتا ہے جس سبب سے اس مرض کا پیشاب
 اکثر لگا ہوتا ہے مگر اسمین کھورائڈ اف سو۔ ڈی۔ ام بہت کم ہی کم بلکہ بعضہ دفعہ
 ہوتا ہی نہیں۔ اس بیماری میں اور سر اکثر رہتا ہے۔ بعضہ قدرات کے وقت
 بیمار ہلکی ہلکی ہاتھیں کرتا ہے اور بعض وقت شدت سے ڈسے۔ لے۔ ری۔ ام اکثر
 ہو جاتا ہے مگر ڈسے۔ لے۔ ری۔ ام کی علامت شراب تو اردن میں نہایت زور شور
 سے پیدا ہوتی ہے۔ مغزل اسقدر جلد جلد لیا جاتا ہے کہ ایک منٹ میں اسکی حرکت
 تیس سے ساڑھ اور گاہے گاہے ایک منٹ میں اسی دفعہ بھی ہوتی ہے جب یہ مرض
 بڑھنے والا ہوتا ہے تو اسکی علامتیں شدت بکڑ جاتی ہیں چنانچہ مغز کی تکلیف
 زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ بلغم زیادہ تر لیسہ اور رنگ اسکا زیادہ تر گہرا اور اکثر اسمین

یہ لکھتا ہے کہ یہ مرض بخار تیز ہوتا ہے۔ تب بخار آ جاتا ہے۔

خون کی دھاریاں بھی ہوتی ہیں۔ نبض سیرج اور کمزور ہو جاتی ہے۔ زبان خشک اور اسپر ہو کرے رنگ کی قرجم جاتی ہے۔ جسم کی حرارت مآہدن کو تیز معلوم ہوتی ہے۔ کمال کمزوری۔ ہڈیاں اور ہیشی طاری ہوتی ہے اور دیگر علامات رو یہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ آخر کار بلغم میں لیس اینین ہوتا بلکہ وہ پتلا اور رنگ اسکا ہو یا یا لیں مری ہو جاتا ہے۔ تنگی نفس کی برہتی جاتی ہے۔ نبض باریک اور کمزور ہو جاتی ہے۔ چہرہ ہیرکا۔ لبیں نیلی۔ اور جسم سرور پسینہ سے معرق ہو جاتا ہے۔ آخر کار بیمار نہایت نڈال ہو جاتا ہے اور دم بند ہو کر یا حالت غشی میں ملک بقا کو کچ کر جاتا ہے جبشش میں گنگرین ہو جاتا ہے تو تنفس سے نہایت بدلو آتی ہے اور بلغم نہایت مٹر ہو انکلتا ہے ۔

نیمو۔ مو۔ نیا کی چند علامات کا مفصل بیان ۔ اس بیماری میں جلد نہایت گرم اور خشک ہو جاتی ہے اور مآہدن کو نہایت تیز گرم محسوس ہوتی ہے بعض دفعہ پسینہ آتا ہے۔ مگر اس سے مریض کوانا قدہ نہیں معلوم ہوتا جسم کی حرارت بہت جلد ۱۰۲ یا ۱۰۳ یا ۱۰۴ تک چڑھ جاتی ہے۔ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرے یا تیسرے دن درجہ اتم کو پہنچ جاتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرض کے انتہا تک حرارت بڑھتی جاوے۔ اور ایسا بھی کیجا گیا ہے کہ حرارت ۱۰۷ اور جب تک بڑھ گئی ہے تیسرے یا چارے کو شفا ہو گئی ہے اور جب یہ بیماری دھماک ہوئی ہے تب حرارت ۱۰۴ یا ۱۰۵ تک بھی بڑھ گئی ہے۔ حرارت میں روزمرہ کی کمی بیشی اکثر اسطور پڑتی ہے کہ علی الصباح حرارت کا درجہ نہایت کم ہوتا ہے۔ دوپہر سے پہلے یا تھوڑی ہی دیر بعد بتدریج بڑھنے لگتا ہے اور عین شام کی وقت حرارت جسم کی درجہ اتم کو پہنچ جاتی ہے تب بتدریج کم ہونے لگتی ہے لیکن بعض دفعہ نصف شب کو کیقدر بڑھنے لگتی ہے اور تب بتدریج گھٹنے لگتی ہے ۔ شاد و نا در ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ان ٹر۔ مے۔ ٹرنٹ۔ فیور کے اشارے میں یہ مرض عارض ہو جاتا ہے تب صبح کی وقت

حرارت کا درجہ صحت پر آجاتا ہے اسوقت اس بیماری کو ان - ٹرنے ٹنٹ - نیو مونیہ
 کہتے ہیں + نیو - مو - نیہ کی بیماری میں دونوں گال اکثر ترشح ہو جاتے ہیں اور مرض کی جانب
 کا گال زیادہ ترشح ہوتا ہے - بعض دفعہ رخسار کے اوپر رنگے ہو جاتے ہیں اور
 چہرہ زردی پیل + اس بیماری کے دوسرے یا تیسرے دن چہرہ پر ہر - پینر کے دانے
 اکثر پیدا ہو جاتے ہیں + اور بعض کا یہ حال ہے کہ بیماری جس قدر وسیع ہوتی ہے نبض
 یہی اس قدر معیض ہو جاتی ہے - مگر اکثر ۹۰ سے ۱۲۰ دفعہ حرکت کرتی ہے اور بعض دفعہ
 اس سے بھی زیادہ چلتی ہے - ابتدا میں نبض میں خوب طاقت ہوتی ہے اور نبض
 خون سے اس قدر پُر ہوتی ہے کہ دبانے سے نہیں دبتی - بعد ازاں کمزور ہو جاتی ہے اور
 اس میں اس قدر کم خون ہوتا ہے کہ دبانے سے دب جاتی ہے اور بعض دفعہ نبض
 ان - ٹرنے ٹنٹ اور بے قاعدہ ہی حرکت کرتی ہے + نیو - مو - نیہ میں ایک
 بڑی بیماری سلامت یہ پائی جاتی ہے کہ بیمار بہت کمزور اور نڈھال ہو جاتا ہے -
 اس مرض کا بیمار مگر اس قدر اونچا کہ کمر اکثر جھٹ پڑا رہتا ہے اور اکثر مشکلون
 کے ہونے کا بیٹھ سکتا ہے + زبان اس میں میل اور خشک ہوتی ہے اور لہجہ اکثر ہٹ جاتی
 ہیں + گاہے گاہے یہ علامات غیر محسوس ہی اس بیماری میں پائی جاتی ہیں کہ کھانے پینے
 دشواری ہوتی ہے - شدت سے تھوئے لگتی ہے - جگر بڑھ جاتا اور یرقان کی علامتیں
 پائی جاتی ہیں یا دست آنے لگتے ہیں - غرض یہ کل علامات خراب ہیں +
 کہانسی جلد شروع ہو جاتی ہے - مگر شدت سے نوبت نبوت نہیں ہوتی بلکہ جب
 کہانسی اُٹھتی ہے تب سانی سے روکی نہیں جاسکتی اور اس سے دم پھولتا ہے
 بلغم - کہانسی کے شروع ہوتے ہی بلغم آنے لگتا ہے جسکی خاصیت یہ ہیں - یہ بلغم
 کفہ اراہین ہوتا لیکن اس قدر لیسیدہ ہوتا ہے کہ نہایت مشکل سے خارج ہوتا ہے بلکہ
 اکثر منہ کے اندر سے کہنچ کر نکالنا پڑتا ہے اور جس برتن میں بلغم ہوتا ہے اگر اسکو با نکل

الٹا دین تب بھی نہیں کرتا۔ اس بلغم کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ خون کی آمیزش کے سبب کبھی تو رنگ کے رنگ کا چنانچہ سیاہی واسطے ہو سکتے ہیں۔ اس۔ بیہوش۔ کمکتے ہیں اور کبھی خون کے طرح طرح کے رنگ کا ہوتا ہے اور چون چون مرض کا دور بڑھتا جاتا ہے بلغم کا رنگ زردی مائل ہوتا جاتا ہے آخر کار پرانگائی۔ ریش کے مرض کا سا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ نہایت تھوڑا خارج ہوتا ہے اور جب مرض زردی شام کا ہوتا ہے تب بلغم رقیق سیاہی مائل رنگ کا اور بدبودار ہوتا ہے۔

علامات خاصہ کے۔ درجہ اول میں جانب ماؤف کا سینہ زیادہ حرکت کرتا ہے ٹھونکنے تو آواز و مان سے ٹھوس پیدا ہوتی ہے کان لگا کر سننے سے تکلم کی آواز تیز اور دم کشی کے ساتھ نہایت باریک کرے۔ پے۔ ٹنٹ رائٹس سنائی دیتی ہے۔ درجہ دوم میں جانب ماؤف کا سینہ کسیدہ رہتا ہو یا معلوم ہوتا ہے اور مقامات مابین پسلیوں کے ہموار ہو جاتے ہیں پر کشن کی آواز بالکل ٹھوس ہو جاتی ہے۔ تکلم کی آواز تیز اور مخف کی آواز بھی تیز جس کو براگمیل۔ بری۔ رنگ کہتے ہیں۔ جب یہ بیماری مرفع ہو نیوالی ہوتی ہے تو مرض کے مقام پر گاہے گاہے میو۔ کس۔ رائٹس سنائی دیتی ہے جبکہ مصطلح میں رنی۔ ٹوکس کرے۔ پے۔ لے۔ شن بولتے ہیں۔ یہ آواز مستعدہ جلد پہنچاتی ہے کہ جانب ماؤف کے کل پیڑ پر میو۔ کس۔ رائٹس مسجع ہوتی ہے تکلم اور تنفس کے آواز کی تیزی رفتہ رفتہ کم ہو کر بالکل مفقود ہو جاتی ہے پیڑے میں دوبارہ ہوا کا گزر ہوتا ہے اور بلغم دوبارہ پسلیوں اور رنگ کے خارج ہونے لگتا ہے اور چون چون لغام میں کم ہوتا جاتا ہے میو۔ کس۔ رائٹس کے عوض پیڑے کی اصلی حالت کی آواز سنائی دینے لگتی ہے اور ٹھونکنے کی آواز بھی چون چون

شش و بصحت لانا جاتا ہے صاف ہوتی جاتی ہے مگر جب یہ مرض نہیں رفع
ہو نیوالا ہوتا ہے تب اوپر کی ساری عملیات میں بڑھ جاتی ہیں اور جب ایک پہرے
سارے کا سارہ سخت ہو جاتا ہے تب تو تکلم اور نہ تنفس کی آواز سُنائی
دیتی ہے کیونکہ اس میں ہوا کا گزر نہیں ہوتا اور جب اس سخت پہرے میں پہرے
پڑ جاتی ہے تب یک - ٹا - رمی - لو - کوئی اور گرگ - لنگ - آواز سُنائی دیتی ہے
اقسام اور کریسپین - نیو - مونسین کی بیماری متعدد ہی بخاروں ای - رمی سبب
اور پائی - میا کے مرضوں میں اکثر عارض ہو جایا کرتی ہے ان صورتوں میں سینہ
نہایت گرم - تکلیف تنفس اور دیگر علاماتوں کو وقتاً بوقت ہو جاتی ہے سینہ بڑھوٹے
کی آواز اور سُسنے کی آواز میں بھی مثل نیو - مو - نیا کے سُنائی دیتی ہیں مثل کی بیماری
جب بڑھ جاتی ہے تب بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے اور یہ انکائی - شش کے مرض
میں تو اکثر ہو جایا کرتا ہے اس وقت اس مرکب مرض کو براکویو - نیو - مو - نیا کہتے ہیں
اور جب اسکے ساتھ بلو - رمی کی بیماری بھی ہو جاتی ہے تب اس مرکب مرض کو
بلو - رو - نیو - مو - نیا کہتے ہیں ۔

علامات تشہیحی بعد وفات - بیمار اگر درجہ اول میں مر جاوے تو پہرے اسکا
منہ نظر آویگا اور اس میں کسی قدر چمچا ہٹ کی آواز بھی ہوگی تیرا شش سے بہت
ساکندہ کچھ لہو اترے گی لنگیگا ان پہرے کو پانی میں چھوڑنے سے کچھ تیر لگا کچھ
ڈوبے گا - جب مریض درجہ دوم میں مرتا ہے تو پہرے اسکا پھل لہو ہوتا ہے اور اس پر
منہ خالی - برین اور پسیلین کے داغ پائے جاتے ہیں - انگلیوں سے دبا کے تو چمچا ہٹ
کی آواز بالکل سُنائی نہیں جیتی تیرا شش تو قائم نہیں ہسکی مثل جگر کے کٹتی ہیں جب
بیمار تیسرے درجہ میں مر جاتا ہے تو اس کے پہرے کی ساخت گلی جاتی ہے اور
اس میں پیپ پائی جاتی ہے ۔

اسباب - پرسی - ڈیپو - زنگ - یہ بیماری طاقتور اور کمزور دونوں کو ہو جاتا
 کرتی ہے - موسم سرد اور بہار *۔

اکسائیمینٹنگ - عام اسباب انفلیمیشن کے - تغیرات موسم - زیادہ محنت جانی -
 مختلف قسم کے بخار - جمع ہو جانا مادہ ٹیو - بر - کل کا - طلب کی بیماری *۔

واقع ہو کہ بعض طبیب اس بیماری کو ایک خاص قسم کا بخار تصور کرتے ہیں اور بہتر سے
 کے انفلیمیشن کو اس بخار کی ایک علامت کہتے ہیں - بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ
 بیماری ایک خاص قسم کے کوم کے سبب سے پیدا ہوتی ہے اور یہ کہ کوم مذکور
 ہو این پیدا ہوتے ہیں جبکہ سو گھنٹے سے شش میں انفلیمیشن ہو جاتا ہے *۔

مدت مرض کی - نیو - مو - نیو یا تو صرف ایک یا دو دن بہتر دن میں ہو جاسکتا
 ہے *۔ جب یہ بیماری جوان یا طاقتور آدمی کو ہو جاتی ہے اور اسپر کوئی اور مرض
 عارض نہیں ہوتا تب اسکی مدت قریب چودہ دن کے ہوتی ہے *۔ اور بچہ پیر
 سے آٹھویں دن کے اندر یہ مرض اختتام کو پہنچ جاتا ہے - خفیف قسم کی بیماری پیر
 دن کو رخصت لانے لگتی ہے مگر جب اس مرض پر کوئی اور بیماری عارض ہوتی
 ہے اور برائگی - نیو - مو - نیو میں بھی ۲۱ دن سے کم میں صحت کی صورت نظر نہیں
 آتی *۔ جب یہ مرض جہلک ہو نیو والا ہوتا ہے تب بیمار چھٹے اور بیسویں دن کے
 اندر مر جاتا ہے *۔

کرائمک نیو - مو - نیو - اس قسم کا مرض یا تو شدید بیماری کا نتیجہ ہو سکتا ہے یا
 بہتر سے میں آنشک کا مادہ جمع ہو کر خراش پیدا ہونے سے ہو جاتا ہے - جاتے کسی
 طور سے پیدا ہوا سین کوئی حصہ بہتر کے کا ہمیشہ کے لئے سخت رہ جاتا ہے - اس
 صورت میں طبیب کو سئل کی بیماری کا دھوکا ہو جاسکتا ہے لیکن وہ یہ خیال کرتا
 ہے کہ بہتر کے کی سختی ٹیو - بر - کل کے مادہ کے جمع ہو جانے سے پیدا ہوتی ہے

خاصہ کہ جب یہ دیکھتا ہے کہ کراہک نیو۔ مو۔ نیامین بھی ہوا کی نالیان اکثر پہلی
 ہوئی ہوتی ہیں اور جیسے سٹ مین میسے اس میں بھی سخت بہرے میں پیہ کر کر خرم
 پیہا ہو جا سکتے ہیں۔ اسکی علامات عامہ بھی یہ قدر سٹ سے مشابہت رکھتی ہیں
 کیونکہ اس میں بھی پیہا کر کر زور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ چہرہ اسکا پیلا پڑ جاتا ہے سینہ
 کے اندر بلوہرہ معلوم ہوتا ہے اور بہرہ کہ جاتی رہتی ہے۔ مگر مثل تہائی۔ سنس کے
 کراہک نیو۔ مو۔ نیامین تو بخیر ہو تا ہے نہ رات کو پسینہ آتا ہے۔ اور نہ دست
 لگاتے ہیں۔ اگرچہ گاہے گاہے کہانسی کے ہمراہ قدرے خون آسکتا ہے +
 علاج اس قسم کے نیو۔ مو۔ نیامین کا مقویات اور محلات سے کرنا چاہئے جیسے
 آیو۔ ڈائیڈ آف۔ پو۔ ٹا۔ یسم۔ آیو۔ ڈائیڈ آف۔ ایون۔ کاڈ۔ لیور۔ آیل وغیرہ
 غذا بیاہر کی مقوی ہونی چاہئے +

علاج۔ یہ تو مہانتے ہو کہ میں مضد کہ حرام سمجھتا ہوں اور صرف میں ہی
 نہیں بلکہ سوادیحی سکیمون کے سارا جہان اسکو پڑا جاتا ہے حقیقت بھی یہی
 ہے کیونکہ جب بلا شد ضرورت کے اور بغیر سچ سمجھ کر قصد لیجاتی ہے تب بیماری
 بوض رفع ہونے کے بڑھنے لگتی ہے۔ پس نیو۔ مو۔ نیامین کی بیماری میں قصد ہرگز نہ
 لینا چاہئے مگر مان جیسے حرام ہی اشتہ ضرورت کیوقت شاذ و نادر حلال ہو جا سکتا ہے
 سیطرہ پر جب جوان اور طاقتور آدمی کو وقتاً نیو۔ مو۔ نیامین ہو جائے اور ان کے آن میں
 بہت سادہ شش کا خون سے پُر ہو جائے جس سبب سے دم لینے میں کمال تکلیف اور تھوڑی
 تھوڑی کہانسی یا بارستانی ہو اور دھننے خانے دل کے خون سے پُر ہو کر پہلیا بہت تب
 مضد کے لینے سے بیمار آسانی سے دم لیتا ہے۔ بعض میں طاقت آجاتی ہے دہنا خانہ دل کا
 خون کے بوجہ سے سبکدوش ہو جاتا ہے اور مضد کے لیتے ہی بیمار رو بصوت لانے لگتا
 ہے + پس یاد رکھو کہ یہ حالت مذکورہ بالا کے نیو۔ مو۔ نیامین کی بیماری میں قصد ہرگز نہ لینا

بلکہ اسطوری علاج کرنا کہ درجہ اول میں مریض طاقتور ہو تو سینہ پر جو جب مرض کی شدت کے جو نگیں لگا دیں تکید کریں یا پولٹس باندھیں اور اسکو بعد دو دو گنہٹہ کے برلین بطور دوا کے اس نسخہ کا استعمال دو دو یا تین تین گنہٹہ بعد کریں۔

نسخہ نمبر ۱۰۱ - نمک تھامی یا چوتھائی گرین + لاط - نم ۱۰ یا ۱۵ ابوند + پانی ایک آونس + غذا ملکی لیکن جب یہ بیمار ہی کسی بڑے یا کمزور جو ان کو بھی ہو چاہے تب جو کون کے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس صورت میں خارجی علاج اس درجہ اول کا صرف تکیدہ در پولٹس سے کرنا چاہئے اور داخلی علاج اس نسخہ سے کریں۔

نسخہ نمبر ۱۰۲ - کار - بونٹ اف ایمو - نیاہ گرین + وائٹم - ایے - کلک - ۱۰ یا ۱۵ ابوند + کمپینڈ ٹنیکر - کمفرہ ۱۰ یا ۲۰ ابوند + پانی ایک آونس + سبکہ ملا کر دو دو یا تین تین گنہٹہ بعد پلا دیں۔ جب یہ مرض درجہ دوم میں آجاتا ہے تب کمزوری کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں اس واسطے چاہئے مریض طاقتور ہو چاہے کمزور خواہ بڑھا ہو خواہ جوان نسخہ کار - بونٹ اف ایمو - نیا کا استعمال کرنا چاہئے اور خارجی علاج اس درجہ کا بلٹرس کریں۔ بطور غذا شوربہ - دودھ - اور اگر کمزوری بہت ہو تو خمر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں درجہ سوم میں ادویہ اور اغذیہ دونو اسٹو - لے - لٹ ہونی چاہئیں اور جب مرض درجہ اول یا دوم سے رو بصحت لائیو الا ہو یہ مقویات مثلاً ڈائیکوٹ - ٹائیڈرو - ککور - اسٹڈ جیسانہ جو ایتیا جن - رشن یا کلنبا یا کواشیا کے ساتھ دیوین +

ہفتم گنگٹ - رین آف وی لنگس

یعنی
مردار پربانا کسی حصہ شش کا بسبب امیڈیشن کے

یہ مرض بہت کم دیکھنے میں آتا ہے علامات اسکی یہ ہیں کہ مریض کے نفیس سے نہایت

بدلو آتی ہے اور کہاں سے ایک رطوبت سبز یا لہو سیاہی اور نہایت بدبو دار خارج ہوتی ہے اور اس میں سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے چھپرے بھی ہوتے ہیں۔ مریض نہایت کم طاقت اور نڈال ہو جاتا ہے اور اسکی نبض بھی کمزور اور جلد چلتی ہے۔ سینہ پر کان لگا کر سننے سے میو۔ کس اور گرگ۔ رنگ۔ رائیخ شامی دیتی ہے علامت ردیہ فوراً ظاہر ہو پڑتی ہیں آخر کار بیمار حالت ضعف میں مر جاتا ہے +

اسباب - جب مرض میو۔ نیا (ذات الریہ) نہایت کمزور آدمی کو ہو جاتا ہے تب اسکا شش مُردار پڑ جاتا ہے +

تشخیص - اس بیماری کی نہایت آسان ہے کیونکہ مریض کے تنفس کی بوسقتہ بدبو ہوتی ہے کہ اس کے بستر کے پاس ناک نہیں پڑتی علاوہ ان میں اسکی کہانی کے ہمراہ جو رطوبت نکلتی ہے اسکی بو اور رنگت اس مرض کی تشخیص کے لئے کافی ہے + بیمار کی نفس کو چھپنے سے اس کے شش میں غاریاں جاتے ہیں اور ان غاروں میں دہی کاٹھی سبز اور بدبو دار رطوبت ہوتی ہے جو مریض کی زندگی میں کہاں سے کہیں نکلتی ہے۔ ان غاروں کی دیواروں پر سبز سیاہ رنگ کے چھپرے ہوتے ہیں جیسے بادری چھان کی جیت سے سیاہ رنگ کے جھول لٹکتے ہیں +

علاج - یہ بیماری نہایت مُہلک ہے اور یہ اور اذیہ مقوی سے اسکا علاج کرنا چاہیے جیسے کار۔ بونٹ آف ایونیٹ اور اذیہ مقوی سے اسکا علاج کرنا چاہیے +

ہشتم تھائی سس پنمونیا سس

یہ بیماری بہ نسبت دہنے کے بائیں شش میں اکثر زیادہ ہوتی ہے اور پھرے کی نوک سے اکثر شروع ہوتی ہے +

اقسام - تحقیقات جدید کے بموجب طبائے نزدیک تھائی سس کا نفاذ شش کے

کئی حالت پر اسحاق کر سکتا ہے چنانچہ

اول۔ پہیڑے کی باریک گین اجتماع خون کے سبب جب پہٹ جاتی ہیں اور خون پہیڑے کی ساخت میں پہنچتا ہے تب وہ منجھڑوں کی شکل بنجاتا ہے۔ یہ ڈلے جب ٹوٹ جاتے ہیں تو انکی شکل پنیہ کی سی ہو جاتی ہے طبیعت انکو دفع کرنا چاہتی ہے تب پہیڑے میں زخم ہو کر غار بنجاتے ہیں * اس قسم کے مرض کو ہے۔ مو۔ رابہک تہائی۔ سس کہتے ہیں *۔

دوہم۔ رانکائی۔ ٹس یا نیو۔ مو۔ دنیا کی بیماری کے سبب ہو اکی نالیون اور ہونکے کیون میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں اور ان دونوں مرضوں کے انفلامیشن کے باعث سے جو مادہ انفلامیشن کا پیدا ہوتا ہے اسیرہما ایسے تغیرات واقع ہو جاتے ہیں کہ وہ پنیہ کی شکل کے بنجاتے ہیں۔ اسکو بھی طبیعت دفع کرنا چاہتی ہے تب پہیڑے میں زخم پیدا ہو کر غار پڑ جاتے ہیں * اس قسم کے تہائی۔ سس کو اصطلاح میں براکیسل اور نیو۔ ما۔ نک تہائی۔ سس کہتے ہیں *۔

سوم۔ آشک کا زہر جب جسم میں سرایت کر جاتا ہے تب وہ شش کی ساخت میں جمع ہو کر پہیڑے کو گھا دیتا ہے * اس قسم کے تہائی۔ سس کو سی۔ نے۔ لے۔ نک تہائی۔ سس بولتے ہیں *۔

چہارم۔ بعض دفعہ رو۔ ما۔ ٹیزم اور گاؤٹ اور آشک اور کثرت سے عوارجی باعث جب خون بگڑ جاتا ہے تب اسکا بگڑا ہوا غائی۔ برین پہیڑے کی ساخت میں جمع ہو جاتا ہے اور شش کے اس مقام کو زخمی کر دیتا ہے * اس قسم کی تہائی۔ سس کو بائی۔ برائیڈ تہائی۔ سس کہتے ہیں *۔

پنجم۔ پانچویں قسم کا تہائی۔ سس وہ ہے جس میں اسکر ایفو۔ لا کے سبب سے ٹیو۔ بر۔ کل کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے * اسکو ٹیو۔ بر۔ کیو۔ لہ تہائی۔ سس کہتے ہیں *

چونکہ اس قسم کا تہائی سسز اکثر دیکھنے میں آتا ہے اور دیگر اقسام کی نسبت یہ زیادہ تر
 جھٹک بھی ہے اس واسطے اسکا بیان الگ کیا جائیگا۔ پس بیان

ٹیٹو۔ برکیو۔ لمر تھالی۔ سسز

یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے ایک اکیوٹ۔ دوسرا کرائنک۔
 اکیوٹ تہائی سسز کو گے۔ لو۔ پنگ کن۔ زم۔ شن بھی کہتے ہیں۔ اس قسم کا
 مرض کم دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ اسطور شروع ہوتا ہے۔ کہ پہلے قدرے سردی لگ کر
 بخا رہو جاتا ہے۔ نبض تیز ہو جاتی ہے۔ درد ہوتا ہے۔ کھانسی ہوتی ہے اور دم لینے
 میں تکلیف۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد ہکٹ۔ ٹاکٹ۔ فیور کی علامتیں ظاہر ہو کر کثرت سے
 پسینہ آنے لگتا ہے اور دست لگاتے ہیں۔ اس بیماری میں پہرے کی ساخت میں
 نہایت جلد ٹیٹو۔ بر۔ کل کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بیمار اب روز بروز لاغر ہونے لگتا ہے
 اور چند ہفتہ کے اندر مر جاتا ہے۔

دوسری یعنی کرائنک۔ قسم کی تہائی۔ سسز اکثر مشاہدہ میں آتی ہے جسکا مفصل بیان
 نیچے کیا جاتا ہے۔

ماہیت۔ اس بیماری کو انگریزی میں کن۔ زم۔ شن اور عربی میں سل کہتے ہیں اور جو
 شخص اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے اُسکو مملول بولتے ہیں۔ اس مرض کو ایسا سمجھنا
 چاہئے کہ صرف شش ہی میں محدود رہتا ہے بلکہ اثر اس مرض کا سارے جسم میں موجود
 ہوتا ہے یعنی جسکی کوسل کی بیماری ہو نیوالی ہوتی ہے عہد طفلی سے طبیعت اس
 کی اس بیماری میں مبتلا ہونے کے لئے مایل رہتی ہے اور آثار مرض اسکا۔ فینو۔ لا
 کے اُسکے سارے جسم میں پائے جاتے ہیں (دیکھو باب اسکا۔ فینو۔ لا پیچھے) سل کی
 بیماری میں ایک مادہ خون سے ایسا پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی بیکار ہو جاتا ہے

اور اس میں طاقت نشو و نما کی ہمیں ہوتی اس مادہ کو اصطلاح میں ٹیو - بر - کل کہتے ہیں - یہ مادہ ٹیو - بر - کل دو قسم کا ہوتا ہے ایک کو اصطلاح میں گرے اور دوسرے کو یا - لو ٹیو - بر - کل کہتے ہیں ۔

گری ٹیو - بر - کل مضبوط اور ملائم ہوتا ہے وہاں سے دب جاتا ہے ۔
یا - لو ٹیو - بر - کل کے مختلف مقدار کے ڈالے ہوئے ہیں اور نسبت گری ٹیو - بر - کل کے اکثر یہ بڑے ہی ہوتے ہیں - ان لون کو دہائے تو آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں اور چھری سے تراشے تو مثل منیر کے کٹ جاتے ہیں - غرض سب بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ سٹل کی بیماری میں خون سے ایک مادہ موذی اور بیکار پھپھرے کی ساخت میں پیدا ہوتا ہے اور جب اسی طرح پیدا ہو جاتا ہے تب طبیعت جو مدبر بدن ہے اور جبکہ بیکار اور موذی مادہ سے نفرت ہوتی ہے جسم سے اس مادہ ٹیو - بر - کل کو دفع کرنا چاہتی ہے - ترکیب اسکے دفع کرنے کی یہ ہے کہ جس مقام شش میں مادہ ٹیو - بر - کل کا ہوتا ہے وہاں پر ایک جنیٹ مشم کا انفلامیشن پیدا ہو جاتا ہے اور پیپ ٹر جاتی ہے - یہ پیپ ٹیو - بر - کل کے مادہ میں جب جذب ہو جاتی ہے تو مادہ مذکور پہلے تو ملائم اور آخر کار گھجنا ہوا اور اس مقام کے پھپھرے کی ساخت پہی گھجاتی ہے اور کہاں کسی ذریعہ جب وہ گلی ہوئی شش کی ساخت اور مادہ ٹیو - بر - کل کا ہمراہ بلغم کے خارج ہو جاتا ہے تب وہاں پر غار رہ جاتا ہے - پس بموجب اس طبیعت کے یہ بیماری تین درجہ میں منقسم ہو سکتی ہے چنانچہ درجہ اول میں جبکہ سٹیج - آف - ڈی - زی - شن کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر شش کی ٹوک یا اوپر کے گوشہ پر دونوں یا صرف ایک ہی قسم کی ٹیو - بر - کل الگ - الگ یا ملے جلے جمع ہو جاتے ہیں وہاں سے کیساں برابر یا جابجا پیدا ہوتے ہوئے نیچے کی طرف آتے ہیں - دوسرے درجہ میں جبکہ سٹیج - آف - فضا نیگ بولتے ہیں ٹیو - بر - کل کا مادہ سبب جذب ہو جانے پر یکے ملائم ہو جاتا ہے اور

تیسرے درجہ میں جب مادہ مذکور کل کر بلغم کے ساتھ خارج ہو جاتا ہے تب اس مقام میں غار رہ جاتا ہے چنانچہ ایسا وسطے اس درجہ کو اسٹیج اف ایکس۔ کے۔ وی۔ شرن بولتے ہیں ۔

ایسا نہ سمجھنا چاہئے کہ ٹیو۔ بر۔ کل کا مادہ صرف پہلے ہی میں پیدا ہوتا ہے بلکہ اس مرض میں اکثر اعضاء میں بھی مادہ پیدا ہو جاتا ہے جیسے رودون کی ساخت میں مے۔ سن۔ لٹے۔ رک۔ عذودون میں + گردون میں + پے۔ ری۔ ٹو۔ نی۔ ام میں جگر طحال اور برائیکسل عذودون میں + دل اور اسکے غلاف میں اور وماغ اور نخاع میں یہی ٹیو۔ بر۔ کل کا مادہ پیدا ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اس بیماری میں جگر کی ساخت چربی میں بھی بدل جاسکتی ہے ۔

علامات پریمی۔ ما۔ نے۔ ٹرمی سم۔ ٹم یہ ہیں کہ عین ابتدا میں اس کا ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی خشک کہانسی ہوتی رہتی ہے۔ صبح کو اٹھتے وقت یا شب کو سوتے وقت اسکی زیادتی ہوتی ہے۔ گلے میں خراش معلوم ہوتی ہے جس سے کہانسی اور یہی ستاتی ہے کچھ عرصہ بعد لیڈر بلغم بے رنگ یا کستھد رنوں کا منہ خارج ہو جاتا ہے یعنی مے۔ مای۔ ٹے۔ ریش ہو جاتا ہے۔ ماضی کی شکایت ہوتی ہے۔ ہو کہ مر جاتی ہے۔ بیمار کا جی مستحکم اور غلبہ صفر کا ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ مریض لاغر اور کمزور ہوتا جاتا ہے اور فی اس بات میں تھک جاتا ہے۔ کاروبار سے طبیعت نفرت کرتی ہے۔ اب مانتہ یا ون کے تلوے جلتے ہیں اور صبح کی وقت تھوڑا بہت پسینہ آ جاتا ہے۔ مریض قانون کو لیے چین رہتا ہے اور صبح کو طبیعت ناخوش اور پرزورہ ہوتی ہے۔ منج بیمار کا چڑچڑاہو جاتا ہے اور اشتہا منکون۔ بدن کا گوشت ڈھیللا۔ چہرہ پیلا۔ آنکھیں سفید اور تیلیان پہلیجاتی ہیں۔ نبض کی سرعت ۹۰ سے ۱۲۰ درجہ تک ہو جاتی ہے۔ بعد کچھ عرصہ کے کہانسی دن کے وقت کئی مرتبہ اٹھتی ہے

اور ذرا سی سخت یا زیادہ سخت ہے بیمار کا دم چڑھ آتا ہے اور وہ تھک جاتا ہے۔
 حرکاتِ تنفس کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے اور نبض بھی خاص کر شام کی وقت زیادہ تر
 میرج لیکن کمزور ہو جاتی ہے اور بخار برابر رہتا ہے مگر کبھی وقت زیادہ اور کبھی وقت
 کم اور طبع میں گرم رہتا ہے۔ تجربہ سے ایسا دیکھا گیا ہے کہ شش میں جب مادہ
 ٹیو۔ بر۔ کلکلاؤں شور ہوتا ہے تب جسم کی حرارت بھی زیادہ ہوتی ہے اور جب مادہ
 مذکور کی پیدائش میں کمی ہوتی ہے تب حرارت جسمی بھی کم ہو جاتی ہے۔ یاد رہے
 کہ ٹیو۔ بر۔ کل کے پیدا ہونے سے پہلے کئی ہفتے برابر بیمار کا بدن گرم رہتا ہے چنانچہ
 ۱۳۔ ۱۴ ستمبر ۱۹۰۷ء درجہ تکہ کی گرمی جسم میں ہمیشہ رہتی ہے۔ مرض کا یہ درجہ یا مرض کی یہ
 حالت کئی ہفتے یا کئی مہینے تک رہ سکتی ہے بلکہ بیمار کو اس قدر افاقہ ہی ہو جاسکتا
 ہے کہ غیب کو شفا کلی کا دھوکہ پڑ سکتا ہے لیکن بیمار سی بد ریج ترقی پکڑتی جاتی
 ہے اور ٹیو۔ بر۔ کل کا مواد اس کثرت سے پیدا ہو جاتا ہے کہ شش میں بسبب اجتماع
 خون کے مریض کو برا نکاسی۔ ریش اور تھو۔ مو۔ نیا کی بیماری ہو جاتی ہے اب مواد
 مذکور جلد کھلے لگتا ہے اور بطن کے ہمراہ پیپ آتی ہے اس وقت علامتِ ایکٹ۔ ٹیکٹ۔ فیدر
 رتبہ (ق) کی پیدا ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت سر اور سینہ پر اس قدر کثرت سے
 پسینہ آتا ہے کہ بیمار نہا جاتا ہے۔ کہانسی اب زیادہ سستاتی ہے اور نبض بھی اب
 زیادہ میرج ہو جاتی ہے ۹۰ سے ۱۱۰ درجہ تک اور جلد جلد چلنے لگتی ہے۔ بیمار سو کہہ کر
 کانٹا ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا درجہ مرض کا کئی ہفتے سے کئی مہینے تک رہ سکتا ہے
 اور اس حالت میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصہ کے لئے بیمار ظاہر میں
 تندرست نظر آسکتا ہے لیکن یہ صرف دھوکا ہے کیونکہ حقیقت اس مدت
 میں ٹیو۔ بر۔ کل کے مواد دانے پیدا ہونے لگتے ہیں تب از سر نو پھر علامتوں کو
 شدت پہنچاتی ہے۔ بیمار کا جی متلاٹا اور غذا کی طرف سے نفرت ہو جاتی ہے

اور بلغم کثرت سے اور پیپ آمیز آتا ہے اور اکثر اس میں خون کی خاریاں بھی ہوتی ہیں۔
 تیسرا درجہ اس مرض کا وہ ہے جس میں ٹیو۔ بریکل کے گل کر خارج ہو جانے سے شش
 میں غار پڑ جاتے ہیں۔ اس درجہ میں کل علامات جنکا ذکر پہلے کیا گیا ہے نہایت شدت
 پکڑ جاتی ہیں چنانچہ سر و پسینہ زیادہ آتا ہے اور دوپہر دن اور رات کی وقت بیمار
 کو نہایت نکان معلوم ہوتا ہے۔ بہوک بالکل مرجاتی ہے اور امعاء کے میو کس روہ
 میں بھی چونکہ مادہ ٹیو۔ بریکل کا پیدا ہو جاتا ہے اسلئے بیمار کو دست لگ جاتے۔
 میں اور بلغم میں اب نرمی پیپ ہوتی ہے۔ نبض استقدر میراج ہو جاتی ہے کہ عمر ایک
 منٹ کے اندر ۱۰ یا ۱۵ دفعہ تک چلتی ہے اور لاغری اس درجہ کو بڑھتی جاتی ہے
 کہ صرف پوست باقی رہ جاتا ہے یا استخوان۔ سر کے بال اب گرنے لگتے ہیں جیض
 بند ہو جاتا ہے پلو۔ رمی۔ سی (ذات الحجب) یا نیو۔ سیو۔ تہور کس کی بیماری بھی اب
 ہو جاتی ہے۔ گلے کے اندر زخم پڑ جاتے ہیں لیکن با اینہم مرتلہ دم تک مریض کے
 ہوش و حواس بدستور قائم رہتے ہیں، اگرچہ طوالت اس درجہ مرض کی نسبت
 درجہ دوم کے کم ہوتی ہے تاہم یا وجود کئی غاروں کے ہی مہینوں تک مریض
 زندہ رہ سکتا ہے۔ چون جو موت قریب آتی جاتی ہے بہوک بالکل جاتی رہتی
 ہے اور نیند نام کو بھی نہیں آتی۔ پاؤں میں آماس تر آتا ہے آخر کار بیمار کا مزاج
 یا اس وحشت لیکر اس دار فانی سے تڑپ تڑپ کر دار جوادانی کو پروا کر جاتا ہے۔
 پس اس مہلک مرض کی بھی سلامتیں ہیں جنکا ذکر اوپر کیا گیا بعض دفعہ تو یہ مرض
 صرف چند ہفتوں کے اندر مہلک ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اسکا مریض چھ ماہ یا
 مہینے تک زندہ رہتا ہے اور بعض مریض ایسے ہی ہٹیل ہوتے ہیں کہ بیسوں
 مہینے مرتے۔

چند بہار غی مسلمانوں کا شرح بیان۔ واضح ہو کہ اس مرض میں ہوا کی

نالیان اور حلق اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن اکثر یہ قاعدہ ہے کہ پہلے بہت باریک
 باؤ ایک ہو اکی نالیان مبتلا ہوتی ہیں بعد ازاں اوپر کی طرف بڑی بڑی نالیوں
 میں یہ مرض بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ جب حنجرہ (لے - رنگس) اس مرض میں مبتلا
 ہو جاتا ہے تب بیمار کی آواز تھوڑی بہت بیٹھ جاتی ہے لیکن بعض اوقات
 اس قاعدہ کا خلاف بھی وقوع میں آتا ہے یعنی پہلے بیمار کو لا - رہنجائی - لٹس ہو جاتی
 ہے اور گلاڑک جاتا اور آواز بیٹھ جاتی ہے اور تب یہ بیمار سی نیچے کی طرف پھیلتی
 آتی ہے یعنی پہلے بڑی بڑی اور تب چھوٹی چھوٹی ہو اکی نالیان مرض میں مبتلا
 ہو جاتی ہیں اور بلغم آنے لگتا ہے - نبض تیز اور پیماہ لاغر ہو جاتا ہے پھر تو اس مرض
 کے ہونے میں کسی کسج کا شک شبہ نہیں رہتا - سل کی بیماری کے اثنا میں
 امراض ذیل اکثر عارض ہو جاتے ہیں چنانچہ پلو - رمی - می - نیو - میہ - تھو - رکس -
 نیو - مو - نیا - برا نکائی - لٹس اور ہے - ماپ - لے - سس - امعا میں حشم
 پڑ جاتے ہیں اور پے - گلا - لٹس اور لا - رنگس اور ٹرے - کیا اور برا نکیل - گلاڈ میں
 بھی خم پیدا ہو جاتے ہیں - بلغم اس بیماری میں اکثر سپ - آمیز آتا ہے اور ذالقمہ
 اُسکا یا تو خیرین یا پیکا یا نکلین ہوتا ہے اور جب یہ بیماری بڑھ جاتی ہے تب
 بلغم میں نرمی سپ ہی ہوتی ہے *

ہے - ماپ - لے - سس - یاور ہے کہ سل کی بیماری میں خون کتنا
 ضروریات سے نہیں ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس مرض کے شروع سے
 لیکر آخر تک بیمار کے بلغم کے ہمسرہ خون مخلوق نہیں آتا اور جب آتا ہے
 تو اکثر درجہ اخیر ہی میں زیادہ آتا ہے مگر کبھی کبھی ابتدا میں بھی آتا ہے
 اور بعض اوقات خون کی مقدار ایسی کم ہوتی ہے کہ بلغم میں صرف خون کے نقوط
 یا دھاریاں ہوتی ہیں اور کبھی مقدار ایک یا دو ڈرام سے ایک دو یا کئی یا عشر

ہلک ہوتی ہے۔ بے باپ۔ مٹے میس کی عیالیت فیصد ہی بچا پس بیمار
 میں اکثر ہینین پیدا ہوتی۔ تنگی نفس کی اس مرض میں اکثر اس قدر ہوتی ہے کہ
 بیمار تھوڑی ہی حرکت کرے یا چند سطریں پڑھے تو سانس چڑھ آتی ہے۔ معدہ
 اکثر بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ ماضیہ کی شکایت رہتی۔ فم معدہ پر درد اور بوجھ معلوم ہوتا
 ہے۔ بیمار کو روغن اور گوشت سے نفرت ہو جاتی ہے، امعاء میں ہی خرابی پائی
 جاتی ہے چنانچہ نسبت صحت کے دست پتے اور زیادہ مقدار میں آتے ہیں۔
 چون جو یہ بیمار ہی بڑھتی جاتی ہے کہیں تو دست آتے ہیں اور کہیں قبض ہو جاتا
 ہے لیکن درجہ اخیر میں اسہال ہو جاتا ہے۔ بعض حالتوں میں پرودہ پے۔ رمی ٹونیم
 چھ جاتا ہے تب پے۔ رمی۔ ٹو۔ نامی۔ ٹس ہو کر بیمار مر جاتا ہے اور بعض اوقات لمبھو
 استعفا ہو جاتا ہے۔

فے۔ زمی۔ کل۔ سائینس۔ اول پل۔ پے۔ شن یعنی بیمار کے سینہ کو ہاتھوں
 سے چھونا۔ عین ابتدا میں ہنسی کی ہڈی کے اوپر یا نیچے کے مقام پر ہاتھ لگا دین تو
 صرف اتنا ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ دم لیتے وقت صحت کی نسبت کم ہنسی ہے
 شش کی نوک پر ہاتھ رکھیں تو نسبت صحت کے بیمار کے تکلم کی آواز کی جراث
 (دو۔ کل فری۔ فے۔ ٹس) تیز تر محسوس ہوگی۔ اس سے ایسا گمان ہو سکتا ہے
 کہ اس مقام کے نیچے جو پیٹھ کے کی ساخت ہے وہ سخت ہو گئی ہے اور جب یہ
 بیمار ہی بڑھ جاتی ہے اور ہاتھوں کو تکلم کی جراث تیز محسوس ہوتی ہے تو اسی
 شش میں عار کا گمان ہوتا ہے۔ یہ عار شش کی سطح پر ہوتا ہے اور اس میں ہوا
 کی آمد و رفت خوب ہوتی ہے۔ اگر پیٹھ اسکا گھبراہٹ کی حرکات کا مدد سے زیادہ
 دور تک محسوس ہوگا۔

پر۔ کشن۔ عین ابتدا میں جب تک دو نو شش کے اندر ہوا کا گراہی طرح ہوتا

رہتا ہے تشنگ پر کشن کی آواز صاف پیدا ہوتی ہے مگر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ
 پیپڑے کی نوک پر جب بہت سے ٹکڑے ٹھو۔ بر۔ کل کے جمع ہو جاتے ہیں تب
 ہی ٹھونکنے سے آواز ٹھوس ہنہن نکلتی شیر طیکہ مادہ مذکور شش کی عین سطح پر ہوا
 بلکہ خوب اندر ہوا اور سینہ کی دیوار اور سخت پیپڑے کے باہر کوئی حصہ تندرست
 پیپڑے کا آجادے تو ٹھونکنے کی آواز صاف نکلتی ہے سینہ کو اس وقت ٹھونکنا
 چاہئے کہ جو وقت بیمار گہری سانس لے اور اس وقت ہی کہ جو وقت زور سے دم چوڑے
 اس ترکیب سے فائدہ ہے کہ اگر شش میں ٹھو۔ بر۔ کل موجود ہے تو گہری سانس کی وقت
 پر کشن کی آواز جانب مآو ف پر تیر معلوم ہوگی اور جانب تندرست پر ہلکی تیزی
 بہت کم معلوم ہوگی اور زور سے دم لینے کے وقت ٹھونکین تو ٹھونکنے کی آواز جانب
 مآو ف پر نسبت جانب تندرست کے زیادہ تر ٹھوس سنائی دیگی لیکن جب
 بیماری بڑھ جاتی ہے تب ٹھونکنے کی آواز دور دراز تک اور خوب ٹھوس سنائی
 دیتی ہے۔ بیماری کے اخیر درجوں میں کہ جب پیپڑے کے اندر غار پیدا ہو جاتے
 ہیں اور ایک یا کئی چھوٹی چھوٹی غاروں میں پیپ بہر جاتی ہے یا ان غاروں کے
 کنارے سخت ہو جاتے ہیں تب ٹھونکنے کی آواز بالکل ٹھوس سنائی دیتی ہے
 لیکن جب غار دھن پیپ ہنہن ہوتی ہے اور وہ شش کی سطح پر واقع ہوتی ہے
 اور انہر جو حصہ پلورا کا ہوتا ہے وہ مٹا ہنہن ہو جاتا ہے تب ٹھونکنے کی آواز یا تو کم
 ٹھوس یا خوب صاف سنائی دیتی ہے +

اسکل - سٹے - شن - سینہ پر کان لگا کر سنے سے مختلف قسم کی آوازیں سنائی
 دیتی ہیں چنانچہ عین ابتدا میں تنفس کی آواز کی قدر تیر سنائی دیتی ہے اور بڑا سلی دم کی
 آواز بلی ہو جاتی ہے اور تنفس کی دونوں آوازیں بے قاعدہ ہو جاتی ہیں اگر یہ علامتیں
 اکٹم رہیں اور سینہ کی ایک ہی جانب پر پیدا ہوں اور خاص کر ان کے ہمراہ

درامی - کرک - لنگ کی آواز بھی سُنا می تو اسے تو ان سے ٹیو - برکل کا ہونا بہت
 ہوتا ہے - یہ علامتیں عین ابتدا مرض میں سو - پرا اسکے - پیو - لہر اور
 سو - پرا - کلے - وی - کیو - لہر اور انفرا - کلے - وی - کیو - لہر معامون پر پیدا ہوتی ہیں
 اگر ان مقامات میں برائے کئی - ٹس کے فے - زمی - کل سائمنس ایسے تنفس کی تیز آواز
 اور سو - نا - رس اور سب - کری - پے - ٹنٹ آواز میں سُنا می دیوین اور دوسری
 پسلی کے نیچے سمیع ہون اور خاصکر ایک ہی شش پر سُنا می دیوین تو ایسے ٹیو - برکل
 کے ہونے کا گمان ہو سکتا ہے جب بیماری بڑھ جاتی ہے اور بڑی بڑی ہوا کی نالیوں
 کے اندر ٹیو - برکل پیدا ہو جاتا ہے تو اُس مقام کے سینہ پر ٹکلم کی آواز کا صد مہ
 اور تنفس کی آواز میں بھی بہت ہی کم سُنا می دیتی ہیں مگر حصہ ماؤف کے گرد تنفس
 کی آواز تیز ہو جاتی ہے جب شش زیادہ سخت ہو جاتا ہے تب قلب بڑی بڑی
 رگوں کی حرکتوں کی آواز بہ نسبت صحت کے تیز اور دردور اور آواز سُنا می دیتی ہیں
 جب یہ بیماری درجہ دوم میں منتقل ہو جاتی ہے تب نرم اور گلے ہوئے ٹیو - برکل کے
 دالوان کے اندر دم کشی کی ہوا کے گزرنے سے مختلف مقدار کے بلیبلے نالی ٹنٹ کر لگتے
 آواز سُنا می دیتی ہے جب مرض کو زیادہ ترقی ہو جاتی ہے اور شش کی غار
 ہٹوڑی بہت خالی جی ہوتی ہیں تب تنفس کی آواز تیز سُنا می دیتی ہے اور جب وہ
 غار پیپ سے اس قدر پُر ہو جاتے ہیں کہ ان سے نکل کر ہوا کی ان نالیوں میں پیپ
 آجاتی ہے جو غاروں میں کہلاتی ہیں تب میو - کس بااگ - لنگ - رائس سُنا می دیتی ہے
 شش میں جب ٹیو - برکل پیدا ہو جاتا ہے تب بیمار کے ٹکلم کی آواز اس قدر تیز
 سُنا می دیتی ہے کہ کالون کو بڑی محظوم ہوتی ہے اس آواز کو اصطلاح میں
 پاک - ٹا - ری - ڈ - کے کہتے ہیں - جب پہلے سے میں چند چھوٹے ڈالنے
 ٹیو - برکل کے متفرق طور پر اور ہر آدھ چہرے ہوئے ہوتے ہیں تب آواز

خشک اور تیز اور برآمدگی دم کی آواز ملیں اور بعض دفعہ برا نکالنی سمجھ
ہوتی ہے ۔

واضح ہو کہ سہل کی بیماری کئی طور سے شروع ہو سکتی ہے مثلاً بعض دفعہ یہ مرض
ایسے پوشیدہ طور پر بڑھتا جاتا ہے کہ جب تک پیپڑے کے بہت سے حصہ
میں ٹیوہرہ کل نہیں پیدا ہو لیتا ہے تب تک تشخیص میں نہیں آتا لیکن تھوڑی
تھوڑی کہانی ہوتی ہو۔ دم لینے میں تکلیف ہو۔ نبض میرے ہو۔ جسم لاغر اور کمزور
ہو جاوے۔ گرمی زیادہ معلوم ہو۔ اخیر شب کو پسینہ آتا ہو۔ بیمار روز بروز لاغر
ہو جاوے تب البتہ اس بات کا شک ظہور کر سکتا ہے کہ بیمار پوشیدہ طور پر بڑھتی
جاتی ہے۔ اس طریقہ پر بیماری ایسے آدمیوں میں ہو جا یا کرتی ہے جنکی عمر ۱۶ یا ۱۸
یا ۲۰ برس کی ہوتی ہے۔ اس صورت میں بیمار بلا کسی معقول وجہ کے لاغر ہونے
لگتا ہے۔ تھوڑی بہت کہانی ہوتی ہے اور ساتھ اسکے قدرے بلغم بھی آتا ہو
دخارے سُرخ یا گرم ہوتے ہیں۔ پاؤں سرد صبح کے وقت خاص کر گلے اور
جہاتی پر پسینہ آتا ہے۔ نبض اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ ایک منٹ میں ۹۰ یا ۱۱۰
یا ۱۲۰ تک چلتی ہے اور جو صبح ہوتا وہی سی بات سے تیز ہو جاتی ہے اور تنفس
کی حرکتیں کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے کہ بیمار ایک منٹ میں ۲۴ سے ۳۸
دفعہ دم لیتا ہے ۔

دوسرا طریقہ اس مرض کے پیدا ہونے کا یہ ہے کہ بیمار کو دفعتاً شدت کا بھار ہو جاتا
ہے عین ابتدا میں اسکلے رشن اور پرکشن کی کوئی بھی آواز نہیں پیدا ہوتی بلکہ
صغراوی تھے ہوا کرتی ہے۔ بیمارین غلبہ صغرا کا پایا جاتا ہے اور زکام کی علامتیں
موجود ہوتی ہیں تب کہانی شروع ہو جاتی ہے اور دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے
رفتہ رفتہ کہانی بڑھنے لگتی ہے اور بلغم بھی آنے لگتا ہے۔ ابتدا میں تو بلغم بزرگ

یتھیا یا گاڑا اور نیلگوں ہوتا ہے مگر رفتہ رفتہ سبزی مائل اور گاڑا پسا پسا آئینہ آنے لگتا ہے اور بعض دفعہ آسمین خون کی دھاریاں بھی ہوتی ہیں اور بخار بدستور چڑھتا رہتا ہے جس سبب سے بیمار کی توجہ شش کے مرض کی طرف رجوع نہیں کرتی یہ بضر ۱۱ سے ۱۲ تا تک چلتی ہے اور ۱۰۰ سے کم تو کبھی ہوتی ہی نہیں یہ بتدریج بخار ایکٹ - ٹیکٹ فیور کے قسم کا ہو جاتا ہے اور مریض جلد لاغر ہونے لگتا ہے اب اس مرض کے ہونے کا شک بالکل رفع ہو جاتا ہے یہ اس قسم کی بیماری اکثر ان لوگوں کو ہو جاتا کرتی ہے جن کا مزاج اسکا - فیولس ہوتا ہے ۔

میسر طور اس مرض کے پیدا ہونے کا یہ ہے کہ بیمار عین ابتدا ہی سے خون تھوکتے لگتا ہے اور تب وہ علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں جن کا ذکر قسم دوم میں کیا گیا ہے ۔

چوتھا طریقہ اس مرض کا وہ ہے جبکہ اصطلاح میں اکیوٹ پلو - نری - کن - نریز کہتے ہیں اس میں بخار شدت سے ہوتا ہے اور بیماری اس قدر جلد بڑھ جاتی ہے کہ دس روز سے بارہ ہفتہ کے اندر ٹھیک ہو جاتی ہے ۔

علامات تشریحی بعد وفات - پہلے مین دونو قسم ٹیو - بر - کل کے پائے جاتے ہیں مینے مے - لے - اے - ری ٹیو - بر - کل اور گری گرا - نیو - لیشن یا ٹیو - بر - کل کے سینہ زروی میل یا شل سینہ کے ڈنے ہر ایک حصہ میں لیکن خاص کر اوپر کے لوہ پر مختلف مقدار اور شکل کے غار بھی پائے جاتے ہیں جگر بڑھ جاتا ہے اور جگر کے مختلف حصہ میں مادہ ٹیو - بر - کل کا پایا جاتا ہے ۔

لے - بر - ٹکس - ٹر کیا اور ہما کے اندر ٹیو - بر - کل کے جمع ہو جانے سے زخم پڑ جاتے ہیں ۔

بخار ضات - برانکائی - ٹس + نیو - مو - نیو - مو - ری - سی - نیو - مو - ہوا کر

چہارم جب یہ مینون باتیں نبض کے اندر پائی جاویں یعنی زیادتی تو اتر اور صرحت اور اگر نبض کم رہے تو سنینہ کو ضرور امتحان کرنا چاہئے۔ لیکن نبض اگر کم پڑے اور سیریل ہو تو بھی اس بیماری کا شک پڑ سکتا ہے مگر نبض کی ان خاصیتوں سے مردوں میں نسبت عورتوں کے اس بیماری کا شک زیادہ پڑ سکتا ہے کیونکہ عورتوں میں صحت کے اندر بھی یہ مینون قسم کے نبض پائے جاتے ہیں۔ پس جب کوئی بیمار سیریل یا کسی اور عضو کی ساخت کی بیماری کی شکایت کرے تو اس کی نبض کا ملاحظہ ضرور کرنا چاہئے۔ نبض اگر خالی اور تو اتر میں تیز ہو یا بہت خالی اور سیریل ہو یا تو اتر میں کم مگر ٹپ اور سیریل ہو تو سنینہ کو ضرور امتحان کرو اور گھڑی اپنے سامنے رکھ کر نبض کا ملاحظہ کرو ایک دو باتیں یہ اور بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایرویا پیشانی پر دو میا دو میا اور دو ہاتھ اور وہ درد قائم رہے اور جب کبھی نبض کا دل دھڑکتا رہے تب بہتر سے دل میں سیریل کی بیماری کا شک پڑ جانا چاہئے۔

بعض دفعہ کراٹک بڑھکائی۔ ٹش۔ نہ تھائی۔ سس میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے جبکہ جب بڑھکائی۔ ٹش میں بکثرت پیپ کی شکل کا بغم خارج ہوتا ہے اور بیجا۔ لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ بڑھکائی۔ ٹش کی بیماری ہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور ٹش تھائی۔ سس کے زمین اتنی لاغری نہیں ہوتی اور اس میں بخار ہوتا ہے۔ نہ مریض خون تھکتا ہے اور نہ پیٹ رن کے سخت ہو جانے کے اثر ان میں غار پیدا ہونے کے۔ نہ زہری۔ کل سائینس اپنے جاتے ہیں۔ غرض ان باتوں پر توجہ کرنے سے ان دونوں بیماریوں میں فرق کیا جاسکتا ہے۔ لیکن بڑھکائی۔ ٹش ہی یاد رہے کہ کراٹک بڑھکائی۔ ٹش کے دور میں تھائی۔ سس کا مرض اکثر ہو جاتا ہے۔

انجام اس مرض کا ہوتا ہے۔

علاج۔ اس مرض کے ابتدائین مطالب علاج کے ایسے ہونے چاہئیں جن سے مادہ ٹیو۔ پیر۔ کل کا حل ہو جاوے خاص مقام شش سے انفلامیشن یا تو خشک جاوے یا رفع ہو جاوے اور سوم بیمار کو طاقت آ جاوے چنانچہ پہلے مطالب کے حاصل کرنے کے لئے آئیوڈائیڈ اف پوٹا۔ سیم یا آئیوڈائیڈ اف ایرن کا استعمال کریں اور انفلامیشن کے روکنے کے واسطے مریض کو سردی سے بچا دیں اور مین باؤن سے پرہیز کر دیں جس سے دوران خون کو تحریک ہوتی ہے اور واسطے رفع انفلامیشن کے جس خاص مقام سینہ پر دروہو اسپرگاہے گا ہے چند جو کین لگا دیں یا بطور کاؤنٹر۔ ایمری۔ ٹیشن کے سینہ کے اوپر کے حصہ پر کرورٹن۔ آئیل یا ہارٹار ہٹک کے مرہم کی مالش کریں بیمار کی طاقت قائم رکھنے کی واسطے تھوڑی بہت ریاضت کر دیں غذا اچھی اور اچھی آب ہو یا مین بوو بائش کر دین مقویات از قسم فولاد اور کاٹو۔ لیور۔ آئیل کا استعمال کریں۔

دوم جب یہ بیمار ہی اس جہ طور پر ظاہر ہو پڑے اور ایسا معلوم ہو جائے کہ شش میں پیپٹرگنی ہے تو اس صورت میں مطالب علاج کے ایسے ہونے چاہئیں کہ جن سے بلغم خارج ہو خاص مقام شش کا انفلامیشن رفع ہو عسلات اتفاقیہ جو تکلیف دیتی ہوں وہ رفع ہوں اور چہارم بیمار کی طاقت کو قائم رکھنا جائے پہلے مطلب کے حاصل کرنے کے واسطے ادویات ایکٹیو رنٹ کا استعمال کریں مطلب دوم کے حاصل کرنے کی ترکیب پہلے بیان ہو چکی ہے اور عسلات اتفاقیہ میں سے عسلات مفصلہ ذیل نہایت تکلیف دیندہ ہیں۔

اول دل کا دھڑکنا جس کو ۱۰ یا ۱۵ ابوند کی مقدار میں ٹیکو آف ڈی۔ جی۔ ٹے۔ ٹریس سے خاتمہ ہوتا ہے ۔

دوم کہانسی جس کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں ایون یا کیناؤنڈ اسکول۔ پل۔ مہ۔

اکٹرکٹ - کو - نام کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے ۔
 سوم بخار کی شدت اسکے دنیہ کے واسطے بیمار کے بدن کو شیر گرم پانی اور سرکہ سے
 پونچھ دین اور سرورقیات پلا دین ۔

چہارم کثرت سے عرق آنا - اس سلامت کو نسخہ مفصلہ ذیل سے فائدہ ہوتا ہے -
 نسخہ - ٹائیلوٹ - سلیفورک - اسٹیم یا ۳۰ بوند + لاڈ - نم ۱۰ یا ۱۰ بوند + یا
 عرق مار - فیا ۳۰ یا ۳۰ بوند + ہمراہ ایک آؤنس پانی کے تین تین یا چار چار گھنٹہ بعد
 پلا دین اور دو دو گرین ار - گو - تین دن میں تین یا چار دفعہ کھلانے سے پہلے ہی فائدہ
 ہوتا ہے + اور یہ نسخہ مفید ہیں ۔

نسخہ - گیا - بکٹ - اسٹیم گرین + اکٹرکٹ آف ہیمپ + گرین + گلغندہ ایک
 گرین + سبکو ملا کر ایک گولی بنا دین اور ہر رات سوتے وقت کھلا دین ۔
 نسخہ - گیا - بکٹ - اسٹیم گرین + ٹائیڈ رو - بکٹ - رک اف مار - فیا ۳۰ گرین +
 گلغندہ جب ضرورت + سبکو ملا کر دو گولیاں بنا دین اور ہر روز رات کو سوتے وقت
 کھلا دین ۔

نسخہ - اکسائیڈ اف زنک - گرین + اکٹرکٹ اف بلا - دو - نصف گرین +
 دو نو کو ملا کر ایک گولی بنا دین اور دو تین تین دفعہ کھلا دین + پسینہ روکنے کے لئے
 پکٹ - رو - ٹاک - سین کی یہ گولیاں بھی مفید ہیں ۔

نسخہ - پکٹ - رو - ٹاک - سین کے ایک گرین کا سا ٹھون حصہ (۱/۲) لیکر حضرت
 شوہ گراف بکٹ اور گھائی - سی - ریتن اف ٹرا - گا - کانٹھ کے ہمراہ خوب طرح کھل
 کر کے ایک گولی بنا لیں اور دو تین راتیں متواتر کھلا دین + چونکہ اس دوا کا اثر جسم
 میں قدرے قلیل جمع ہو جاتا ہے تو کچھ عرصہ کے بعد اسکو موقوف کر دینا چاہئے ۔
 پانچویں علامت غشیان - اسکو ڈائی - لوٹ - ٹائیڈ رو - سیما بک اسٹیم سے بڑا

فائدہ ہوتا ہے ۔

ششم اسپہال - اس حالت کو قاضیات سے فائدہ ہوتا ہے ۔
ہفتم خون ہو کھار دیکھو اس مرض کو ایسا کی طاقت قائم رکھنے کے لئے غذا مقوی
اور زود مضام کا استعمال کریں اور اس بیماری کے اخیر درجہ میں کہ جب بیمار نہایت
کمزور اور زرد مال ہو جاوے تب ادویات ایسی - میو - لٹ - مشکاوا میں اور امیو - نیا کام
میں لادیں ۔ فرانس کے ڈاکٹر مورس صاحب یو - ڈو - فارم کی بڑی تعریف کرتے ہیں
چنانچہ ایک مریضہ کا حال بیان کرتے ہیں کہ ۱۸ مہینے سے اسکو سٹل کی بیماری تھی
ایہوں نے مقوی دوا کے ہمراہ آیو - ڈو - فارم کا یہ نسخہ آٹھ مہینے کھلایا کہتے ہیں کہ بعد
اس مدت کے مریضہ بالکل تندرست ہو گئی اور شش کا غار بالکل بند ہو گیا ۔
نسخہ - ڈو - ورس باؤڈ ہر گرین ۴ آیو - ڈو - فارم ایک گرین ۴ اکٹر اکٹ اف
جن - شن - ۲ - گرین ۴ سکو ملا کر ایک گولی بنا دیں اور ایسے ایک ایک گولی دن ہر
تین دفعہ ہمراہ مقویات کے کھلا دیں ۔

اطباء کی رائے کافی زمانہ اتفاق ہے کہ سٹل کی بیماری میں خضابان کرپوزوٹ
کا استعمال مفید ہے - اس دوا کے استعمال کرنے کی تین ترکیبیں ہیں - اول اسکو پانا -
دوم شگہانا - سوم مقعد یا فم رحم میں اسکی بھکاری کرنی ۔
اگر پانا ہو تو فار - ما - کو - پیا کا کرپوزوٹ مکسچر بہت موزون ہے جسکے فی آونس میں ایک
قطرہ کرپوزوٹ ہوتا ہے ۔

اسکی خوراک کی مقدار نصف آونس میں مرتبہ ہونی چاہئے اور بعد غذا کے پانا چاہئے
مگر مقدار کو نہایت احتیاط سے بتدیج دواؤں تک بڑھا سکتے ہیں ۔
اگر شگہانا ہو تو نسخہ جات ذیل بہت موزون ہیں - نسخہ - آیو - ڈو - فارم ۲۴ گرین
کرپوزوٹ ۴ قطرے - آئیل آف یو - کے - لپٹ - ٹس - قطرے ۔

مذکور کے دونوں حصے اسپین جڑ جاتے ہیں ۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو حصہ پلو - راکا پسپوں
 پر چسپا ہے اکثر اسپین پہلے انفلا میشن ہوتا ہے ۔ پس واضح ہو کہ پہلے پہل اسپین
 ہے کہ عروق شعیہ کے خون سے پُر ہو جانے کے سبب پرودہ پلو - راکا رنگ خوب ترخ
 ہو جاتا ہے بلکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اُن رگوں کے بعض بعض کے پھٹ جانے سے
 پرودہ پلو - راکا پر جا بجا خون کے دبے بہی پڑ جاتے ہیں ۔ پرودہ خشک ہو جاتا ہے اور
 اسکی جھا جاتی رہتی ہے اور مکدر ہو کر موٹا بھی ہو جاتا ہے ۔ بعد ازاں ایسا ہوتا ہے
 کہ لف پیدا ہو کر پرودہ مذکور کے بہت حصے چسپان ہو جاتا ہے ۔ مقدار اور
 خاصیت اُس لف کی مختلف ہوتی ہے اور اکثر تہ بہ تہ جمع ہوتی ہے ۔ اب مگر بعض
 دفعہ عین ابتدا ہی سے آب خون میں غامی برین ملا ہو اُس پرودہ کی تہیلی میں تداثر
 پانے لگتا ہے اور اسپین غامی - برین کے ٹکڑے اوپر اوپر تیرتے پھرتے ہیں ۔
 مقدار اُس آب خون کی مختلف ہوتی ہے مگر بعض دفعہ اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ
 پلو راکا کی ساری تہیلی پھر جاتی ہے تو پڑا بہت اسپین خون بھی ہو سکتا ہے اور
 سٹرانڈ کے شروع ہو جانے سے کچھ تھوڑی سی گیاس بھی کیسہ مذکور میں پیدا ہو جاتی
 ہے ۔ جب یہ بیماری رو بصحت لایندہانی ہوتی ہے تب آب خون اور لف جذب
 ہونے لگتا ہے اس مادہ کے بہت سے حصہ میں اتنی ہو جاتی ہے اور تب وہ جذب
 ہو جاتا ہے ۔ باقی کے حصہ میں خون کی رنگین پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ جاندار کو
 پرودہ پلو راکا کے دونوں حصوں کی پسلیوں سے جوڑ دیتا ہے ۔ بعض دفعہ جب بیماری
 طبیعت میں تشک یا گاؤٹ یا رو - ما - ٹیزم یا اسکرا - فیو لاکا مادہ ہوتا ہے
 تب اور دیگر لوہے سے بھی آب خون جذب ہونے لگتا ہے بلکہ پلو راکا کی تہیلی بھی
 میں رہ کر گندہ ہو جاتا ہے اور پیپ کی شکل پکڑ لیتا ہے ۔ شش کا یہ حال ہوتا ہے
 کہ اگر کسی بیماری کے سبب پہلے سے سخت ہو گیا ہو تب پہلے تو آب خون تیز

تیر کر سانسے کی طرف اُٹھ آتا ہے بعد ازاں اس پانی کے دیاؤ سے دھبے دیتے اس قدر
دوب جاتا ہے کہ مثل تکر گوشت کے ہو جاتا ہے۔ دیاؤ جلد ہٹ جاوے تو پہچڑا پسلی کے
پہر حالت اصلی پر آسکتا ہے نہین تو ہمیشہ کے لئے سخت ہو کر بیکار ہو جاتا ہے یا اس میں
کمی اور قسم کی خرابی پیدا ہونے لگتی ہے۔

پلو۔ ری۔ سی کی بیماری اکثر تھوڑے ہی حصہ پر محدود رہتی ہے اور اس جگہ تندرستی
لفظ پیدا ہو کر مقابلہ کی سطح کو جوڑ دیتا ہے۔ مثلاً ذونا و پلو۔ ری۔ سی کی بیماری دونوں
طرف ہو جاتی ہے۔

کہ ایک پلو۔ ری۔ سی اس وقت کہتے ہیں کہ جب پلو۔ راکے دو ٹو حصے سرسبز چڑیا بن گئے
اور پسلیاں اندر کی طرف خم کھا جاتی ہیں اور نتیجہ اکیوٹ پلو۔ ری۔ سی کا ہوتا ہے۔
یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آب خون جو اکیوٹ پلو۔ ری۔ سی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے
وہ خون کا تین روہ جاوے اور جذب ہونے کے بلکہ پیپ کی شکل کا بنجاوے اور اس صورت
میں اس حالت کو اصطلاح میں ام پائی۔ میا کہتے ہیں۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ
سے کوئی سوراخ پیدا ہو جاتا ہے اسے آب خون ہوا کی نالی میں یا تو برابر جاری رہتا ہے
کو جس حالت کو فٹن چھو۔ ٹن۔ ام۔ پائی میا کہتے ہیں یا شاید نادر رو دون میں رہتا
رہتا ہے۔ لگا ہے لگا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کرائٹ پلو۔ ری۔ سی کی حالت میں یا تو ایک
شروع ہی سے خاصہ کہ جب یہ مرض کسی کو دوسری دفعہ ہو جاتا ہے۔ فرمن طور پر ظاہر
ہوتا ہے۔

یاد رہے کہ جب یہ بیماری بائین جانب ہوتی ہے اور اس میں آب خون بکثرت تراوش
پاتا ہے تب دل اپنی جگہ سے کہک کہ کبھی قدرہ ہنی طرف آ جاتا ہے۔
اقسام۔ یہ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک اکیوٹ دوسری کرائٹ۔

اول اکیوٹ پلوریسی

علامت عامہ۔ بیمار کو جاڑے کے ساتھ تخت آتا ہے۔ پہلو تو سینہ میں بوجھ معلوم ہوتا ہے لیکن تھوڑے ہی عرصہ بعد پستان کے چٹے ایسی شدت کا درد پیدا ہوتا ہے کہ گویا کوئی بے چہرہ گھبراہٹ ہے ٹیس اس درد کی منہلی ٹھہری اور بغل تک محسوس ہوتی ہے تھوڑی بہت سہ کمی کہانی بھی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس مرض کے ساتھ جب برائے کائی۔ ٹس۔ یا تو نوبیا یا سائل کی جاری بھی ہو جاتی ہے تب کہانی زیادہ ہوتی ہے اور ان بیماریوں کے خاص قسم کا بلغم بھی اخراج پاتا ہے۔ چہرہ مریض کافہ کہندہ ہوتا ہے۔ دم لینے میں اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ مریض سینہ کو حرکت نہیں دے سکتا بلکہ شکم کی حرکت سے سانس لیتا ہے۔ دم لینے یا کھانسنے۔ باب ماؤف کی طرف ٹٹنے سے درد کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ نسل یوج اور سخت ہو جاتی ہے زبان میلی اور اُس پر سفید زخم جاتی ہے۔ پیشاب کم اور سُرخ رنگ کا آتا ہے۔ جسم گرم اور رخسارے سُرخ ہو جاتے ہیں جب پلوریسی۔ سی کی جاری میں پیپ پڑ جاتی ہے اور وہ پیپ سینہ کے جوف میں جمع ہو جاتی ہے تب اس مرض کو ام۔ پائی میا کہتے ہیں۔

فی۔ نرمی۔ کل۔ سائنس۔ عین ابتداء میں سینہ کو ٹھوکنے سے آواز کی صفائی میں چند ان فرق نہیں پڑتا لیکن جب لف پیما ہو جاتا ہے تب ٹھوکنے کی آواز کستھدہ ٹھوس ہو جاتی ہے کان لگا کر سنیں تو دونوں حصے پلورہ کے آپس میں رگڑنے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے جبکہ اصطلاح میں ڈک شن سوانڈ بولتے ہیں پہلو تو یہ آواز نہایت مائع اور ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کر جاتی ہے لیکن پلورہ کی سطح پر جب لف کے والے پیدا ہو جاتے ہیں تب ایک ہی جگہ پر قائم رہتی ہے اور زیادہ تر تیز ہو جاتی ہے ہم اس آواز کی تشبہ اس آواز سے دے سکتے ہیں جو کسی چوٹی کے کان کے اندر داخل

ہونے سے پیدا ہوتی ہے جب سیرم پیدا ہوتا ہے تب مقعد سیرم کی جب تک تھوڑی ہوتی ہے تب تک بیمار کے تکلم کی آواز اس پتلے طبق پانی کے اندر سے ہر اکہا کم کا نوں کو ایسی سُسنائی دیتی ہے جیسے کوئی بکری میما رہی ہے۔ اصطلاح میں اسے آواز کو امی۔ گا۔ نو۔ نی کہتے ہیں لیکن پانی کے زیادہ پیدا ہونے سے ای۔ گا۔ نو۔ نی ہی نہیں سُسنائی دیتی * اُس وقت صرف تنفس کی آواز کمزور سُسنائی دیتی ہے اور چون جوں حقد پانی کی زیادہ ہوتی جاتی ہے تنفس کے آواز کمزور ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ جب سینہ پانی سے پُر ہو جاتا ہے تب کوئی بھی آواز مسموم نہیں ہوتی * بیماری کے اس درجہ میں اگر سینہ کو ٹھوکے تو آواز بالکل ٹھوس پیدا ہوتی ہے اور پیلوون کے سج کی جگہ بالکل ہموار بلکہ اونچی ہو جاتی ہے مگر بچوں میں پلو۔ را کی تھیلی کے اندر پانی پیدا ہونے کے جو جو علامتیں اوپر بیان کی گئی ہیں انہیں اختلاف ہوتا ہے چنانچہ جب پلو۔ رمی۔ سی کی بیماری کے سبب سے بچوں کے سینہ کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے تب سبب اسکے کہ سینہ انکا زیادہ تر نرم اور پھیلنے کے قابل بہت ہوتا ہے پانی پیدا ہوتے ہی سینہ بہت ہی پھیل جاتا ہے مگر بہت جوالون کے بچوں کے اندر رونی اعضا پانی کے پیدا ہونے سے ادھر ادھر کم کسک جاتے ہیں عموماً وہ این سینہ پانی سے بہت زیادہ چڑھی ہو جاتا ہے تب ہی براکیئل۔ بری۔ ونگ کی آواز سُسنائی دیتی ہے اور ڈوئل رتی زونڈر بھی تیز ہوتا ہے +

اسباب - پری۔ ڈسپو۔ زنگ۔ وجع مفاصل کا ہونا +
ایکسا میڈنگ کا ز۔ سردی کا لگنا۔ صدماتِ بیرونی۔ کسی سید کا ٹوٹ جانا وغیرہ جسم میں بخار کا ہونا۔ متصل کے اعضا میں انفلامیشن کا ہونا۔ شش میں مادہ ٹیو۔ بر۔ کل کا ہونا +

تشخیص - پلو - رو - ڈی - نیا کی (یعنی چھانی کے گوشت کا درد) پلو - رو - سی
 سے فرق کرنا آسان ہے کیونکہ ان دونوں کی علامتوں میں بڑا فرق ہے۔ بلکہ پلو - رو - سی
 اور نیو - مو - نیا میں اکثر فرق کرنا پڑتا ہے۔ پس یاد رہے کہ نیو - مو - نیا کا نیا بہت
 شدید ہوتا ہے جلد کی حرارت زیادہ تر تیز اور چہرہ ہی زیادہ تر سرخ ہوتا ہے مگر
 سینہ کا درد مثل برچی گھونے کے نہیں ہوتا جیسے پلو - رو - سی میں ہوا کرتا ہے
 نیو - مو - نیا میں رس - لٹے - اس - پیو - ٹم خارج ہوتا ہے مگر پلو - رو - سی میں
 نہیں۔ علاوہ ازیں کری - پے - ٹنٹ رائکس خاکہ کر نیو - مو - نیا ہی میں پیدا ہوا
 کرتا ہے۔ نیو - مو - نیا میں پہلے راجب سخت ہو جاتا ہے تب ٹھوکنے کی آواز سمجھ
 ٹھوس نہیں ہوتی جبکہ پلو - رو - سی میں سینے کے جوف میں بانی کے جمع ہو جانے
 سے ٹھوس پیدا ہوتی ہے اور بیمار کی کرٹ بدلنے سے نیو - مو - نیا کی ٹھوس آواز
 کی حد نہیں بدلتی بلکہ حد اس ٹھوس آواز کی اس خط کے برابر ہوتی ہے جو پیچے کے
 گوشہ کو اوپر کے گوشہ سے علیحدہ کرتا ہے پس واسطے نیو - مو - نیا کی ٹھوس آواز
 کی حد تجربی ہوتی ہے اور افعی نہیں ہوتی جیسے پلو - رو - سی میں بانی کی سطح
 کے افعی طور پر ہونے سے پر - کشن کی ٹھوس آواز کی حد افعی ہوتی ہے۔ مریض کے
 تکلم کی آواز کی جھراٹ (ڈوڈ - کل - زری - مے - فٹ) پلو - رو - سی میں نہیں
 پیدا ہوتی مگر نیو - مو - نیا میں خوب تیز سنائی دیتی ہے۔
انجام ایک ہی جانب کی پلو - رو - سی کا انجام اکثر نیک ہوتا ہے اور بیماری اگر
 دونوں طرف ہی ہو پہلے ہی انجام ہمیشہ خراب نہیں ہوتا اور بایئٹس ڈیزیز یا سل یا
 سرطان وغیرہ مریضوں میں جب یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے تب ہی اس مرض سے
 بیل تلف نہیں ہوتا۔

دوم کرانک پلورسی

یہ مرض یا تو نتیجہ بیماری شدید کا ہوتا ہے یا ابتدائی سے اسکی علامتیں خفیف پیدا ہوتی ہیں اور بیمار کو دم لینے میں اور جانب تندرست کی طرف لیٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ بخار ہوتا ہے۔ نبض تیز چلتی اور مریض لاغر ہو جاتا ہے *

علاج۔ اس بیماری میں مریض کے سینہ کو جب قدر کم حرکت ہوتی ہے درود اور کھانسی کو سبب قرار دیا جاتا ہے۔ پس سینہ کو آٹھی کنک کی دھجیوں سے قائم کر لیں یا غزالین سے سینہ کو خوب طرح لپیٹ دیں۔ مریض طاقتور ہو اور بیماری بھی نہایت شدت کی ہو تو ابتدا میں مریض کے سینہ پر جب طاقت چند جو کین لگا دیں اور تب پولٹس باندھیں یا فوسن۔ ٹے۔ شن کرین اور دوا کے طور پر کیا۔ لو۔ مل کرین ایفون ایک گرین تین تین یا چار چار گھنٹہ بعد دیویں اور جب مرض کا زور سبب کم ہو جاوے تو ماؤف سینہ پر ایک بڑا سا ہلٹر لگا دیں اور جب پانی پیدا ہو جاوے تب سینہ پر مرہم سیاب کی مالش کرین اور ان گولیوں کو تین تین یا چار چار گھنٹہ کے بعد کھلا دیں *

لشٹن سفوف ڈی۔ جی۔ ٹیلز ایک گرین * سفوف اسکویل۔ ایک گرین * بلو پیل۔ سہ گرین * اسکی ایک گولی بنا دیں۔ اس سے فائدہ ہو اور بیمار کو دم لینے میں تکلیف ہو۔ چہرہ نیلگون اور فکر مند ہو جاوے تو پانچویں چھٹی پیل کے بیچ میں ٹرو۔ کار۔ کتو۔ لا داخل کر کے پانی نکال لیویں * اس مرض کے پانی کے جذب کرنے کے واسطے فرانس کے ڈاکٹر پٹیر صاحب جلد کے اندر پیے۔ لو۔ کار۔ پین کی بچکاری کو بہت مفید جانتے ہیں۔ اس بچکاری کے کرنے سے فوراً پسینہ آ جاتا ہے اور تھوک بھی کثرت سے پیدا ہوتا ہے جس سے

سینہ کا پانی جذب ہو جاتا ہے۔ مقدار بچکاری کی ایک گرین کا ۱/۲ حصہ *
 واضح ہو کہ بعض طبیب ابتداء میں کیا۔ نو۔ مل کا استعمال منع کرتے ہیں بلکہ
 مار۔ مار۔ مار۔ اے۔ ٹکٹ یا ا۔ کو۔ ٹائیٹ سے دوران خون کی تیزی کو کم کرنا
 برکتاتے ہیں *

دوم ٹائیڈ رو۔ تھو۔ ر کس

تقریف۔ اس بیماری میں ایک یا دو نوجانب کی پلورا کی تہیلی میں سیرم پیدا
 ہو جاتا ہے یہ مرض از قسم ڈراپ۔ سی کے ہے پلورا یا پیٹریس یا قلب یا گردوں
 یا بڑی بڑی رگوں کی بیماری کے باعث پیدا ہوتا ہے *
 مامیت۔ بعد وفات کے لاش کے امتحان سے سینہ کے اندر دو طرف
 تھوڑا بہت پانی پایا جاتا ہے رنگت اسکی یا تو پانی کے طور پر ہوتی ہے یا کھنٹی
 سبزی لیل۔ مقدار اسکی اکثر آٹھ یا نو یا نیٹ تک ہوتی ہے *
 علامات۔ سینہ کے اندر پانی یا تو تہیج یا دفعتاً بھر جاتا ہے جب قدرت
 بھرتا ہے تب چند ان تکلیف دہندہ علامتیں نہیں پیدا ہوتیں مگر اس صورت میں
 ہی دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تھوڑا بہت بھرم آتا ہے۔ چہرہ اور لب نیلگون
 ہو جاتے ہیں۔ پاؤں میں آماس ہو جاتا ہے۔ نبض یا تو غیر معمولی اور جلد چلتی ہے اور
 پیشاب بہت کم پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ پانی کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے تب تک
 تو ریض چت لیٹ سکتا ہے لیکن جب بہت سا پانی دفعتاً پیدا ہو جاتا ہے تب
 پیٹریس دب جاتے ہیں اور انکی حرکت فوراً کم ہوجاتی ہے۔ چہرہ بیمار کا نیلا اور دم
 لینے میں کمال تکلیف ہوتی ہے * لیکن رفتہ رفتہ پیدا ہو کر جب سینہ پانی سے
 خوب بھر ہو جاتا ہے تب بیمار سے لیٹا نہیں جاتا کیونکہ لیٹنے سے پانی شش کی جڑوں

سبک ہیکل ہوا کی بڑی بڑی نالیوں کو دبا دیتا ہے اسوقت مریض کا دم بند ہونے لگتا ہے اسلئے ٹیکہ یون بڑیک لگا کر اپنے سر کو سامنے جھکا کر بیٹھا رہتا ہے جب یہ بیماری دل یا کسی اور عضو کی بیماری کے سبب پیدا ہوتی ہے تب پہلے پاؤں یا ہاتھوں کے پوٹے سوچ جاتے ہیں۔ پیشاب زیادہ اور اس میں البیو۔ من ہوتا ہے یا کم اور شرج رنگ کا آتا ہے اور دیگر علامات ڈراپ۔ سی کی بیماری کی پیدا ہوتی ہیں جب پانی کی مقدار زیادہ رہتی ہے تب سینہ کے کان لگا کر منے سے کریسل میں پانی میو۔ کس۔ راکس۔ اور کافنی اور گاہے گاہے اسے۔ کافنی بھی ششائی دیتی ہے جب پانی جذب زیادہ ہوتا ہے تب سینہ کو ٹھونکنے سے آواز ہٹوس پیدا ہوتی ہے اور ششوں کا کافنی آواز آتا ہے۔ کافنی ششائی دیتی ہے اس جانب کے سینہ کی حالت باقی رہتی ہے اور یہ جانب سینہ کی ادھی بھی ہو جاتی ہے اور سیلوں کے نیچ کی جگہ۔ ہیکل اور بھی ہو جاتی ہے جب پانی کے ہمراہ ہوا بھی ہوتی ہے تب سینہ کے ہاتھ سے ٹپ ٹپ کی آواز پیدا ہوگی۔

تشخیص۔ اس بیماری کو مرض بلو۔ ری۔ سی سے فرق کرنا چاہیے چنانچہ اس مرض میں مثل بلو۔ ری۔ سی کے شدت کا زور نہیں ہوتا اور کھانسی بھی کم ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی لیکن اس مرض میں بے نسبت بلو۔ ری۔ سی کے زیادہ تر تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس میں اکثر سینہ کی دونوں طرف پانی جمع ہو جاتا ہے مگر بلو۔ ری۔ سی میں اکثر ایک ہی جانب میں ہوتی ہے مائید رو۔ تہو۔ رکش میں پانی چڑھ کر سینہ کی دونوں طرف بھر جاتا ہے اسلئے دائیں جانب میں قائم رہتا ہے لیکن بلو۔ ری۔ سی میں چپ بائیں جانب میں ہوتی ہے تب دل دہنی جانب کسک آتا ہے۔

علاج۔ اس بیماری کو دیا کرنا چاہیے کہ جس سے پانی جذب ہو جاوے چنانچہ اس مریض کے مہل کرنے کے واسطے مدرات کا استعمال کرتے ہیں۔

لنخہ - سفوف ڈھی رچی - لٹے - لٹس اور اسکینٹل - پوڈ ایک ایک گرین - بلو پل
 م - گرین - واسکی ایک گولی بنا کر چار چار گنڈہ بعد کھلاوین اور ساتھ ان گولیوں
 کے - تم گرین ٹائیٹر اور دھابوڈ ٹنگھ انٹ اسٹیل سمراہ دو آؤنس پانی کے دن میں
 تین دفعہ پادین اور ان مہمون میں سے کسی مہم کی مالش کریں -
 لنخہ - ہائی - کلورائیڈ اف - مرکب - ری ہریاہ گرین - پکینوڈ - آئیوڈین - آئیٹ
 - ریہ ڈرام - چربی سو ڈرام یا ایک آؤنس - سکولہ لالین -
 لنخہ - ہائی - کلورائیڈ اف - مرکب - ری ہریاہ گرین - آئیوڈائیڈ اف - پوڈاسیم
 م ڈرام - ڈوسٹڈ واٹر جب ضرورت - چربی ایک آؤنس - سکولہ لالین -
 جب اس علاج سے فائدہ نہیں ہوتا ہے اور بیمار کو دم لینے میں کمال تکلیف
 ہوتی ہے تب سینہ کو چھید کر پانی نکال دیتے ہیں -

سوم نیو - مو - تھو - رکنس

تعریف - پلورائیٹیلیٹین ہوا کا بہرہ جانا لیکن ہوا کے ساتھ جب پانی بھی پیدا
 ہو جاتا ہے تب اس مرکب بیمار کی کوٹائیڈ رو - نیو - مو - تھو - رکنس بولتے ہیں -
 مامیت - ان صورتوں میں پلورائیٹیلیٹ کے اندر ہوا بہرہ جاسکتی ہے -
 اول - جب باہر کی ہوا کا داخل پلوراکے اندر نہیں ہو سکتا ہے تب ایسا قیاس
 کرتے ہیں کہ پلوراکے اندر کسی رطوبت کے متغض ہو جانے سے یا خود پلوراکے
 کے گرد اور پر پڑ جانے سے ہوا پیدا ہوتی ہے -

دوم - جب ایسا - فی - گس (مری) یا معدہ کھجاتا اور چھیدا جاتا ہے اور وہ
 سوخا پلورائیٹیلیٹ میں جا کھداتا تب بھی پلوراکے اندر ہوا بہرہ جاسکتی ہے -
 سوم - جب ضرب و زخم یا کسی دھنسل کے باعث پلورائیٹ چھیدا جاتی ہے اور باہر کی

ہوا پلورا کی تہیلی کے اندر داخل ہو جاتی ہے *۔

چھبہ - جب سہل کی بیماری میں سش کے اندر زخم پڑ جاتا ہے اور زخم پلورا کی تہیلی میں پھوٹ جاتا ہے تب بھی پلورا میں ہوا ابھر جاسکتی ہے لیکن زیادہ ہے کہ پہلے تین طریقے اس مرض کے پیدا ہونے کے بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں بلکہ یہ بیماری چوتھے ہی طریقہ سے اکثر پیدا ہوتی ہے۔ پس جب یہ مرض اس چوتھے طور سے پیدا ہوتا ہے یعنی جب سش میں زخم پڑ جانے سے پردہ پلورا چھد جاتا ہے اور اسکی تہیلی میں ہوا ابھر جاتی ہے تب یہ علامتیں پیدا ہوتی ہیں *۔

علامات - جانب مؤف میں نہایت شدت کا درد دفعتاً پیدا ہو جاتا ہے اور مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس جانب کا کوئی عضو چر گیا ہے اور کسی طوبت کے قطرات ٹپکتے ہوئے یا اسکی دھڑکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ دم لینے میں کمال ہی تکلیف ہوتی ہے جس سے ماتہ پاؤں سر ہو جاتا ہے اور بدن سرد پسینہ سے عرق عرق ہو جاتا ہے۔ غرض جب پلورا کی تہیلی کے اندر ہوا ابھر جاتی ہے تب ہم گھٹنے یا اس سے کم عرصہ میں دھان پانی بھی پیدا ہو جاتا ہے مگر پانی کے پیدا ہونے سے پہلے مریض کثرت لیٹا رہتا ہے۔ نبض نہایت جلد چلتی ہے۔ چہرہ فکر مند اور آسہلانا تکلیف کے پائے جاتے ہیں۔ لیکن رخسار سے اور چہرہ اکثر نیلگیں ہو جاتا ہے۔ سینہ بالکل منہر پڑتی بلکہ مریض گاہے گاہے اونگھتا ہے اور چونک پڑتا ہے۔ آواز سیدھ جاتی ہے اور بعضہ خوب بالکل سُنا ہی نہیں دیتی *۔

علامات سینے کے - جب سینہ کے اندر صرف ہوا ہوتی ہے تب سینہ بہت کم حرکت کرتا ہے بلکہ نیچے کا سینہ بالکل بے حرکت ہوتا ہے۔ سینہ

اس قدر ہر سلیجنا ہے کہ سلیبون کے بیچ کی جگہ بھی ہسٹیکر اوپن ہو جاتی ہے۔ سینہ کے ٹھونکنے سے آواز مثل تبتور کے نکلتی ہے۔ جب سرفہر ہو اکی اوسط ہوتی ہے تو تنفس کی آوازیں کمزور ہو جاتی ہیں لیکن جب ہوا بہت زیادہ بھر جاتی ہے تو کوئی بھی آواز نہ ہنیں سُنائی دیتی ہے۔ جب ہوا کے ہمراہ پانی بھی سدا ہو جاتا ہے تب بیمار چاہے جس کو ڈپر ہو ٹھونکنے کی آواز اوپر سے صاف آوریجے۔

ٹھوس سُنائی دیگی اور سینہ پر کان لگا کر سُنے سے پانی اور ہوا کی آپس میں بکریاں سے ڈھل ڈھل کی آواز سُنائی دیگی علاوہ آوازیں ایک اور آواز پیدا ہوتی ہے جسکو اصطلاح میں مے۔ ٹماک۔ ٹنگ۔ ٹنگ کہتے ہیں۔ اس آواز کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سیرم لینے اب خون کے قطرات اوپر سے پانی پر گرتے ہیں تب یہ آواز پیدا ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک یہ آواز ہوا کے بلبلوں کے بہنے کی ہے۔

علاج۔ سینہ پر پچھانگا کر گلاس بٹھا دیں اور مریض بہت ہی کمزور ہو تو مرث ڈرامی۔ کینک کریں۔ اس ترکیب سے نہایت فائدہ ہوتا ہے اور جانب ڈاف پر متواتر بلٹر لگانا بھی فائدہ مند ہے۔ قبض ہو تو ملکے مسہلات سے ملین کریں اور غذا مقوی اور نرم و ہضم دین دم لینے کی تکلیف کے رفع کرنے کے لئے ادویات انہیس۔ پاز۔ مو۔ ڈوک مثلاً لو۔ پے۔ لیا اور گانجا بلا۔ ڈونا۔ دھتورا۔ اکو۔ ٹماٹ اور انہیسوں کا استعمال کریں پانچ پانچ گرین کی مقدار میں مشک کے بھلانے سے یہ بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جب کسی ترکیب سے رفع تکلیف نہ ہو سکے تو سینہ کو چھید کر پانی نکال دیں۔

باب امراض آلات انضمام لبطن مقالہ اول امراض زبان و دہن و گلو

زبان کی بیماریاں

زبان ایک لحمی عضو ہے جو منہ کے اندر ہوتا ہے۔ اس پر ایک میوہ کس پر وہ چسپان ہے جس پر بے شمار غدود مین ترکیبوں سے چہرے ہوتے ہیں۔ کئی شریانوں سے اس میں باخراطاقین پرستکتی ہیں۔ چنانچہ مثل لثامہ اعضا کے اس میں بھی انفعالی مشین ہو سکتا ہے جس سے زبان پھول کر درد کرنے لگتی ہے اور پانی جاری ہونے لگتا ہے۔ اس کے انفعالی مشین کو اصطلاح میں گلابی ریش کہتے ہیں۔

علاج چھتہ کرین اور منہ میں برف رکھیں۔ زبان بہت پھول گئی ہو تو لمبائی سے بچھپا لگائیں تاکہ خون اور پانی خارج ہو جاوے۔ درم کے سبب سے دم بند ہونے لگے تو عمل ٹرے کیا۔ مٹی کرین۔

زبان پر زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ زخم کئی قسم کے ہوتے ہیں چنانچہ بعضہ نفع پیدا ہوتا ہے کہ معده یا رودہ میں جب کسی طرح کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تب زبان کی بالائی سطح پر زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔

علاج ایسا سودا کہ کاغذہ یا سودا کہ کاغذہ کا عرق لگائیں۔ ایسی ادویات کہانے کو

مخون ہو جاتا ہے اور اس کی شریانیں ان اعضا میں راض زبان پر کئی قسم کی

وین جن سے مامنہ درست ہو +

بعض اوقات انفلاشن کے سبب پہنی بان پر چھوٹے چھوٹے زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ انکو بھی قیضات کے غرغره یا لگانے سے فائدہ ہوتا ہے جیسے پشکری سوڈا، گھوٹیا وغیرہ۔ ادھکھانے کے لئے کورٹ اف پوٹاش میناجائیوہ دوسرے اور تیسرے درجہ کے آشک کے سبب زبان پر زخم اور سو۔ راجی ستر کی چین پیدا ہو جاتی ہیں +

علاج۔ نائے۔ ٹریٹ اف سلورنگا دین ادھکھانے کو سیلاب اور یوٹوڈائن پٹام دین +

کن۔ سرف وی۔ ٹنگٹ

زبان پر جب سرطان کی بیماری ہو جاتی ہے تب اس پر خفیف قسم کا زخم پیدا ہو جاتا ہو کنہارے جکے اٹے ہوئے ادھ پیندا اونچا بیچا ہوتا ہے +

علامات۔ اس بیماری کی ساری علامتیں تین تین یعنی شدت کا یہ کہتے ہیں۔ رال کا بہنا اور کمزوری جو سرطان کی بیماری میں اکثر ہوا کرتی ہے + پہلے پہل تو زبان چھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور نکلنے میں درد ہوتا ہے تب نہایت شدت کی پیشیز کا فون تک پہنچتی ہیں۔ رال کثرت سے بہتی رہتی ہے۔ زخم خون خون بڑھتا جاتا ہے نہایت بدبودار عفونت خارج ہوتی رہتی ہے۔ بیمار جلد اناغرا اور کمزور ہونے لگتا ہے۔ راتین قیامت کی گزرتی ہیں۔ درد کی تکلیف۔ لکھ کی تکلیف اور نکلنے کی تکلیف ہر آن بڑھتی جاتی ہے + گاہے گاہے خون بھی جاری ہوتا ہے اور زبان بھول جاتی ہے تب یا تو دم بند ہو کر یا نڈھال ہو کر بیمار تلف ہو جاتا ہے +

علاج۔ یہ مرض لاعلاج ہے۔ درد کی تخفیف کے لئے ہسینون کا استعمال کریں

خون بند کرنے کے لئے قابضات لگا دیں اور دوا اور غذا مقوی سے طاقت کو قائم رکھیں۔ اور جب تکلیف زیادہ ہوتی ہے تب عمل جراحی سے زبان کو کاٹ کر نکال ڈالتے ہیں۔ زبان بعض بعض جگہ سے چر بھی جاتی ہے جس سے بیمار کو کہانے اور گفتگو میں کمال تکلیف ہوتی ہے، اشقوت پر سوہاگ یا سیمتہ لگا دیں اور کہانے کو کھوٹ آف بڑا شادین۔ بعد نفع زبان پر گول گول یا بیضوی شکل کے چمکنے چمکیلے دماغ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اکثر یہ بیجا تشک کا ہوتا ہے تو سیاب کے مرکبات کا استعمال کرنا چاہئے۔

زبان کے نیچے سبب - گت - زمی - لری - غدود کی مجری ہوتی ہے بعض نفع اس میں ایک گاڑی طوبت جمع ہو کر رسولی بن جاتی ہے جبکہ اطفال میں رسی - نیو - لا یولتے ہیں - رطوبت کو نشتر نکال دینا چاہئے اور تب قابضات کی نگہی کرانی چاہئے۔

اسٹو-مے - ٹائیٹس یعنی دہن کا انفلایشن

یہ بیماری چار قسم کی ہوتی ہے - اول اسٹو-مے - ٹائیٹس اری-تے - مے - ٹو زام دوم اسٹو-مے - ٹائیٹس ڈو-لے - کیو-لے - رس سوم اسٹو-مے - ٹائیٹس فنگو-زاد چہارم اسٹو-مے - ٹائیٹس گنگری - نو-زا۔

علامات قسم اول - یہ بیماری نہایت نچے بچوں کو ہوا کرتی ہے سہمیں دہن و زبان گرم سرخ اور بعض نفع خشک ہو جاتے ہیں اور زبان کی نوک اور کناروں پر چھوٹے چھوٹے دانے پیدا ہو جاتے ہیں - یہ بیماری اکثر معدہ اور امعاء کے انفلایشن بہر

ہوا کرتی ہے۔ جب یہ مرض چھ مہینے سے نو مہینے کے بچوں کو ہوتا ہو تو اکثر اس میں بخار ہو جاتا کرتا ہے۔ اس مرض کا انفلاشن سارے دہن میں بلیون تک پھیل سکتا ہے اور لیمن اس میں بہو لکڑیٹ بھی جاسکتی ہیں بعضہ نئے پھر مرض ہر پیر کے دانے ہی پیدا ہو سکتے ہیں جب مرض مزمن ہو جاتا ہے تو اکثر اس میں بہت کثرت سے الہتی ہوتی ہے۔

علاج۔ دہن زبان خشک ہونے کو سیدانہ کی پوٹلی پانی میں تر کر کے بچہ کے منہ کے اندر بار بار پیسین اور غذا دودھ کی دیوین اگر معدہ میں کسی طرح کی خرابی ہو تو اس کا علاج کریں۔
 علامات قسم دوم۔ اس بیماری میں لیون رنگا لون کے اندر کیجا تہ زبان میں دہن چڑھ جاتا ہے گول گول لہرے ہوئے سفید لہرے کے متفرق دانے پیدا ہوتے ہیں ان لون کی نوک میں بی ہو جاتی ہیں جب یہ لٹ جاتے ہیں تب تھوڑی سی سیدر دہن تکلیف ہے اور اگلی جگہ پر ایک چوڑا سا زخم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری بچوں کو دانت نکلتے وقت ہو جاتا ہے۔

ہے اور سن آدمی بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں اسباب خرابی اسکا باعث ہون کی جڑی گلیٹوں میں انفلاشن ہو جاتا ہے۔ علاج باہمی کار۔ لونٹ اف سوڈا دیا اگر گریز یا دودھ کا استعمال کریں۔
 زخم پھر عرق یا سیرت اف سلوٹکار میں علامت قسم سوم۔ اس بیماری کو تھرش اور اف بہت ہی جلد سے ہوتا ہے۔ اس بیماری میں ایسا ہوتا ہے کہ لیون اور گالون اندر دوسوٹون تالو اور مان سیل گلاڈ یہ اور زبان کے اوپر اور نیچے اور خاص کر کنارہ پیر سفید مخرطی ایک قیدر گول ایچ لون کے طور کے اونچی اونچی چٹین پیدا ہوتی ہیں بعضہ غیر بیماری سے سانس کی گس کے ذریعہ موند تاکہ ٹرکیا کے ذریعہ ہو کی لیون تک پہنچاتی ہے جب مرض شدید ہوتا ہے تو چٹین کو پسین ملکا گال اور زبان پر سفید یا پیور سے رنگ کے بڑے کے طور نکلتے ہیں۔ یہ چٹین ملا ہو جاتی ہیں اور کچھ عرصہ بعد جب علاج ہو جاتی ہیں تب انکی جگہ ایک شش دانہ یا خفیف خرم رہتا ہے بعد ازاں جہاں اس مقام یا تو خشک ہو جاتا ہے یا یہ چٹین پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ مرض ابلی اسکا باعث کمزور اطفال کو جاتا ہے بچہ کو نکلنے اور دودھ پینے پر ناخفیف ہوتی ہے جب یہ بیماری شدید ہوتی ہے تو مریض کو تھکے اور دست آئے ہیں جب اسکا ذہن ہو کی لیون میں ہو جاتا ہے تب کہانی ہوتی ہے اور طبع کے ساتھ

بہور سے رنگ کے باریک باریک لٹے اختلاج پاتے ہیں۔ جب کہ کمزور ہو جاتا ہے تو چٹون کی جگہ پر ٹہری قسم کے زخم پڑ جاتے ہیں اور کثرت سے رال بہتی ہے بچہ اس میں غذا نہیں کھا سکتا تو آخر کار ناقہ کشی کے باعث مرجاتا ہے۔

اسباب۔ میوہ کس مہین کی کاپے تھے۔ لی۔ ام پروہ میں ایک قسم کی کائی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ مرض متعدی ہی ہے۔

علاج۔ خرابی امحا اور اسہال کا علاج معمولی طور پر کریں اور ایک ٹم ام سوہاگ۔ آونس پانی میں حل کر کے دہن کو بار بار دھو ڈالیں اور چٹون پر آم گزین ٹائٹریٹ اف سلور کا عرق دین میں ایک یا دو دفعہ لگا دیں۔

علامات۔ تم چہارم۔ اس بیماری کو کون۔ کرم اور ریش اور نو۔ ما اور طاٹر۔ لیکن کبھی کہتے ہیں۔ یہ بیماری کمزور بچوں کو ہو جایا کرتی ہے اور اکثر دو برس یا پنج یا چھ برس کی عمر میں ہو کرتی ہے۔ بچہ کمزور بے چین اور لاغر ہو جاتا ہے۔ بھوک مرجاتی ہے۔ منہ سے رال بہتی رہتی ہے جھوٹے پھول جاتے ہیں اور ان پر چوٹے چوٹے زخم پیدا ہو جاتے ہیں بعد ازاں کسی گال پر ایک سخت سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ منہ کھول کر دیکھیں تو اس گال کے چوں نیچ سفیدی پائل یا خاکی رنگ کا ایک داغ نظر آتا ہے یہ داغ بتدیج بڑھنے لگتا ہے یہاں تک کہ کل حصہ اس گال کا اور لبین اور سٹور سے ہی زخمی ہو جاتے ہیں۔ رال کثرت سے بہتی ہے اور نہایت بدبو دار ہوتی ہے۔ زخم پھیلتا جاوے تو گال کو چید کر مار نکل جاتا ہے اور بعض دفعہ جثرون تک یہی پھیلا جاتا ہے اس وقت ہڈی زخمی ہو کر ٹھرنے لگتی ہے۔ اس بیماری میں سارا گال مر رہا بھی پڑ جاسکتا ہے اور صورتیں غایت درجہ کا ضعف لاحق ہوتا ہے اور دیگر اسقام جسمی بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔

چنانچہ بعض دفعہ پردہ پیسے - رمی - لٹ - فی - ام اور سے - سر - ٹرک عدد و مین
انفکامیشن ہو جاتا ہے - شش مین بھی خرابی پر رہا ہوتی ہے آخر کار حالت ضعف
میں مریض راہی ملک عدم کا ہو جاتا ہے ۔

علاج - سلف کی جگہ پر ٹریٹریٹ اف سلور یا خالص ٹریٹریٹ اسڈ لگا دیں
اور منہ کے اندر کلورائیڈ اف زنگ کی بچکاری کریں (اگر مین ۸ آؤنس پانی مین)
یا اس عرق کی بچکاری کریں ۔

لشخہ - لائیکوار - سوڈمی کلور - رمی - نے - ٹے ۶ ڈرام ۵ پانی - ۵ - آؤنس ۵ دونوں
کو ملا لیں ۵ یا اس عرق کی بچکاری کریں ۔
عرق - پر - منگے - نٹ اف پوٹاش ایک ڈرام سے ۶ ڈرام تک ۵
ایک پانیٹ پانی مین ملا لیں اور لشخہ ذیل پیسے کو دیں -

لشخہ - کلورٹ اف پوٹاش ۵ گریں ۵ کپاؤنڈ ٹینکراف سکونا - ۳ - ڈرام ۵
سکو ملا کر دن مین تین دفعہ ملا دیں - یہ لشخہ ایک سال کے بچہ کے لئے موزوں ہے
مگر یہ ضرور دیا دے کہ کلورٹ اف پوٹاش کے استعمال سے بعض دفعہ زہر کی
علامتیں پیدا ہو جاتی مین چنانچہ بھوک مر جاتی ہے - سرگرمی منہ لگتا ہے اور
شدت سے پیاس لگتی ہے اور پیشاب مین البیہ - من پایا جاتا ہے - پس اس
دوا کو چاہئے کتنی ہی کم مقدار مین ہو مخلو محہ مین نہ دینا چاہئے اور انشاء استعمال
مین پیشاب کا ملاحظہ ہمیشہ کرنا چاہئے ۔

ٹان - سی - لائی - ٹش

یہ بیماری دوستم کی ہوتی ہے ایک ایکوٹ دوسری کرائیک

اول اکیوٹ ٹان سی۔ لامی ٹس

اس بیماری کو کوئین۔ نری بھی بولتے ہیں۔

علامات اسکی یہ ہیں کہ بیمار کو پہلے جابر معلوم ہوتا ہے بعد ازاں قدرے گرمی۔ پشت و دست و پامین درد ہوتا ہے۔ نبض چرار اور سریع ہوتی ہے۔ گلے میں گرمی اور خشکی معلوم ہوتی ہے اور نگلنے اور نگلنے کرنے میں درد اور تکلیف۔ حلق سرخ ہو جاتا ہے لیکن ٹانسس۔ گلنڈ زیادہ تر مرغ اور چولے ہوئے ہوتے ہیں، پیرزد اور کسقتد بہورے، ناک کی رطوبت چمٹی ہوتی ہے۔ زبان میلنی اور اسپر سفید رنگ کی فرجی ہوتی ہے۔ چون جوان بیماری طبعی جاتی ہے ٹانسس۔ گلنڈ کا ورم بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ نگلنا اور نگلنے کرنا بھی سوار ہو جاتا ہے۔ پتلی چیرینک کی راہ نکل آتی ہیں۔ لیسار تھوک بہتا رہتا ہے۔ دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور کانون میں ٹیسین پڑتی ہیں۔ علامات بخار کی زیادہ ہوتی جاتی ہیں۔ اعضا شکنی کمال۔ لیکن جب بیماری اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تب بخار کثرت ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری ۵ سے ۷ دن تک رہتی ہے اور نتائج اسکے یہ ہوتے ہیں کہ یا تو انفلامیشن رفع ہو جاسکتا ہے یا پہلے درجہ کے انفلامیشن کے بخار کے عوض جب سپٹیر جاتی ہے تب خفیف بہت کمزور ہو جاتا ہے یا گلیٹون میں سپٹیر کر زخم پیدا ہو سکتے ہیں اور ہندو و مرد اور بھی پڑ جاسکتا ہے یا یہ بیماری اکیوٹ سے کرائیک ہو جاسکتی ہے۔

اسباب۔ پری۔ ڈسپیا۔ زنگ۔ جوانی۔ کمزوری۔ آتشک اور پہلے بھی اس مرض کا ہونا۔

اکسائٹنگ کار۔ سردی اور گرمی کی حالت میں سرد پانی پینا اور نگلنا

علاج۔ بیماری خفیف ہو تو زکام کا علاج کریں۔ شدید ہو تو باہر کی طرف
 ٹانسس۔ گلند پر جو کین لگا دیں۔ فو۔ مین۔ ٹے۔ ٹین کریں اور روئی گرم کر کے گلے پر
 باندھ دیں اور نصف دودھ اور پانی جو زین گرم کر کے اٹھاؤ غرہ کریں۔ جب پیپ
 پڑ جاوے تو انٹر۔ ٹل۔ کر ڈیڈ۔ ار۔ طری کا خیال یہ کہ نہ ستر سے چیر دیں بعد از
 گرم دودھ اور پانی کی کھٹی بار بار کر دیں۔ جب گلندیاں اترتھیں پھل جاتی ہیں کہ دم
 لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو اسے چمک اودیات سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر
 بخار ہو تو فویر۔ کیسچر کا استعمال کریں اور بخار نہ رہو بخار کے تو دوا اور غذا متوی
 دیوں مثلاً کوئین۔ شور بہ وغیرہ مگر آج کل اس بخار کی علاج سی۔ لی۔ سی۔ لٹ۔ اف
 سو۔ ڈا سے کرتے ہیں۔ چنانچہ بیماری کے شروع ہوتے ہی اس نسخہ کا استعمال کرتے ہیں
 نسخہ۔ سی۔ لی۔ سی۔ لٹ۔ اف سو۔ ڈا ۵ دیا ۴ کریں ۴ کار۔ بلو۔ نٹ۔ اف
 ایمو۔ نیا ۳۰ کریں ہسپنل سرپ ۴ ڈرام ۴ واٹر ایک آؤنس ۴ سکوا کر دو
 رو یا تین تین گھنٹہ بعد پلا دیں۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔
 اب تھوڑا اندازہ کرنا کہ اگلا کی توجہ اس بیماری کی ایک آؤرٹم پر بھی ہے جسکا
 نام انہون نے کر ڈی۔ پس۔ ٹان۔ سی۔ لائی۔ ٹین یہ کہتا ہے۔ اس میں مثل مرض
 ڈف۔ تہ۔ ریا کے ایک پردہ کا وہ پیدا ہو جاتا ہے جس سبب اسکا مذکورہ
 بالانام کہتا ہے مگر اس میں اور ڈف۔ تہ۔ ریا کی بیماری میں بڑا فرق ہے چنانچہ
 اس بیماری کی نسبت شہرینو۔ یارک کے (یہ شہر امریکا میں ہے) ڈاکٹر ہٹولٹ
 نے جو تحقیقات کیا ہے انکو ذیل میں درج کیا جاتا ہے تاکہ ناظرین اس سے
 واقف ہوں اور ایک سید ہے سادے مرض کو ہلکا بیماری ڈف۔ تہ۔ ریا
 کی نہ بنا دیں چنانچہ۔

کرو۔ پس ٹان سی۔ لائی ٹس

اور
ڈف۔ تھے۔ ریا

ایک ہی بیماری نہیں ہیں

مضمون ڈاکٹر ہوٹل نیو نازک

ڈاکٹر ہوٹل صاحب فرماتے ہیں کہ وہ طبیب غلطی پر ہیں جو این دو نو بیماریوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہی سبب کہ ہم اخباروں میں اکثر پڑھتے ہیں کہ بعض طبیوں نے ڈف۔ تھے۔ ریا کے سیکڑوں بیماریوں کو آرام کیا ہے۔ اگر بغور دیکھیں تو جن بیماریوں کا وہ حال کہتے ہیں وہ دراصل مریض کرو۔ پس ٹان سی۔ لائی ٹس کے ہونے کو ڈف۔ تھے۔ ریا کے ان طبیوں کا اکثر یہ قاعدہ ہے کہ ٹان سی۔ لائی ٹس کے سبب مریض ٹان سی۔ لائی ٹس کے جب کوئی پرودہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس مریض کو ڈف۔ تھے۔ ریا قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ بیماری دراصل کرو۔ پس ٹان سی۔ لائی ٹس کی ہے اصل مریض ڈف۔ تھے۔ ریا کی نہیں۔ زمانہ حال کے تجربہ سے یہ ثابت ہے کہ جو پرودہ کرو۔ پس ٹان سی۔ لائی ٹس میں ٹان سی۔ لائی ٹس میں پیدا ہو جاتا ہے اس میں اور اس پرودہ میں کچھ بھی فرق نہیں ہے جو انفلیمیشن کے سبب جسم کے اور حصوں پر پیدا ہوتا ہے۔ پس ڈف۔ تھے۔ ریا کی تشخیص صرف اس کا ذہن پرودہ کے ملاحظہ سے نہیں ہو سکتی بلکہ اور اور علامتوں پر بھی غور اور توجہ کرنی چاہئے چنانچہ

اول ڈنٹ - تھے۔ ریا کی بیماری میں مریض اٹھانا نہایت کمزور ہو جاتا ہے
کیونکہ بعض اُسکی نہایت میرے اور دل کی حرکت نہایت جلد گھٹ جاتی ہے جس
سبب سے بیمار جلد ہلک ہو جاتا ہے +

دوم - ڈنٹ - تھے۔ ریا میں جو کاذب پردہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک ہی فکری
مقام پر پیدا ہو جاتا ہے جیسے سافٹ پے۔ لٹ اور نے۔ رنگش اور ناک کے چھپے
کے سوراخوں پر اور لے۔ رنگش پر یا ایسا ہوتا ہے کہ اُن مقامات کے کسی مقام پر
پیدا ہو کر ایک کو چوڑ کر دوسرے پر پیدا ہوتا جاتا ہے +

سوم - ڈنٹ - تھے۔ ریا میں بنیاب کے اندر البیو۔ من اکثر پایا جاتا ہے +

چارم - ڈنٹ - تھے۔ ریا کا نتیجہ اکثر فالج ہوتا ہے +

پنجم - ڈنٹ - تھے۔ ریا کی بیماری متعدی ہے یعنی اسکی چوت ایک آدمی
سے دوسرے کو جلد لگ جاتی ہے +

بچوں کو اکثر ایک قسم کا سور۔ تھروٹ ہو جاتا ہے جس میں مذکورہ بائسلا متین
مرض ڈنٹ - تھے۔ ریا کی اکثر نہیں پائی جاتی ہیں گو اُس سور۔ تھروٹ میں
بھی پردہ کاذب پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ ذیل کے بیماریوں کے حالات سے یہ
بات ثابت ہوتی ہے +

مریض اول - گیارہ نومبر کو ایک لڑکا مہیکر علاج میں آیا جسکی عمر ۱ سال کی
تھی اور وہ خوب توانا تھا۔ صبح تک لڑکا چنگا بھلا کیلٹا کو دتا تھا۔ گیارہ بجے لڑکا
شروع ہوا ۱۱۔ دو دفعہ آئی اور سینہ میں درد تھا اسی وقت سے مریض نہایت
بیمار معلوم ہونے لگا + تین گھنٹہ بعد شروع ہونے مرض کے جب میں نے دیکھا
تو جسم کی حرارت ۱۰۳۔۲ پر تھی۔ نبض ۱۴۰۔ اور نفس کبیرت ۳۲ سینکے ملاحظہ
سے کوئی بیماری ثابت نہ ہوئی مگر جب حلق کا ملاحظہ کیا تو دو نوٹان۔ سیل نکلا

بہت سوچے ہوئے نظر آئے اور دہننے عذو پر ایک دبیز بہہ راز روی ٹیل
پر وہ دیکھائی دیا بائین عذو کے بھی قریب و ٹوٹ پڑا سیاہی پردہ تھا۔ دوسرے
دن حرارت جسم کی ۴۰.۲ پر تھی پردہ مذکور بھی صاف نظر آتا تھا مگر ایک ہی
محدود جگہ پر تھا جا بجا چتر ہوا نہ تھا۔ مگر پہلے کی نسبت رنگت اسکی زیادہ تر
نرم تھی۔ تیسرے دن حرارت ۱۰۱.۶- اور لہذا ان درجہ حرارت کا تندرستی پر گیا
اور چوتھے روز گلاب لکھلکھ تندرست ہو گیا۔

مریض دوم۔ اس لڑکے کی عمر پانچ سال کی تھی۔ ایک دن شام کی وقت گلے
میں درد بتایا اور رات کی وقت لرزہ سے نہایت سخت بخار ہو گیا۔ جب دوسرے
دن میں نے دیکھا تو حرارت ۴۰.۴ درجہ پر تھی اور تنفس کی حرکت ۴۰۔ اور نبض ۳۵ تھی
اسکی بھی دونوں ٹانگے اس عذو و سوچے ہوئے تھے اور ان پر ایک زرد ٹیل مجد و دکاب
پر وہ چسپاں تھا۔ دوسرے دن حرارت ۴۰.۵ پر تھی لہذا ان تندرستی کے درجہ
پر آگئی امید یہ مذکور بھی بالکل جذب ہو گیا۔ مرض کے پانچویں روز بیمار بالکل تندرست
ہو گیا۔ ایسے آؤ ۱۹ بیمار دن کے حال سے کہ پاس بچے ہوئے تین جن میں عجائبات
قریب ایک ہی قسم کی تھیں۔ عمر ان لڑکوں کی ۱۴ مہینے سے ۱۰ سال تک کی تھی
ان ساروں کو یہ مرض شدت سے ہو گیا تھا۔ چنانچہ ۵ کو شدت سے لرزہ ہو کر بخار
ہو گیا تھا۔ اور تین کو یہ بیمار سی تھے سے شروع ہوئی تھی مگر سب کو شدت سے
سور۔ تھڑا (گلاؤ گھٹا) تھا اور ان کے بدن کی حرارت بھی زیادہ تھی۔ سات
بیماروں میں مرض کے پہلے یا دوسرے دن حرارت کا درجہ ۱۰۳ تھا اور مین ۴۰.۴ یا
اس سے زیادہ۔ بخار کی مدت پندرہ بیماروں میں اوسط تین دن کی تھی اور ایسا
دیکھا گیا تھا کہ جبکہ شدت بخار کی پہلے روز تھی دوسرے روز نہ تھی اور بہ نسبت
دوسرے روز کے تیسرے دن بخار کم تھا۔ گلے کی تکلیف چار سے سات روز تک

رہی تھی صرف ایک بیمار میں ہفتہ کے زیادہ رہی ۔

اُن ۱۹ بیماروں میں سے نصف سے زیادہ کاٹان - سیل عذو و سو جا ہوا تھا ۔
 پندرہ بیمار میں کا ذب پر وہ کارنگ زرد یا بھورا زردی مائل تھا اور ایک یا دو میں
 اُس پر وہ کارنگ بالکل بھورا یا سبز مائل زردی تھا ۔ دو ٹمکٹ کے دو نو عذو و دوں پر پر وہ
 کا ذب پیدا ہوا تھا اور ایک ٹمکٹ مریضوں کے صرف ایک ہی عذو پر وہ پر وہ تھا
 لیکن کسی بیمار کی نیوٹروف - وٹو - لایا سا فٹ - پے - لٹ پر وہ پر وہ تھا اور نہ اُن بچاؤ دان
 میں سے کیسے پیشاب میں البیور - من تھا مگر ٹان میں نے بعضہ فقہ ایسا دیکھا ہے کہ ایسے
 بیماروں میں گاہے گاہے قدر کے قلیل البیور - من پایا جاتا ہے اُن بیماروں میں سے
 کو جی بھایا نہ تھا جسکی چوٹ ایک سے دوسرے کو لگ گئی ہو ۔ اب اُن بیماریوں
 کی تشخیص کے باب میں یہ کہتا ہوں کہ جن طبیبوں کو ایسے بیماروں کے علاج کا موقع پایا
 ملا ہو وہ اُن بیماروں کو ہرگز ڈف - تھے ۔ ریا کے مریض نہیں کہنے گئے ۔ البتہ میں یہ
 کہتا ہوں کہ بعضہ فقہ ڈف - تھے ۔ ریا کی بیماری پوشیدہ طور پر پیدا ہو کر آہستہ آہستہ
 بڑھ جاسکتی ہے مثلاً گلے کی تکلیف جب بہت تھوڑی ہوتی ہے اور علامات
 عامہ بھی ایسی خفیف ہوتی ہیں کہ جن پر طبیب کی توجہ کم ہوتی ہے تب اکثر فالج ہو جاتا
 ہے ۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈف - تھے ۔ ریا کی بیماری تھی ہر عکس کے
 بعضہ فقہ ایسے ہی بیمار تھے جن میں گلو کی تکلیف تو کم مگر گردہ کی عکس تا نہایت
 شدید ہوتی تھی ہر عکس کے جب اصل ڈف - تھے ۔ ریا کی بیماری سیلو پر شروع
 ہوتی ہے کہ بطور پر مذکورہ بالا کرد - پس طمان - سی - لائی - لٹن کا مرض شروع ہوتا
 ہے اور جب اُس ف - تھے ۔ ریا کی بیماری میں جسم کی حرارت تیز مگر گلو کی علامتوں کو
 چند دن شدت نہیں ہوتی ہے تب وہ بیماری جاری یا پنج دن کے اندر رفع نہیں ہوتی
 بلکہ بقول اکثر کڈھ مارے ایسی صورتوں میں خون کے اندر زہری مقدار بکثرت ہوتی ہے

اور بیماری دو ہی تین دن کے اندر مہلک ہو جاتی ہے ۔
 اور جس بیماری کا ذکر پہلے ہے طبیعوں نے اس کے کئی نام رکھے ہیں مگر میں اس
 کا نام کرو۔ پس ٹان۔ سی۔ لائی۔ ٹس اچھا سمجھتا ہوں، ذیل میں حاضر ہے۔ تھوڑا
 اور کرو۔ ٹس۔ ٹان۔ سی۔ لائی۔ ٹس میں فرق بتاتا ہوں ۔

ٹوف - تپے - ریا	کرو۔ پٹس۔ ٹان۔ سی۔ لائی۔ ٹس
۱۔ یہ مرض اکثر پشیدہ طور پر شروع ہوتا ہے ۔	۱۔ یہ مرض انما نا شروع ہو جاتا ہے
۲۔ مرض کے تیسرے دن سے پہلے اکثر زیادہ تکلیف نہیں ہوتی مگر بعد تیسرے دن کے مریض نہایت بڈھال ہو جاتا ہے ۔	۲۔ بیماری کے پہلے اور دوسرے دن تک علامات عامہ کو شدت ہوتی ہے مگر بیمار بڈھال نہیں ہو جاتا ۔
۳۔ اس بیماری میں شروع کے اندرجات ۱۰۰ یا ۱۰۱ درجہ ہوتی ہے اور تب چوتھے یا پانچویں دن بتدریج بڑھتی جاتی ہے ۔	۳۔ یہ مرض ۱۰۳ سے ۱۰۴ درجہ کی حرارت سے شروع ہوتا ہے ۔
۴۔ نبض جب سیرج ہوتی ہے تب بہت کمزور ہوتی ہے ۔	۴۔ نبض پُر اور سیرج ۔
۵۔ رنگ سرسبز بعض دفعہ سبزی یا لیل یہ پردہ پڑے ۔ دھو۔ لا اور سانف۔ پے۔ لٹ اور فے ۔ رنگش اور ٹان۔ سل غدد ووز پر بھی پیدا ہو جاتا ہے ۔ اُکھاڑے یا نہ اُکھاڑے بلکہ زہری جھیرے تو اس	۵۔ پردہ کا ذب زردی مائل ہوتا ہے اسکے کنارے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں ۔ اُکھاڑے تو وہاں سے خون جاری نہیں ہوتا ۔ یہ پردہ صرف سطح پر ہوتا ہے یعنی گہرا نہیں ہوتا ۔ بہت

۱۔ خبیثہ جلی سے چمٹا ہوا ہینن ہوتا ہے لگتا ہے۔ یہ
تو پھر ہینن پیدا ہوتا۔ مرض کے عین شروع
یہی مین پیدا ہوتا اور ایک ہی جگہ پر محدود
رہتا ہے پہلی ہینن +

تو پھر جلد پیدا ہو جاتا ہے۔ بیماری کے
پہلے بلکہ دوسرے دن ہی شاید پیدا ہو۔
نہایت جلد پہلیا جاتا ہے۔

۲۔ اس میں ال۔ بے۔ مے۔ نیو۔ ریا
کی بیماری ہو جایا کرتی ہے۔
السیو مین پایا جاتا ہے۔

۳۔ یہ بیماری دوسرے دن نہایت شدید
ہو جاتی ہے اور چوتھے روز بیمار رو بہ
لانے لگتا ہے۔

۴۔ بی شفا کے ایسین پیے۔ را۔ لی۔ یس
۸۔ ایسین پیے۔ را۔ لی۔ یس اکثر ہو جاتا
کبھی ہینن ہوتا۔

۹۔ ایکے متعدی ہونے میں شک ہے۔ ۹۔ یہ بیماری اکثر چوت سے پہلی ہے۔

ڈف۔ تپے۔ ریا کی بیماری میں جسم کے غدود اکثر بڑھ جایا کرتے ہیں لیکن چونکہ
ٹان۔ سی۔ سی۔ تپے۔ ریا میں بھی ایسا ہو جایا کرتا ہے تو یہ علامت ان دونوں بیماریوں
کی تشخیص کے لئے معتبر ہینن ہے۔

دوم کرانک ٹان سی لائی ٹیس

علامات ٹان سیس۔ گھنڈ بڑھ کر سخت ہو جاتی ہیں نکلنے حکم کرنے

اور سماعت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ منہ بیمار کا کیس قدر کھلا رہتا ہے اور دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔

اسباب - پری - ڈیپو - زنگ - آتشک - اسکر - فیولا اور کرنٹس میں پیشیا
اکسائیٹنگ کارڈ - ایکوٹ ٹان - سی لائی - ٹس ۔

علاج - مرکبات فیولا و مثلاً آئیوڈائیڈ اف ایرن کا استعمال کریں تبدیل
آب دہوا کرادیں اور بیمار کو گرم کپڑا پہنا دیں گلیٹیوینر تیز عرق ٹریٹریٹ اف سلور کا
لگا دیں اور اس نسخہ کا غرغہ کرا دیں -

النسخہ - ٹے - نیکٹ - اسٹڈ - آکرین - ریکٹی - فائیڈ - اسپرٹ آدوا آونس +
کمفر کسپر سٹریس سات آونس + باہر کیٹرف گلیٹیوینر گاہے گاہے ایک مہ جو کین
یا جیوٹا سبٹریٹ گادیں اور آئیوڈ - ٹین - اینٹ منٹ کی مانش کریں جب گلیٹیوینر
زخم پڑ جاتا ہے تو اکثر یہ بات آتشک کے سبب ہوتی ہے اگرچہ یہ بیماری آہستہ
آہستہ بڑھتی ہے تاہم روکی نرجا دے تو ناک اور حلق اور آخر کار رے - دنگس تک
زخم پھیل جاسکتا ہے کلورائیڈ اف سوڈی - ام کا غرغہ کرا دیں اور زخموں پر
بار بار ٹریٹریٹ اف سلور لگا دیں اور غذا اور دوا مقوی سے بیمار کی طاقت
کو قائم رکھیں ۔

پے - رو - ٹائیٹس

اسکو انگریزی میں ٹینٹیس اور ہندی میں کن پٹری کہتے ہیں ۔
یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے - ایک کو امی - ڈیو - پے - تہاک (یعنی جواز خود نیلہ ہو)
پے - رو - ٹائیٹس - نش اور دوسرے قسم کو سم - ٹو - ٹاک (یعنی جو کسی مرض کی
ایک علامتوں میں سے ہو) پے - رو - ٹائیٹس - ٹس بولتے ہیں چنانچہ بیان

اولیٰ می ٹیو پیے تھک پے روٹائی ٹیس

باب - یہ بیماری پہلے کثر پڑے۔ بہت ہو جاتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی خاص گہر میں یا ایسی جگہ میں دور رہ کر سکتی ہے جیسے درے یا کھارے میں جہاں بہت سے لوگ کام کیا کرتے ہیں۔ یہ بیماری چھٹی عمر میں کثر ہو جاتی کرتی ہے اور پانچ سے سات سال کی عمر میں تو اکثر ہو جاتی ہے اور مردوں کو نسبتاً عورتوں کے زیادہ ہوتی ہے۔

ماہیت - اس مرض میں ایک یا دو نوپے - راٹھ غدودہ میں انفعائش ہو جاتا ہے۔ بعض اطباء کہتے ہیں کہ غدودہ کے سے - لید - لکڑے شیدو میں بہت - انفعائش ہوتا ہے بعض کی رائے ہے کہ غدودہ کی مجری (ڈوگٹ) میں بیماری پہلے شرح ہوتی ہے - غدودہ ماؤف میں خون کی زیادتی ہوتی ہے اور وہ چھول جاتا ہے اس کی ساخت کے لیدو میں سیرم نفوذ کر جاتا ہے - بعض دفعہ دھان فامی - برین بھی پایا جاتا ہے مگر یہ بات یاد رہے کہ جب یہ بیماری کسی اوڈر مرض کے دور میں نہیں ہوتی ہے بلکہ ازخود ہو جاتی ہے تب اس میں شاذ و نادر میں پٹا کرتی ہے - تاہم یہی ہے کہ ورم جلد نفع ہو جاتا ہے اور غدودہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے ۔

علامات - اس منکامادہ ۱۴ سے ۲۰ دن تک کیڑا رہ سکتا ہے اکثر تو ایسا ہی جوتا ہی کر دینے پر غصہ ہو کر سوچنے سے پہلے بیمار کو دو تین روز تک سخت رہتا ہے مگر گاہ گاہ بخار اور درم و دونوں کی دھندلچا ہوا جان بڑھ کر بیمار ہی کے شروع سے آخر تک بخار رہتا ہے لیکن گاہ ایسا ہی جوتا ہوا کہ مرض کی خاص علامتوں کے ظاہر نہ ہونے کی بنا پر بخار بخار ہو جاتا ہے بخار مذکور شدہ یہ نہیں ہوتا اور نہ بیمار بہت ماندہ معلوم ہوتا ہے کان کے عین پیچھے روٹھ غصہ و مین م پیدا ہو جاتا ہے یہ درم رفتہ رفتہ ندامتی گو - مانتا کہ پہلے جاتا ہے بلکہ جبر اور گردن کے نیچے تک م امتزاتا ہے

اور بیمار بدست ہو جاتا ہے۔ وہاں تو درمیکھا اور محسوس ہوتا ہے مگر درمیانہ حصہ اس کا
 بہ نسبت گردے کے سخت ہوتا ہے۔ درم کے اوپر کی جگہ منہ ہو جاسکتی ہے لیکن اکثر ایسی
 نکتہ میں خرق ہنہیں پڑتا، خاصکر منہ کوٹنے سے چبانے سے یا انگلی کے دقت
 ہونے پر ابھرتا ہے۔ روئے چینی اور تناؤ معلوم ہوتا ہے اور دبانے سے بھی درد ہوتا ہے
 لگا ہے لگا ہے منہ سے تھوک جاری ہو جاتا ہے۔ گاہے مریض کانوں سے اچھی
 طرح سن نہیں سکتا۔ درم پانچویں چھٹے دن اکثر کم ہو جاتا ہے تب دو تین روز
 بعد بالکل رفع ہو جاتا ہے مگر اس اثنا میں دوسری طرف کا عذو و سوجھ لگتا ہے
 اور شکل پہلے عذو کے اسپینور پر اپنا دور پورا کرتا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ
 دونوں جانب کے عذو ایک ہی دفعہ سوچنے لگتے تین۔ گاہے گاہے درم کے رفع ہو جانے
 کے بعد بھی کچھ عرصہ تک اس جگہ سختی رہتی ہے اور بہت شاذ و نادر عذو دین سپ
 پڑ کر ذیل باہر کی طرف یا کان کے اندر پھوٹ جاتا ہے تب کان کے باہر کے سوراخ سے
 پیپ جاری ہونے لگتی ہے، بعض دفعہ سب۔ مگر۔ لری عذو تو بھی اس مرض میں
 مبتلا ہو جاتا ہے اور ارد گرد کے لم۔ فائٹھاٹ عذو اور نیزٹان۔ سل عذو بھی اکثر پڑ جاتے
 ہیں + ایک بڑی بیماری خاصیت اس اڑ۔ یو۔ یے۔ تھک۔ خمپس کی یہ ہے کہ
 یہ مرض ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ انتقال کر جاتا ہے۔ یہ بات خاصکر حوالہ
 میں اکثر پائی جاتی ہے چنانچہ پے۔ را۔ ٹڈ عذو کو انفلامیشن کو چون چون تخفیف
 ہوتی جاتی ہے یہ مرض اکثر انٹین میں ہر ت کر جاتا ہے لیجے آر۔ کاسی۔ لٹس
 کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے ٹیو۔ نی۔ کا۔ دی۔ جے۔ نے۔ لٹس کے اندر
 سر پیدا ہو جاتا ہے اور فوٹ سوچ جاتا ہے + گاہے گاہے ایسا بھی ہوتا ہے
 کہ پے۔ را۔ ٹڈ عذو اور حصین مرض میں ایک ہی دفعہ مبتلا ہو جائے ہیں یا ایسا
 ہوتا ہے کہ پہلے تو عذو اور تب خفیہ اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے خفیہ سے جب بیماری

رفع ہو جاتی ہے۔ تب دوبارہ غدود میں انفلامیشن ہو جاتا ہے۔ اس طرح کئی مرتبہ ہوتا رہتا ہے اور تب یہ مرض رفع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ار۔ کائی۔ لٹس کی بیماری اکثر رفع ہو جاتی ہے مگر بعض دفعہ خفیہ لائو ہو کر چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس طرح عورتوں میں اندام نہانی کے لب اور پستان اور او۔ وے۔ ری میں (خفیہ الرحم) پے۔ را۔ ٹڈ غدود کی بیماری انتقال کر جاسکتی ہے۔ بہت شاذ و نادر ایسا بھی مل گیا ہے کہ پے۔ رو۔ ٹائی۔ لٹس کے دور میں چین۔ جائی۔ لٹس (دماغ کے پروون کا انفلامیشن) ہو گیا ہے۔

علاج۔ بیت کو سر و ہوا میں نکلنے نہ دین۔ ابتدا میں ایک جلابوین اور تب فیور پاؤڈر یا فیور۔ کپچر۔ یا سے لائن۔ کپچر کا استعمال کریں اور وہم پریکٹس کے اسپرڈی گرم کر کے رکھیں اور ٹیکوٹ ڈھانٹے کی طرح باندھ دین۔ ضرورت ہو تو چند جو کین لگاویں۔ پیپ بڑگئی ہو تو اسکو ہولٹین۔ بند رفع ہونے انفلامیشن کے مقام پر سختی رہ جاوے تو ٹیکچر ان ایڈیوٹین لگاویں۔ غدود کو چوڑ کر بیماری کسی اور جگہ انتقال کر جاوے تو پے۔ را۔ ٹڈ غدود پر رائی کی ٹی یا بلستر لگا کر پھر انفلامیشن پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ار۔ کائی۔ لٹس کا علاج حسب قاعدہ کریں۔

دوم۔ سم۔ ٹو۔ مائٹ پے۔ رو۔ ٹائی۔ لٹس

اس بیماری کو انگریزی پے۔ را۔ ٹڈ۔ بیو۔ بو بھی کہتے ہیں۔

اسباب۔ اس قسم کا پے۔ رو۔ ٹائی۔ لٹس یا تو کسی شدید جیسی کے دود میں عارض ہو جاتا ہے یا اس مرض کے رفع ہو جانے کے بعد بطور نتیجہ کے ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ ٹائی۔ فزن۔ فیور کے دبا میں یہ بیماری اکثر ہو جاتی ہے۔ لیکن چمک اور رو۔ بیو۔ لا اور اسکلر۔ لے۔ ٹے۔ نا اور پیفہ اوینو۔ مو۔ تیا اور دیگر امراض کے تشا میں بھی عارض ہو جاتی ہے کہ جب یہ بیماریاں کسی مکرور آدمی کو ہجاتی ہیں۔ یا وہی حالت کو پہنچ جاتی ہیں۔

ماہیت تشریحی۔ سم۔ ٹو۔ ما۔ ٹک اور ای۔ ٹیو۔ یے۔ تہک۔ پے۔ را۔ ٹا۔ ٹیکس
 میں یہ فرق ہے کہ سم۔ ٹو۔ ما۔ ٹک قسم کے مرض میں اکثر پیپ پڑ جاتی ہے گو بعض
 دفعہ بلا پیپ پڑنے کے بھی یہ مرض رفع ہو جاسکتا ہے + بعد اجتماع خون کے جب
 غزوہ پہول جاتا ہے تب اسکی مجریوں میں ایک شبہ جمع ہو جاتی ہے اور وہ جلد پیپ
 بن جاتی ہے + غزوہ کے درمیان گزشتے گلنے لگتے ہیں تب انہیں یا تو الگ الگ کئی
 دُہل پیدا ہو جاتے ہیں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اُن گزشتوں کے درمیان کی خست
 گل گل کا ایک بڑا سا دُہل بن جاتا ہے۔ غزوہ کے ارد گرد کے مقام میں بھی بیماری
 سرایت کر جاتی ہے چنانچہ۔ لیو۔ لہ۔ ٹے۔ شیو اور سلسل پڈ کی عفانی پے۔ سی
 اس۔ لے۔ ام اور خود ہی بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاسکتی ہے علاوہ انہیں اس
 مرض کا انفعا میشن دماغ کے پردوں یا خود دماغ میں اور کان میں بھی سرایت کر جاتا ہے
 گاہے گاہے غزوہ دُہل بھی پڑ جاتا ہے +

علامات۔ ابتدا مرض میں اکثر علامات ظاہر نہیں ہوتیں بلکہ انفعا میشن پوشیدہ
 طور پر پڑتا جاتا ہے۔ مگر جب غزوہ میں پیپ پڑ جاتی ہے تب اوپر کی جلد سرخ ہو جاتی
 اور اسپر اونچے اونچے دُہل کے منہ نمودار ہو جاتے ہیں جبکہ دبانے سے پیپ کی موجوں کی
 ثابت ہو سکتی ہے + شگاف دیکر پیپ خارج نہ کیجئے تو کان کے راستہ یا فے۔ زنگس
 میں یا منہ کے اندر پھوٹ جاتی ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گردن کے نیچے بلکہ سینے کے
 اندر بھی نکل کی پیپ پھوٹ جاسکتی ہے۔ علامات عامہ اکثر اسپین روی قسم کی ظاہر
 ہوتی ہیں +

علاج خارجی۔ بار بار پول۔ ٹس نگا دین یا فو۔ من۔ ٹے۔ شن کرین اور پیپ
 کے پڑنے ہی فوراً شگاف دیکر خارج کر دین +
علاج داخلی۔ مقویات اور مغزات سے کرنا چاہئے +

مقالہ دوم

تہائی - رائیڈ غدودون کی بیماریاں

تہائی - رائیڈ غدودین و وقت کی بیماریاں ہو سکتی ہیں چنانچہ

اول بران - کو سیل

انگریزی میں اس بیماری کو گائے - ٹر اور ہندی میں گہگ اور پنجابی میں گلہڑا لوتے میز
علامات - تہائی - رائیڈ گٹھی یا تو ساری میز اسکا ایک گوشہ سوج جاتا
ہے مگر پہلے سخت اور پھلکا رہتی ہے بعد کچھ عرصہ کے ٹام ہو جاتی ہے اور پہلے تو
آہستہ آہستہ اور بعد کچھ عرصہ کے چاروں طرف سے جلد بڑھنے لگتی ہے اور جب بہت
بڑھ جاتی ہے تب ٹرنے - کیا اور گلو کی رگوں کے دب جانے سے بیمار کو تکلیف
ہوتی ہے +

علامات تشریحی بعد فوات گٹھی بڑھ جاتی ہے اور اس کے کیسے ہی بہت
پھیل جاتے ہیں - ان کیسوں کو ترانے تو ان کے اندر مختلف قسم کی رطوبتیں پائی
جاتی ہیں +

اسباب - پرسی - ڈسپیو - زنگ - عورت کا ہونا - جوانی - اور یہ مرض
موروثی بھی ہے +

اکسائٹنگ کا ز - معلوم نہیں کہتے ہیں کہ جس گہگ کے پینے کے پانی میں چونہ اور
گنے - شیا کے نمک بکثرت ہوتے ہیں اس پانی کے پینے سے دماغ کے لوگ اس مرض میں
مبتلا ہو جاتے ہیں - بعض تعلقات میں یہ مرض ان - ڈمی - کٹ ہے جیسے ہسٹری

ملکون میں ۶

علاج۔ گٹھی پر مرہم آئو۔ ڈین یا ریڈ۔ آئیوڈائیڈ اف۔ مر۔ کیوری نکا دین اور
بیار کو تبدیل آف دہوا کرادین ۶

دوم ایکس۔ اف تہل۔ گٹ گٹائیٹر

اس مرض کو گریٹنس ڈیزیز یا بریش۔ ڈوز ڈیزیز بھی کہتے ہیں ۶
تعریف۔ دل دھڑکنے لگتا ہے۔ گلو اور سر کی رگیں تڑپنے لگتی ہیں تھامی۔ رائیڈ غدود
بڑھ جاتا ہے اور اسپین بھی تڑپ پائی جاتی ہے۔ آنکھوں کے ڈھیلے باہر کی طرف ابھرتے
ہیں جسکو اصطلاح میں ایکس۔ اف۔ تہال۔ مٹس کہتے ہیں۔ یہ بیماری جوان عورتوں میں
جبکی عمر سے ۳۰ سال تک کی ہوتی ہے اکثر پائی جاتی ہے اور اکثر پر ہمیشہ نہیں
اُن عورتوں کو انے۔ میا ہوتا ہے یا انکے خون میں کسی کسی طرح کی بیقاعدگی پائی جاتی
ہے اور انکا علاج تر۔ وٹس ہوتا ہے ۶

ماہیت۔ اس بیماری کی یہ ہے کہ تھامی۔ رائیڈ غدود اور سرور گلو کی رگوں پر جو
۱۔ سو۔ موٹرا عصاب ہوتے ہیں وہ مغلج ہو جاتے ہیں اور ول کے عصاب کو
تہایت تحریک ہوتی ہے۔ تھامی۔ رائیڈ غدود کی ساخت میں کچھ تو سیرم جمع
ہو جاتا ہے اور کچھ عرصہ بعد خود وہ غدود موٹا ہو جاتا ہے جس سبب سے اُسکی رگیں
پھیل جاتی ہیں اور وہ غدود موٹا ہو جاتا ہے۔ اس بیماری میں آنکھوں کے ڈھیلے
اس سبب سے باہر کی طرف ابھرتے ہیں کہ اُنکی رگوں میں خون زیادہ آتا ہے تب
وہ پہیل جاتی ہیں اور ڈوہیلوئین کی قدر اڑی۔ ماہی ہو جاتا ہے یہ بھی سبب ہے
کہ جو پردہ اس۔ نے۔ نو۔ بگزی۔ لری۔ نے۔ شہر پر لگا ہوتا ہے اُسکے گوشت کے
ریشے سُک جاتے ہیں اور آنکھوں کے ڈھیلے باہر کی طرف ابھرتے ہیں ۶

حکومات - یہ قاعدہ ہے کہ اس بیماری کے مریض اپنے مہا اور کلو - روسٹس
 کے مریضوں میں مبتلا رہتے ہیں اس مرض کی خاص علامتوں کے شروع ہونے سے
 پہلے وہ بہت ہمت دیتے ہیں اور مزاج اگلا چڑا ہوتا ہے اور یہ کہ ان کے لیے - ٹے - شن
 بتدریج اور خاص علامتوں کے شروع ہونے سے بہت پہلے ہونے لگتا ہے - بڑا ہوا
 ہوا - رائیڈ غدد و دبانے سے ماہیوں کو مائع اور لچکا اور محسوس ہوتا ہے اور رگین کی
 ایسی تڑپتی ہیں کہ کان لگا کر سننے سے خون کے حرکت کرنے کی حرکت کی آواز سنائی دیتی
 ہے - آنکھوں کے ڈھیلے بعد رہا ہوتے ہیں کہ پوٹون میں سما نہیں سکتے - دل بے تحاشا
 اور بے قاعدہ حرکت کرتا ہے - دونوں کے - رائیڈ شرائین میں بھی بے تحاشا طرب پائی
 جاتی ہے - دماغ کی رگین خون سے پُر ہوتی ہیں اور تڑپنے لگتی ہیں - اور سر گھومتا ہے اور
 درد کرنے لگتا ہے - اس بیماری کے مریض اکثر کمر درد ہوتے ہیں - آنکھ بہت پسینہ آتا ہے
 اور ان کے جسم کی حرارت اکثر تیز ہوتی ہے اور بدبھنی رہتی ہے - غدد و کبے بڑھ جاتے
 سے دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے - آواز بھاری ہو جاتی ہے یا بالکل سٹیہ جاتی ہے
 علاج - اس بیماری کا علاج مقویات سے کرنا چاہئے مثلاً فولاد اور کونین وغیرہ
 اور غذا بھی مقوی ہونی چاہئے - دل کی بے چینی رفع کرنے کے لئے ڈی جی - ٹے - ریس
 مفید ہے اور نیکو پراف - اس - ٹر - فن - تھس آڈ سے دس قطرے دینے میں مرتبہ
 بعد غذا کے بھی مفید ہے - ضرورت ہو تو نبض کی سرعت کم کرنے کے لئے پندرہ سے
 ۲۰ قطرے تک بھی دے سکتے ہیں - بعض صورتوں میں بلا - ڈو - ناہمراہ فولاد کے مفید
 پڑتا ہے اور بعض طبیب ار - گٹ کی بہت تفریف کرتے ہیں چہاں تا لینی چاہئے
 تاکہ آنکھوں کو صدمہ نہ پہنچے - پس آنکھوں پر ہمیشہ پردہ رکھا کریں اور ضرورت ہو
 تو ان پر بندج باندھ دیں ۔

مقالہ سوم

امراضِ معدہ

اول کن - جش چن - آف - وی - ششک

علامات - معدہ کے یہو کس مبین میں خون جمع ہو جاتا ہے اور اسکی ٹکٹیاں ہی خون سے پُر ہو جاتی ہیں جس سبب سے گیس - طرک - جو سہنتہ آہستہ اور کم پیدا ہوتا ہے - بہوک مر جاتی ہے بد بھنی ہوتی ہے - زہا خشک اور تشکی معلوم ہوتی ہے - تہوڑا بہت فیض رہتا ہے آخر کار معدہ کی باریک رگوں سے خون ٹپکنے لگتا ہے - معدہ کی رطوبت سے عکس سیاہ رنگ کا ڈلا بن جاتا ہے جب قے کے ذریعہ نکلتا ہے تب سکو ہے - ما - ٹے سے بھیس کی بیماری کہتے ہیں یا امعا سے گزرتے وقت تغیر ہو کر اجابت کے راہ نکلتا ہے تب اس بیماری کو **جش** - لے - نا کہتے ہیں اس مرض میں خم معدہ کے اوپر بے چینی اور درد اکثر معلوم ہوتا ہے **اسباب** جب سینہ اور شکم کے اعضا میں درد خون کی رکاوٹ ہوتی ہے جیسے سی - رو - شش آف - وی لے - درد اور ام - نامی - سی - ما اور ماٹھی - ٹرل والو کی بیماری میں ہوا کرتا ہے تب معدہ کے اندر کن جش - چن یعنی اجتماع خیر نکلا ہو جاتا ہے اور فیصد فحہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حیض کے بدلے ماہ بہ ماہ معدہ سے خون آتا ہے ۔

علاج - علاج اس بیماری کا سبب پر موقوف ہے مثلاً پورٹل - سہر - کو لے شن میں رکاوٹ ہو تو نمکین علاج میں جیسے سنا اور نمک یا سٹ - لکٹر پاؤڈر اور مدرات کا استعمال کریں جیسے اسے - ٹرل اور نیا ٹرٹل آف پوٹاش گرم چیزوں کے کھانے

پینے سے پرہیز کرادین + معدہ کے مقام پر درد ہو تو راحی کی پٹی چسپان کرین اور معدہ کے مقام پر چند جوکین لگا دین لیکن سی۔ رو۔ سس۔ آف۔ دی۔ لے۔ درد ہو تو جوکین نہ لگا دین اس سے اندیشہ خون کے بکثرت جاری ہونے کا ہے *

دوم ہے۔ ما۔ ٹے۔ می۔ سس

تعریف۔ جب معدہ سے خون تھے کے ساتھ آتا ہے تب اس مرض کو ہے۔ ما۔ ٹے۔ می۔ سس کہتے ہیں چنانچہ جو خون تھے کے ہمراہ آتا ہے وہ جگہ دار بنین ہوتا۔ مگر بعض دفعہ اس میں غذا ملی ہوتی ہوتی ہے اور گیاس۔ ٹرک۔ جو اس کے مایہ ڈرو۔ کلورک اسٹیکٹین ملنے کے سبب رنگ اسکا سیاہی مل ہو جاتا ہے *

تشخیص۔ اس بیماری کو ہے۔ ماپ۔ ٹے۔ می۔ سس سے فرق کرنا چاہئے چنانچہ ہے۔ ماپ۔ ٹے۔ می۔ سس میں خون کی نکلیاں آتی ہیں وہ خون سرخ رنگ کا اور جگہ دار ہوتا ہے اور اکثر بلغم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے مگر ہے۔ ما۔ ٹے۔ می۔ سس کا خون سیاہی مل اور جگہ دار بنین ہوتا اور اس میں اکثر غذا ملی ہوتی ہوتی ہے * خون کے آنے سے پہلے ہے۔ ماپ۔ ٹے۔ می۔ سس میں کھانسی ہو ا کرتی ہے۔ دم لینے میں تکلیف اور دل دھڑکتا ہے۔ حلق میں ٹھہر رہا ہٹ اور سینہ کے اندر ایک عجیب کیفیت پائی جاتی ہے۔ بر خلاف اسکے ہے۔ ما۔ ٹے۔ می۔ سس میں معدہ کے مقام پر بے چینی ہوتی ہے *

ان دونوں بیماریوں میں جو فرق ہے نقشہ ذیل سے خوب واضح ہوتا ہے۔

ہے۔ ماپ۔ ٹے۔ می۔ سس	ہے۔ ما۔ ٹے۔ می۔ سس
۱۔ دم کی تکلیف سینہ میں درو یا گرمی	۱۔ غشیان۔ معدہ کے مقام پر بے چینی

۲۔ بہت بہت خون مٹے کے ساتھ آتا آتی ہیں۔	۲۔ کہا سنی کے ساتھ خون کی ٹھکیان
۳۔ خون جھگ دار ہوتا ہے۔	۳۔ خون جھگ دار ہوتا ہے۔
۴۔ خون سیاہی مائل ہوتا ہے۔	۴۔ خون خوب سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔
۵۔ خون میں غذا ملی ہوئی ہوتی ہے۔	۵۔ خون میں بلغم ملا ہوا ہوتا ہے۔
۶۔ پاخانہ کے راہ خون ہینن آتا ہے۔	۶۔ پاخانہ کے راہ خون ہینن آتا بشرطیکہ بیمار نکل جائے۔
۷۔ معده کی بیماری کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔	۷۔ برائیکسل یا شش کی بیماری کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔

اسباب۔ بعض دفعہ کوئی بھی سبب دریافت نہیں ہو سکتا۔ بعض دفعہ خون حیض یا کسی اور قسم کے جریان خون کے بدلے بیمار خون کی قے کرتا ہے + بعض دفعہ جب خون میں کسی قسم کی خرابی پڑ جاتی ہے تب خون کی قے ہو کر آتی ہے جیسے اس - کر دی کی بیماری میں + کبھی معده میں کسی امینہ - ریزم کے پھٹ جانے سے کبھی دل - کبھی جگر یا کسی اور عضو کی بیماری کے سبب جب دوران خون میں رکاوٹ ہوتی ہے تب بھی مریض خون کی قے کرتا ہے + مگر یہ بیماری معده کے کن جینین یا معده میں کنسر یا زخم کے ہونے سے اکثر پیدا ہوتی ہے ۔

علامات۔ بہ نسبت مردوں کے یہ بیماری عورتوں ہی کو اکثر پیدا کرتی ہے اکثر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ خون کی قے آنے سے پہلے فم معده یا پسلیوں کے نیچے بے چینی اور بوجہ اور دھیمادھیمادہ معلوم ہوتا ہے۔ مریض گھبرا جاتا ہے اور ایسا معلوم کرتا ہے کہ غش کہا کر گر جائیگا۔ اکثر جی متلاتا سر گھومتا اور بیض آہستہ اور کمزور ہو جاتی ہے اور خون کے آنے ہی بیمار خوف کہا کر نڈھال ہو جاتا ہے

اس بیماری میں تھوڑا سا خون رودہ میں بھی اتر جاتا ہے اور پانخانہ کے راہ خارج ہوتا ہے۔ پانخانہ کے ساتھ خون چاہے معدہ کا چاہے رودہ کا آوے اس بیماری کو مے۔ مے۔ نہ کہیں گے۔»

عسلج۔ چنہ گنبہ تک کہانے کو کچھ نہ دین تب دودہ سا گوداندہ یا آتش جو پلا دین۔ آج سہرہ دینے یا برف کے ٹکڑے چوستے دین۔ دوا کے طور پر اس نسخہ کا استعمال کریں۔

نسخہ۔ گیا لاک اسٹد ۱۵ سے ۲۵ گرین + ٹیکچر آف سے۔ فی مین ۲ ڈرام +
ارور ماٹک سلیفورک اسٹد ۱۵ سے ۲۰ بوند + ڈسٹیکٹ وائٹ آؤٹس +
سبکو ملا کر ایک خوراک کریں اور چار چار گنبہ بعد پلا دین + یہ نسخہ بھی مفید ہے۔
نسخہ۔ آئیل آف ٹرین۔ ٹامین۔ بونڈ + لاڈنم + بونڈ + میو۔ سلج ۱۰ ڈرام +
پانی ایک آونس + سبکو ملا کر دو دو تین گنبہ بعد پلا دین +

شوگر آف لڈ اور ایفون کی گولیاں بھی مفید ہیں۔ بعضہ نسخہ زیادہ مقدار میں ایک دو خوراک ٹیکچر آف اسٹیل کے پینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ فم معدہ پر بڑا لگانا بھی فائدہ کرتا ہے۔»

جب یہ مرض پُرانا ہو جاتا ہے یا تے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا خون آتا رہتا ہے تب یہ نسخہ مفید پڑتا ہے۔

نسخہ۔ ارو۔ ماٹک سلیفورک اسٹد ۱۵ ڈرام + کنیا وند ٹیکچر آف سنکونا +
ڈرام + ایفونٹن آف سنکونا + آونس + سبکو ملا کر چٹا حصہ دو یا تین دفعہ دیکو
پلا دین۔ اور اکثر کو نین اور نو لا دہی مفید پڑتا ہے +

سوم گس - ٹرائی ٹس

یعنی

معدہ کا انفلامیشن

یہ بیماری تین قسم کی ہوتی ہے ایک ایکوٹ گس - ٹرائی ٹس * دوم سب ایکوٹ گس - ٹرائی ٹس * اور تیسری کرائمک گس - ٹرائی ٹس *

اول ایکوٹ گس - ٹرائی ٹس

اس مرض کو ایکوٹ گسٹریک کٹا بھی کہتے ہیں -

اس کا باب - پیری - ڈسپو - ٹنک کا زہنچہ اور بوڑھے اور کمزور آدمی اور وہ جنکے ماضی میں خلل رہتا ہے جب کھانے پینے میں بے اعتدالی کرتے ہیں تب نسبت آدھون کے اکثر اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں *

اکسائیٹنگ کارز - جب کوئی تیز چیز کھانے پینے میں آتی ہے تب نہایت گرم یا نہایت سرد چیزیں - زیادہ مصالح اور شراب یا زہر کے قسم کی چیزیں جیسے ٹار مار اے ٹمک اور سنکھیا + بدن کے گرم ہونے کی حالت میں یہ ضروری پیا جاتا ہے تب ہی یہ بیماری ہو جاسکتی ہے *

علامات - آدمی جب کوئی تیز زہر کھا جاتا ہے تب فم معدہ کے مقام پر چھین کے ساتھ درد ہوتا ہے جبکہ وہ بانے سے شدت ہوتی ہے - یہ درد اوپر اور ہر گونہ مکرر شپٹ کی طرف پھیل جاتا ہے - برابر جی متلاتا رہتا اور اچکائی ان آتی رہتی ہیں - نبض تیز ہو جاتی ہے اور دم لینے میں تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے

تشنگی مشدت ہوتی ہے سر دیانی کو طبیعت نہایت چاہتی ہے گھسیٹنے ہی تھے
 ہو جایا کرتی ہے۔ اب لطیف نڈھال ہونے لگتا ہے غشی ظاہری ہوتی ہے۔
 نبض نہایت میرل ہو جاتی ہے۔ چہرہ ہلکا اور بد اطراف ہو جاتا ہے۔ اور چہرہ
 نہایت فکر مند۔ انفلا میشن بدستور جاری رہتا ہے۔ زبان سرخ اور چمکیلی ہو جاتی
 ہے۔ قبض رہتا ہے۔ پیشاب کم اور سرخ رنگ کا آتا ہے۔ کمال بے چینی اور بھکیا
 شروع ہو جاتی ہیں اور نہایت ضعف کی حالت میں بیمار تلف ہو جاتا ہے۔

صورت حال تشیرخی بعد وفات۔ - مدہ کے اندر رکا پردہ ہوا سے ہوتا
 سرخ پایا جاتا ہے اور چہل بھی جاتا ہے اور جا بجا سے عیام ٹرکے گئے ہیں لگتا ہے۔
علاج۔ - مدہ میں کوئی شے تیز موجود ہو تو فوراً نئے کراوین ابتدائیں جلا کر
 فائدہ ہوتا ہے مگر بار بار جلاب کا دینا بڑا نقصان ہے بلکہ حقہ کریں۔ فم ہر جو کین
 لگاویں اور ماشا سڈو کا استعمال کریں جیسے سوڈا یا پوٹاش لیور۔ اور دوسری۔ سنگ
 ڈرافٹ کے پلاوین نرٹیک برف کھلاویں۔ اینڈین کا استعمال کریں۔ بلانڈ فیوٹ
 پر برف کے لگانے سے اور کبھی کھمید کے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے غذا کے طور پر
 دو دو یا آتش جو پلاوین در نہ چھپا رہی کے ذریعہ غذا پہنچاویں۔ زہر کے خارج کرنے
 کے لئے ہٹک۔ پنپ کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ جب مریض نہایت کمزور
 تب غذا کی بڑی احتیاط کریں عرصہ تک گودانہ یا اراروٹ پلاوین کوئی غذا اخیل نہ دیں۔

دوم سب اکیوٹ گس ٹرائی ٹس

بہت قسم اول کے مدہ میں اس قسم کا انفلا میشن اکثر ہو جاتا ہے مگر اسکی علامتیں نسبت
 اکیوٹ انفلا میشن کے کمتر ہیں۔ یہ ہوتی ہیں لیکن سین۔ یہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے کہ جب اس
 قسم کا مرض عرصہ دراز تک قائم رہتا ہے تب مدہ کی پلاوین موٹی ہو کر سخت ہو جاتی ہیں

اگر پانی۔ لو۔ رتن تنگ ہو جاتا ہے۔ بلکہ معدہ میں زخم بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔

اسباب۔ بڑا بھاری سبب اس بیماری کے پیدا کرنے کا شراب ہے شراب کے پینے سے معدہ کا ستیاناس ہو جاتا ہے۔ اور ثقیل غذا کے کھانے سے بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ فاقہ کشی۔ بعد ریاضت کے سرد پانی کا پینا اور انقلابیٹن اور بجاہ کی بیاریوں میں بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسے اسکار۔ لے۔ ٹے۔ نا۔ ہیفہ۔ ہو۔ پنگ۔ کاف۔ اری۔ سی۔ پے۔ کن۔ ڈف۔ تے۔ ریا۔ پانی۔ ای۔ میا۔ چمک۔ اور۔ رو۔ پیو۔ لا۔ اور پلو۔ فیور اور نیو۔ مو۔ نیا۔ اور رو۔ ما۔ ٹیزم۔

تھوڑی تھوڑی مقدار میں سنکبیا کا کھانا۔ بعض فہ کاوٹ کی بیاری کا زہر بھی اس مرض کو پیدا کرتا ہو۔

علامات۔ جب یہ مرض خفیف ہوتا ہے تب تھوڑی بہت بدھمی کی علامتیں پائی جاتی ہیں جیسے زبان میللی۔ فم معدہ پر تھوڑی بہت بے چینی۔ قبض۔ فقدان اشتہا و زائ۔ سر اور گت۔ رین لینے ایک قسم کا درد سر جہین تے ہوا کرتی ہے۔ ایک ہلکا جلاب اور بعد ازاں غذا تھوڑی اور لطیف۔ ان علامتوں کے دفع کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے۔ جب مرض کبھی غار زباندہ شدید ہوتا ہے تب فم معدہ پر زیادہ تر بے چینی اور تکلیف معلوم ہوتی ہے اور معدہ میں درد بھی ہوتا ہے۔ پیشانی پر درد ہوتا رہتا ہے اور مریض بہت ہمت ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ دل دھڑکتا اور غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جی ہمیشہ متلا تار بہت اور منہ بہر بہر کے پانی آتا رہتا ہے۔ غذا اکثر تے ہو جایا کرتی ہے اور ساتھ اس کے بہت سارے پانی بھی خارج ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ پیش کے ساتھ دست آتے رہتے ہیں لیکن اکثر قبض رہا کرتا ہے۔ زبان میللی اور بیجاہ گندہ دہن ہو جاتا ہے۔ تشنگی کی شارت ہوتی ہے مگر غذا کی طرف سے طبیعت نفرت کر جاتی ہے۔

علاج۔ ثقیل غذا سے باندھ کر پینہ کرادیں۔ تپتی چیزیں پیئے کو دین نکالیں جلاب سے نفع قہر کرین۔ تپنے کے روکنے کے لئے ایفو۔ دی۔ سنگ۔ ڈرافٹ ہمارہ ڈوامی۔ لیوٹ۔ فائیڈ۔ و۔ سیباک اسڈ کے دین برف کا پانی پلا دین۔ معدہ کے مقام پر رائی کی ٹپٹی یا ٹیکسٹر کرین اور شاڈ و نادر جو ٹکون کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جب شدید علامتیں نفع ہو جاوے تب بستمہ ہمارہ مقویات کے استعمال کرین۔

سوم کرانک گس ٹرائی۔ ٹس

اسباب۔ وہی نامقول شراب خانہ خراب۔ اس قسم کی بیماری کو بھی پیدا کرتی ہے اور خراب یا ثقیل غذا کا برابر استعمال کرنا۔ دل شش اور جگر کی ساخت کی بیماریاں جسے دوران خون میں رکاوٹ ہو کر معدہ میں کرانک انفلیمیشن پیدا کر سکتے ہیں اور یہ مرض بڑانکائی۔ ٹس۔ تہائی۔ سیس اور شش کے ام۔ فائی۔ سی۔ ماکے ساتھ ہی پیدا ہو سکتا ہے۔

علامات۔ بعد غذا کے تکلیف اور بے چینی یا غلومدہ میں کوڑی کے نیچے درد معلوم ہوتا ہے۔ دل ڈوبا جاتا ہے۔ بہوک کا زیادہ لگنا لگنا غذا سامنے آتی ہی نفرت کا ہو جانا تشنگی شدت ہوتی ہے۔ منہ سے بدبو آتی ہے۔ موڑ سے نرم اور سرخ رہتے ہیں۔ زبان میللی اور سرخ۔ پیٹ چولار ہٹا ڈکا کر ٹش آتے ہیں۔ کلیجہ جلتا ہے۔ تپنے کے ساتھ کثرت سے پانی خارج ہوتا ہو دپائی۔ رو۔ سیس، قبض رہتا۔ کمزوری ہوتی ہے۔ دست و پاسر د رہتے ہیں۔ سر میں درد رہتا۔ بیمار پست ہمت ہو جاتا نیند آتی ہو اور دل دھڑکتا ہے۔ بیمار لاغر اور پیلا پڑ جاتا ہے۔

علاج۔ ایسی دوا دین جس سے معدہ کے میو۔ کس پر وہ سے زیادہ رطوبت کا خارج ہو جانا بند ہو جاوے جیسے سل۔ فائیڈ۔ اف۔ سوڈا حب نسخہ ذیل۔

لشخہ - سلفائیڈ اف سوڈا ۳۰ سے ۶۰ گرین + الفیوٹرون اف کویشیا ڈیڑھ آؤنس
دو نو کو ملا کر تین دفعہ پلا دین - یا بسمتہ کا استعمال کریں *

لشخہ سب نائیٹریٹ اف بسمتہ ۵۰ گرین + بائی - کار - بونٹ اف سوڈا ۳۰ اگر تین
کنیاؤنڈ پاؤڈر اف ٹریگا - کانتہ ۶۰ گرین + سبکو ملا کر ایک پڑیہ بنا دین اور دن میں
تین یا چار دفعہ کھلا دین یا لشخہ - کار - بونٹ اف بسمتہ - ۵۰ اگر تین *

کنیاؤنڈ پاؤڈر اف کائی - نو ۲۰ گرین + ایک پڑیہ بنا کر چار چار گھنٹہ بعد کھلائیں
اکسائیڈ یا نائیٹریٹ اف سلور ہی اس بیماری کو فائدہ کرتا ہے - چنانچہ -

لشخہ - اکسائیڈ اف سلور ایک یا دو گرین + ارو - مائیٹ پاؤڈر ۲۰ گرین +
اکسٹریکٹ اف ہیمپ ۱۰ گرین + سبکو ملا کر ایک گولی بنا دین اور دین میں تین دفعہ کھلائیں

لشخہ - نائیٹریٹ اف سلور ایک گرین + اکسٹریکٹ اف مائیو سی مش ۳۰ گرین +
دو نو کو ملا کر ایک گولی بنا دین اور دن میں تین دفعہ کھلا دین *

اگ - زالٹ اف سی - سی - ام بھی اس بیماری کو مفید ہے - چنانچہ -

لشخہ - اگ - زالٹ اف سی - سی - ام ۳۰ گرین + اکسٹریکٹ اف مائیو سی مش
۳۰ گرین + دو نو کو ملا کر ایک گولی بنا دین اور دین میں تین دفعہ کھلا دین *

کائی - نو اور لاگ - ڈوڈ سے بھی اس بیماری کو فائدہ ہوتا ہے - چنانچہ -

لشخہ - ٹیکو آف کائی - نو ۶ ڈرام + ڈی - کاک - شن اف لاگ ڈوڈ ۸ آؤنس
دو نو کو ملا کر چھ حصہ دین میں دفعہ پلا دین غولا در پر پھکڑی کا یہ لشخہ بھی مفید ہے

لشخہ - پھکڑی ۶۰ گرین + سلفٹ اف ایرن ۲۰ گرین + کوئین ۱۰۰ گرین +
ڈائیکوٹ سلیفورک اسٹ ایک ڈرام + پانی ۸ آؤنس + سبکو ملا کر اٹھواڑھ

حصہ دین میں تین دفعہ بعد غذا کے پلا دین + قبض ہو تو کنیاؤنڈ رووربرب - بل کا استعمال
کریں - مگ دو اچھو کر کرنے سے پہلے غذا کا پکا بندہ دبت کرنا چاہیے مثلاً چونہ کے

پانی کے ہمراہ دودھ پلا دین اور پتلی غذا جیسے شوربہ ساگو دانہ وغیرہ پلا دین فقیر
چیزوں سے احتراز کرین اور بڑھنے سے بھی شراب کا نام نہ لین ۛ

ٹوس - پپ - شیا

اگرچہ اردو میں ٹوس - پپ - شیا کو بھضی کہتے ہیں مگر بھضی کا لفظ ٹوس - پپ - شیا
کی کل علامتوں پر حاوی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے بھضی
کی شکایت کرتا ہے تب وہ اس مرض کو ایک اونی بیماری سمجھ کر عرق سولفائیہ قیویہ
یا داسا کا لائٹک کہاں مانتی دیتا ہے گو یا کہ اس کے نزدیک بھضی کی کچھ حقیقت ہی
نہیں ہے۔ مگر طبیب کے نزدیک ٹوس - پپ - شیا کل بیماریوں کی مانگی جاتی ہے کیونکہ
یہ بات ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ جب کسی گہرائی کے باورچی خانہ میں کہاں یا کباب
پختا ہے اور اس کہانے کو کنبہ کے لوگ کھاتے ہیں تو سب کے سب بیمار ہو جاتے ہیں
اسی طور پر مدہ جسم انسان کے گہرائی کا باورچی خانہ ہے جب معدہ بگڑ جاتا ہے تب
انہیں غذا اچھے طور پر ہضم نہیں ہوتی اس واسطے اس غذا کی پرورش آخر جسم کے کنبہ کے
لوگوں کو یعنی مختلف اعضا سے (جیسے دماغ شش دل جگر گردے وغیرہ وغیرہ)
کی پرورش کے لئے کافی نہیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ان اعضا کے انوال میں
خرابی پیدا ہو جاتی ہے یعنی دماغ جو کل اعضا پر حکمران ہے ضعیف ہو جاتا ہے۔
پہٹے سست ہو جاتے ہیں۔ جگر ماندہ پڑ جاتا ہے۔ گردے جکڑ جاتے ہیں۔ ناس کے
بلن کی صفائی کے لئے داروغہ مقرر فرمایا ہے وہ غریب بھی مارکر بیٹھ رہتے ہیں قصہ
کو تہا نہ تہا یا دین انکھناک کان وغیرہ جتنے اعضا میں غذا کے اچھے طور پر
ہضم نہ ہونے کے سبب سے بھی اندھے پڑ جاتے ہیں۔ تم نے نعمان حکیم کی کہانی
تو سنی ہو گی کہ انہوں نے معدہ کی تمثیل دیکر بگڑی ہوئی رعایا کو اپنے بادشاہ کا

میٹھ کیونکہ کر دیا تھا۔ خلاصہ اس قصہ کا یہ ہے کہ یونان کے کسی شہر میں کوئی بادشاہ تھا اور حضرت لقمان شیر سلطنت تھو۔ خدا کا کرنا بادشاہ کی کُل رعایا باغی ہو گئی اس بات پر کہ ہم تو محنت کرتے ہیں اور بادشاہ ہمارے کماؤ پر چین اڑاتا ہے ہم کس لئے اپنی جان ہلاک کریں۔ غرض رعایا اس بات پر منور ہو گئی اور بادشاہ سے بگڑ کر شہر چھوڑ دیا اور سب کے سب کسی پٹھانی پر جا بیٹے۔ بادشاہ کو نہایت تردد ہوا جاتو تھے کہ رعایا لقمان کو اپنا بزرگ سمجھتی تھی۔ بادشاہ نے بلو کہ کہہ کہ حضرت یہ وقت آپ کی حد دیکھئے۔ تشریف لیجائے اور رعایا کو سمجھائے۔ حکیم صاحب بموجب فرمان کے پٹھانی پر گئے رعایا تعظیم و قد ہو کر آداب بجالائی۔ حکیم صاحب نے فرمایا یا روثم نے یہ کیسا بکھیرا مچا رکھا ہے۔ کیونکہ میں اپنے گھروں کو لوٹ جاتے اور اپنے بادشاہ کی تابعداری کرتے۔ انہوں نے اپنا عذر بیان کیا۔ حکیم صاحب نے یہ کہانی کہہ سنائی کہ اسے لوگوں سنو۔ اگلے زمانہ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ اگلہ کان مانتہ باؤن اور کُل اعضا جسم کے معدہ سے اس بات پر خفا ہو گئے تھے۔ کہ ہم تو محنت کرتے ہیں۔ اور معدہ ہٹا حوام کا کہتا ہے۔ نہ ہم کام کریں گے۔ نہ اسے جٹھا کر اکٹھا نیگے آپ ہی ہر کام جاسکا۔ غرض مانتہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پاؤں چلنا پسپا کر کے کسے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ معدہ بیچا ہ پڑا پڑا بولکھتا تھا اور ان کی ہر توفی پر تاسف کرتا تھا۔ اور ہر جسم کے کُل اعضا خوش ہوتے تھے اور تسخو کے طور پر ہنس ہنس کے مریض سے پوچھتے تھے۔ کہ بتلاؤ بچا کیا حال ہے۔ معدہ غریب مسکاتا تھا اور کہتا تھا کہ خیر چند عوارض سہمی دیکھ لیکن ایک دن گزرا و دو دن گزرے تین دن گزرے غرض کہ اتنے میں ابتر ہو کر ہو کر کپٹنے لگے ٹانگیں تہر تہرانے لگیں۔ آنکھوں کی بھارت کم ہونے لگی۔ کان بہرے ہو گئے اور جسم کے دیگر اعضا کا بھی ابتر حال ہو گیا تب نو ایک دوسرے کا منہ ٹکٹنے لگے۔ آپس میں کہنے لگے یا روثم یہ کیسا ہو گیا۔ لینے کے

دینے لگے۔ تو برعکس ہو گیا ہم نے تو معدہ کو نرا ہی تھی آپ ہی مصیبت میں گرفتار ہو گئے لاچار معدہ کے پاؤں پر سبھوں نے اپنے اپنے سر رکھ دئے۔ اور عرض کی کہ حضرت ہم بھول گئے تصور معاف فرمائے تب معدہ نے بکار رکھنا سنا ہے یہ تو اگرچہ یہ سچ ہے کہ تم کھاتے تھے اور مجھے کھاتے تھے پر سارے کا سارا صرف میں ہی تو نہیں کھا جاتا تھا۔ تمہاری پرورش کے لئے ہی غذا تیار کرتا تھا۔ لہٰذا جو مینے معاف کیا پھر ایسا نہ کرنا۔ سب اُٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے معدہ بدستور آپ کھانے لگا اور انکو بھی کھانے لگا۔ پھر تو سب اعضا اگلے طور پر چاق ہو گئے اور جسم کا کارخانہ بھی بدستور جاری ہو گیا۔ منورف رعایا سمجھ گئی اور بادشاہ کی مطیع ہو گئی۔

تم نے دیکھا کہ صرف ایک معدہ کے بگڑ جانے سے انسان کے سارے جسم میں کیوں بگڑ خرابی برپا ہو جاتی ہے اور سعدی رحمۃ اللہ کا یہ شعر کہ -
شعر -
جو عضوے بد رو آدود و زنگار و گز عضو ما را ماند تشرار

اگرچہ دیگر اسقام جسمی پر بھی راست آتا ہے پر معدہ ہی کی بیماری پر زیادہ تر طلاق کرتا ہے۔

اور یہ کی تمہید سے تم سمجھ گئے ہو گے کہ میں اس بیماری کی علامتوں کی دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں ایک تو علامت خاصہ جو صرف معدہ اور دیگر آلات انضمام میں پائی جاتی ہیں اور دوسری علامت عامہ جو آلات انضمام کی خرابی کے سبب سے جسم کے کل اعضا میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن علامتوں کے بیان کرنے سے پہلے میرا جی یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ غذا کیونکر ہضم ہوتی ہے۔ گو حکیم مطلق نے غذا کے ہضم کرنے کی خدمت جن جن اعضا کی سپرد کی ہے جب تک انکی تشریح عام اور انکی ساخت کی بار یک مبنی تشریح سے واقفیت نہ ہو گی تب تک ان اعضا کے

مخفی مجسمہ میں نہیں آتے تھے پس پہلے ان اعضا کی تشریح بیان کر دینا چکا کام غذا کے ہضم کرنے کا ہے مگر چونکہ یہ کتاب تشریح کی نہیں ہے اور اسکے پڑھنے والوں کو یہ بھی سے تشریح سے واقفیت پیدا کرنی چاہئے اس واسطے اس موقع پر صرف اس قدر تشریح کا ذکر کرتے ہیں جس کا حفظ کر دو غبار سے پاک ہو جائے اور انگلی ٹیڑھی ہوئی تشریح انکو یاد آجائے *

اب توجہ ہو۔ دہن سے بیکر مبرز تک ایک پیچہ رانی ہے۔ کہیں سے پتلی کہیں سے ہتیلی ہوئی۔ اسکے مختلف حصے ہیں جن ساروں سے تم واقف ہو گے ورنہ اگر کتاب کو کیونکر سمجھ سکتے ہو عسلاوہ اس نالی کے جگر اور لبلبہ ہی غصہ کے فعل کو دیتا ہے۔ دہن کو جب ملاحظہ کرو گے تو اسمی انت دکھائی دینگے اور ایک لمبی عضو ہی نظر آدینا جسکو جدید کہتے ہیں۔ دانتوں کو بغور دیکھو گے تو انہی شکلیں طرح طرح کی نظر آدینگی یعنی کوئی تو چیرنے اور پہاڑنے کے ہونگے کوئی لٹرنے کے اور کوئی پسینے کے۔ زبان کو جب دیکھو گے تو اسپریشیا رچوئی چوٹی گلیٹان نظر آدینگی جن سے رات دن تھوک پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اب آگے بڑھو گے تو ایک ہتیلی نالی دکھائی دینگی + اور ڈایا فرام (دیا فراغ) پردہ کے نیچے اترو گے تو وہ ہتیلی نالی ہیکر ایک ہتیلی کے طور پر دکھائی دینگی جسکو عربی میں معدہ کہتے ہیں + ذرا بڑھ جاؤ اور اس معدہ کی سیر چھ طور پر کر لو دیکھو تو صانع مطلق نے اسکے اندر کیا یہ عجائبات رکھے ہیں لیکن تمہاری آنکھوں میں اس قدر نور کہاں جو وہ عجائبات دکھائی دیں۔ یہاں باریک بین کی مدد لو گے تو خدا کی قدرت کا تماشا دیکھو گے یعنی ذرا سا مکڑہ معدہ کا کاٹ کر باریک بین سے دیکھو گے تو بیشمار گلیٹان نظر آدینگی اور ان سے بحرمان لکڑہ معدہ کے اندر کے خملوں میں ان کے کلمے دھانے دکھائی دینگے *

چلو آگے بڑھو اور قدرت کا تماشا دیکھو۔ یہ پہلا حصہ رودہ کا ہے، نولہ سین بارہ
انگشت کا (اٹھاسو) پھر دہائی کرو دیکھو اس میں ایک سو پنج ہے۔ پتانگاؤ اس کا
تعلق کس سے ہے اس میں جگر اور پتہ کی مجری اور بلب کی مجری ملکر کہلتی ہیں۔ لہٰذا بڑے بڑے
اور کھلے رودون کی سیر کرو۔ انہیں کہو لکڑی بننے بائیں خوب نظر دوڑاؤ وہ داکا کا نغہ
قدرت کا نظر آتا ہے یہ دیکھو چوٹے چوٹے غزوہ اور آنکے دھانے۔ وہ دیکھو سفید رنگ
کی باریک باریک ریگسں رودون کے اندر کیجاں کیسی حال کی طرح پہیلی ہوتی ہیں گویا
کہ صنائع قدرت نے ان رودون کے اندر بابائے بن۔ نیٹ کا فرش بچھا دیا ہے۔ پہلاتا
تو نکات پر ریگسں کہاں (ما۔ سا۔) (نہ) کو جاتی ہیں گل جمع ہو کر ایک پتیلی میں گھلتی
ہیں (اعویہ ما۔ سا۔) ریتھ یعنی رمی۔ سیٹ۔ لٹ۔ کیو۔ لم کاٹھی لی) اب دیکھو ان
سے ایک اوزن نامی شروع ہوتی ہے جو فقرات پشت کے ساتھ ساتھ جاکر بائیں
طرف کی جو۔ گو۔ لر۔ دین اور سیٹ۔ کھی۔ وی۔ آن دین جہاں پر ملتے ہیں اس
جگہ کہکتی ہیں (تہو را سکت طو کٹ) آگے اور رودے میں جنہیں اوزن ہی سم کی عجائبات
ہیں۔ اب باہر نکلو۔ دین اور زبان میں جو غزوہ میں ان سے ایک لعاب پیدا ہوتا
رہتا ہے۔ اس لعاب دین میں کیمیا گروں کے بیان کے بموجب ایک خرد ہوتا ہے
جس کا نام انہوں نے ٹامی۔ لین رکھا ہے خواص اسکے یہ ہیں کہ جب لقمہ منہ کے اندر
داخل ہوتا ہے تب دانت اسکو کترتے اور چباتے ہیں اور زبان غذا کے اس لقمہ
کو منہ کے چاروں طرف پھرتی ہے اور لعاب دین میں سانسی ہے جس سے اس لعاب
کا ٹامی۔ لین اس لقمہ کے اسٹارچ کے ساتھ ملکر اسکو شکر بنا دیتی ہے تم نہتے کیون
ہو۔ یہ بات غلط ہے کہ غذا کا اسٹارچ تھوک کے ٹامی۔ لین کے ساتھ ملکر شکر میں بدل
نہیں جاتا اگر غلط ہے تو یہ بتاؤ کہ جب تم گہوٹ کی بوکھی دٹی کھاتے ہو تب تھوڑے عرصہ
کے بعد تمہارا منہ میٹھا کیوں ہو جاتا ہے۔ اس لئے میں چینی کہاں سے آئی کہ جس سے

مہار کے منہ کو میٹھا کر دیا وہی مائی - لین اس روحی کے استطیع کے ساتھ
ملگیا اور اس کو شکر بنا دیا تاکہ خون میں منجذب ہو سکے کیونکہ استطیع خون میں
جذب نہیں ہو سکتا ۰

معدہ میں جو غدود ہیں انکی تشبیہ کس سے دون انکو عطار کی دوکان کے قرائے کہوں
تو بجا ہے کیونکہ مثل قراہون کے اینین طرح طرح کے عرقیات ہوتے ہیں - نمک کا تیزاب
سکر کا تیزاب وغیرہ علاوہ ایک اور شے ہی ہوتی ہے جسکو پپ - ٹون کہتے ہیں
جب تم نے اٹنا عشرہ کی سیر کی تھی تب اس میں ایک سو باخ دیکھا تھا کہ جس میں مجری
صفر اور مجری لبلبہ کہلتی ہیں تاکہ صفر اور لبلبہ کی رطوبت اٹنا عشرہ میں آ جاوے
اگر پوچھو ان دونوں رطوبتوں کا یہاں کیا کام تھا تو سنو - صفر جب کیموس میں مل جاتا
ہے د کیموس پینے کا ٹائی سکھاتے ہیں کہ جب معدہ میں غذا کی ہیت بدل جاتی ہے
تب اسکی ترشی کو رفع کرتا ہے - علاوہ اسکے صفر سے عفونت رفع ہو جاتی
ہے اور رو دین کو بھی تحریک ہوتی ہے جس سے قبض نہیں ہونے پاتا اور لبلبہ کی
رطوبت کا یہ خاصہ ہے کہ جب کیموس کے ساتھ ملتی ہے تب اسکے اجزاء مد منہ
کو (روغندہ جزو) پہنچا کر ایسا زلال بنا دیتی ہے کہ اس زلال کو باسا - ریتھ کی ریگز
آسانی سے جذب کر لیتی ہیں اور استطیع کا جزو بھی اس رطوبت سے شکر میں بدل
جاتا ہے ۰ پہلا رو دین میں جو باریک باریک سیفد رنگین مثل حال کے پہیلی ہوئی
تم نے دیکھی تھیں وہ کس مصرف کی تھیں - وہ میان رکھو یہ وہ رنگین ہیں جو غذا کی
اصل کو رکائیل (کینیکر اس رنگ میں پہنچاتی ہیں جو سب - کلکی - وی - ان - دین اور
جو - گیو - لہ - وین کے آپس میں ملنے کے مقام پر کہلتی ہے تاکہ کائیل خون دریدی میں
ملکر قلب کے دینے خانوں میں ہوتے ہوئے شمش میں جا کر لورا قوام با جاوے اور
جسم کی پرورش کے قابل بن جاوے - پس یاد رکھو جب لقمہ منہ کے اندر داخل ہوتا ہے

تب دانت اُسکو چباتے ہیں اور زبان اُسکو دہن کے لعاب میں سانپتی ہے
 وہاں سے جب وہ نوالہ معدہ میں داخل ہوتا ہے تب معدہ کی رطوبت مائع
 (گشک جو س) کے ساتھ ملکر چرخ کہا تا ہے اب وہاں سے کھسکتا ہوا جب اثنا
 عشرہ میں آتا ہے تب اُسکی وہ کیفیت ہو جاتی ہے جو ہم نے اوپر بتلای ہے اب
 چون چون نیچے اترتا آتا ہے ردودون کے غدودون کی رطوبتون کے ساتھ مل کر
 اُسکا پرورشی جز علیحد ہو جاتا ہے جبکہ مار سا۔ ریتھ جذب کر کے خون میں پہنچائے
 جاتے ہیں۔ جو فضل چھٹ کر رہ جاتا ہے وہ براز کی شکل نیکر میرز کے براہ شکم سے خارج
 ہو جاتا ہے۔ اب دیکھا تم نے ماضیہ کا فضل کیونکر انجام پاتا ہے اسباب میں اگر زیادہ
 علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو مکملی صاحب کی فرزا۔ یا۔ لچی کا ترجمہ جو میں نے کیا ہے پڑھو
 اب بدھنمی کی علامتوں کا بیان سنو۔ پہلے۔

علامت خاصہ۔ معدہ جب بگڑ جاتا ہے تب اشتہا میں فرق پڑ جاتا
 ہے یعنی کہی تو بہوک زیادہ ہو جاتی ہے اور کہی کم اور کہی بالکل گنتی ہی نہیں *
 دوسری علامت قے اور غشیان کی ہے یعنی کھانا کھاتے ہی جی متکا
 لگتا ہے اور گھنٹہ دو گھنٹہ بعد قے ہو جاتی ہے اور مریض سارا کھانا اگل دیتا ہے *
 آروغ اور نفخ۔ کسی وقت کی غذا اچھے طور پر ہضم نہیں ہوتی ہے تب اس سے
 ہوا پیدا ہوتی ہے۔ یا معدہ کے بگڑ جانے سے تعفن ہو جاتی ہے اس سبب سے
 بھی ہوا پیدا ہوتی ہے۔ غرض اسطور پر جب ہوا پیدا ہو گئی تب پیٹ پھول جاتا ہے
 (پے دھائی۔ ٹش) اور دو کار (دای۔ رکن۔ ٹے۔ شن) آنے لگتے ہیں معدہ
 میں جب ترشی زیادہ ہوتی ہے تب تو دکار ترش آتے ہیں اور جب کھانگھرت سے ہوتا
 ہے تب آروغ بھی جکڑ آتے ہیں *
وجع المعدہ یعنی معدہ کا درد۔ یہ درد کئی طور کا ہوتا ہے چنانچہ بعض دفعہ

بہضم کے وقت معدہ میں صرف میٹھا میٹھا دروہوتا رہتا ہے اور کلیجہ جلتا رہتا ہے اسکو اصطلاح میں کار-ڈی-ال-جیا کہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ معدہ میں ایسی شدت کا درد ہوتا ہے کہ بیمار زسیت سے ناامید ہو جاتا ہے یہ درد اکثر خلو معدہ میں ہوتا ہے اور اصطلاح میں اسکو گرس-ٹرو-ڈی-نیا کہتے ہیں معدہ کے تشنج کے سبب سے یہ درد پیدا ہوتا ہے یعنی معدہ جب اپنے آپ پر ایٹھ جاتا ہے تب نہایت شدت کا درد ہوتا ہے اور جب ایٹھ رنج ہو جاتی ہے اور معدہ کی قدر و ڈیلا ہو جاتا ہے تب درد کو بھی تخفیف ہو جاتی ہے مگر غرض اسطرح کبھی خفیف اور کبھی شدید ہوتا رہتا ہے خدا دشمن کو یہی یہ درد دکھلائے وہ کی نوبت کیوقت بیمار ماہی بے آب کی طرح تڑپتا ہے ایک قسم کا درد مٹھتا بھی ہے جو کھانا کھاتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک غذا بہضم نہیں ہوتی ہے یا تے کے ذریعہ نکل نہیں لیتی ہے جب تک ہوتا رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معدہ کے کرائک انفلامیشن یا آسکے میو-کس پر وہ کے زخمی ہونے کے سبب سے یہ درد پیدا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے دو چار گھنٹہ بعد معدہ میں درد شروع ہوتا ہے اور کئی گھنٹے بعد معدہ میں درد شروع ہوتا ہے اور کئی گھنٹے بعد معدہ میں درد شروع ہوتا ہے اور کئی گھنٹے بعد معدہ میں درد شروع ہوتا ہے۔ یہ درد معدہ میں زیادہ تر شئی کے ہونے سے پیدا ہوتا ہے بعض دفعہ ایک قسم کا تشنجی دروایہ آدمیوں کو ہو جاتا ہے جو گاٹ کی بیماری میں مبتلا ہونے میں۔ نوبت اسکی رعنا شدت سے پیدا ہو جاتی ہے۔

پاجی-رو-سرمش-اس سلامت کو عام انگریزی زبان میں وارٹر-براش کہتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ فم معدہ پر ایک جلن سی معلوم ہو کہ یا تو قے ہو جاتی ہے یا دکار کے ذریعہ پانی کے طور پر تریش یا پیکی یا مکین یا ایک پتلی بطوبت کثرت سے خارج ہو جاتی ہے۔ پاجی-رو-سرمش کی علامت اکثر صبح کیوقت

کہ جب معدہ خالی ہوتا ہے پیدا ہوتی ہے پہلے فم معدہ پر ایک درو پیدا ہو کر
 بیار کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا معدہ کچھ کوب گیا ہے۔ یہ درد اکثر شہریدہ ہوتا
 ہے اور تھوڑے عرصہ تک رہ کر پانی کے طور کی ایک پتلی رطوبت کثرت سے
 خارج ہو جاتی ہے۔ یہ علامت بہ نسبت مردوں کے عورتوں میں زیادہ باہمی
 جاتی ہے اور بڑھاپے میں اکثر پیدا ہوتی ہے اور نظام عصبی یا رحم کی خرابی کے سبب
 یا معدہ کی ساخت یا بلبلہ یا جگر کی ساخت کے مرض کے سبب پیدا ہوتی ہے۔
 جو عرصہ سے بدبھمی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے فم معدہ پر ثقل رہتا ہے۔ جو منہ
 قبض رہتا ہے اور کبھی دست لگ جاتے ہیں زبان میل اور مرعشہ گندہ دہن
 ہو جاتا ہے۔

علامات عامہ۔ معدہ میں جب غذا ایسے طور پر فہم نہیں ہوتی ہے
 تب جسم کے کل اعضا میں کسی نہ کسی طرح کی خرابی ضرور پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ اوپر
 بتلایا گیا ہے چنانچہ معدہ میں جب غذا استعفن ہو جاتی ہے اور اس سے ہوا پیدا
 ہو کر معدہ پھول جاتا ہے تب ڈا۔ یا۔ زام کو اوپر کی طرف ٹھیل دیتا ہے جس سے
 دل اب جاتا ہے اور زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے اور اُس میں درد بھی ہوتا ہے
 کے اس درد کی نسبت میں اپنا تجربہ تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارے بار
 بہتر کے مریض ایسے آئینکے خامکہ دروسہ کے طالب علم اور یہ کہینکے کہ حکیم صبا میرے دل کے
 مقام میں درو ہوتا ہے اور بے چینی معلوم ہوتی ہے اس بات کو یاد رکھو ہمیشہ نہیں پر
 اکثر یہ درد اور بے چینی بہنہمی کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ اگر تم ان سے دریافت کر گے
 تو یہ کہینکے کان جناب مجھے کہنا نا اچھی طور پر فہم نہیں ہوتا بلکہ غذا کے بعد پیٹ تھوڑا بہت
 پھول جاتا ہے اور پاخانہ اکثر قبض رہتا ہے۔ جو وقت فہم کا وقت آتا ہے میرے دل
 کے مقام پر درد اور بے چینی معلوم ہوتی ہے۔ اور جب ایک دو دو گاہ کھل کر آتے ہیں

دل کے درد کو تخفیف ہو جاتی ہے مگر تھوڑے عرصہ بعد پھر درد ہونے لگتا ہے
لیکن جب غذا بالکل سہم جاتی ہے تب درد بھی جاتا رہتا ہے ایسے بیماروں سے
جست لیٹا نہیں جاتا اور نہ دہنی کر ڈ پر سو سکتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے
کہ اس قسم کا درد دل شراب خواروں ہی کو اکثر ہو جاتا ہے کیونکہ شراب کے
نشہ میں اندھا دہند جو پاتے ہیں وہ نوٹا ہون سے ہٹوٹے جاتے ہیں اور بغیر جیگا
بگلتے جاتے ہیں جس سے معدہ میں غذا شمعین ہو کر ریح پیدا ہو جاتی ہے اور
پہلا ہوا معدہ جب ڈا۔ یا۔ فرام کو اور کھیرف ٹھیل دیتا ہے تب بیچارہ دل
دب جاتا ہے اور اُس میں درد ہونے لگتا ہے ۵

علامہ درد دل کے جنکو مضمضی کہتی ہے اسکو درد مسر بھی کہتا ہے اور مسر بیماری اور
کن پٹی کی ریگن تڑپتی ہیں انکھیں خواب آلودہ ہوتی ہیں ہاتھ پاؤں ٹوٹنے لگتے
ہیں۔ مکر میں درد کرتا ہے۔ بعض دفعہ بنیاتی میں ہی فرق پڑ جاتا ہے۔ نسیان
ہو جاتا ہے۔ حافظہ درست نہیں رہتا۔ طبیعت کار و بار کی طرف سے نفرت
کرتی ہے۔ جی گر جاتا ہے۔ نیند آتی نہیں جو آتی بھی ہے تو طح طرح کے خواہ
خواہ نظر آتے ہیں۔ خواب میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کوئی سینہ کو مار رہا
اور بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیمار سوتے سوتے وحشت ناک خواب دیکھ کر گونگے
ہو پر گر گیا نہ لگتا ہے جہاں اسکو آسپ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہوت گا گہڑ
رہا ہے۔ لیکن درحقیقت یہ بھی ایک علامت مضمضی کی ہے اور یہ اسطوریہ سے پیدا
ہو جاتی ہے کہ جب غذا ہضم نہیں ہوتی تب اس سے ہوا پیدا ہو کر معدہ پہل جاتا ہے
یہ ہوا دکار کے ذریعہ باہر نکلنا چاہتی ہے۔ آدمی اگر جاگتا ہو تو کوشش کر کے دکار سے لپٹا
ہے تو نہ بوا خارج ہو جاتی ہے۔ لیکن نیند کھالت میں اُس ہوا کے نکلنے میں کوشش
نہیں کر سکتا اسلئے وہ ہوا معدہ کے قعر اعلیٰ کے راستہ امی۔ سا۔ فی۔ گس (دری ہیز)

اگر سو اکی تالی کو درے۔ کیا جو اسکے اوپر ہوتی ہے دباتی ہے تب م بند ہونے لگتا ہے اور بیمار گہر کر غینگی بیہوشی میں کچھ کا کچھ بچے لگتا ہے یا گونہ کے طور پر لگیانے لگتا ہے جب دو ایک ٹوکا رکھل کر آجاتے ہیں تب اسکو آرام آجاتا ہے +

اسباب - جب کہانا ہو سک سے زیادہ کھایا جاتا ہے یا جب غذا کچھ یا نسیل کھائی جاتی ہے یا اذیت کھائی جاتی ہے یا دانتوں کے درد کے سبب یا شراب کے نشہ میں اچھے طور پر چبائی نہیں جاتی ہے تب وہ غذا ہضم نہیں ہوتی۔ شرابی ہمیشہ بدھمی میں مبتلا رہتے ہیں + اس م کے پینے سے منہ کی رطوبت ماضم یعنی گشک جو اچھے طور پر پیدا نہیں ہونے پاتی اور جگر کا خلص بھی چونکر بگڑ جاتا ہے اسلئے صفر اچھے طور پر پیدا نہیں ہونے پاتا کہ ماضم کو مدد دے سکے + کھانے میں زیادہ پانی پینا بھی ماضم کو نقصان دیتا ہے کیونکہ اس سے گشک - جو سہ پٹا پڑ جاتا ہے اور غذا پائینا اثر اچھے طور پر نہیں کر سکتا - ہرے پیٹ میں کہانا بھی بدھمی کا باعث ہے - جب تک پانچ چھ گھنٹے گزرنے لیں تب تک دوسری مرتبہ کھانا نہ کھانا چاہئے + دندن کرنا زیادہ محنت کرنی - تھکان کے بعد کھانا کھانا - کھانا کھانے کے بعد ہی کام میں مشغول ہونا یا دوڑنا دھوپنا یا جلد جلد چلنا پہرنا - کسی چیز پر طبیعت کا زیادہ زور لگانا - ٹکر بچ و غم تر و دو دکا را و رکم طاقتی ان ساری باتوں سے بدھمی پیدا ہوتی ہے +

اس موقع پر ایک بیمار کا حال یاد آیا - اس نے مجھے ایسا معقول جواب دیا کہ دل بے اختیار چاہتا ہے کہ اس جواب کو اس جگہ درج کروں - وہ یہ تھا کہ جو - میں نے اُسے کہا کہ حضرت نکر و تر و دول سے دور کر دیجئے ورنہ دواسے فائدہ نہ ہوگا - اس نے جواب دیا کہ آپ سچ فرماتے ہیں مگر بقول استاد شعر - پہا کمر معیشت ہے دھان غدغہ خشر - اسودگی حریت یہاں ہے نہ دھان ہے + پر کینہ نکر و تر و دول سے دور ہو + مسدہ کا میوہ کس پر وہ یا غصہ لاتی پر وہ میں جب بیمار ہی ہوتی ہے یا جب گرا یا بک

فعل میں عمل واقع ہوتا ہے تب ہی یہ صفت ہو جاتی ہے۔ دماغ ریشش جگر یا رحم میں جب کسی قسم کی بیماری ہوتی ہے تب منہ میں بھی شرکت کے سبب شدت سے تڑپ ہونے لگتی ہے۔ جب خون میں کسی قسم کا زہر سرایت کر جاتا ہے جیسے بخار مہیضہ وغیرہ کا تب ہی معدہ کا فعل بگڑ جاتا ہے اگر وہ کسی سخت کیمیائی میں (کیمیائٹس ڈیزیز) جب یاور یا خون سے خارج ہونا نہیں پاتا ہے تب ہی شدت سے پونے لگتی ہے۔

علاج۔ مثلاً زائیکس کے اس مرض کے علاج میں ہی جب تک غذا کا کامل بندوبست نہیں کیا جاتا ہے تب تک اسے ہرگز فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ پس غذا کا انتظام پہلے کر دواؤں اور آجیو کر دو۔ اپنے بیمار کو پہلے کھانا کھانا سکھاؤ کہ کھانا جب سامنے آوے گا تب نہ بچے طور پر دھوکہ ٹھہنا چاہئے اس وقت تفکرات و تبادی کو دل سے دور کرنا چاہئے۔ کھانا آہستہ آہستہ اور خوب طرح چبا کر کھانا چاہئے ایسا نہ کرنا چاہئے کہ نوالے جلد جلد منہ کے اندر داخل کرتے گئے کچھ چبانے کچھ نہ چبانے کی نہی لگتے گئے کہ مبادا کہیں اس میں سوجھاؤ دھتر جاتا ہے۔ صاف جگہ اور صاف برتنوں میں کھانا چاہئے۔ کھانے سے پہلے پانی بالکل نہ پینا چاہئے اور درمیان یا بعد کھانا کھانے کے ہی کم پینا چاہئے۔ غذا کے بعد گھڑی دھکڑی آرام کرنا چاہئے۔ اس احتیاط کے پابند ہونے کے سبب سرکاری فائر کے قازم اکثر اس مرض میں مبتلا رہتے ہیں۔ دانت ہونے کے سبب غذا اچھے طور پر چبا جی نہ جائے تو مصنوعی دانت بنوالین۔ اکثر لوگوں کو مصنوعی دانتوں سے پرہیز ہوتا ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ اصلی دانت کی جگہ کسی جانور کے دانت جڑ دیتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے مصنوعی دانت چینی کے ہو کر تے ہیں اور دانت بنانے والے ایسے عمدہ طور پر ان کو بناتے ہیں کہ اصل اور فعل میں فرق نہیں کیا جاسکتا۔

بشرط یہی غذا سے پہلے یا کھانا کھاتے وقت یا غذا کے بعد یا کتنا معقول اور نہایت پر عادت ہے۔ میں بار بار یہ چکا ہوں کہ صحت میں شراب پینا مضر ہے۔ سودی کا یہ مصرع

کیا پُر معنی ہے چنانچہ کسی نے میرے سے سعدی کے اس مصرع کے معنی پوچھے
 کہ یکے نقصان مایہ و دیگر ثنات ہمسایہ۔ کہ کیا معنی ہیں میں نے کہا کہ اسکے معنی شراب
 کے ہیں۔ پوچھنے والا حیران ہو گیا۔ پہر پوچھنے لگا کیونکر۔ میں نے جواب دیا کہ دیکھو پتے سے
 خنجر کر کے ایک مفر صحت چیز یعنی شراب پیتے ہیں۔ مایہ کا نقصان ہوا کہ ہنہیں۔ اور
 دیکھو شراب پی کر شرابی کہلاتے ہیں اپنے کو رسوا کرتے ہیں لوگوں میں انکا چرچا چلتا
 ہے ثنات ہمسایہ ہوا کہ ہنہیں۔ ہے ہے ہندوستان اور شراب۔ بقول میر حسن
 مصرع ستم ہے ستم ہے ستم ہے ستم ہے ہندوستان میں شراب کا پینا گویا کہ آگ میں
 کبھی چھڑنا ہے۔ گرمی میں گرمی سر اسر ہو قونی ہے کہ کچھ اُفدہ۔

چاء کا استعمال۔ چار ایک فضول چیز ہے اور زیادہ پی جائے تو مضر صحت
 بھی ہے کہانے کے بعد اسکو نہ پینا چاہئے۔ بالکل زہینا ہی اچھا ہے اور جو پیتے ہو
 تو دو چار گھنٹہ بعد غذا کے پینی چاہئے۔ کہانے کے بعد کہ جو وقت عمدہ غذا اور پانی
 سے سیر ہو گیا ہو چاء کے پینے سے گھٹک۔ جس پتلا پڑ جاتا ہے۔

چار سے بہتر کافی ہے۔ مگر اسکے پینے کی بھی کچھ ضرورت نہیں ہم ہندوستانیوں
 کو تو دال روٹی چاول ترکاری دودھ دہی تھوڑا مکھن یا گھی نہایت موافق پڑتا ہے
 تم حیران ہو گئے ہو گئے کہ صاحب انہوں نے تو غذا کی ہرست سے گوشت کو بالکل
 اڑا ہی دیا۔ سنو گرم ملک میں گوشت کھانا اچھا نہیں اسکے کہانے سے جگر کے فضل
 میں تصور برپا ہو جاتا ہے جو بہت چاہئے تو تھوڑا کھاؤ۔ مگر گوشت میں تازی ترکاری
 بھی پڑی ہو وہ ہم ہندوستان کے لوگ سبات کو نہیں مان سکتے کہ غیر گوشت کھانے
 کے آدمی کو طاقت نہیں آتی دیکھو جو اچھے ہندو میں گوشت نہیں کھاتے پر انکا کیا بگڑتا
 ہے۔ کیا وہ کمزور ہیں یا انہیں طاقت نہیں ہے البتہ انہیں اور گوشت خوردن میں
 اتنا فرق صرف ہے کہ مثل گوشت خوردن کے صبح کو اُٹھتے ہی یہ لوگ جگر کے مقام پر

لکھیاں ہنہیں ہارے تم نے شیریں شہری سے ہر اس نکتہ کو سمجھ جاؤ ۔
 کہانا وقت معمولی پر کہانا چاہئے تاکہ بندہ کو اس وقت کا انتخاب رہے اور ہوک لگائے
 غذا ہضم نہیں ہوتی تو ایک وقت کی غذا کو تین چار دفعہ تقسیم کر کے کہانا چاہئے تاکہ معدہ
 کو بار بار گزرے اور مدد ملے نہ ہونا پادوسے ۔ جب غذا کا ایک کا بندہ دلت ہو چکے تب دوا
 تجویز کرو چنانچہ

بد ہضمی کا علاج دوا سے ۔ یاد رہے کہ بد ہضمی کی بیماری میں معدہ دو حالتوں
 سے خالی ہنہیں ہوتا یا تو اس میں ترشی زیادہ ہوتی ہے یا کہ رسی جز کا غلبہ ہوتا ہے چنانچہ
 معدہ میں جب ترشی زیادہ ہوتی ہے تب کھٹے و کارائے ہین اور تھے کا مادہ ترش
 ہوتا ہے اگر کہار زیادہ ہو تو کچا جو جلتا ہے تھے کا مادہ نکھین ہوتا ہے ۔ پس اس مختلف
 حالتوں کا علاج ترش یا کہار دوا سے کرنا چاہئے مثلاً معدہ میں کہار زیادہ ہو تو ترش دوا
 کا استعمال کرنا چاہئے جیسے پانی ملا ہوا تیزاب گوگرد یا تیزاب شورہ یا نمک کا ۔ گر میں
 دودھ سے نمک کے تیزاب کو اور تیزابوں سے بہتر سمجھتا ہوں ۔ ایک کٹ کو ٹینڈ ۔ د ۔ کلورک
 اسٹینے نمک کا تیزاب گسٹرک ۔ جوس کا ایک جز ہے ۔ دوسری وجہ یہ کہ نمک کے تیزاب
 میں چونکہ کلو ۔ رین ہوا ہوتی ہے اس واسطے یہ تیزاب غذا کو متضین ہنہیں ہونے دیتا ۔ مگر
 جب گیس ۔ ٹرک ۔ جوس کے کم پیدا ہونے کے سبب بد ہضمی ہو جاتی ہے تب میں
 پانی ملے ہوئے ٹائٹرو ۔ کلورک اسٹک کو ہمراہ خیسانہ چراتیا یا جن شین یا کلسو
 دیا کرتا ہوں اور بعض اوقات ان کو دمی نباتاتی خیر و نکاٹیکو بھی ملا دیتا ہوں اور معدہ
 کے اندر جب ترشی زیادہ ہوتی ہے تب کسی کہار دوا کا استعمال کرتا ہوں جیسے
 سٹو ا پٹاش اور بہتہ وغیرہ ۔

فے ۔ میں حکمت کا علاج کئی طور سے کرتا ہوں چنانچہ شرابی کو تھے اکثر ہو کرتی ہے
 اور مادے کا ترش ہوتا ہے ۔ پس ان پے مالنوں کے لئے یہ نسخے مفید ہیں چنانچہ

لشجہ - بائی - کار - بونٹ اف پوٹاش ۵۱ - گرین - ٹیکچر آف کلیمو ۳۰ قطرے۔
 انفیوژن اف چراتیا ایک آؤنس - سبکو ملا کر ایک خوراک کین اور دن میں تین دفعہ پلاوین
 لیکن جب تک شراب نہیں چھوڑ لی اور گوشت کی غذا کم نہیں کر دیا مگر ٹیک کسی دواسے فائدہ
 نہوگا۔ اور اس حالت میں یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

لشجہ - بائی - کار - بونٹ اف سوڈا ۵۱ - گرین - روبرب پاؤڈر ۵۱ - گرین - بسمتہ ۵۱ - گرین
 سب کی ایک پڑیر بناوین اور دین تین دفعہ کھلاوین۔
 جب تھے معدہ کی کسی آؤر خرابی سے ہوتی ہے تب یا تو ترش یا کٹ ادوا کے ہمراہ ڈائلوٹ
 فاسٹرو - سیانک اسٹک کے پلانے سے فائدہ ہوتا ہے چنانچہ۔

لشجہ - ڈائی - لیوٹ فاسٹرو سیانک اسٹک ۳۰ قطرے - کار بونٹ اف بسمتہ ۵۱ - گرین تازہ
 تیار کیا ہوا میو - سلج - ۲ آؤنس - پانی ۴ آؤنس - سبکو ملا کر بمقدار ایک آؤنس کے غذا سے
 پہلے دن میں تین مرتبہ پلاوین - اور استعمال کرنے سے پہلے شیشہ کو ہلاوین۔

اور اگر - خور - وی - سنگ ڈرافٹ کا بھی استعمال اس صورت میں کر سکتے ہیں - لیکن جب تک
 غذا کا انتظام نہیں کیا جاتا ہے تب تک کسی دواسے تھے نہیں رکھتی - جب تھے متواتر اور شدت
 ہوتی رہتی ہے اور نہیں رکھتی ہے تب آئیو - ڈین آؤر من - تھال سے بعض فائدہ ہوتا ہے
 چنانچہ دو یا تین قطرے ٹیکچر آف آئیو - ڈین ایک آؤنس گرم کیا ہوا پانی میں ڈالکر دن میں
 ۳۰ دفعہ پلاوین اور جو من - تھال کا استعمال کرنا ہو تو یہ نسخہ کام میں لاوین -

لشجہ - من - تھال دو یا تین گرین - شوگر اف ملک ۲ یا ۳ گرین - دونوں کو ملا کر دن میں تین
 دفعہ پلاوین - اس علاج سے اوس تھے کو بھی فائدہ ہوتا ہے جو ایام حل میں ہوا کرتی ہو۔

در د معدہ - اوپر یہ بتلایا گیا ہے کہ معدہ میں کتنی قسم کا درد ہوتا ہے چنانچہ ایک نووہ درد
 شدید جو معدہ کے تشنج کے باعث اور ترشی کے زیادہ ہونے کے سبب ہوا کرتا ہے اس قسم
 کے درد معدہ کو گھٹا - ٹرو - ڈی - نیا کہتے ہیں - پس -

علاج در و گرس - ٹرو - ٹومی - ٹینا کا - جب نوبت اس رو کی خفیف ہوتی ہے تب
 سینک اور رائی کی پٹی لگانے سے اسکو تخفیف ہو سکتی ہے لیکن جب نوبت اس کی شدت سے
 ظاہر ہوتی ہے تب گھنٹوں میں سینک کو ولیدے کئی کئی دفعہ رائی کی پٹی لگائی ہے کسی سے کچھ
 بھی فائدہ نہیں ہوا ہے - پس جب دیکھتا ہوں کہ در و کی نوبت ہر آن شدید ہوتی جاتی ہے
 تب بیمار کو ایک گرین ٹائیڈ رو - کلو رٹ - اف - مار - فیڈر یعنی ایک لائیکو ایکادو و ڈرام
 لکھا دیتا ہوں - اس کے کھلاتے ہی بیمار کو نیند آ جاتی ہے - دوسرے دن کوئی ہلکا سا جلاب
 دیتا ہوں بھی شد - ڈیٹر پاور ڈریکٹر اٹیل اور تب بیمار کی غذا کا پکا بندوبست کر کے عورت
 تک اس نسخہ کا استعمال کریں -

نسخہ - باجی - کار - جونٹ اف پوٹاش ۵ اگرین - اردو - مٹک اسپرٹ اف ایمو - نیب
 ۵ قطرے - نیچر اف ایونڈینٹ ۵ قطرے - انفورژن اف ٹائٹ ڈیڈ اولس ۵ سبکو ہاک
 ایک خوراکہ گرین اور ایسے ہی ایک خوراک چھ چھ گھنٹہ بعد پلاوین اس در و کے بیمار کو اکثر
 قبض کا کرتا ہے - میری حاجت جلاب دینے کی نہیں بلکہ رفع قبض کی واسطے مین روغن بادام
 کا استعمال کرتا ہوں یا زار کا نہیں بلکہ خانہ کشیدہ کیونکہ یار کے روغن میں ہمیشہ کپوٹ
 ہوا کرتی ہے غرض اس روغن کا ایک یا دو تولہ ہر روز دوسرے روز دپلو اتا ہوں اس سے
 ہر روز اجابت با فراغت آ جاتی ہے اور رفع قبض کے واسطے مین ایسا بھی کرتا ہوں کہ اوپر کے
 نسخہ کی فی خوراک مین ۲ یا ۳ قطرے لے - کوٹڈاکٹر لکٹ اف کے - رابٹ - ری - ڈاکے
 ملا دیتا ہوں - جب خلوصہ مین مدد ہوتا ہے تب غذا کے کھانے سے آرام آ جاتا ہے یا کبھی
 دو آون کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے -

اگر معدہ کے کراکپ انفلامیشن یا اس کے پردہ کے تھنسم کے باعث درد ہو تو اسکو مائیسٹ
 اف سلور سے فائدہ ہوتا ہے - چنانچہ نسخہ - مائی ٹرٹنق سار لہ گرین ساکٹر لکٹ اف مین بن
 سا گرین - دونوں کو ملا کر ایک گولی بنا دیں اور بارہ بارہ گھنٹہ بعد دس روز تک لکھا دیں -

غذا کے دو چار گھنٹہ بعد جب درد ہو تو اکثر اسکو بہار دو اون کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے (دیکھو پیچھے نسخہ سودا اور لیسیتہ کا)

پانی - روکس - رسین بہت سا کہنا یا نمکین پانی پئے کے ذریعہ خارج ہوتا ہے - غرض اس عسارت کو قابضات سے فائدہ ہوتا ہو جیسے کیا - لاک اسٹ اور فیون یا کیا وڈ کاٹی - نو پاؤڈر یا کیا وڈ کے - لٹے - کیو پاؤڈر یا لیسیتہ یا کو - نام یا بلا - وڈنا جب گمشدہ - جس کے کم پیدا ہونے کے سبب سے کہانا ہضم نہیں ہوتا ہے تب اکثر اس نسخہ سے فائدہ ہوتا ہے ۔

لشخہ - مائے - ٹرو - مائڈرو - کلورک اسٹ ڈائلیوٹ ۴ ڈرام + لائے - کوک اسٹک - مین ۲۴ قطرے سے ایک ڈرام تک + اسپرٹ اف کلورا - فارم ۴ ڈرام + ٹینکچر اف جیجر ۳ ڈرام + پانی ۸ - آؤنس + سبکوٹا کر اسکا آٹھواں حصہ ہمراہ ایک لٹر پانی کے تین دفعہ دین پلاوین + ماضیہ صرف ضعیف ہو گیا ہو اور معدہ میں زیادہ جڑی بوٹی ہوئی ہو تو کڑوی بناتی دو اون کا ٹینکچر یا جیسا مذہ کا استعمال کریں جیسے چرتیا یا گلو یا زیم یا جن - شن + یا بارک + جیٹیدہ علامتیں رفع ہو جائیں اور بعض صرف کمزور ہو تو فلاو کے ان ٹینجن میں سے کسی کا استعمال کریں +

لشخہ - ٹار - ٹری - ڈاٹ - ایرن ۱۰ گرین + ارو - مائک اسپرٹ اف ایونیاس ۳ ڈرام + انفیوژن اف کواشیا ۸ آؤنس + سبکوٹا کر چٹا حصہ دین تین دفعہ پلاوین + لشخہ - سائی - ٹریٹ اف ایرن اینڈ ایونیاس ۱۰ گرین + کاربو - خٹ اف ایونیاس ۱۰ گرین + ٹینکچر اف جیجر ۳ ڈرام + پانی ۸ - آؤنس + سبکوٹا کر چٹا حصہ دین تین دفعہ پلاوین + لشخہ - ڈائی - ساٹ اسونی سائی - ٹراس ۱۰ گرین + ارو - مائک اسپرٹ اف ایونیاس ۳ ڈرام + بائی - کار - پونٹ اف پوٹاش ۴ گرین + انفیوژن اف کلہا ۸ آؤنس + سبکوٹا کر چٹا حصہ دین دو دفعہ پلاوین +

لشخہ - فراخی - اٹ - اموئی - ساجی - ٹراس - ہم گرین + لائیگوار - اسٹرک - نے ۳۰
 وطرے + الفیوثرن - اف - کوہشیماہ آؤش + سیکو ملاکر ایک آٹھواں حصہ نہیں دے
 دفعہ بلاوین +

لشخہ - ری - ڈیوٹنڈ ایرن - ہم گرین + وحی لے - ری - نٹ - اف - زنک - م - گرین +
 اسٹرک - نائٹن ایک گرین + گلائی - سی - ریٹن حسب ضرورت + سیکو ملاکر احتیاط سے
 - آگولیون میں تقسیم کریں اور اپنی چاندی کا ورق مڑ کر ایک ایک گولی بعد غذا کے دینے
 تین دفعہ کھلا دیں +

پیپ - مین ہی ایک دوا ہے جس سے کہتے ہیں گیس - ٹرک جو س پیدا ہوتا ہے اور فم
 کو مدد ہوتی ہے مینے بھی اس دوا کو چند انگریزوں میں آزمایا ہے لیکن جیسی اسکی تفریف
 مست تھا ویسا اسکو نہیں پایا +

ہندوستانیوں میں نہ مینے اسکو استعمال کیا ہے اور نہ میں تم کو استعمال کی صلاح
 دیتا ہوں کیونکہ جس چیز سے یہ بنتی ہے (دیکھو قرابادین رحیمی) ہندو اور مسلمان دونو
 کو اس سے پرہیز ہے +

السرف وخی - اشک

اس بیماری میں بہ نسبت مردوں کے عورتیں زیادہ تر مبتلا ہوتی ہیں اور ایک یا دو قاعدے
 کو سامنے کے حصہ اور پیچے کے خم اور خم اعلیٰ کی نسبت معده کے پچھلے حصہ اور اوپر کے خم
 اور خم اسفل میں ہی زخم اکثر پیدا ہو جاتے ہیں + زخم کے سبب سے معده بہت کم پیدا
 جاتا ہے اور جب سوخا ہو جاتا ہے تب بے - ری - ٹو - نامی - ٹیس ہو کر پیا مر جاتا ہے -
 علامات - خم معده کے پوڑے سے مقام پر کوڑھی کے پیچے کہاں لگتا ہے یہی
 یا بعد غذا کے درد معلوم ہوتا ہے گھنٹہ یا دو گھنٹہ تک دہا کر چون چون معده عالی ہوتا

جاتا ہے نفع ہوتا جاتا ہے اور فم معدہ کے محافظی پشت پر بھی سیاہی محدود و درد اکثر معلوم ہوتا ہے جب کوئی ثقیل غذا کھائی جاتی ہے یا کوئی چیز گرم یا تر پی جاتی ہے تب اس درد کو شدت ہوتی ہے اور جوان عورتوں میں یا بام حیض کے قریب اور زیادہ ہوتا ہے بیمار کا جی ملتا ہے اور تھکتی ہوتی ہے ساتھ اس تھکے کے یا تو غذا یا ترش رطوبت یا صفرا یا خون اخراج پاتا ہے بعض دفعہ پاخانہ کے ہمراہ بھی خون آتا ہے پاخانہ اس میں اکثر قیض رہتا ہے بیمار لاغر ہو جاتا ہے۔ چہرہ فکر مند اور تکلیف زدہ۔ اکثر اس بیماری میں جی تکلیف بہت کم ہوتی ہیں اور بعض دفعہ خاص معدہ کی تکلیف بھی کم پیدا ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ معدہ کا زخم بہت جلد بڑھ جاتا ہے اور زخم کے پیدا ہونے سے چند ہفتہ کے اندر معدہ چھید بھی جاتا ہے مگر یہ حادثہ کم وقوع میں آتا ہے + بعض حالات میں زخم یہ سو تک رہ سکتا ہے اور اسکی معمولی علامتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں کبھی کبھی اس سے خون جاری ہو جاتا ہے آخر کار معدہ چھید جاتا ہے +

اسباب۔ پری۔ ڈسپو۔ زنگ۔ کاز۔ عورت کا ہونا۔ کثرت شراب خاری۔ تھک جانا اور فکر و غم۔

تشخیص۔ اس مرض کو ڈس۔ پری۔ شیا اور پرائی کیا سٹری۔ ٹس اور گیس۔ ٹرال۔ جیہ کے درد سے فرق کرنا چاہئے چنانچہ اس مرض میں فم معدہ کو دبا کر سے ایک محدود جگہ پر درد معلوم ہوتا ہے اور اس درد کی ٹیس پشت پر بھی محسوس ہوتی ہے اس میں بار بار تھکتی ہوتی ہے اور خون آتا ہے +

علاج۔ غذا ہلکی اور پتلی ٹوین سٹاک دودھ آدھا شوربہ ساگو دانہ لیکن خمر اور چارہ وغیرہ گرم عرقوں کا استعمال نہ کریں۔ دبانے سے درد بہت ہو تو مقام درد پر زنی کی پٹی یا بلستر لگا دیں شدت کا درد زیادہ ہوتا ہے تو انہیں کا استعمال کرنا

اگر گیسٹرو-ڈی - نیا اور پائی - روئس کی علامات موجود ہوں تو نائٹریٹ آف سسٹم
کا استعمال کریں - شدت کی تہ ہو تو ڈائیلوٹ - ٹائیڈ روئس یا ٹانک رس کو
کام میں لادیں اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں دودھ اور ساگو دانہ کھلا دیں خون تپتا
ہو تو گاہے گاہے برف کھلا دیں اور مرض ہماٹے - جی سسٹم کا علاج کریں تینس ہو تو کٹر
پلاک روغ کریں - دست آتے ہوں تو کیناؤنڈ یا ڈوڈر اف کائیو کا استعمال کریں انے میا
اور کمروری کی علامتیں موجود ہوں تو سائٹریٹ ان ایرن انڈ - کوئین گلابی سٹی
میں حل کر کے پلا دیں - جب یہ مرض شراب خواروں کو ہو جاتا ہے تب انکا امید بلیج
شراب کو خود زچہ پڑیٹے تو تھوڑے ہی عرصہ بعد شراب انکو خود چھوڑ دیگی مگر انکو بھی
زیادہ مقدار میں نہ پینے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے »

کنسر - آف - وی - اسٹمک

علامات - عین ابتدا میں بخیر بد بطنی کے کوئی خاص علامت اس مرض کی ہنیر
پائی جاتی لیکن بعد تھوڑے دنوں کے بیمار لاغر ہو جاتا ہے بد بطنی سکتا ہے اور نرم
معدہ میں ایک محدود سولی محسوس ہوتی ہے اسوقت جلن درد اور ٹیسین معلوم
ہوتی ہیں - جی متلا تہے - کہنے اور بدبودار دکارین آتی ہیں - تپے ہوتی ہے جسکے ساتھ
یا تو غذا یا ریلو بت میو - کس باجون اخراج پاتا ہے - بالکل قبض ہو جاتا ہے - شکم کڑکڑ
دب جاتا اور سخت ہی ہو جاتا ہے مریض نہایت لاغر ہو جاتا ہے - چہرہ پتلا اور
خکرمند ہو جاتا ہے - جب کنسر کی بیماری معدہ کے فاسفل میں ہوتی ہے تو غذا
امعا میں آتہ نہیں سکتی اور معدہ میں جمع ہو کر متھن ہو جاتی ہے اور تپے کے
ذریعہ نکل آتی ہے »

اسباب - پیر پیٹ - ڈیسیپو - زنگ - خاص طبیعت »

اکسائیٹک - کانزیر پناڈس - پیپ - شیا اور شراب خوار می ۔
 علاج - غذا ہلکی اور پتلی - مثلاً ساگو دانہ - دودھ یا دودھ اور سوچی - اس غذا
 کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں بار بار کھلانا چاہئے - معدہ میں ترشی زیادہ ہو
 ہو تو دودھ کے ساتھ چونہ کا پانی ملا دین یا سوڈا کا استعمال کریں نہیں ایک یا دو
 دفعہ ہر روز غذا کی پچا کرین - شکم پر کاؤ - لیورائیل کی ماش کریں - درد رفع
 کرنے کے لئے جو کین لگا دیں - ایون کھلادین - فو - من - ۷ - شن کریں اور بیمار
 کو آرام سے رکھیں ۔

مقالہ چھپا رم

امراض الامعا

اول مرض ہی - سائی - ٹس

سیکم یعنی معا اور جو دہنی ہی - لا - ایک - فاسا میں ہوتا ہے اور جسکے صرف سامنے
 اور دونوں بطنوں پر پردہ ہے - ٹو - فی - ائم ہوتا ہے کبھی کبھی بیماری میں مبتلا
 ہو جاتا ہے چنانچہ جب اس حصہ ر دودھ میں سخت سستہ یا میوہ جات کی کھٹلی
 یا چمکے یا خام سیب یا بیر کے ٹکڑے یا کچھوے یا چمنے کے گولے جمع ہو جاتے ہیں تب
 یا تو سخت سے توجیح کا درو یا بعض ہو کر بیمار کی ہلاک کر ڈال سکتا ہے اس دودھ
 میں بعض دفعہ امعا کا فضلہ اس قدر جمع ہو جاتا ہے کہ وہاں پر ایک بڑی سولی بن
 جاتی ہے - جب اس دودھ میں یا اس کے نکال میں (جسکو مطلق میں دڑے - خام
 پر ایسٹس کہتے ہیں ان کشیاء مذکورہ بالا میں سے کوئی شے پھنس جاتی ہے تو
 سخت کا نام لیتے ہیں ۔

انفلوینس کی بیماری یا تو صرف اُس رودہ کے میوکس پرودہ ہی میں محدود رہ سکتی ہے یا اسکے تینوں پُرت اِس مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بہر حال اِس مرض کو اصطلاح میں یا تو سی۔ سائی۔ ٹس یا ٹف۔ لائی۔ ٹس کہتے ہیں اور لُجب انفلوینس صرف رودہ کے نکال ہی میں محدود رہتا ہے تب علامات نہایت شدید پیدا ہوتی ہیں۔

علامات۔ مرض سی۔ سائی۔ ٹس کی علامات یہ ہیں کہ خفیف بخار ہوتا ہے نیند بہت کم پڑتی۔ بہوک مرتباً ہوتی ہے۔ جی متلاتا ہے۔ اُبلکا ہینا آتی ہیں اور پانچا کبھی قبض اور کبھی ست لگتا ہے۔ دہنا سی۔ لاکھ رمی جن پر محدود ہوتا ہے اور در در کے لگتا ہے۔ وہ دہانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ بیمار ہاتھ پاؤں سمیٹے ہوتے یا توجہ یا دہنی کروٹ پر لیٹا رہتا ہے۔ مگر قبض متواسقہ تر ہوتی ہے اور نہ چہرہ ایسا لکڑھٹا ہوتا ہے جیسا پے۔ ری۔ ٹو۔ نامی۔ ٹس یا ارن۔ ٹے۔ رائی۔ ٹس کی بیماری میں ہوا کرتا ہے۔ جب یہ بیماری بڑھنے لگتی ہے تب اُس پر جو حصہ پے۔ ری۔ ٹو۔ نیم کا ہوتا ہے اُس میں بھی انفلوینس ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ انفلوینس سارے پے۔ ری۔ ٹو۔ نیم میں پھیل جاتا ہے اور ترقی پانچویں سی۔ لیو۔ لمر۔ ٹے ریشہ میں پیپ رڈ کروٹیل پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ڈنبل یا تو باہر ہوٹ سکتا ہے یا رودہ میں یا عورت کے اندام نہانی میں ہوٹ جاتا ہے تب بیمار کو تھوڑے عرصہ کے لئے افادہ ہو سکتا ہے لیکن ڈنبل پہرہ جاتا ہے۔ اس طرح جب کئی بار بہتر اور بد ہوتا ہے تب پیپ رڈ ہر دو راستہ کر لیتی ہے اُس وقت ایک نہایت خونناک مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ڈنبل پرودہ پے۔ ری۔ ٹو۔ نی۔ ام کی تہیلی میں ہو جاتا ہے تب بیمار کو نہایت تکلیف ہوتی ہے اور چند گھنٹوں کے بعد تلف ہو جاتا ہے جب کسی جسمانی سبب سے اس کا

اس رودہ کے نکال میں ہو جاتا ہے تو ابتدا ہی سے نہایت شدت کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں چنانچہ نہایت شدت سے پیش ہوتی ہے بیٹ پھول جاتا ہے ہچکیاں ستاتی ہیں اور شدت سے تپے ہوتی رہتی اور - وی - رمی یا خضہ یا ران میں درد ہوتا ہے اور قبض ہو جاتا ہے - اکثر چائے ماؤف مردار بھی پڑ جاتی ہے تب عام پیے - رمی - ٹو - نامی - لٹس ہو کر بیمار مر جاتا ہے - بعض دفعہ سکیم میں کرانک انفلامیشن بھی ہو جاتا ہے اسکے علامتیں تدریج اور خفیفہ طور پر ظاہر ہوتی ہیں چنانچہ نوبت بنوبت درد ہونے لگتا ہے - بیمار لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے - دہنی ای - لایک - رمی - جن میں قورلچ کا سا درد ہونے لگتا ہے - بیمار کا پیٹ پھول جاتا ہو کر مر جاتی ہے - کبھی تو قبض اور کبھی ست لگتا ہے - اکثر میو - کس پر وہ اس رودہ کا زحمن ہو جاتا ہے تب خون جاری ہونے لگتا ہے ۔

علاج - اس بیماری میں جناب ہرگز نہ دینا چاہئے مقام مرض پر پو لٹس لگا دین اور بیمار کو اس قدر اینون کہلا دین کہ جس سے درد کا آرام آ جاوے اور اسکے اثر کو چند روز تک قائم رکھیں ۔ غشیان اور تپے روکنے کے لئے ایے - فر - رمی - سنگ - ڈرافٹ یا سوڈا یا بسہمتہ یا ڈائیلوٹ ٹائیڈرور سیانک اسڈ کا استعمال کریں - برف کہلا دین اور جو دستوں کی ایسی ضرورت ہو تو کسٹرائیل کی بچکا رمی کریں اور جب تک شفا کئی ہو بیمار کو چٹ چاب بستر پر لٹا رکھیں - کھانے کو بجز پتیلی غذا کے اور کچھ نہیں جب لرزہ اور دیگر علامات پیپ پیدا ہونے کی ظاہریوں تب ایو - نیا براڈ می لورٹ ڈائین بیفہ شوربہ وغیرہ کا استعمال کریں - ڈونل ہر طرف پھوٹنے والا ہو تو احتیاط سے چیر کر اس پر مختلف مقدار کی گدیاں باندھیں تاکہ پہرہ نہ جاوے - اس مرض کے کرانک قسم میں بیمار کو غذا متعوی دین کو نہیں اور اسڈ کا استعمال کریں اور کا ڈیوٹر ل سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے ۔

ان - ٹے - رائی - ٹس

چھوٹے رودون کے انفامیشن کو ان ٹے - رائی - ٹس کہتے ہیں مگر یہ بات ہمیں کہی جاسکتی کہ آیا انفامیشن ڈیو - ٹی - نم (نا عشرہ) یا جے - جیو - نم (دقائق) یا ای - ٹی (صائم) میں ہے - علامہ انین انفامیشن یا تو اس رودہ کی مکمل پرتون میں ہو جاسکتا ہے یا صرف میو - کس پرت ہی میں محدود رہ سکتا ہے ۔

علامات - یہ بیماری اکثر اسطور پر شروع ہوتی ہے کہ بیمار کو لرزہ ہوتا ہے جسم گرم نبض تیز اور تشنگی ہوتی ہے - شکم میں خاصکراف کے گرد مثل قویج کے شدت کا درد ہونے لگتا ہے - جی متلاتا اور شدت سے تنے ہونے لگتی ہے - شکم کو دبائے سے درد زیادہ ہوتا ہے اور ابتدا ہی سے اس مرض میں قبض رہتا ہے - اربا ایسا ہوتا ہے کہ دفعتاً پیٹ پہلے لگتا ہے - شکم کا درد اکثر کم یا بالکل موقوف ہو جاتا ہے لیکن تپے پر ستور جاری رہتی ہے اور قبض بھی اسی طور پر رہتا ہے - ہچکچاتی ہین اور حالت ردی طاری ہو جاتی ہے - چہرہ وب جاتا ہے نبض کمزور - ماتہ یا وزن سرور اور سار جسم سرور پسینہ سے مرق ہو جاتا ہے مگر مرتے دم تک ہوش و حواس قائم رہتا ہے - پہلے تو جو کچھ معدہ میں ہوتا ہے وہ ہمراہ کٹرک - جوس اور صفرا کے تپے کے ساتھ خارج ہو جاتا ہے بعد ازاں تپے کے مادہ میں نہایت بدلہ ہوتی ہے اور جسد فوم بران کی تپے ہونے لگتی ہے جسکو اصطلاح میں ایش - ٹیڈ - کو - ری - شش - وا - مے - ٹنگ کہتے ہیں - نبض پہلے تو پُر اور سخت ہوتی ہے پھر مگر جلد اسقدر کمزور ہو جاتی ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتی ۔

تشخیص - اس بیماری اور کا - لٹ میں یہ فرق ہے کہ اس مرض میں بخار ہوتا ہے اور نبض تیز جسم گرم - کا - لٹ میں بخار نہیں ہوتا - جسم کی حارات صحت کی حالت پر

رہتی ہے۔ اس بیماری میں شکم کے اندر جو روہوتا ہے وہ بتدریج بڑھتے بڑھتے
 شدید ہو جاتا ہے اور جب تک روہ مردار نہ پڑ جائے برابر ہوتا رہتا ہے مگر دو دن
 کے مردار پڑ جانے سے دفعتاً موقوف ہو جاتا ہے۔ کاک کا روہ چونکہ تشنجی ہے تو کبھی مادہ
 اور کبھی کم ہو جاتا ہے لیکن دفعتاً موقوف نہیں ہو جاتا۔ ان۔ ٹے۔ راجی۔ ٹس
 کا بیمار روتا ہوا ون سمیٹے ہوئے چت پڑا رہتا ہے کاک کا بیمار پیٹ پر تکیہ
 رکھ کر اونٹ کا پڑا رہتا ہے۔ ان۔ ٹے۔ راجی۔ ٹس کے درد کو دبانے سے شدت
 ہوتی ہے کاک کا روہ کو دبانے سے آفات ہوتا ہے۔

علاج۔ اس بیماری میں جلاب ہرگز نہ دین بلکہ ایندین کا استعمال کریں تاکہ
 درد کو آفاقہ ہو۔ شکم پر خوب طرح فو۔ من۔ ٹے۔ شن کریں بیمار کو بستر پر لٹائے رکھیں
 بالکل حرکت کرنے نہ دیں۔ جب انفلیمیشن کی علامتیں رفع ہو جاویں کسی بلکے مہل
 سے رفع قبض کریں خاص کر کٹر اسٹیل سب سے بہتر ہے۔ بعد ازاں بقیاتی مقویات
 کا استعمال کریں۔ غذا سیراج الہضم اور پتلی مین جیسے ساگو واد یا اراروٹ یا حرن
 دوہ۔ حالت روحی طاری ہو نیوالی ہو تو مفرحات کو کام میں لادیں۔

ریکم روہ کی بیماریاں

ریکم یعنی معاقیم کی بیماریاں ایسی ہیں جن سے مریض کو نہایت تکلیف ہوتی ہے
 اور چونکہ یہ روہ رحم کے نیچے ہی ہوتا ہے اس واسطے اسکی بیماری کے سبب سے
 بعض دفعہ عورت عقیم ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ اس روہ کی بیماریوں کی علامت
 ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ طبیعے ہو کا کہا جاتا ہے اور رحم یا خضیۃ الرحم کی طرف
 ہلکا ہنسوب کرتا ہے۔

میں موقع پر ریکم کی طرف چند بیماریوں کا ذکر کیا جائیگا چنانچہ

اول رک - ٹائی - لٹن

ریکٹم کا انقلاب

علامات - متعدد کے گرد نہایت گرمی محسوس ہوتی ہے - شدت کا درجہ کسی ٹیمن سکیم اور پشت تک پہنچا جاتی ہیں + اس - قینک - ٹر عضلہ شدت سے سکڑا ہوا اور روک کر لئے لگتا ہے + پچش کے ساتھ لیسڈ اور سیاہی لیل بلغم آتا ہے + مثلاً نہ میں اچھڑ خراش ہوتی ہے کہ پچھڑا بار بار آتا ہے تیسری تسکین نہیں ہوتی + علاج - غذا ہلکی اور پتلی دین اور بیمار کو بستر پر لٹا رکھیں + چار چار یا چھ چھ گھنٹہ بعد ریض کو آب گرم میں بیٹا دین اور اس عرق کی پچکاری کریں -

لنچ - ۷ - کو - راڈ اسٹرکٹ اف او - پی - ام - ۳۰ بوند سے ایک ٹرام تک + ٹیکچراف بلا - ڈو - ناہ ابوند سے ۳۰ بوند تک + کابنجی ۳۰ ادنس + سکولاکر ریکٹم کے اندر پچکاری کریں +

دوم فی - شتریں آفندی ریکٹم

شفاق المقتد

مہرز کے مقام کو انگلیوں سے پسلا کر دیکھیں تو لہجائی سے شفاق دکھائی دیتے ہیں انہیں بعض دفعہ مگر چاھکر پاخانہ کے وقت اس شدت کا درد ہوتا ہے کہ ڈر کے مارے بیمار پاخانہ نہیں بیٹھتا اسکے اس مرض میں ہمیشہ قبض ہوتا ہے جو اجابت ابھی جاتی ہے تو دین گھنٹہ تک درد اور جلن ہوتی رہتی ہے +

علاج - قدر کے کٹر ایل چاکر نہ قبض کریں یا ہلکے ملینات سے تلمین کریں + حلوہ سنایا حلوہ گوگرد + خارجی علاج اسطور پر کریں کہ نصف آونس مرہم سیلاب

۴۰۔ گرین اکثر کٹ اف پلا۔ دو۔ نالیکر قد رے آئیل اف ہتیو۔ برو۔ ما کے ذریعہ
 یون پنج موٹی اور ڈیڑھ پنج لبنی تہی بنا کر معقدہ کے اندر رکھ دین یا اس نسخہ کی پیکھا
 کرین۔ نسخہ۔ شوگراف لڈ۔ اگرین ۴۰ لاؤم ۲۰ بوند ۴۰ آب مقطر ایک آؤنس ۴
 سکومالین ۴۰ ان ترکیبوں سے زخم رفع ہون تو لبنائی سے انہیں اسقدر عمیق
 پچھنا لگا دین جس سے ریش۔ فینک۔ ٹرسل کے چند ریشے بھی کٹ جاویں تاکہ اس
 مذکور حرکت نہ کرنے پاوے۔ اب فیون کہلا کر دو تین روز تک قبض رکھیں
 بعد ازان کسی ہلکے سہل سے رفع قبض کر کے مقویات کا استعمال کرین اور ایسی تدبیر
 کرین جس سے پھر قبض نہ ہونے پاوے بلکہ اجابت پتلی آتی رہے ۴

سوم پرو۔ لپ۔ سس۔ آذی۔ ریکٹم بلعنے خروج المقصد

یہ بیماری بچون میں اکثر پائی جاتی ہے۔ کبھی تو ریکٹم رودہ کا صرف میو۔ کس۔ پو۔ اور
 کبھی تینوں برت باہر نکل آتے ہیں ۴
 اسباب۔ اس۔ فینک۔ جزر۔ سل۔ کمرور ہو جانا۔ اجابت کی وقت کو نہ تھا
 عرصہ تک اسہال کا جاری رہنا۔ کرم کے سبب خراش کا ہونا۔ اعضا سے
 بول کی بیماری۔ مثلاً نہ میں پتھری کا ہونا ۴
 علاج۔ رودہ کو پٹپٹری کے پانی سے دھو کر فوراً اندر کر کے گدیان بازہ دین
 اور لنگوٹ بازہ کرنا لگین کو دراز کر دین ۴ بچہ کو لٹا کر پانچا پھر اوین ۴ تاہنات
 کی پیکھا رہی سے بھی اکثر فائدہ ہوتا ہے مثلاً ۴۰ سے ۴۰ ہونڈ تک ٹیکر آف اسٹیل دو
 آؤنس پانی میں ملا کر اسکی پیکھا رہی کرین نہیں تو ٹانگ ایسڈ کی پیانی ٹیپی

داخل کریں۔ داخلی علاج اس بیماری کا اسطور پر کریں کہ نباتاتی یا معدنی دواؤں سے بیمار کو طاقت بخشنیں جیسے فولاد اور بارک۔ چرتیا اور معدنی تیزاب وغیرہ + ان علاجات سے فائدہ نہ ہو تو بیمار کو جراح کے حوالہ کر دیں۔

چہارم مقعد میں خارش ہونا

ایسے بیماروں کی مقعد میں اکثر کھجلی ہوتی ہے جو یا سیر یا دبھنکی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور گرم چمنے کے سبب بھی مقعد میں خارش ہوتی ہے۔ دبھنوں کو یہ بیماری اکثر ستاتی ہے اور عورتوں کو حمل کے اخیر و فون میں اس قسم کی کھجلی ہو اگر تھی ہے۔ خارش گرمی کے سبب سے زیادہ ہوتی ہے۔ خارش کی شدت رات کے وقت اکثر زیادہ ہوتی ہے اور بیمار کی نیند میں خلل ڈالتی ہے۔ کھجلائے کھجلائے بیمار مقعد کی جلد کو سرخ اور زخمی کر دیتا ہے۔

علاج۔ سرد پانی سے آب ست لیا کریں۔ غذا سیراج الہضم دین کہ حسین گرم مصالحہ بنو۔ سرو بستر کے پرسوئیں۔ قبض ہونے دین۔ اور مرض کے مقام پر ان ادویات کو نکالو۔
لشخہ۔ تبناکو کے پتے ۲۰ اگرین + کہولتا ہوا آب گرم ایک پائینٹ + ایک گنہٹہ تاک
ہنگو کر جہان لین + اس عرق سے آب دست لین۔

لشخہ۔ ڈائیکوٹ + ڈائڈرو۔ سیانک + اسڈ + ڈرام + شوگراف۔ لڈ۔ ۶۰ گرین۔
ریکٹی۔ فائیڈ۔ اسپرٹ ایک آونس + عرق گلاب ۸ آونس + سیکو ملا کر آب ست لین۔
لشخہ۔ کروسیو۔ سب۔ لی۔ مٹ ۳ گرین + ڈائیکوٹ + ڈائڈرو۔ سیانک +
ڈرام + عرق گلاب ۸ آونس + سیکو ملا کر مرض کے مقام پر لگا دیں۔

لشخہ۔ سوٹاک ایک یا دو ڈرام + روغن بادام ایک آونس + عرق گلاب ۸ آونس
سیکو ملا کر آب دست لین۔ بیمار سیٹلی ہو تو سیکویا کا استعمال کریں۔

خارش کے نزع کرنے کے لئے یہ مرہم بھی بہت ہی مفید ہے۔ علاوہ خارش کے
 بواسیر کے ستون پر بھی لگانے سے درد کو خود آرام آجاتا ہے +
 نسخہ - یا مڈرو - کلورٹ ان کوکین + اگرین + سلفٹ ان مار فباہ گرین +
 سلفٹ ان اٹرو - پیاہ گرین + ٹے - ہنک اسٹ + اگرین + دسے - سے + لینز
 ایک آونس + اسنس اف روزر - جب ضرورت + سبکو ملا کر مرہم بنالین - اور ہر
 دفعہ اجابت کے بعد مقعد میں یا بواسیر کے ستون پر لگا دیا کریں - پاخانہ قبض نہ ہو
 نسخہ - کرو - سیو سب - لی - مرٹ - ٹویٹرہ گرین + نو شادرہ گرین + کار - بالک - اسٹ
 ایک ڈرام + گلکٹی - سی - ریٹن - ۴ - آونس + عرق گلاب اسعد جس میں کل عرق
 چھ آونس پورا ہو جاوے - مقعد کے گرد اس عرق کو صبح و شام لگانا چاہئے +

دور - مرش

واضح ہو کہ انسان کے شکم میں اکثر سات قسم کے کرم پائے جاتے ہیں انہیں سے چار
 تو ایسے ہیں جنہیں شکم ہوتا ہے اور تین ایسے جو ٹھوس ہوتے ہیں لیکن انہیں شکم
 نہیں ہوتا + شکم دار کو اصطلاح میں سی - ل - مین - کہا اور غیر شکم دار کو ٹسٹ - رل - مین
 کہتے ہیں +

جماعت اول

سی - ل - مین - تھا

اول ڈرائی - کو - سی - فی - ٹسٹ - ٹوس - پار

انگریزی میں اسکو لانگ تھریڈ ورمز کہتے ہیں -

یہ کرم چوڑا سا ہوتا ہے اور سی - کم (معاذ اللہ) اور بڑے رو دو دن کے دیگر مین

ہینا ہی پایا جاتا ہے ڈیڑھ انچ سے دو انچ لمبا اور بہت باوریک ہوتا ہے کہتے ہیں
کہ تندرست آدمی کے رودون میں ہی یہ کرم بکثرت پایا جاتا ہے۔ ان کرموں کے
ہونے سے کوئی خاص مسمات نہیں پیدا ہوتی *

• دوم انکے۔ بڑے لمبیری کاٹی ٹوس

انگریزی میں اسکو لارج۔ رائنڈ ورم کہتے ہیں اور پنجابی میں ملیپ *
یہ کچھ اچھوٹے رودون میں خاص کر خراب طور پر پائے ہوئے بچوں کے معاینہ پایا جاتا
ہے اسکی مقدار اور شکل مٹی کے کچھوے کی سی ہوتی ہے طوالت میں ۶ سے ۱۲ یا ۱۴
انچ تک ہوتا ہے اور رنگ اسکا لہکا ہوا ہوتا ہے۔ اگرچہ اسکی سکونت کی جگہ چوٹی
انٹریاں میں تاہم اوپر معدہ تک اور نیچے تو لون تک بھی چلا جاسکتا ہے پس جس
دفعہ فٹے کے ساتھ ہند سے نکل آتا ہے اور کبھی مستون میں بھی پایا جاتا ہے۔ بعض
دفعہ یہ کرم شکم میں نہایت کثرت سے ہوتے ہیں اور جو ملاستین انکے ہونے سے
پیدا ہوتی ہیں وہ بہت نمایان نہیں ہتین لیکن انکے ہونے سے پیاس کی شدت
ہو سکتی ہے نیند بے طور پر نہیں آسکتی ہے اور بیمار رات کو وانت پیتا ہے بعض
دفعہ مریض کست رہتا ہے۔ چہرہ زرد اور بیمار گندہ دہن ہو جاتا ہے۔ پیٹ نکل
پڑتا ہے۔ ماتہ پاؤں بے پڑ جاتے ہیں۔ بھوک کم ہو جاتی ہے۔ پاخانہ کے ہمراہ آدن
آتی ہے ناکہ کھلی جاتی ہے پیچیش اور معدہ میں خارش ہوتی ہے *

سوم انگری۔ یو بڑے۔ کیمو۔ لے۔ رس

انگریزی میں اس کرم کو اسال تحریڈ ورم اور ہندی میں چننے اور پنجابی میں چمچوٹے
یا سیونکے بولتے ہیں۔ یہ کرم اکثر تو ریچم رودہ میں پائے جاتے ہیں لیکن بعض دفعہ

سکت۔ مائند فلکشر اور یکم ناک ہی پائے جاتے ہیں شکم کے سب کرموں سے یکرا
 چھوڑا ہوتا ہے چنانچہ اکثر چتھائی پنج سے زیادہ لمبا نہیں ہوتا اور اکثر بچوں ہی میں
 پایا جاتا ہے۔ اسکی بیج کئی نہایت شکل سے ہوتی ہے بیکٹا دو ٹاکم ہوتا ہے بلکہ اکثر
 سیکڑہ لٹکا ایک گولاسا بنجاتا ہے اسکے ہونے سے اکثر عسالتیں پیدا ہوتی ہیں
 متعدد میں نہایت شدت کی خارش ہوتی ہے یا خانہ پچش کے ساتھ آتا ہے۔ ہوک
 مرجاتی ہے بچہ ناک کو فوجتا رہتا ہے۔ منہ سے اسکے بد بو آتی ہے۔ رات کو چھی طح
 نیند نہیں آتی۔ گاہے گاہے زیادہ تر خوفناک عسالتیں بھی پیدا ہوتی ہیں جیسے تشنج
 کو۔ سیالینہ رعشہ مرگی۔ اور اندام نہانی میں خراش پیدا ہوتی ہے۔

چہارم اسکے۔ راش۔ ٹوما ویو۔ ڈوسی۔ نے۔ لی

یہ کرم چھوٹا سا قریب تھائی پنج کے ہوتا ہے اور مضر و شمالی اٹ۔ لی میں پایا جاتا ہے۔

جماعت دوم

اس۔ ٹے۔ رل۔ مین۔ تہا یعنی غیر شکم وار کرم

اول۔ ٹے۔ نیا سو۔ لے۔ ام

اگر نریہ میں ایکویٹیب۔ سوزم اور عربی میں جب القرا اور ہندی میں کد و دانہ کہتے
 ہیں۔ بعض دفعہ تو صرف تہا ہوتا ہے لیکن گاہے گاہے تین چار بھی پائے جاتے ہیں۔
 اس کے علیحدہ علیحدہ کوڑے ہوتے ہیں جنکے آپس میں جڑ جاتے سے سارا کرم فیتے کی
 شکل کا لمبا بنجاتا ہے چھوٹی انٹرلوین میں بودو بایش کرتا ہے اور ۵ گز سے ۵ گز تک
 لمبا ہوتا ہے۔ نہایت کم چوڑا حصہ اسکا دو ٹاکمیں چوڑا اور درمیانہ حصہ جو نہایت

وسیع ہوتا ہے چار یا پانچ لائین تک چوڑا ہوتا ہے۔ سر اسکا چھوٹا اور چوڑا ہوتا ہے جو عسلا متین اس کرم کے ہونے سے پیدا ہوتی ہیں وہ چند ن نمایان ہنہین ہوتین بلکہ تغیر سکمی تب ہی چھ طور پر ہوتی ہے کہ جب اسکے چند ٹکڑے باخانہ میں پائے جاتے ہیں لیکن بعض صورتوں میں بیمار کو ہوک نہایت شدت سے لگتی ہے مریض کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ معدہ میں سکے درد ہوتا ہے اور مثلاً میں خراش۔ مریض کا سر گھومتا ہے کانون میں آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ گاہے گاہے بیمار کو غش آجاتا ہے بے چینی ہو جاتی ہے اور ناک اور معدہ میں کھجلی ہوتی ہے +

دوم ٹے۔ نیامے۔ ڈیلو۔ کانے۔ لے۔ ٹا

بہت کدو دانہ کے اسکے ٹکڑے کی قدر بڑے بڑے ہوتے ہیں +

سوم باد۔ ریلو۔ سی۔ فی۔ لس۔ لے۔ لیس

اس ملک کے آدمیوں میں یہ کرم ہنہین پایا جاتا +
اسباب۔ کربون کے انڈے یا نہایت چھوٹے چھوٹے بچے کو گوشت یا خراب پکا ہوا گوشت کے کھانے سے انسان کے معدہ میں داخل ہوتے ہیں اور نباتی ہشیا کے ذریعہ بھی انکا دخل میں۔ وہ میں ہو سکتا ہے جیسے ساگ پات اور بعض میوہ جات جیسے سیب اور آٹو وغیرہ اور میلے پانی کے وسیلہ سے بھی وہ انڈے جسم انسان میں داخل ہو سکتے ہیں کدو دانہ کے انڈے اور بچے ایسے مقامات میں کہ جہاں بانی کڑا رہتا ہے اکثر پائے جاتے ہیں جیسے جیل اور تالاب وغیرہ +
علامات۔ شکم میں جب کرم ہوتے ہیں تب یہ علامتیں پیدا ہوتی ہیں بشک

پہول جاتا ہے اور اس میں قویٰ کما سادہ ہوئے لگتا ہے۔ مریض اپنی ناک کو لٹہتا ہے مقصد میں کچھلی ہوتی ہے اور سیون کے مقام پر پہنچ کر شہوتی ہے بیمار گندہ دہن ہو جاتا ہے۔ پانچا نہ کہی تو قبض اور کبھی ست لگ جاتے ہیں۔ دروسر رہتا ہے۔ بیمار رات کو دانت پستیا ہے۔ چہرہ زرد اور کبھی سفید ہو جاتا ہے اور بیمار ماندہ رہتا ہے بہوک کہی تو زیادہ اور کبھی کم ہو جاتی ہے لیکن تشخیص کامل تب ہی ہوتی ہے کہ جب براز کے ہمراہ کوئی کرم یا اسکا کوئی ٹکڑا خارج ہوتا ہے اور جب شکم میں کرم نہایت خراش پیدا کرتے ہیں تب عصبی استائین پیدا ہوتی ہیں کہ کبھی تو تشنج اور کبھی مرگی اور کبھی ہسٹیریا کی نوعیت میں ہوتی رہتی ہیں۔ کالون میں آوازین سنائی دیتی ہیں سرگرم رہتا ہے۔ خون پتلا پڑ جاتا ہے اور بعض دفعہ مریض دیوانہ بھی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کہ وہ نہ شکم میں ہوتے ہیں تب سر کے مایوں میں برابر درو رہتا ہے اور یہ علامت اکثر عورتوں ہی میں پائی جاتی ہے۔

علاج۔ کچھ سے اور کم دوا نہ کے لکھو کئی دوائیں ہیں جیسے اول و غنہ مارپین چنانچہ نسخہ کسٹرائیل ۴ ڈرام ۴ روغن مارپین ۴ ڈرام ۴ میو۔ سلج۔ ۴ ڈرام + سرپ اف جگر ایک ڈرام ۴ پانی ۴ ڈرام ۴ سبکو ملا کر ایک خوراک کریں اور تھار منہ پلا دیں +

دوہ سن۔ ٹو۔ نین چنانچہ نسخہ۔ سن۔ ٹو۔ نین ۲ سے ۴ گرین تک + شوگر اف ملک ۵ گرین + تھوڑے سے دوہ میں ملا کر تھار منہ پلا دیں +

قبل ازینے اس دوا کے بیمار کو ۲ گنٹہ تک فاقہ رہنا چاہیے ضرورت ہو تو آٹھ دس روز تک اس خوراک کو ہر روز پلاتے رہیں اور چھ گنٹہ کبھی اس دوا کے مریض کو ایک آؤنس کنیاؤنڈ ڈولیکاک۔ شن اف الونز پلا دیں +

یہ نسخہ آؤنڈ ڈولیکاک کے لئے مجرب ہے اور کم دوا نہ اور چھپنے کے واسطے

یہی مفید ہے + بیمار کو اس بات کی خبر کر دینی چاہیے کہ سن - ٹو - نین کی چند خوراک
کہانے کے بعد بصارت میں بعض دفعہ فرق پڑ جاتا ہے یعنی اشیاء ہسکو نیل یا زرد
یا کسی اور رنگ کی دکھائی دیتی ہیں - گاہے گاہے سن - ٹو - نین کی ایک خوراک کے
ہمراہ ایک گرین کاتیسر حصہ پوڈا - نلین بھی ملا دیا جاوے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے +
اور راونڈ ڈرام کے لئے یہ نسخہ بھی نہایت محبوب ہے -

نسخہ - کلورا - فارم ایک ڈرام + کسٹریٹل - ایک + آونس + کرو - ٹن - آئل ایک پونڈ
سبکو خوب طرح ملا دیں - خوراک ۴ ڈرام سے آونس تک +

سوم کتو چنانچہ نسخہ - کتو کا سفوف - ۴۴ گرین یعنی ۴ ڈرام + شہہ اسفد رجب سے
لعوق بجاوے - نصف اسکا ہمارٹنہ ملا دیں اور باقی چہ گنٹنہ بعد + یہ نسخہ کہ دوا ان
کے واسطے مفید ہے +

چھارم کیلا چنانچہ نسخہ - کیلا ایک ڈرام سے ۳ ڈرام تک + سرب یعنی شہہ تین
ڈرام + میو - سلج ۲ ڈرام + پانی ۳ آونس + سبکو ملا کر ایک خوراک کریں اور ہمار
مٹنہ ملا دیں اور چہ گنٹنہ بعد ایک تیز جلاب دیدیں - یہ نسخہ کہ دوا ان کے لئے مفید ہے +
پنجاب میں کیلا کو مہی میں ملا کر پاتے ہیں +

ہشتم - لی کوئیڈ کسٹریٹل اف مل - فرن اسکے استعمال کرنے کی ترکیب ہے
کہ پہلے روز صبح کے وقت کسٹریٹل کا ایک جلاب دیدیں اور اس روز بچہ کی غذا
بالکل کم کریں یعنی یا تو صرف ساگو دان یا آتش جو ملا دیں رات کو پہر جلاب دین تاکہ کربول
پر بروز بالکل نہ رہے اور دوسرے روز صبح کو اس نسخہ کا استعمال کریں +

نسخہ - لی کوئیڈ کسٹریٹل اف مل - فرن ۲۰ سے ۴۰ پونڈ + سرب اف جنجر
۴ ڈرام + میو - سلج ۴ آونس + پانی ۴ آونس + سبکو ملا کر ہمارٹنہ ملا دیں اور چہ
گنٹنہ بعد کسٹریٹل کا ایک جلاب دیدیں - اس نسخہ کو دوا تین دفعہ پلانے سے ہمارا

کرم نکل آتا ہے تاکہ پھر پیدا نہ ہونا پارسے۔ مقویات خاصہ معدنی تیزاب ہمراہ ٹینکچراف اسٹیل اور کواشیا کے پلاوین اور ہمار کو تاکید کر دین کہ اپنے کہانے میں نمک زیادہ کہا یا کرے اور کہا نا خوب طرح پکا کر کہا دے چمنون کے مارنے کے واسطے آب سرد یا انفیوژن اف کواشیا کی چکپاری کریں یا بموجب اس نسخہ کے اسٹیل اور کواشیا کی چکپاری کریں۔

لنسخہ ٹینکچراف اسٹیل ایک سے تین ڈرام تک + اکثر کٹ اف کواشیا گریز اکثر کٹ اف بار۔ بے۔ ڈوز۔ الونز مگرین + انفیوژن اف کواشیا + آؤٹز اس چکپاری کے بعد کیا۔ لورمل اور انسکامو۔ نی کا ایک جلابے یوین + یا بموجب اس نسخہ کے کہانے کے نمک کی چکپاری کریں +

لنسخہ کہانے کا نمک ایک آونس + آتش جو ۴ آونس + دونو کی ملائین + یا چونے کا پانی یا ایک آونس پانی میں + ابوند سلفیورک۔ اتھر لاکر اسکی چکپاری کریں یا اگر مریض جوان ہو تو ٹینکچراف اسٹیل ۴ ڈرام نصف پائیت پانی میں ملا کر اس کی چکپاری کریں۔ یہ کرم نہایت وقت سے مارے جاتے ہیں کیونکہ علاوہ ریگیم کے سیکم اور کولن کے اوپر کے حصہ میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ پس ایسا کریں کہ تین چار جلابے درجے ایسے دین جن سے خوب کھنگر دست آجاوین تاکہ چمنے رودہ کے اوپر کے حصہ سے کھسکریجے اتر آوین اور چکپاری کو کنا اثر اپنر خوبطرح ہو سکے۔ اس ترکیب کو کئی مہفتہ بلکہ کئی مہینے برابر کرنا چاہئے اور گاہے گاہے کہانے کو فولاد اور جلاب بھی دیا کریں نہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بغا ہر تو کرم ہاک ہد جاتے ہیں اور تھوڑے عرصہ تک تکلیف بھی رنج ہو جاتی ہے لیکن بار بار یہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ مریض ہزار ہوں کہ علاج سے دست بردار ہو جاتا ہے +

کالہرہ لعینہ مہیضہ

ماہیت - اس مرض کی نسبت اطباء کے خیال و طور کے ہیں لیکن دونوں فریق کی رائے اس بات پر متفق ہے کہ یہ بیماری ایک خاص قسم کے زہر سے پیدا ہوتی ہے چنانچہ بعض اطباء ایسا قیاس کرتے ہیں کہ جب زہر مذکور جسم میں سرایت کر جاتا ہے اثر اس کا پہلے خون پر ہوتا ہے اور یہ کہ جسم کے اندر یہ زہر خود بخود پیدا ہو کر زندہ رہتا ہے دوسرا خیال اس زہر کی نسبت یہ ہے کہ پہلا اثر اس کا امعاء کے میوہ کس پر ہوتا ہے اور دماغ سے خون میں سرایت کر جاتا ہے اس زہر کی نسبت ایک بڑی بات قابل یاد رکھنے کے یہ ہے کہ جب اس زہر میں طوبت مل جاتی ہے تب اجزاء اسکے بہت جلد خود بخود منتشر ہو کر نریل ہو جاتے ہیں چنانچہ ہی سبب ہے کہ بعض باہتوڑے عرصہ تک رہ کر نابود ہو جاتی ہے اور ایسا واسطے انگلستان میں کہ جہان کی آب و ہوا سرد اور مرطوب ہے زہر اس مرض کا عرصہ تک تروتازہ نہیں ہو سکتا لیکن ہندوستان کی آب و ہوا ہمیشہ گرم و خشک ہوتی ہے اس واسطے اس مرض کی طاقت اور اثر کو قائم رکھتی ہے کم ہو جانا حرارت غریزی کا اور مٹا ہونے کو سرد محسوس ہونا مریض کے جسم کا گویا کہ خاص مسامین اس مرض کی ہیں - یعنی اس زہر کے سرایت کر جانے سے خون میں اس قسم کے تغیرات واقع ہوتے ہیں جن سے یہ علامتیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ بات یاد رہے کہ اس بیماری میں خرابات غریزی حقد رکھ جاتی ہے اس لیے کہ یہ مرض بھی زیادہ تر مہلک ہوتا ہے اور دست و پے کا آنا اور تشیخ کا ہونا اس بیماری کی بیماری مسامینوں میں سے نہیں ہیں کیونکہ بار بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ مریضوں کو نتو دست اور نہ تھے آئے ہیں پھر بھی تھوڑے عرصہ کے اندر مر گئے ہیں سبب اس کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ خون کا طرہ ہو کر اس قدر جلد جسم

جائتا ہے کہ دست دے کے آپیکہ موقع نہیں رہتا۔ جب کہ لیس لیٹے حالت ردی میں بیمار مرتبہ رہتا ہے تب اسکی نفش کے امتحان سے یہ علامات ہائی جاتی ہیں کہ امعا کے اندر ایک عرق گدلا بے بو اور مثل چاولون کے دھوون کے پایا جاتا ہے اور اسکے غدود دھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جگر طحال اور گردے خون سے پر ہوتے ہیں مثلاً خالی اور سکڑا ہوا ہوتا ہے اور شش میں بھی اجتماع خون کا ہوتا ہے۔

ماہیت اور سبب - نئی زمانہ اس مرض کی نسبت جو تحقیقات ہوئی ہیں انکا ذکر نیچے کیا جاتا ہے چنانچہ وہ یہ ہیں کہ اکثر اطباء کی رائے میں اس بیماری کا اکسائیٹیک کا زائیک خاص قسم کا زہر ہے جو خود خود کرومون کی شکل کا ہوتا ہے مگر ملک جرمینی کے ڈاکٹر کاگ نے اس بیماری کے زہر کی نسبت جو تحقیقات کی ہیں ان سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہیفیہ کی بیماری کے دست ثلث کے مادہ میں خمدار چھٹے چھٹے گرم ہوتے ہیں جو اس مادہ میں نہایت تیزی سے حرکت کرتے ہیں ان کو مونکا نام انہوں نے رکھا۔ بی۔ سی۔ گنس رکھا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ گرم کیا ہیں کیونکہ پیدا ہوتے ہیں اور ہیفیہ کے پیدا کرنے میں انکا تعلق کس قدر ہے ان باتوں کی نسبت ہنوز تحقیقات ہو رہی ہیں۔ پس ان امور میں کوئی رائے سختہ نہیں دیجا سکتی۔ ہیفیہ کی بیماری متعدی ہے مگر اس معنی پر نہیں کہ جیسے چھپک وغیرہ متعدی امراض ہیں۔

گنس۔ ٹے۔ جی۔ ان یعنی چھوٹا پس بیماری کی مریض کے دستوں میں ہوتی ہے یعنی دستوں کے مادہ کے ذریعہ یہ مرض اور ٹون کو ہو جاتا ہے مثلاً جب وزن اسکا بھئی ستون کا مادہ پینے کے پانی میں مل جاتا ہے اور وہ پانی پیا جاتا ہے تب لوگوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ پہلے پہل جب خارج ہوتا ہے تو خاص ہر اس بیماری کا یہ ضرر ہوتا ہے چار یا پانچ روز بعد اس میں تشہید ہوتی ہے۔ دودھ کے

ذریعہ بھی ہضیہ کا نہ ہر عالمگیر ہو جاسکتا ہے اور کھانے پینے کی دیگر شیا کے وسیلہ بھی پسلی جاسکتا ہے۔ بڑے بڑے تجربہ کار طبیبوں کا یہ بھی قول ہے کہ نہر اس بیماری کا دہی ہے۔ لے۔ ریا ہے جس سے نوبتی بنی پیدا ہوتے ہیں اور اس میں شک بھی نہیں کیونکہ ہم بارہا ایسا دیکھتے ہیں کہ جس موسم میں لے۔ لے۔ ریا کا زور شور ہونا پڑے تب نوبتی کا بازار گرم اس موسم میں ہضیہ کی وبا بھی پھیلتی ہے اور بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے تو مریض ہضیہ کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے بعد ازاں تب ہو جاتی ہے اور یہ کہ اسی موسم میں بعض لوگوں کو ہضیہ ہو جاتا ہے پر اکثر تب نوبتی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

اقسام مرض - یہ بیماری تین قسم کی ہوتی ہے یہ تینوں اقسام کے خون کے تغیرات پر منحصر ہیں۔

اول - قسم خفیف اسطور پر شروع ہوتی ہے کہ پانی کے طور پر تیلے تیلے دست اور تھے کثرت سے آتی ہے مگر ان دست دتے کے آنے سے نہ تو مریض کے جسم کی حرارت میں چندانہ کمی ہوتی ہے اور نہ خون کا دوران بہت سست ہو جاتا ہے۔ علامات خوفناک اور شدید مثلاً دست دتے اور شنج کے شروع ہونے سے ۴۲

گنہٹہ یا دو تین یا چار روز پیشتر جو جسم ہمال جا رہی ہوتا ہے اسکو اصطلاح میں پری - مانی - ٹیری ڈا - یا - ریا یعنی اسپہال مندرہ کہتے ہیں۔ اگرچہ اس خفیف قسم میں بھی جسم کی حرارت کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور دوران خون سست پر بھی تنگ خاص ہضیہ کے دست نہیں شروع ہو لیتے ہیں تب تک شنج کی علامت پیدا نہیں ہوتی کو لیس کی حالت کی ردی علامتیں اس خفیف قسم کی بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہیں لیکن اس قدر شدید نہیں ہوتیں جبکہ دوسری اور تیسری قسم کی بیماری میں ہو کر تری میں علاوہ ازیں اس قسم کے مرض سے بیمار اکثر جان بر ہو جاتے ہیں۔

دوم۔ جب زہر کی مقدار ذرہ زیادہ ہوتی ہے تب دوسرے درجہ کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس میں دو ہی تین کستوں کے بعد شدت سے تشنج ہونے لگتا ہے۔ اور کوئیس کیمالت کی ردی مسلماتین ہی بہت جلد اور شدت سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اس قسم کی بیماری سے جب مریض مرتا ہے تب اس کی انش کے امتحان سے چھوٹے رد و دون کے اندر گاڑ ہی سیخند رنگ کی رطوبت مثل چاؤ لون کے دھون کے پائی جاتی ہے *

سوم۔ جب خون کے اندر بہت زیادہ زہر سرایت کر جاتا ہے تب دورہ خون کا بہت ہی سست یا بالکل ٹرک جاتا ہے اور عین ابتدا ہی سے جسم کی حرارت تقریباً کم ہو جاتی ہے کہ بیمار کا بدن سرد و مانند برف کے ہو جاتا ہے۔ اس قسم کا مرض نہایت شدید بہت ہی جلد ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس میں دست بہت کم یا بالکل آٹے ہی ہین۔ بیہوشی کی آواز بیٹھ جاتی ہے وہ بہرا ہو جاتا ہے اور سر اسکا گھبراہٹ سے لگتا ہے۔ کھل رطوبتیں جسم کی خشک ہو جاتی ہیں اور خون صاف ہین ہونے پاتا اسلئے جسم بیمار کا نیلا پڑ جاتا ہے *

علامات مندرہ۔ جس جگہ ہیضہ کی باہیلیتی ہے وہاں کے لوگوں کی طبیعت گہرائی ہوتی اور وحشت زدہ ہو جاتی ہے ہیضہ کا خوف دلون میں سما جاتا ہے اور اکثر دنگا کا ضمیمہ بگڑا جاتا ہے۔ اور خاص بیماری کی علامتوں کے شروع ہونے سے پہلے مریض بے چین اور سست ہوتی ہے اور چہرہ کا رنگ فق + اور دو یا تین روز پہلے سے اکثر دن کو ڈا۔ یا۔ ریا کے طور پر دست چھانے لگتے ہیں جبکہ اصطلاح میں پری۔ مانے۔ ٹری ڈا۔ یا۔ ریا کہتے ہیں *

علامات خاص بیماری کی۔ یا تو پری۔ مانے۔ ٹری ڈا۔ یا۔ ریا پہلے ہوتا ہے اور تب خاص بیماری شروع ہوتی ہے یا خود بخود اس طور سے شروع ہوتی

ہے کہ جھکا پہلا آدمی کہا تا پینا کہا کر سونے کو جاتا ہے اور ادھی رات یا صبح تک
 با رام سوتا رہتا ہے اسوقت بلا وجہ جی متکا کر شدت سے دست دتے شروع ہوجاتے
 ہیں۔ چون چون دست دتے آتے جاتے ہیں۔ مریض کمزور اور نڈھال ہوتا جاتا ہے
 جسم سرد مانند برف کے ہو جاتا اور ہاتھ پاؤں میں تشنج ہونے لگتا ہے دم لینے میں
 تکلیف ہوتی ہے۔ دوا کمزور یا سیٹھ جاتی ہے۔ تشنگی کمال درجہ پر ہوتی ہے اور
 بیمار بے چین ہو کر بستر سے پرت پڑنے لگتا ہے۔ اور کپڑے ادھر ادھر ہڈیک دیتا ہے۔
 ہاتھ پاؤں کی انگلیاں مسکڑ کر ایسی ہو جاتی ہیں کہ جسی عرصہ تک پانی میں بھگوئے
 سے ہو کرتی ہیں۔ ناخن نیلے پڑ جاتے۔ آنکھیں دب جاتیں۔ پردہ قرنیہ پست ہو جاتا۔
 رخسارے دب جاتے۔ ناک نکل پڑتی زبان اور لبیں نیلی پڑ جاتی ہیں۔ نبض کمزور
 ہو جاتی ہے۔ بلکہ ہنچون پر محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ابتدا ہی سے پیشاب بند ہو جاتا
 ہے۔ مگر ہوش دجو اس قائم رہتا ہے جسم کی حرارت اس قدر کم ہو جاتی ہے کہ ۹۰ یا
 ۹۵ درجہ سے زیادہ نہیں ہوتی اور منہ کے اندر کی حرارت تو اس سے بھی کم ہوتی
 ہے۔ حالت رومی میں دست دتے کم آتے ہیں یا بالکل بند ہو جاتے ہیں۔
 تین سے چوبیس گھنٹہ کے اندر بیمار اکثر مرتے ہیں اور جو اس عرصہ کے بعد بھی بچ
 رہتے ہیں وہ رو بصحت لانے لگتے ہیں اور انکی نگاہیں گاہے شفا بھی ہو جاتی ہے۔
 غرض جب طبیعت صحت کی طرف رجوع کرتی ہے تب جسم بتدریج گرم ہوتا جاتا ہے
 چہرہ پر سرخی آتی جاتی ہے خون دورہ کرنے لگتا ہے۔ نبض اور تنفس کی حرکت صحیح
 ہوتی جاتی ہے۔ بیمار کو اب چین آتا جاتا ہے۔ تھوڑا بہت پیشاب بھی آنے لگتا ہے۔
 اور سنبھال سیا ہی ٹیل بدبو دار دست ہوتے ہیں۔

ایٹج اف رمی۔ اک۔ شن۔ یہ وہ درجہ ہے جس میں خاص بیماری کی علامتیں
 نفع ہو جاتی ہیں مگر بعض صحت کے ان علامتوں کے جھکا ذکر اذیر کیا گیا ہے علامات

ذیل ظاہر ہونے لگتی ہیں چنانچہ دماغ یا شش میں اجتماع خون کا ہو جاتا ہے اور بیمار پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ بُرائے تو ایسا بولتا ہے جیسا کوئی نیند کی چوٹ میں بولتا ہے پیشاب پیدا نہیں ہوتا۔ دروسر غنودگی ہوتی ہے رفتہ رفتہ کامل مہوشی طاری ہو کر بیمار مر جاتا ہے۔ بعض دفعہ اس رمی - اکشن کے درجہ کا بخار متبدرج بڑھتے بڑھتے کئی دن کے اندر رومی ہو جاتا ہے اور بیمار کو ہلاک کر ڈالتا ہے *۔

ہیضہ کے بیمار کے دستوں کے امتحان سے یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ انہیں پانی کا جزو کثرت سے ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت پئے۔ تپے۔ لی۔ ام ایک شے دانہ دار اور ایک جزو ریشہ دار قد رے البید۔ من براسے نام تھوڑا سا صفر انگر ٹھیکین اجڑا حاکم کہنا کا نمک بہت کثرت سے ہوتا ہے *۔

متابج ہیضہ کی بیماری سے جب مریض رو بصحت لانے لگتا ہے تب بعض دفعہ عرصہ تک دست و تپے جاری رہتے ہیں یا دنوں تک شب و روز برابر ہچکچاتی رہتی ہیں بعض دفعہ نیرہ قرنیہ لگنے لگتا ہے اور کبھی جسم پر بکثرت و بسل پیدا ہو جاتے ہیں *۔

صورت حال شیرجی بعد وفات - لاش سکڑی ہوئی رنگت اُسکی نیلگون ہتھ پاون سخت اینٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ موت کے بعد لاش گرم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ حرارت ۱۰۳ درجہ تک ہو جاتی ہے اور کئی گھنٹہ برابر برہمتی ہے *۔ رودون میں مہی چاول کے دھون کی سعی طوبت پائی جاتی ہے جو زندگی کجالت میں دستوں کے ہمراہ خارج ہوتی تھی۔ رودون کا میو سکس پر وہ موٹا ہو کر ملائم ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ سرخ بھی دیکھا جاتا ہے۔ دل پتھرے اور دیگر اعضا سے مین خون کے دھبے پائے جاتے ہیں * لاش کے اندر جو خون

ہوتا ہے وہ گاڑ گا اور سیاہ رنگ کا ہوتا ہے دل کے دہنے خانہ اوپلو نہری
 اور بڑی ایسی سیاہ خون سے پُر ہوتی ہیں مگر دل کے بائیں خانے خالی ہوتے ہیں
 بہیرون میں بہت خون نہیں پڑتا بلکہ سکڑ کر خشک ہو جاتے ہیں ۔
حفظ ماقدم بیضہ کے دنوں میں جن باتوں میں احتیاط لینی چاہئے انکا ذکر تلبیس
 حفظ ماقدم امراض و بائیں میں نہایت تشریح کے ساتھ کیا گیا ہے جسکو دیکھو ۔
علاج خاص مرض کا - واضح ہو کہ اطباء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جسم میں
 خاص قسم کے زہر کے سریت کر جانے سے بیضہ کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور یہ
 کہ کوئی بھی فاد اس زہر کا ابتک یا ذت نہیں ہوا لہذا اس بیماری کی علامتوں
 کے دفعہ کا علاج کرنا چاہئے لیکن یاد رہے کہ جب خاص مرض شروع ہو جاتا ہے
 تب دوا کی کچھ ہی بیش نہیں چلتی اس واسطے مناسب کہ حفظ صحت کے قواعد کی پابندی
 ضروری کریں تاکہ خاص بیماری نہ لگ جاوے اور اسپہال مندرہ جب کبھی موجود
 ہوں تو فاضلات سے فوراً روکنا چاہئے اور مثل اور اطباء کے ہم اس بات کو نہیں مانتے
 کہ اسپہال مذکورہ معاینہ اغذیہ غیر منہضم یا کثرت سے فضلہ کے ہونے سے جاری ہوتا
 ہے اس واسطے بذریعہ سہلات مثلاً کشر تیل کی منہغائی شکم کرنا چاہئے بلکہ اپنا تجربہ ہے
 کہ جب کسی مقام میں بیضہ کی دباہی ہوتی ہے تو بیضہ کے زہر سے ہوا اس جگہ کی نہریلی
 ہو جاتی ہے غرض جس کیسکی طبیعت میں اس زہر کے اخذ کرنے کی استعداد ہوتی ہے
 وہ بعض دفعہ اسپہال مندرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پس اس اسپہال کو عین ابتدا ہی
 میں بذریعہ فاضلات کے روک دینا چاہئے اس خیالی سے کہ خاص مرض کی علامتیں
 شروع ہونے پادین کہ جو وقت درابیکار ہو جاتی ہے ہم نے اس بات کا ذکر اوپر
 کر دیا ہے کہ کوئی بھی فاد بیضہ کے زہر کا ابتک دریافت نہیں ہوا اس واسطے ہر ایک
 طبیب بموجب اپنے تجربہ کے بیضہ کا علاج اپنے ہی طور پر کرتا ہے پس ہم یہی اس

موقع پر دھیمی علاج بتلاتے ہیں جسکو کہ ہم نے سالہا سال کام میں لایا ہے وہ علاج یہ ہے کہ عین ابتداء میں مرض میں کافور کا استعمال کرتے ہیں اور یہ نہایت مفید پڑتا ہے لیکن اکثر اس سے دست ہٹتے ہٹتے جاتے ہیں۔ تشنج موقوف ہو جاتا ہے اور مارتہ پائیز میں گرمی آجاتی ہے مگر اس دوا کو عین ابتداء میں دینا چاہئے ورنہ اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اور جب تک علامتوں کو تخفیف نہ ملے اسٹراک اسپرٹس اف کمفر چار سے چھ بوند کی مقدار میں دس دس منٹ بوندینا چاہئے علامتوں کو جب تخفیف ہو جائے تب گھنٹہ گھنٹہ بعد دینا کافی ہے۔ جب اس دوا سے فائدہ نہیں ہوتا ہے تب علامتوں کے دفعیہ کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ دستوں کے روکنے کی واسطے اگر بن کیا بول اور دیگر ایفون کی دو گولی بنا کر پیار کو کھلا دیں۔ فوراً ہٹتے ہو جاوے تو ایسے ہی دو گولیاں بنا کر پھر کھلا دیں۔ ان سے دست نہ نہ کین تو ان نسخہ جات میں سے کسی کا استعمال کریں۔

لشخہ۔ چاک کمپرسر ایک آؤنس ٹینکچر آف کے۔ ٹے۔ کیو ایک ڈرام۔
اکٹرکٹ آف ٹاگ۔ دو۔ نم گرین۔ گھنٹہ گھنٹہ یا دو دو گھنٹہ بعد پانچ یا اس نسخہ کا استعمال دو دو یا تین تین گھنٹہ بعد کریں۔

لشخہ۔ شوگر آف لیڈ نم گرین۔ ڈو اینیلوٹ اسے ٹکٹ اسڈم بوند ٹیچا یا ہو اپانی ایک آؤنس۔ سبکو ٹالین اور یہ گولیاں بھی جنکو اصطلاح میں کارہ پس کہتے ہیں مفید ہیں۔ نسخہ۔ ہینگ۔ نم گرین۔ سفوف مسخ مچ ایک گرین۔ ایفون ایک گرین۔ اور شوگر آف لیڈ کی بچکا ری بھی دستوں کے روکنے کی واسطے مفید ہے مثلاً۔ نم گرین شوگر آف لیڈ دو آؤنس پانی میں حل کر کے اسکی بچکا ری کریں۔ نئے بشت ہو تو بیوتی ہو تو اسکے روکنے کے واسطے فم معدہ پر دھائی کی پیٹی لگا دیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے برف کے کھلا دیں۔ تشنج رفع کرنے کے واسطے یا تو سفوف ریجیل یا سرسوں کے تیل میں جاسٹیل رگڑ کر زور زور سے مالش کریں جسم کی حرارت قائم رکھنے کے لئے بوتلون میں گرم پانی بہا کر پیار کے

۱۲- پاؤں اور بغلوں میں لگا دین + نبض نام رکھنے کی واسطے اس نسخہ کا استعمال کریں۔
 نسخہ - کار - یونٹ اف ایمو - نیاہ گرین + سلفیورک ایتر ۲ یا ۴ بوند + عرق کافور
 ایک آونس + سبکو ملا کر حسب طاقت مریض کے دس دن یا پندرہ پندرہ منٹ بعد یا آدھ
 آدھ یا گھنٹہ گھنٹہ بعد پلا دین + لیکن یاد رہے کہ اگر دستوں کے بند کرنے کے واسطے
 بویض نسخہ چاک میکچر کے نسخہ شوگر اف لڈ کا استعمال کریں تو نسخہ بالائی فی خوراک میں
 بویض کار - یونٹ اف ایمو - نیاہ کے ۴ یا ۵ بوند لائیکہ ایمو نیاہ میں اس خیال
 سے کہ مبادی جسم میں کار - یونٹ اف لڈ نہ بن جاوے جو خود ایک زہر ہے + تشنگی رفع
 کرنے کے واسطے ۴ یا ۵ ڈرام اسٹیک اسٹیک ایک بوتل پانی میں ملا کر اور اگر دستوں
 ہو سکے تو اسکیرف میں سرور کے بقدر ایک یا دو آونس کے پیار کو پلا دین اور برف کے
 ٹکڑے کھا دین - اس بیماری میں تشنگی شدت سے ہوتی ہے اور اگر جب پانی پلانا منع یا
 ہے لیکن اس قدر زیادہ پانی نہ پلانا چاہئے جس سے فوراً تھے ہو جاوے + دم لینے میں
 تکلیف ہو تو سینہ پر ایک بڑی سی سی کی ٹی لگا دین - اس مرض میں بیمار کے
 بدن اور بستر پر سرور کہ چڑکنا معینہ ہے اور ڈیٹکٹ اسٹیک اسٹیکس ہر وقت بویض
 اسکے پانی میں سرور ملا کر پیار کو پلا دین + مریض کے بستر کو صاف شہرا کہیں اور مواد
 دست دتے کو خشک مٹی کے پیچے داب دین جیسا کہ پیچے حفظ ماتقدم میں بتلایا گیا
 ہے +

۱۳- واضح ہو کہ جب مرض خفیف ہوتا ہے تب ابتداء میں کار - لڈ برادوں کے کلو - رو - ڈائیز
 کے استعمال سے دست تھم جاتے ہیں +

۱۴- علاج درجہ رمی - ایکشن کا - یہ وہ حالت ہے کہ بعد نفع ہو جانے علامات
 رویہ یعنی کولایس کی پیدا ہوتے ہی اس میں بیمار کی نبض تیز ہوجاتی ہے بدن گرم ہوتا
 ہے - آنکھیں سرخ ہوجاتی ہیں اور مریض پر غم و دگرگی طاری ہوتی ہے کہ جن ساری

علامتوں سے دماغ میں اجتماع خون کا ثابت ہوتا ہے پس اس حالت میں ایسا کریں کہ
اسٹی۔ میو۔ لیسٹ اوویات جیسے ایمو۔ نیا برانڈی غیر پلاوین اور تھوڑی تھوڑی مقدار
میں کیا۔ لو۔ مل کہلاوین اور غنودگی زیادہ ہو تو گردن پر بلٹرنگا وین اور کہانے کو اغذیہ
ہضم اور مقوی یونین مثلاً دودھ۔ شیربا۔ انڈے۔

علاج نتاج کا۔ مریض کو عرصہ تک تھے آتی ہو یا شدت سے پھپھکتی ہوں
تو تھوڑی تھوڑی مقدار اینون یا دار۔ نیا کی استعمال کریں اور فم معدہ پر رانی کی پٹی لگا دیں
اس سے یہ علامتیں رفع ہوں تو معدہ کے مقام پر چھوٹا سا بلٹرنگا وین اور ٹیڈر سیا نکٹ
اسٹ۔ ڈاکو۔ زوٹ۔ کلو۔ فارم یا سلفورک۔ پتھر کا استعمال کریں۔

دست آتے ہوں تو ادویات مناسب سے انکو روکیں پر وہ کار۔ نیا لکھاوے تو زخم میں
م۔ گرین کانٹے۔ ٹریٹ اف سلور سو۔ لیو۔ شن لگا دیں۔ دوا اور غذا مقوی لین مثلاً
کوئین اور زمر اگر جسم پر پھوڑے نکل آ دیں تو جراحی کے قاعدہ سے انکا علاج کریں۔

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سفیدہ کا مریض ساری باتوں سے تن۔ رست معلوم ہوتا ہے لیکن
یشاب نہیں پیدا ہوتا اس صورت میں ایسا کرنا چاہئے کہ کمر کے مقام پر رانی کی پٹی لگا دیں
ڈرائی۔ کینگ کریں۔ سلامتی کا استعمال کریں نہیں تو اس نسخہ کو کام میں لا دیں۔

نسجے۔ نامی۔ ٹریڈ گرین۔ نامے۔ ٹرک۔ پتھر ۲۔ لونڈا۔ انفیوژن اف بے۔ کیو ایک
آؤنس۔ سبکو ملا کر تین تین باچار چار گھنٹہ بعد پلا دیں۔

مرض ڈی۔ سن۔ ٹری

تعریف۔ اردو میں اس مرض کو آؤن لہو کی بیماری کہتے ہیں۔ لاج۔ ان۔ ٹن۔ نامین
پینے معافی کے میو۔ کس جمرین کے انفلمیشن کو ڈی۔ سن۔ ٹری کہتے ہیں یہ بیماری

تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ایکوٹ یعنی حاد۔ دوسری سب ایکوٹ اور تیسری
کروانک یعنی مزمن +

اول ایکوٹ ڈی۔ سن۔ ٹرمی

ماہیت۔ چھل اس بیماری کی یہ ہے کہ بڑے رو دون کے سارے یا کسی حصہ کے
میو۔ کس پردہ میں انفلامیشن کے ہونے سے خون زیادہ آتا ہے تب وہ پردہ پھول کر
شخ اور خشک ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں اس میں لطف پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس درجہ میں
مرض رفع ہو گیا تو بہتر درجہ پر پہنچا، بجا زخم پڑ جاتے ہیں۔ یہ زخم یا تو گول گول یا
آٹھ سے پانچ بجے ہوتے ہیں اور کوئی تو چھوٹے چھوٹے اور کوئی بڑے بڑے ہوتے ہیں
اگر نگاہ بندہ کر زخم خشک ہو گئے تو بہتر درجہ پر چڑھ جاتے ہیں اور بجا کے سرخ رنگ
کے وہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ پس اس ماہیت کے ملاحظہ سے ناظرین کو واضح ہو جائیگا
کہ یہ بیماری تین درجوں میں تقسیم ہو سکتی ہے یعنی درجہ اول وہ جس میں میو۔ کس پردہ
صرف خون سے پُر ہو جاتا ہے۔ دوسرے درجہ وہ جس میں پردہ مذکور میں زخم پڑ جاتا
ہے اور تیسرے درجہ مرض کا وہ ہے جس میں میو۔ کس مجہزین بلکہ کل روہ مردار پڑ جاتا
ہے۔ پہلے ہم تینوں درجوں کی علامات اور تب انکا علاج الگ الگ بیان کر دیتے
ہے۔ **علامات درجہ اول۔** ایکوٹ بیماری اسطور پر شروع ہوتی ہے کہ پہلے بیمار کو
پیلے پیلے دست آتے ہیں بعد دو چار روز کے خاص علامات درجہ اول کی اسطور پر
شروع ہوتی ہیں کہ بیمار کو تھوڑی تھوڑی آؤن اور لہو کی نہایت چش اور درد کے ساتھ
بار بار دست آتے ہیں اور ہر ایک دست کی وقت بیمار اس قدر زور لگاتا ہے کہ جس کا
بیان نہیں کیا جاسکتا۔ پھر ہی بخیر و جا قطرہ خون کے یا ایک آوہ سدے کے کچھ
آوہ نہیں خارج ہوتا شکم میں اور خاصہ کی سیم (معا عور) اور ساگ۔ مایڈ فلکس پر

راکب حصہ معاقبولیت کا) دبانے سے درد اور درم معلوم ہوتا ہے بیمار کی زبان خشک اور درمیشیا سے میلی اور کنارے اُسکے سُرخ ہوتے ہیں اور بخار ہو جاتا ہے جس سبب سے نفخ تیز اور خون سے پر جسم گرم ہشیا بکم اور سُرخ اور کمال بے چینی ہوتی ہے۔ بہوک مر جاتی ہے۔ اس درجہ کے دستوں کو دھو کر ملاحظہ کریں تو بخار آؤں اور خون کے یا کوئی مسدہ کے کچھ اذہن ہین ہوتا +

علامات درجہ دوم۔ اب سست کی قعدہ پیلے پیلے اور کھلکھلاتے ہیں لیکن پیش اور رود کے ساتھ اور خون جو بیمار ہی بڑھتی جاتی ہے دست کبھی تو زرد اور کبھی سبز رنگ کے آتے ہیں اور انہیں خون اور صلف کے ٹکڑے ہو کر آتے ہیں اور مجیدہ بلغم کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں۔ بعضہ فہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض سست کے نزاعون ہی جاری ہونے لگتا ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ اب رودون میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں انکے اوپر کا جھوپڑا جن بارکایے گون کے وسیلہ سے اٹکا رہتا ہے وہ رگ مریض کی زور زور سے کھینچنے کے سبب ٹوٹ جاتا ہے اور انگور دن کو بھی صدمہ پہنچتا ہے تب خون جاری ہونے لگتا ہے۔ بہ نسبت درجہ اول کے اب بخار کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اور اس درجہ کے اخیر میں بخار بالکل فرو ہو جاتا ہے۔ اب بیمار روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہے چنانچہ نفخ اسکی بارکایا دبلی ہوتی ہے چہرہ دب جاتا ہے۔ ناک نفل پڑتی ہے۔ رنگ چہرہ کا سیاہ پڑ جاتا ہے۔ مریض لاغر اور نہ ڈال ہو جاتا ہے۔ بہوک مر جاتی ہے۔ سبب کمال ضعف کے آواز پٹھ پٹھ جاتی ہے اور اب بیمار بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ اس وجہ کو دستوں کے امتحان کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ بیمار کے شب و روز کے بول و براؤ کو ایک طرف نہیں جمع رکھیں اور صبح کیونکہ اسکا امتحان اسطور پر کریں کہ پہلے اس برتن میں پانی چھوڑ دیں اور لکڑی سے دست کو خوب ہلکا کر پھر نے دین بعد ازاں اوپر کے پانی کو ہٹا دیں پھر دوبارہ اس طرف کو پانی سے پھر کر کے ہلکا کر پھر پانی کو ہٹا دیں اسطور پر پٹھ

مرتبہ کریں تب اس برتن میں جو کچھ ہوا اسکو جینی کی سفید چوڑی رکابی میں ڈالکر دیکھئے
 سے یہ چیزیں پانی جائینگے۔ خون کے ڈلے۔ سلف کے ٹکڑے کو بھی توڑے بڑے
 چار یا پانچ یا چھ پنج کے اور کوئی روپیہ یا اٹھنی چوٹی یا دو انی برابر گول گول رنگ
 کیسکا خاک کیسکا زردی بل اور کیسکا رنگ ہو رہا۔ منجہ بلغم یعنی میوہ کس کے ٹکڑے
 یہی پائے جائینگے۔ شکل ان منجہ بلغم کے ٹکڑوں کی مختلف ہوتی ہے۔ کبھی سوس گندم
 کے طور پر کبھی نرود اور سبز چھڑوں کے طور پر کبھی مثل قطرات روغن کے ۔

علامات ورجہ سوم۔ اس درجہ میں دست تھوڑے تھوڑے سیاہی مل دہیت
 بدبودار آتے ہیں۔ بیار کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ چہرہ پر مردہ پن چھا جاتا ہے بغض
 نہایت بارکب جلتی ہے۔ بدن مردہ پسینہ سے مرق ہو جاتا ہے اور مریض نڈال ہو کر
 نہایت ضعف کچھالت میں مر جاتا ہے۔ اس درجہ کے دستوں کو دھونے سے سیاہ
 رنگ کے سلف کے ٹکڑے پائے جائینگے ۔

علامات آلفا قیہ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض عین ابتدائی سے نہایت
 کمزور اور نڈال ہو جاتا ہے اور خون آمیز اور نہایت متعفن مست آتے ہیں اور وہی
 چار روز کے اندر مر جاتا ہے اس قسم کے مرض کو اصطلاح میں ہے۔ مو۔ را۔ جکت
 ڈی۔ سن۔ ٹری کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب درجہ دوم کے اندر
 رودون میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں اور اس باعث کوئی حصہ رودہ کا چھد جاتا ہے تو براہ
 اور پیپ اور خون وغیرہ پے۔ ری۔ ٹو۔ فی۔ ام میں جا کر ٹپے ہو قے۔ ری۔ ٹو۔ پیپ
 ہو کر بجا رہ جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پے۔ مو۔ را۔ ٹی۔ ٹول دینوں کے ذریعہ
 رودون کے زخم کی پیپ جگر کے اندر سرایت کر جاتی ہے تب مریض کے جگر میں کثرت
 سے مرنسل پیدا ہو جاتے ہیں اور کبھی انشاء مرض میں پیار کا پیٹاب بند ہو جاتا ہے یا جگر
 آتا ہے اور کبھی پاخانہ کے راہ نہایت کثرت سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ واضح ہو کہ جب

مرض حاد ہلک ہو جیوالا ہوتا ہے تب اسکی صورت ایسی ہی ہوتی ہے جکا ذکر
اوپر کیا گیا لیکن جب یہ بیماری رو بصحت لاتی ہے تب تدریج کل علامتوں کو
تحفیف ہوتی جاتی ہے اور بیمار تندرست ہو جاتا ہے نہین تو ایکوٹ بیماری کہلک
ہو جاتی ہے *

دوم سب ایکوٹ ڈمی - سن - ٹری

جب کمزور یا ایسے آدمی کو ڈمی - سن - ٹری کی بیماری ہو جاتی ہے جکا نزلہ و موسمی
ہوتا یا جو شراب نہین پیتے اور گوشت بھی کم یا بالکل نہین کھاتے یا جو پیدائش
ہی سے ضعیف البیان ہوتے ہیں جیسے ہندوستان کے اکثر باشندے ہوا کرتے
ہیں تب اس مرض کی علامتیں جیٹکا ذکر ایکوٹ مرض میں کیا گیا ہے شدت نہین
پکڑتین بلکہ قدرے خفیف طور پر پیدا ہو کر یا تو بیماری بالکل رفع ہو جاتی ہے یا سب
ایکوٹ سے کہلک ہو جاتی ہے + یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے باشندہ کو جب
ہو توں لہو کی بیماری سچی جاتی ہے تب وہ اسکا چند ان خیال نہین کرتے - وہی چا دل کہا لیتے
یا اسپنول آدھا کچا آدھا پھنسا ہوا پھانک لیتے ہیں جس سے بیمار بھی رفع ہو جاتی
ہے + مگر یورپ کے باشندہ ان کو جب مرض ہندوستان میں ہو جاتا ہے تب نہایت
شدید ہو کر اکثر ہلک ہو جاتا ہے +

سوم کہلک ڈمی - سن - ٹری

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض رفع ہو جانے کے ایکوٹ بیماری کی علامتیں عرصہ
دراز تک جاری رہتی ہیں اور اس اشعار میں کہی شدیداور کبھی خفیف ہو جاتی
ہیں مدست بار بار آتے ہیں اور رفتہ رفتہ زیادہ تر پتلے ہوتے جاتے ہیں رنگ

اکٹا ہو۔ اور وہ کھارہوتے ہیں انہیں لغیم اور خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے دست کے وقت پچیش اور درد کم ہوتا ہے بیمار ذرہ بردار لاغر ہوتا جاتا ہے اور زبان کی نوک اور کنارے سرخ ہو جاتے ہیں اسکو کہتے ہیں کہ ایکوٹ ڈی سن۔ ٹری کرانک سوگئی اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ عین ابتدا ہی سے یہ بیماری کرانک ہو سکتی ہے چنانچہ ایکوٹ مرض کے بیان کے وقت اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مرض کی خاص علامتوں کے شروع ہونے سے پہلے دو چار روز تک بیمار کو پتلے پتلے دست آتے ہیں غرض ہست جب عرصہ دراز تک جاری رہتے ہیں تب بھی اس مرض کو کرانک ڈی سنٹری کہتے ہیں +

ماہیت سکرانک ڈی سن۔ ٹری کی یہ ہے کہ اس میں رودہ کا مینہ کس پرودہ سنج اور موٹا ہو جاتا ہے اور اسپرڈاز اور لٹھا پائی جاتی ہیں اور رودوں میں اکثر گول گول زخم اور بعض مقاموں پر زخم کے داغ بھی پائے جاتے ہیں +

اسباب ڈی سن۔ ٹری کی بیماری کے گرم ملک میں بودا باش کرنا۔ تمام مہوہ جات کا کھانا۔ لے۔ ریا اور بعض دفعہ یہ مرض وبا ٹی بھی ہو جاتا ہے۔
علامات تشریحی بعد وفات۔ جب کوئی بیمار ایکوٹ مرض سے مر جاتا ہے تو اسکی نعش کا محتاج اسطور پر کرنا چاہئے کہ شکم کی چاک کر کے امی۔ لیم رودہ جہان آخر ہوتا ہے اس مقام سے دریغ اوپر ڈور سے گرہ لگا دین اور دوسری گرہ میمر کے پاس۔ یکم رودہ پر لگا کر ان دونوں مقاموں سے رودوں کو کاٹ دین تب مے۔ سن۔ ٹری سے علیحدہ کر کے رودوں کو شکم سے باہر نکال کر میمر پر دراز کر دین بعد ازاں ایکم سے دیگر یکم تک فیجی سے کہہ لے دین اور پانی سے دھو ڈالیں اب غاظہ کرنے سے رودوں کے چوٹے چوٹے خدو ابھر کر نکلے ہوئے دکھائی دینگے اور گول گول یا ترچے زخم نظر آئینگے۔ بعضوں پر سلف کے ٹکڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔

بعض زخموں پر سرخ سرخ انگور نظر آویں گے اور بعض مقام پر جو زخم خشک ہو گئے ہوں
انکے دوع پائے جائیں گے اور دوا پیرودہ سکڑا ہوا ہوگا۔ بعض دفعہ ررودہ میں سورخ
بھی پایا جاتا ہے۔ بعض مقام کے زخم سیاہ اور انیر سیاہ رنگ کے سلف ہوتے
ہیں۔ جگر کو نکال کر تڑا شے تو بے شمار چھٹے چھٹے دھیل پائے جاتے ہیں۔

علاج کیوٹ ڈوی۔ سنٹری۔ ورجہ اول۔ بیمار کو ٹوٹا م کسٹریٹل اور
قطرے لاڈم پلا دین تاکہ اگر کوئی سٹڈ ہو وہ نکل آوے بعد ازاں اپنے۔ کے۔ کو انا
کا استعمال کریں جسکی ترکیب یہ ہے کہ اس دوا کے استعمال کرنے سے پہلے مریض کو
دو گرین اینون کہلا دین اور نم معدہ پر راسی کی پٹی لگا دین تاکہ معدہ کی خراش مرنج
ہو اور بیمار کو اپنے۔ کے۔ کو انا کی برداشت ہو جاوے ورنہ تھ ہو جانے کا احتمال
ہے۔ غوراک اپنے۔ کے۔ کو انا کی پیار کی طاقت اور مرض کی شدت پر منحصر ہے چنانچہ
مریض اگر طاقتور ہو اور بیماری شدید تو۔ اگرین سے لیکر ۱۰ یا ۲۰ گرین تک

تین تین یا چار چار گنٹھ بعد کہلا دین جب تک سست کہل کر اور پتلے پتلے نہ آویں
اور پش اور درد کو تخفیف نہ ہو یعنی اس دوا کو دوسرے درجہ کے ابتدائیک براہ
جاری نہ کریں۔ اور اگر پش یا درد کی شدت ہو تو ایک یا دو گرین اینون دن میں
ایک یا دو دفعہ کہلا دین۔

کوکلی علاج۔ اس درجہ کا دستور پر کریں کہ دین میں ایک یا دو دفعہ اینون کی پیکاری کریں
اور یکم اور سگ۔ مابند۔ فلکشر پر دروازہ رورم ہو تو جو کین لگا دین ہین تو فوین ٹیشن
کریں یا پوٹلس نایہین اور اس درجہ میں معتد کے گرد جو کون کے لگانے سے بھی نائد
ہوتا ہے۔ غنڈا۔ آتش جو یا ساگو دانہ۔

ورجہ دوم۔ ٹی۔ سن۔ بڑی کی بیماری کے براہ کو ہر روز دو ہوا کر امتحان کرنا چاہئے
اس سے یہ بات معلوم ہو جاوے گی کہ بیماری کو فے درجہ میں ہے۔ غرض جب یہ کہیں

گردست پتلے پتلے اور زیادہ معتداری میں آدین اور سبجاری کی شدت بھی کم ہو جاوے تو
ابتدا میں مناسب پیچیدگی تو ایسے کے۔ کوانا جاری کی کہیں نہیں تو دس مس گرین
ڈورس پاؤڈر چار گھنٹہ بعد کہلاوین اور اب بعض آتش جو یا ساگو دانہ کے بیمار کو شوب
یا دودھ وغیرہ غذا دین اگر دوستوں کے امتحان میں سلف یعنی زخمیوں کا چھڑا یا یا جاوے
اور خون کے ڈبے بھی ہوں تو اوویات قابض اور مقوی کا استعمال کریں مثلاً

گیا۔ لک۔ اسٹیاٹامک۔ اسٹیاٹوگراف۔ لڈیاٹے۔ ٹریٹ اف سلور ہمارا
امیون کے چار چار یا چھ گھنٹہ بعد کہلاوین اور اس نسخہ کا استعمال بطور متغی کریں
نسخہ۔ کوئین مگرین۔ ڈیسیکٹ۔ سلیفوک۔ اسٹ۔ ابوڈ۔ لاڈنم۔ ابوڈ۔ پانی
ایک آونس۔ دین تین مرتبہ بلا دین اور قابض کے طور سلفٹ اف کاپر بہرہ مفید ہے
در دکی نہایت شدت ہو تو گاہے گاہے امیون کہلا یا کریں۔

لوکل علاج۔ سیکم اور سیٹ۔ مائیڈ۔ فلکشر۔ درد ہو تو پوٹس لایہ میں۔ دین
دو دندہ امیون کی بچکاری کریں اور اگر دست بار بار نہایت پتلے اور زیادہ مقدار
میں ساتھ درد اور پیچیدگی کے آدین تو اس بچکاری کا استعمال دین ایک یا دو دفع
کریں چنانچہ۔

نسخہ۔ شوگراف۔ لڈ۔ مگرین۔ لاڈنم۔ ابوڈ۔ پانی۔ آونس۔ سبکو مالین۔ پانچا
کے ہمراہ خون زیادہ آوے تو اس بچکاری کو کام میں لا دین۔
نسخہ۔ بیول کی چھال ایک آونس۔ پانی۔ آونس۔ آوہ گھنٹہ تک جوش دیکر چھان
لین۔ اور اس عرق میں مٹام پھیکری ملا کر بچکاری کریں اس سے بھی خون بند
ہو تو اس نسخہ کی بچکاری کریں۔

نسخہ۔ ٹیکمرف۔ اسٹیل۔ ایک ڈرام۔ پانی ایک پائیٹ۔ دو نوکو مالین۔ پہرہ
خون جاری رہے تو معتد کے اندر آراہے۔ کیو۔ لم داخل کریں۔ کسی رنگ کا ٹنڈ

اگلا دیکھیں تو فوراً اُسکو باندھ دیں اور جب کسی ترکیب سے خون بند نہ ہو تو اب ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔
 ایار۔ ٹاکو بند ریلو ٹور۔ نے۔ کٹ کے دبا دیں ٹائمر ٹرٹ اف سلور کی پچکا ری اس درجہ
 مرض میں نہایت مفید پڑتی ہے اس پچکا ری کا عرق جب زخم پر بہر جاتا ہے تو اُنکے
 اندام کی صورت ہو جاتی ہے چنانچہ ۴۰ گرین ٹائمر ٹرٹ۔ اف سلور کو ۲۰ آؤنس ٹرٹ
 واٹر میں حل کر کے پچکا ری کریں چونکہ اب روز بروز بیمار ملا غر اور کمزور ہو جاتا ہے تو انڈیز
 مقوی سے اُسکی طاقت کو قائم رکھنا چاہئے مثلاً دودھ۔ شوربہ۔ بھینہ۔ خمر وغیرہ +
 درجہ سوم۔ جب دستوں میں سیاہ رنگ کے سلف پائے جاویں تو اس سے جاننا
 چاہئے کہ اب بیمار سی تیسرے درجہ پر آگئی ہے اور رودہ مردار پڑ گیا ہے اور بیمار نہایت
 کمزور ہو گیا ہے۔ غرض سوقت سوائے ادویات اٹھی۔ میورلٹ کے اور کچھ چارہ نہیں
 چنانچہ بیمار کو خمر اور مقوی غذا دیں اور دوا کے طور پر ایو۔ نیا اور ایتر کام میں لادیں +
 حال میں اکیوٹ ڈی۔ سن۔ ٹری کا علاج ایک نئی ترکیب سے کیا جاتا ہے یعنی
 سلفٹ اف مگن۔ شیا کے خوب کٹاڑ ہے عرق سے + اس علاج کے موجد فرماتے
 ہیں کہ یہ عام قاعدہ ہے کہ اکیوٹ ڈی۔ سن۔ ٹری کا علاج زیادہ مقدار پر لے۔ لگت سے
 کرتے ہیں۔ مگر اس دوا کے زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نہایت ضف ہو جاتا
 ہے اور چونکہ اس سے غشیان اورتے ہی جوتی ہے تو مریض اب بھی کمزور ہو جاتا ہے۔
 علاوہ ازیں اس دوا کے استعمال سے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھے برابر جاری رہتی ہے
 تھمتی ہی نہیں + پس چونکہ آپے۔ لگت کا یہ حال ہے تو اب اسکا استعمال متروک ہونا
 جاتا ہے اور اسکی جگہ سلفٹ اف مگن۔ شیا اس ترکیب سے استعمال کرتے ہیں کہ
 سلفٹ اف مگن۔ شیا اسقدر لیویں جو سات آؤنس پانی میں حل ہو کر خوب کٹا
 عرق بن جاوے اب اس میں ایک آؤنس ڈائینوٹ سلفیو رک اسٹیلادین اور اس
 کٹاڑ ہے عرق میں سے چار ڈرام لیکر گنٹہ گنٹہ یا دو دو گنٹہ بعد پلاوین جب تک براتہ

کے دست بلا آؤن اور خون کے خوب گھٹک نہ آؤین درد اور پچیش رفع نہوے اور حرارت جسم کی کم نہو جائے۔ غرض جب پاخانہ تندرستی کے رنگ و روپ اور قوام کا اور شب و روز میں صرف وہی یا تین مرتبہ آنے لگے تب کسی قابض مرکب استعمال کریں جیسے ڈائریکٹ سلیفورک اسٹیمراہ لائونگ یا ٹمپکھ آف ہمپکے دین یا ہمراہ افیون کے کسی قابض دوا کی گولیاں کھلا دیں۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ بیمار کی غذا نہایت ہلکی اور زود ہضم ہونی چاہئے۔

یہ یاد رہے کہ اوپر کا گڑھا عرق سلفٹ اف گمنے شیا کا خاصکہ اس وقت مفید پڑتا ہے کہ حیوت ڈھی۔ سن۔ ٹرمی کی بیماری نہایت اکیوٹ ہوتی ہے کیونکہ بیماری جب قدر کم نہ ہوگی عرق مذکور اس قدر کم فائدہ کرے گا۔

سب اکیوٹ ڈھی۔ سن۔ ٹرمی کا علاج اسطو پر کریں پہلے بیمار کو قدرے کٹرائیل پاؤین تاکہ سندہ وغیرہ فاسد مواد معاسے خارج ہو جاوین۔ بعد ازاں تین تین یا چار چار کریں آپے۔ کے۔ کوانا ہمراہ افیون کے چار چار گھنٹہ بعد کھلا دیں۔ اور یہ ویسی علاج بھی بہت مفید ہے چنانچہ اسپنڈل کا پہاٹکنا یا اسکا لعاب معہ بیج کے شربت نمفٹہ کے ہمراہ پینا لعاب بہیدانہ یا لعاب لیشہ خطمی ہمراہ شربت نمفٹہ کے چار دفعہ دین پینا اور بطور غرض کے وہی چاول کھانا پچیش اور درد نہ پادہ ہو تو افیون کی پچکاری کریں اور شکم خاصکہ سیکم اور سیگٹ۔ مائیڈ۔ فلکشر کے مقام کو سکیڑیں جب بیماری کا زور کم ہو جائے تب قابضات کا استعمال کریں جیسے ڈورنٹس پاؤڈر کاٹے نو پاؤڈر گیا لاک اسٹٹانک اسٹ وغیرہ۔

کرانک بیماری میں ابتدا ہی سے قابضات اور مقویات کا استعمال کرنا چاہئے جیسے کوڈین افیون کپاؤنڈ چاک پاؤڈر ہمراہ افیون کے یا کپاؤنڈ گاٹی۔ نو پاؤڈر وغیرہ

بہت مفید ہے *

اسہمال شرکی - اسکا یہ حال ہے کہ اکثر حاملہ عورتوں کو بعض صبح کے قے کے حمل کے ابتدائی مہینوں میں انترسم کا اسہمال ہو جاتا ہے اور بچوں کو وراثت نقلتے وقت بعض نازک مزاج آدمیوں کو رنج اور غم سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے *

علاج - بذریعہ میون کے کرنا چاہئے اور دیگر قابضات کا استعمال کریں *

اسباب - سردی کا لگ جانا پسینہ کا بند ہو جانا - رنج اور غم - دانتوں کا نکلنا - حمل - شدت گرمی - اغذیہ ثقیل - خام میوہ جات یا سخت میوہ جات کا زیادہ کھانا - یا متعفن چیزوں کا کھانا - مسہلات تیز کا زیادہ لینا - قبض کا ہونا - شکم میں گرم کا ہونا - گاؤٹ یا روماتزم - ٹیڑم کا شکم میں انتقال کر جانا - ریل کی بیماری - انجی - رک فیور اور ہیضہ کے پہلے ہی اسہمال اکثر ہو جاتا ہے *

مے لینا

تعریف - اس بیماری میں سیاہ رنگ کا خون کم و بیش متغیر ہو کر امعا سے خارج ہوتا ہے *

اسباب - یہ بیماری ان امراض گلوٹلر شش کی ایک علامتوں میں سے ہے جن سے جسم کی دریدہ خون میں خون رُک رُک کر دورہ کرتا ہے اور یہ بیماری معدہ اور وٹو - وینیم کے زخم میں انٹے - رک فیور میں ڈی - سن - ٹری در انٹا - سے سپش میں بھی پیدا ہوتی ہے اور رودہ کے اندر جب اینو - رینرم کی آبیلی بہت جاتی ہے تب بھی باخاندہ کے ہمراہ خون آتا ہے *

علاج - اس بیماری کا ان امراض پر منحصر ہے جنکے سبب سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے *

کانس لے۔ پے۔ شن یعنی قبضیت

امعا کے فعل یا ساخت میں فرق پڑ جانے سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے چنانچہ جب ساخت میں بیماری ہوتی ہے تب رووہ یا تو شکرا کر تنگ ہو جاتا یا منفذ اسکا بند ہو جاتا ہے وہ سبب قبضیت کے جن سے رووے اچھے طور پر اپنی معمولی حرکت نہیں کر سکتے۔ (پے۔ رس۔ ٹمال۔ ٹکٹ۔ مویشن) یہ مین صفر کا اچھے طور پر پیدا نہ ہونا۔ درزش کا نہ کرنا۔ رووہ میں تشنج یا فالج کا ہو جانا۔ فتق کی بیماری۔ اور جب ایسی چیزیں کھاتی جاتی ہیں جیسے آلو یا میدہ کہ جنہیں رووہ کو سخت کر دینا چاہیے اجزا جیسے چوکر یا ریشہ وغیرہ نہیں ہوتے تب بھی تبص ہو جاتا ہے کیونکہ اس قسم کی چیزیں رووہ کے اندر ایسی جمع ہو جاتی ہیں کہ گویا کسی نے سیسہ لپکا کر پلا دیا ہو۔

علامات۔ اجابت کے باب میں یہ یاد رہے کہ اکثر آدمیوں کو ہر روز ایک دفعہ پاخانہ جانے کی عادت ہوتی ہے لیکن کوئی دو دفعہ اور کسیکو دوسرے یا تیسرے دن پاخانہ پھرنے کی عادت ہوتی ہے۔ لیکن خلاف ثلوت جبکو قبض ہو جاتا ہے اُنکے عمدہ جگر بلبلیہ اور رووہ کے غدودوں کا فعل اچھے طور پر انجام نہیں پاتا جس سبب ایسے لوگوں کی طبیعت ہمیشہ مکدر رہتی ہے۔ حافظہ اور حواس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ رنگت جسم کی پیلی پڑ جاتی ہے۔ درود سرد کن پٹی کی شرائین تڑپتی ہیں۔ کاروبار کو بھی نہیں چلتا۔ پیشاب کم اور سرخ رنگ کا آتا ہے دل دھڑکتا ہے۔ آخر کار حالت بیمار کی ایسی ہو جاتی ہے جسکو دسی طبیب میر تقی کہتے ہیں +

علاج۔ رفع قبض کیواسطے جلاب کا استعمال نہ کریں بلکہ جیاتک ہو سکے ایسی دوا سے احتراز کرنا چاہئے۔ سب سے عمدہ علاج قبض کا یہ ہے کہ مرغیکو چلنے پھرنے کی عادت

ڈالین اور غذا ایسی بین جسمین رودون کو تخریک دینا والی اجزا موجود ہوں یعنی بعض
بندے کے آٹے کی رودنی جسمین چکر کے وترے ملے ہوئے ہوتے ہیں کہلاواین اور
نازی ترکاری اور میوہ جات کا ہی استعمال ضرور کر دین۔ ان باتوں کی پابندی ملے
فائدہ نہ ہو تو سہلات کے عوض ہلکے پلیٹات کا استعمال کریں جیسے سفوف بلبلہ یا خمیر
بنفشہ یا گرسے۔ گو۔ رینہ۔ پاؤڈر یا کمپاؤنڈ۔ رو بر پیل۔ یا پوڈا۔ فلین یا صبر کی گولیاں یا
صبر کے ساتھ اکثر کٹ اف نمکس۔ دامیکا یا ملاؤ۔ ناملاوین اور یہ نسخہ قبض کشا بہت
ہی فائدہ مند ہے۔

نسخہ۔ لے۔ کوئیڈ اکثر کٹ اف کسے۔ رائگ۔ رمی۔ ڈا۔ ۳۰ یا ۴۰ قطرے *
ٹینکچر اف نکس۔ ۱۰۔ میکا۔ قطرے * گاجی۔ سی۔ رین۔ ۲ ڈرام * پانی ایک آؤنس *
سبکو ملا کر صبح یا شام پلاوین * جب ان دو آؤنس سے قبض کو سیکھ۔ فائدہ ہو جائے
تب پلیٹات کے عوض مقویات کا استعمال کریں جیسے۔

نسخہ۔ کوئین۔ ۲ اگرین * سلفٹ اف ایرن ۲ اگرین * لائیکیا۔ اسٹرکنیا ۳۰ پوند *
اروساٹک سلیفورک اسٹڈ ڈیڑھ ڈرام * الیٹوٹرن اف کوشیا ۸ آؤنس *
سبکو ملا کر چھ حصوں میں دفعہ پلاوین * یا اس نسخہ کا استعمال کریں *
نسخہ۔ سلفٹ اف زنگ ۲ اگرین * اکثر کٹ اف نکس۔ ۱۰۔ میکا ۴ اگرین *
اکٹر کٹ اف رو۔ بر۔ ۳۰ اگرین * سبکو ملا کر بارہ گولیوں میں تقسیم کر کے ایک ایک
گولی دین۔ دودنہ کہلاوین * اور یہ نسخہ بھی اچھا ہے۔

نسخہ۔ ڈائے۔ لیوٹ نمائے۔ ٹرو۔ ٹائیڈ رو۔ کلورک اسٹ۔ ۲ ڈرام *
لائی۔ کو۔ اسٹرکنیا۔ ۳۰ پوند سے ایک ڈرام تک * اسپرٹ اف کلوراک فارم *
ڈرام * ٹینکچر اف جنجر ۳ ڈرام * پانی ۸ آؤنس * سبکو ملا کر اسکا آٹھواں حصہ لیکر اس میں
تین تولہ پانی شامل کر کے دین۔ دین دفعہ پلاوین۔ ہین۔ تو اس نسخہ کا استعمال کریں *

لشجہ - وی - لے - رمی - نٹ اف زنگ ۱۲ سے ۴۴ گرین تک +
اکٹر اگٹ اف بلا - ٹاڈ - نام گرین + اکٹر اگٹ اف جن - شن ۴۴ - گرین +
سبکہ ملاکر بارہ گولیوں میں تقسیم کر کے ایک ایک گولی دشمنین تین دفعہ کھلاوین +

آبش - ٹرگ - شن آف وی - با - وٹس

یعنی

رودون میں روک ٹوک جانا

اس باب - رودون کے منفذین کی سبب سے روک ٹوک جاسکتا ہے چنانچہ بعض دفعہ
ایسا ہوتا ہے کہ رودون کے اندر جب سرطان کی بیماری ہو جاتی ہے یا زخم پیدا
ہو جاتے ہیں یا انفلامیشن ہو جاتا ہے تب منفذ تنگ ہو جاتا ہے یا رودون کا
ایک حصہ دوسرے کے اندر داخل ہو کر گرہ لگ جاتی ہے جس کو اصطلاح میں
انسٹا - سار - سیپ - شن کہتے ہیں یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رودون کے اوپر جو
سیرس پردہ ہوتا ہے اسی میں انفلامیشن کے باعث لف پیدا ہو جاتا ہے
یا رودہ اپنی جگہ سے اُدھر اُدھر ہو جاتے ہیں + یا کسی رسولی یا ڈنبل کے سبب
دب جاتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ پل - دس کے سوراخ کے اندر داخل ہو کر
کوئی حصہ رودہ کا پھنس جاتا ہے گا ہے گا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ براز کے
سڈ سے بنکر رودہ کے منفذ کو مسدود کر دیتے ہیں اور منفذ مذکور کسی خارجی شے
یا خشک صفر کے منجھڑ بکڑوں کے پھنس جانے سے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ جب
ان بکڑوں پر مواد جمع کر لیا گیا تو پھر ہی پتہ ہری کے طور پر بننا دیتا ہے +

کرن - سز کی بیماری میں بہ نسبت چوٹوں کے بڑے رودے ہی اکثر زیادہ تر

مبتلا ہوتے ہیں اور لمف کے ڈور دن سے اکثر اسے - لی - ام رودہ بھی تنگ ہو جاتا ہے اور

ان - ٹا - سا - سیپ - شن

اس حالت کو کہتے ہیں جس میں ایک رودہ دوسرے میں داخل ہو کر پھنس جاتا ہے اور کین - جس - چین یا انفلامیشن اور لمف کے پیدا ہو جانے سے منفذ اسکا تنگ ہو جاتا ہے ۔ اکثر تو رودہ کے ایک ہی حصہ میں ان - ٹا - سا - سیپ - شن پایا جاتا ہے پر بعض دفعہ تین یا چار یا اس سے بھی زیادہ حصوں میں گرہ لگ جاتی ہے اور رودہ کے اوپر کا حصہ نیچے کے حصہ میں پھنس جاتا ہے اور آدھے سے زیادہ مریضوں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ اسے - لی - ام اور - سی - کم معاقولون کے اندر داخل ہو کر پھنس جاتے ہیں ۔

اس قسم کے روک لیئے ان - ٹا - سا - سیپ - شن عہد طفلی اور بڑے بچے میں زیادہ تر پایا جاتا ہے ۔

علامات - ان - ٹا - سا - سیپ - شن کی یہ ہیں کہ جب تیز حباب کاٹل ہوتا ہے یا بعد شدید قولنج کے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیمار کو دم بدم پانخانہ کی حاجت ہوتی ہے شکم میں شدت کا دروازہ پیش ہوتی ہے ۔ اجابت کے ہمراہ یا تو نرا خون یا خون اور آئون ملے ہوئی آتی ہے اور تھوڑی بہت مرض ان کے پیش

کی علامتیں بھی موجود ہوتی ہیں ۔ ان علامتوں سے اس قسم کا روک پھنین پہچانا جاتا مگر ان بار بار پانخانہ کی حاجت ہو اور کچھ بھی نہ آوے بلکہ مریض کو ہچکچایاں اور برازی تے آوے تو اس مرض کے ہونے کا گمان ہو سکتا ہے ۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو حصہ رودہ کا پھنس جاتا ہے ان میں انفلامیشن

پیدا ہو کر سب پڑ جاتی ہے اور زخم پڑ جانے کے سبب سے وہ حصہ علیحدہ ہو کر جانے کے ساتھ خارج ہو جاتا ہے تب رو دھکا منفذ شروع سے آخر تک ایکسا ہو جاتا ہے *

دوسرے سبب آئیں۔ ٹرک۔ شن کا یہ بتلایا گیا ہے کہ بعض دفعہ رو دھ مین تہری کا مارا جمع ہو جاتا ہے تب منفذ رو دھ کا بند ہو جاتا ہے مگر یہ بات بہ نسبت انسان کی کھجائی کرنے والے حیوانات میں زیادہ پائی جاتی ہے *

علامات عام قسم کے رو وون کی۔ آئیں۔ ٹرک۔ شن کے بیمار کو بار بار تپتی ہوئی ہے۔ پہلے تو معدہ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے اور تب تپنے کے ساتھ براز نکلتا ہے جبکہ اصطلاح میں اس۔ ٹرک۔ کو۔ رمی شنس۔ و۔ جی ٹنگ کہتے ہیں * شکم میں کبھی خفیف اور کبھی شدید رو دھ ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ پیٹ پھول کر بقدر سائبنا جاتا ہے۔ ہچکیاں نہایت ستاتی ہیں۔ بیمار ڈھال ہو جاتا ہے۔ احتیاط سے ٹیٹلنے سے روک کے عین مقام پر ایک گولہ محسوس ہوتا ہے مگر آئیں ٹرکشن کے ہر قسم میں بیمار نہایت جلد ڈھال ہو جاتا ہے * بعد چند روز کے شدید

لے۔ رمی۔ ٹو۔ تائی۔ ٹس کی علامتیں پیدا ہونے لگتی ہیں اور یہ تاعدہ ہے کہ آئیں۔ ٹرک۔ شن جب قدرتی ہو گا اس قدر تپتی بھی دیر دیر سے ہو گی مثلاً آئیں۔ ٹرک۔ شن اگر ٹیو۔ ڈی۔ نم رو دھ مین ہو تو عین ابتدا ہی سے تپ جلد اور نہایت شدت سے ہوتی ہے * اور روک جب قولون میں ہوتا ہے تب عرصہ کے بعد تپتی ہے اور یہ بھی بات یاد رہے کہ جب رو دھ کے اوپر کے حصہ پر روک ہوتا ہے اور علاج سے ہنین نفع ہوتا تو مہفہ کے اندر حالتِ رمی طاری ہو کر بیمار تلف ہو جاتا ہے اور روک جب قولون رو دھ مین ہوتا ہے تب اسپین درد اور تکلیف چونکہ کم ہوتی ہے اور اس صورت میں غذا کی اصل یعنی کائیل کے

جذب ہو جانے میں ہی چونکہ بہت بچ نہیں ہوتا اس واسطے اس قسم کے اُبسن ٹرکشن
یعنے روک میں بیمار کئی ہفتہ کے بعد ہلاک ہوتا ہے مگر اس بات کو بھی نہ بھولنا چاہئے
کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیمار کی زیت کی اُمید بالکل نہیں ہوتی تاہم خود بخود
چہرہ پر صحت کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ پس یاد رکھو کہ یہ مرض جب قدرِ عرصہ
دراز کا ہو جاتا ہے اُس قدر بیمار کو صحت کی اُمید زیادہ ہوتی ہے *

علاج۔ اگر دریافت ہو جائے کہ روده میں روک پڑ گیا ہے تو ہرگز جلاب نہ دینا
چاہئے لیکن عین ابتدائے اُبسن ٹرکشن کی تشخیص مشکل ہے مگر چونکہ اس بیماری میں
ہمیشہ قبض پہا بکرتی ہے تو جلاب دیا کرتے ہیں مگر ایسا جلاب نہ دینا چاہئے جو تیز ہو
یا جس سے بکثرت دست آوین چنانچہ ایک خوراک کسٹرائل کی ملاوٹ دینا یا کوئی اور
ایک اہل تجربہ کریں لیکن بہتر تو یہی ہے کہ کسٹرائل اور تارپین کا حقہ کریں لیکن جب یہ
بات معلوم ہو جاوے کہ روده میں کسی قسم کا روک پڑ گیا ہے تو ہرگز جلاب نہ دینا چاہئے
کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس حالت میں جلاب کے دینے سے بجز نقصان کے فائدہ ہرگز نہیں ہو
سکتا پس اس صورت میں ایسی تجویز کرنی چاہئے جس سے بیماری کی طاقت قائم رہے اور روک کی
تکلیف رفع ہو۔ تقویت غذا ہی سے ہو سکتی ہے مگر اس بات کا ضرر خیال ہے
کہ اس صورت میں جب قدر زیادہ غذا دیا جائے گی اُس قدر پیٹ پہو لکہ تکلیف زیادہ
ہوگی علیٰ ہذا القیاس پانی بھی زیادہ نہ بلانا چاہئے۔ پس ایسا کریں کہ غذائیں اقل المقدار
اور کثیر المنفعت دین جیسے انڈے۔ شوربہ وغیرہ توڑا توڑا اور عرصہ عرصہ بعد ملاوٹ
پانی کی جگہ برف کے ٹکڑے دین اور پانی اس قدر دین جس سے صرف وہن تر ہو جاوے
تھے کی اگر شدت ہو تو غذا بذریعہ پکپکری کے پہنچا دیں۔ دوسرے مطلب کے حاصل کرنے
کے لئے یعنی رفع تکلیف کے واسطے جو درد کے سبب ہوتی ہے ایک کام کریں کہ درد
اگر خفیف ہو تو بلا۔ دوسرا اور مہین کا استعمال کریں مثلاً چوتھائی گرین اسٹراکٹ اف

ہلا۔ ڈو۔ نا اور گریں اکثر لکٹ اف ہن۔ ہن کے تین تین یا چار چار یا چھ چھ گنٹہ
 بعد بوجہ شدت مرض کے گولی بنا کر کھلاوین۔ لیکن درد کی شدت جب زیادہ
 ہوتی ہے تب بجز افین کے کسی اور دوا سے نفع درد اور تشنج رفع ہو سکتا ہے اور نہ
 بیمار کی روح تحلیل ہونے سے باز رہ سکتی ہے۔ پس ایک یا دو ٹیڑھ گریں یا دو دو گریں کی
 مقدار میں افین چار چار یا چھ چھ گنٹہ بعد دینی چاہئے ہنن تو جلد کے اندر مار۔ نیا
 اڑو۔ پیاکہ پچکاری کریں اور شکم پر ہلا۔ ڈو۔ نا اور افین اور مقبہ کالیپ کر کے پو۔ لٹس
 باندھیں یا ٹیکسڈ کریں اور پانی یا ہوا کی پچکاری کریں چنانچہ بیمار کو اس ترکیب سے چت
 لگاوین جس سے پل۔ دس تو ادینا اور باقی کا دھڑنچا رہے۔ اب اسٹمک۔ پنپ کی
 لمبی لمبی کریم کے اندر جہاں تک بازو رکھئے جاسکے داخل کر کے پچکاری کے وسیلہ
 شیر گرم پانی چھڑاتے جاوین جب تک رووہ بہر جاوے۔ جب پچکاری کو لمبی سے علیحدہ
 کر دیا جاوے تاکہ پانی بہ جاوے تب اپنے ماتھوں سے شکم کو پیچھے سے اوڑھ دیا۔ نوم
 کی طرف دانا چاہئے تاکہ رووہ کے پیچ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاوین اس ترکیب
 کو ایک یا کئی دفعہ آزمانا چاہئے اور اس ترکیب کے کرنے میں کلورا۔ فارم منگہا
 کی بھی بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے۔ بچوں کے ان۔ ٹا۔ سا۔ سپ۔ شن میں رووہ
 کے اندر دھونکنی سے ہو اور دینے سے بعض دفعہ فائدہ ہوتا ہے لیکن اس عمل کے
 کرنے کے وقت ۱۔ مو۔ نیا اور برانڈی پاس رکھنی چاہئے کیونکہ رووہ کے اندر ہوا
 داخل کرنے سے غشی طاری ہونے کا احتمال ہے۔

جب علاوہ ان۔ ٹا۔ سا۔ سپ۔ شن کے کسی اور طور سے رووہ میں روک
 پڑ جاتا ہے تب اس پچکاری سے اکثر فائدہ ہو جاتا ہے چنانچہ ۳۔ آولس
 سلفورک ایتر ۱۲۔ آولس فیل وائٹ مین ملا کر اسٹمک۔ پنپ کی لمبی لمبی جہاں تک
 ممکن ہو خوب اندر داخل کر کے پچکاری کر دیں۔ اس سے کھنگر پاخانہ آجاتا ہے اور

روک ٹھٹھا جاتا ہے ۔

ٹے۔ بس۔ مے۔ سن۔ ٹے۔ ریکا

ماہیت تشریحی - یہ بیماری خاصکے پکون ہی کہہ سکتی ہے۔ اس بیماری میں مے۔ سن۔ ٹے۔ رک۔ عذو دون میں ماوہ ٹیو۔ بر۔ کل کا جمع ہو جاتا ہے جس سے انکی ساخت بگڑ جاتی ہے اور عذو دون کی ساخت کے بگڑ جانے سے غذا کی اصل لینے کا میل ادن لکٹ۔ ٹے۔ ال۔ ما۔ سا۔ رلقہ (رگوں سے گزر نہین سکتی ہے) میں ٹیکر عذو دون سے ہوتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں اس واسطے بیمار کی پرورش جیسے طور پر نہین ہو سکتی ۔ ٹیو۔ بر۔ کل کا ماوہ جمع ہو جانے سے عذو دون کو رکیو تر مانع کے چوٹے اندوز کے برابر ہو جاتے ہیں ۔

علامت - شکم میں تھوڑا بہت درد ہوتا رہتا ہے۔ بلین بچہ کی سرخ مٹی ہین سمنہ کی باچون میں چھوٹے چھوٹے زخم پیدا ہو جاتے ہیں یا بلین ٹھٹھا ہی جاتی ہیں ۔ کبھی تو قبض مگر اکثر نہایت بدبودار دست آتے رہتے ہیں شکم بچہ کا پہلا ہوا اور سخت ہوتا ہے اور لکٹ۔ ٹے۔ ال۔ رگوں کے رک جانے کے سبب جسم کی پرورش جیسے طور پر نہین ہو سکتی اس واسطے مریض لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ جسم پیدا ہو جاتا ہے اور کم طاقتی رت زبرد زیادہ ہوتی جاتی ہے ۔ اس اثنا میں یا تو سل کی بیماری ہو جاتی ہے یا دماغ مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے یا خود اسی بیماری کے سبب مریض گف ہو جاسکتا ہے ۔ اور جو عین ابتدا سے علاج کیا جاوے تو شفا ہی ممکن ہے ۔

تشخیص - اس بیماری کی آسان نہین ہے لیکن بچہ کا مزاج اسکا۔ فیو۔ لس ہو (دیکھو پیچھے) شکم بڑھا ہوا ہو۔ لاغری اور طحال بڑھ گئی ہو۔ شکم کو ٹپانے سے مے۔ سن۔ ٹیکر عذو دون کو بڑھ ہے ہوئے محسوس ہوں اور شکم میں ایسا درد ہو کہ گویا سویا جیتی

میں تو اس بیماری کا شک پڑ سکتا ہے *

علاج - علاج اس بیماری کا مقویات اور محکمات سے کرنا چاہئے چنانچہ کونڈا مقوی ترین جیسے دودھ - شوربہ - انڈے وغیرہ اور دوا کے طور پر کاڈیلیور - آئیل ہمراہ آئیوڈائیڈ اف پو - ٹا - سیم سرپ اف آرہوڈائیڈ اف ایرن کے مفید ہے مناسب ہو تو کوئی ہلکا مرکب فولاد کا استعمال کریں جیسے سائٹریٹ اف ایرن انڈ - کوئین یا ایمونیا دستون کے روکنے کے واسطے ہلکے قابضات کا استعمال کریں جیسے کمپاؤنڈ جاک پاؤڈر ہمراہ سوڈا اور بہتہ کے اور لے - کوئیڈ اکثر کرکٹ اف کسکے - را - ریگٹ - را - ڈا بمقدار ۱۰ یا ۱۵ قطرے کے مفید ہے - شکم پر ایفون یا کسی اور لینی - منٹ کی ماش کریں یا سٹیگمین ہینن تو پولٹس باندھیں زیادہ سردی یا دھوکہ اور بارش سے بچا دیں - ہوا در مکان میں رکھیں یا تبدیل آب دہوا کر اوین *

۱۰ - لکسینی قولنج

علامات - شکم میں خاص کر ناف کے گرد ٹھہر ٹھہر کر شدت کا درد ہوتا ہے جبکو دبانے سے آرام آجاتا ہے - قبض ہوتا اور اکثر تھے بھی ہوا کرتی ہے مگر نتو اس میں بخار ہوتا ہے نہ نبض تیز ہو جاتی ہے اور نہ مثل ان - لے - ٹ - رائی - ٹس کے بیمار اس میں ہمت اور منفک ہو جاتا ہے قولنج کا درد اکثر بد ہضمی کے سبب ہو جاتا ہے خاص کر جب شکم میں نفخ بھی ہوتا ہے اس صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ جب تک ڈکارتے ہینن ہو لیتی ہے یا شکم سے ہوا خارج ہینن ہو لیتی ہے تب تک شدت کا درد ٹھہر ٹھہر کر ہوتا رہتا ہے اور بعض دفعہ بعض تشنج کے سبب بھی قولنج ہو جاتا ہے جیسے خوف یا سردی یا ہٹے - ریایا گاؤٹ وغیرہ مرض میں ہو جاتا ہے اس صورت میں ادویات ذیل تشنج سے فائدہ ہوتا ہے جیسے ایتھر کلو - را - فارم بلا - ڈونا اور اسیٹون اور جیم میں معدنی

زہرون کے اثر کے جمع ہو جانے سے ہی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے جیسے تانبہ سیسہ

وغیرہ ۔

تشخیص۔ اسپین اور ان۔ ٹے۔ رائی۔ ٹس کی بیماری میں جو فرق ہے اسکا ذکر
 پہلے ہو گیا ہے اب درگروہ (لفٹ۔ رال۔ جیا) اور قولنج میں فرق بتلایا جاتا ہے
 کیونکہ ان دونوں قسم کے درون میں ہنہایت مشابہت ہے چنانچہ جیسے اسپین ایسے
 درگروہ میں بھی ٹھہر کر شدت کا درد ہوتا ہے ان دونوں بیماریوں میں قے بھی ہوا کرتی
 ہے اور ان دونوں میں متوجہ بخار اور نہ نبض تیز ہوتی ہے + مگر فرق یہ ہے کہ گروہ کا درد گروہ
 کے مقام سے اٹھتا ہے۔ قولنج کا درد قولون (ردوہ) کے کسی حصہ میں ہوا کرتا ہے۔ گروہ
 کے درد کی پیشانی۔ ری۔ (مرمرجری پیشاب) سے لیکر خضیبون اور انون تک پہنچا جاتی ہے
 قولنج کے درد میں یہ بات ہنہین ہوتی۔ جس کیلئے گروہ میں درد ہوتا ہے نکات اس کے
 پیشاب میں ریت بھی آتی ہے۔ علاوہ ازیں درگروہ میں پیشاب تھوڑا تھوڑا اور
 ساتھ جلن کے آتا ہے قولنج میں ایسا بہت ہی شاذ ہوتا + ان دونوں مرضوں کی تشخیص
 میں غلطی بھی ہو جاوے تاہم کچھ اندیشہ نہیں کیونکہ ان دونوں کا علاج یکساں مسہلات
 حقنہ جات اور مخدرات سے کیا کرتے ہیں۔

علاج۔ روہ میں کہیں روک نہو (اٹش۔ ٹرک۔ رشن) اور قے بھی آتی ہو تو
 کسٹریل کا جلاب دین۔ ورنہ کسٹریل اور روغن تارپین کا حقنہ کریں۔ پیٹ کو سکین۔ پیرہی
 وروغن نہ ہو تو افیون اور یا تہر کا اس مال کریں چنانچہ۔

نسخہ۔ لاؤنم۔ ۳ بوند۔ سلفیورک۔ ایتھر۔ ۴ بوند۔ عرق پودینہ ڈیڑھ اونس۔ سب کی ایک
 خوراک کر کے بیمار کو پلا دیں۔ اور یہ نسخہ بھی مفید ہے۔

نسخہ۔ اکٹر اکٹاف بلا۔ ڈونڈا۔ ایک گرین کا چوتھا یا تیسرا حصہ + افیون۔ ایک گرین جابک
 گولی بنا کر چار چار گنٹھ بعد کھلا دیں +

بعض دفعہ پیٹ پر برف کی ٹوٹلی کہہ دیتے سے درد رفع ہو جاتا ہے۔ ساتھ قولنج کے
 نفع زیادہ ہو تو عقد کی نلی کو جہان تک آسانی سے رائل ہو سکے۔ کچم کے خوب
 اوپر گرانا چاہئے۔ اس سے ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ سی کوئی سے علیحدہ کر لیتے
 ہیں تب بہت سی ہوا شکم سے خارج ہوتی ہے اور درد کو فوراً افاقہ ہو جاتا ہے۔

کا۔ پر کالاکا۔

یعنی

درد قولنج تانبے کے سبب سے

دفعہ شکم میں شدت کا درد اچھ کھڑا ہوتا ہے جسکو دبانے سے شدت ہوتی ہے۔
 درد خم معدہ یا ناف کے قریب قدر اوپر نہایت شدت کا معلوم ہوتا ہے اور اکثر اسکی
 نوبت تھوڑے عرصہ تک رہ کر گزر جاتی ہے اگرچہ ایک دو دن تک بھی رہ سکتی
 ہے۔ پانچاندہ اس میں اکثر معمولی طور پر آیا کرتا ہے مگر بعض دفعہ جی متلاتا اور تھے بھی ہوتی
 ہے۔ رنگ پیلا پڑ جاتا اور چہرہ فکر مند۔ آنکھیں بند ہوتی ہیں اور بے نیلی ہو جاتی ہیں
 اور سوڑوں کے کناروں پر ایک اودھی نکھر پیدا ہو جاتی ہے۔ لالہ لگ رہو اکی تالیوں
 کے تشنچ کے سبب م لینے میں تکلیف ہوتی ہے وجہ اسکی بھی معلوم ہوتی ہے
 کہ میں کے ذرا ہوا کے ساتھ سونگھنے میں آتے ہیں۔ ٹھٹھیرے اور وہ لوگ جو تانبہ
 ڈالتے ہیں اس مرض مبتلا ہوتے ہیں۔ علاج۔ اسے مہل ہے۔ جبکہ دین۔ شکم تھک کر
 اور تھراؤ دینا استعمال کریں۔

ل۔ کالاک

لاٹن میں اس بیماری کو کالیکا۔ پک۔ ٹو۔ نم کہتے ہیں۔
 علامات اسکی مثل عام قسم قولنج کی علامتوں کے ہیں مگر اسکا درد اکثر

آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں میں بھی درد اور کمزوری محسوس ہوتی ہے
 ہاتھ یا کلاسی مفلوج ہو جاتی ہے اور شکم اکثر کھچا ہوا ہوتا ہے اور بیماری کے مسوڑوں
 پر نیلی بیکر پیدا ہو جاتی ہے ۛ

اسباب - یہ مرض رنگ بازوں کو سیسہ کے ذرات جسم کے اندر مہریت کر جانے
 سے اکثر پیدا ہوتا ہے - اور حال میں رنگ کئے ہوئے مکان میں سونا سیسہ کی طرحی
 کا پانی پینا سبب اس بیماری کے ہیں ۛ

علاج - مسہلات سے قبض رفع کریں چنانچہ تین گرین ریزن ان جلیف
 کہلا کر اس نسخہ کا استعمال کریں -

نسخہ - سلفٹ ان گنے - شیا ڈیڑھ آونس - کارب بوٹ ان گنے - شیا ڈرام
 پے - پرمینٹ ڈیڑھ آونس - سکوٹاکر چٹا حصہ ہر روز صبح کی وقت پلاوین ۛ بھیکو
 آب گرم میں بٹھاوین اور آب شیر گرم کا حقنہ کریں - درد کے رفع کرنے کے واسطے
 افیون اور بلا - ڈونکا استعمال کریں - غذا ہلکی اور تیلی دین اور سلفٹ ان گنے شیا
 کہلا کر کئی روز تک دستیوں کو جاری رکھیں ۛ جب نوبت بیماری کی رفع ہو جائے
 اور حاجت کہلا کر آجایا کرے تب آئیو ڈائیڈ ان پوٹاسیم کا استعمال کریں ۛ

مقالہ پنجم
پر دہ پے - ری - ٹو - نیم کی بیماریاں

پے - ری - ٹو - نامی ٹش
 یہ بیماری دوستم کی ہوتی ہے ایک الیوٹ دوسری کرائمک

اول کیوٹ پے۔ ری۔ ٹو۔ ٹائی ٹس

ماہیت۔ انفلمیشن کے ہونے سے پردہ پے۔ ری۔ ٹو۔ ٹی۔ ام کی رگیں خون سے پڑھو جاتی ہیں اور وہ پردہ نکل ہو جاتا ہے اور جب بجا اسپرٹس رنگ کے دیتے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ پردہ کی جلا جاتی رہتی ہے اور وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ لف پہلے روون کے پیچون میں پیدا ہو کر انکو جوڑ دیتا ہے۔ اب انفلمیشن رفع ہو گیا تو بہتر درجہ سیرم پیدا ہونے لگتا ہے۔ مقدار سیرم کی استحد زیادہ ہو سکتی ہے کہ سارا پیٹ پانی سے بھر جا سکتا ہے یا کثرت سے لف پیدا ہو کر پردہ پے۔ ری۔ ٹو۔ ٹی۔ ام کے پیڈیٹوں کو جوڑ دے سکتا ہے۔ انفلمیشن بضعہ فوہ سارے شکم میں اور کبھی تھوڑی ہی جگہ پر پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً وہ حصہ پے۔ ری۔ ٹو۔ ٹی۔ ام کا جو معدہ اور او۔ مین۔ ٹم اور مے۔ سن۔ ٹے۔ ری اور مشانہ پر ہوتا ہے بہ نسبت اسی حصہ کے جو جگر طحال اور چھوٹے روون پر ہوتا ہے انفلمیشن کی بیماری میں کم مبتلا ہوتا ہے۔

علامات پہلے در و شروع ہوتا ہے چنانچہ ابتدائیں پردہ کے کسی کسی حصہ میں در و ہوتا ہے مگر جلد سارے شکم میں بھا جاتا ہے دبانے سے در و کو زیادتی ہوتی ہے اور ساتھ اس کے شدت کا بخار ہوتا ہے۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بیمار کو پہلے سردی معلوم ہوتی ہے اور لہزہ چڑھ کر در و شروع ہو جاتا ہے مگر بضعہ فوہ شکم کے کئی حصہ میں خاص کر مٹھی۔ پو۔ گیشن۔ ٹرک) مقام زیر ناف یا دہنی یا بائیں امی۔ لا۔ اک۔ ری۔ جن کو لہہ کا مقام) میں وقتاً شدید در و شروع ہو جاتا ہے اور بیمار نہایت نڈال ہو جاتا ہے یہ در و ایسی شدت کا ہوتا ہے کہ شکم کے عضلات کی حرکت سے بھی ڈرہ جاتا ہے مثلاً بول و براز کا خارج ہونا یا گہری سانس لینا مشکل

ہو جاتی ہے بلکہ کپڑوں کی ہی برداشت نہیں ہوتی۔ پس ہاتھ پاؤں سیکڑے ہوئے
 مریض چپ چاپ چت پڑا رہتا ہے۔ شکم کھچا ہوا اور گرم اور پھولا ہوا ہوتا ہے اور دم
 لیتے وقت درد کے سبب مریض شکم کے عضلوں کو حرکت نہیں دے سکتا۔ پانخانہ
 قبض ہوتا ہے اور اکثر نہایت شدت سے جی متکاتا اور تھوٹے ہوئے لگتی ہے جسم نہایت
 گرم اور پہلے پہل خشک ہوتا ہے تب تھوڑے ہی عرصہ بعد فاقہ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے
 ہیں۔ نبض سریع اور کمزور ہو جاتی ہے اور مریض جلد جلد دم لیتا ہے۔ ہچکیاں آنی پڑتی
 اور زبان پر موٹا فرج جاتا ہے۔ اب رودون میں ہوا بہہ جاتی ہے اور بیمار کو دم لینے
 میں کمال تکلیف ہوتی ہے۔ چہرہ بیمار کا نہایت تکلیف زدہ اور فکرمند ہو جاتا ہے
 اور حالت روحی شروع ہو جاتی ہے۔ اب پیٹ پھول جاتا۔ نبض نہایت سریع اور کمزور
 ہو جاتی ہے لیکن۔ اس سے بھی زیادہ۔ چہرہ پر زردہ پن چھا جاتا ہے۔ دم آہستہ آہستہ لیا
 جاتا ہے۔ ہچکیاں آنے لگتی ہیں۔ سارا بدن سرور پسینہ سے معرق ہو جاتا ہے اور مرض
 کے آٹھویں یا دسویں دن مریض سافراہ عدم کا ہو جاتا ہے۔

اسباب۔ بیماریاں خود کم پیدا ہوتی ہیں بلکہ قریب و زخم معدہ یا رودہ کے چھوٹنے
 متانہ کے شق ہو جانے۔ جگر کے ڈنبل کے پھوٹ جانے۔ ہرنیک کے سبب رودہ میں پھانسی
 لگ جانے سے اکثر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جگر طحال اور معدہ اور رودہ کا انفلامیشن
 ہے۔ رمی۔ ٹو۔ نی۔ ام میں سرایت کر جا سکتا ہے اور اور دے۔ ریزہ (حقیقۃ الرحم) اور
 یوٹ۔ رش کی بیماری میں ہی یہ مرض ہو جا یا کرتا ہے۔ عورت کو جب سوزاک
 ہو جاتا ہے تو اسکا انفلامیشن بذریعہ فے۔ لو۔ پے۔ ان۔ ٹیوب (قاوف نامی) کے بروہ
 پے۔ رمی۔ ٹو۔ نیم میں سرایت کر جا سکتا ہے۔ علاوہ ان سببوں کے یہ بیماری مدعی
 اور رطوبت کے باعث بھی پیدا ہو سکتی ہے اور خون میں جب کوئی زہر سرایت کر جاتا
 ہے تب بھی ہو جا سکتی ہے۔

صورت حال تشریحی بعد وفات - بعد موت کے شکم کو چاک کر کے دیکھنے سے پے - رمی - ٹو - نی - ام کی تریلی مین پانی اور جابجا بلف کے ٹھکڑے پائے جاتے ہیں اور وہ پردہ مکرار و موٹا نظر آتا ہے - رودے آپسہ اور او مین - ٹم اور مے - منطری کے ساتھ جڑ جاتے ہیں *

سلاج - بیمار کو حرکت کرنے نہ دین - شکم پر جو کین لگا دیں اور پوست کی تلمیہ کمرین برداشت ہو تو چوکر کی پولس باندھیں اور کہانے کو دو گرین کیا - لو - تل اور ایک گرین فیوز تین تین یا چار چار گنڈے بعد دین - جلاب دینا کسی حالت میں نہ چاہئے مگر جب مرض کو کسی قدر تخفیف ہو نیچے کے بڑے رودوں میں سسٹون کا ہونا بھی ثابت ہو جائے تب گرم پانی اور کسٹریل کا حقنہ کر سکتے ہیں - شکم میں ہوا بہت ہو تو نہایت باریک ٹرڈ - کار سے رودہ کو چسید کر ہوا نکال دیں تاکہ کچھ عرصہ کے لئے سختیف ہو جائے اس عمل کے کرنے میں اندیشہ نہیں ہے * جب روعی سلامتین شروع ہو جاویں تب فوراً مفرحات کا استعمال شروع کر دیں جیسے برانڈی ایوسینا اور ایتھر *
عند امتقویٰ بن جیسے آب نیجی اندھے وغیرہ *

دوم کرانک پے - رمی - ٹو - نامی - لٹس

بعض دفعہ یہ مرض کیوٹ پے - رمی - ٹو - نامی - لٹس کا نتیجہ ہوتا ہے مگر اکثر اوقات اونچو ذہنی پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی تو تھوڑے ہی حصہ پے - رمی - ٹو - نی - ام میں محدود رہتا ہے اور کبھی سارے پردہ میں پھیل جاتا ہے *

علامات - اس مرض کی علامتین اچھے طور پر نمایاں نہیں ہوتیں کیونکہ درد ایسین اکثر کم ہوتا ہے لیکن قولنج کی سی درد کی نوبتیں اکثر ہو جاتا کرتی ہیں بعض دفعہ ایسین بخار ہو جاتا اور بدبو دار دست بھی آتے ہیں * علاج - تھوڑے عرصہ تک

مخفیہ رہ کر شکم پر درد کرنے لگتا ہے اور اب اسہال شروع ہو جاتا ہے اور
 جی بھی متانے لگتا ہے بہوک جاتی رہتی ہے اور پیلاہلاخ اور کمر ہونے لگتا ہے
 کچھ عرصہ بعد پردہ پے۔ ری۔ ٹو۔ نی۔ ام کے جوف میں پانی پیدا ہونے لگتا ہے
 جس سبب سے شکم بڑھنے لگتا ہے +

چھوٹے بچے جنکا مزاج اسکا۔ فیو۔ لس ہوتا ہے اکثر پیو۔ بر۔ کیو۔ لر پے ری۔ ٹو۔ ٹائٹس
 کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعد موت کے ایسے بچوں کے شکم کے امتحان سے
 پے۔ ری۔ ٹو۔ نی۔ ام میں کثرت سے ٹیمو۔ بر۔ کل کے چوٹے چوٹے دانے پائے
 جاتے ہیں اور رودن کے بچوں میں اس کثرت سے لطف پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ
 آپس میں جڑ جاتے ہیں اور جگر اور طحال پر ایسی لطف کا موٹا سا پردہ بن جاتا ہے۔ اس
 مرض میں بھی ہی مسامیتین پیدا ہوتی ہیں جنکا ذکر اوپر کرنا کہنے پے۔ ری۔ ٹو۔ ٹائٹس
 میں کیا گیا ہے +

علاج - شکم کے مقام پر پلٹر یا ٹیکچرافٹ آئیوڈین کی مالش کریں اور بطور
 دوا کے مرکبات آئیوڈین کا استعمال کریں جیسے آئیوڈائیڈ آف ایزین
 آئیوڈائیڈ آف پو۔ ٹا۔ ہیم یا ناس۔ فٹ آف ایزین اور کاڈ۔ لیور۔ آئیڈل +

اس۔ سائے۔ ٹس

یعنی

شکم میں پانی پیدا ہو جانا

تقریب۔ پے۔ ری۔ ٹو۔ نی۔ ام کے جوف میں پانی پیدا ہو جاتا ہے جس سبب
 شکم بڑھ کر تن جاتا ہے +

اسباب - کرائیک پے - رسی - ٹو - نائی - ٹس کے سبب شکم میں پانی بھر سکتا ہے - عملادہ اوزین جگر کی بیماری کے سبب جیسے سی - رو - سس اور گنسر وغیرہ - پیر - ٹل - وین کا منفذ بند ہو جانے سے + گردن کی بیماری کے سبب جیسے کیوٹ اور کرائیک برائیش ڈیزیز شش اور قلب کی بیماریوں کے سبب + طحال کے مرض کے سبب بھی اس - سائی - ٹس پیدا ہو سکتا ہے لیکن خاص جگر کی سی - رو سس اور گردن کی بیماریوں کے سبب شکم میں اکثر پانی پیدا ہو جاتا ہے +

ماہیت - اس بیماری کی یعنی شکم میں پانی کیونکہ پیدا ہوتا ہے پیچھے بیان ہو چکی ہے (دیکھو بیان ڈراپ - سی) +

علا مات - بیمار کو دیکھتے ہی یہ مرض پہچانا جاسکتا ہے کیونکہ اوپر کا دھڑکا وغیرہ جاتا ہے - چہرہ مکرر مندا اور شکم بڑھ جاتا ہے - ملاحظہ کرنے سے شکم صرف بڑھا ہوا ہی نظر نہیں آتا بلکہ چھلکا اور اسکی جلد کی وریدیں اکثر ہیکر نمایاں ہو جاتی ہیں + تھیکے لگانے سے پانی کی لہریں ہاتھوں کو محسوس ہو سکتی ہیں - جون جون پانی زیادہ پیدا ہوتا جاتا ہے بیمار کو دم لینے میں تکلیف ہوتی جاتی ہے کیونکہ جگر طحال اور معدہ اور کوڑھٹہ جاتا ہے سینہ پر کان لگا کر سننے سے منہ کی حرکتوں کی آواز میں سینہ کے ہتھک نیچے تک نہیں سنائی دیتیں جبکہ صحت کی حالت میں مسموع ہوتی ہیں اور پشت کی جانب دونوں استخوان کف کے مابین خاص کر اس مقام کے بائیں طرف ٹیو - ہو - لر - بری - وٹاکٹ سنائی دیتی ہے - دل کی نوک اپنی جگہ سے کچھ اوپر ہلکے پائین جانب کو ہو جاتی ہے + اور اس - سائی - ٹس کے ہمراہ اما - سار - کا بھی ہو جاتا ہے - اکثر تو دونوں ٹانگیں مگر چہرہ اور دونوں ہاتھ ہی خاص کر جب یہ مرض گردن کے سبب پیدا ہوتا ہے سوجھ جاتے ہیں سوجھنے کے مقام کو دبانے سے انگلیوں کے داغ پڑ جاتے ہیں پیشاب اکثر کم اور اُس میں کثرت سے لے - ہٹسٹ کے قسم کے مرکبات ہوتے ہیں -

لیکن جب ایش - سامی - شس جگر کے سی - رو - سس کی بیماری کے سبب سے
 پیدا ہوتا ہے تب پیشاب میں اکثر صفرا پایا جاتا ہے اور جب گردن کے مرض
 میں ہو جاتا ہے تب پیشاب میں البیو - من ہوتا ہے + رفتہ رفتہ بیمار لاغر
 اور کمزور ہوتا جاتا ہے - بہوک جاتی رہتی ہے - راتیں بے چینی میں اور دن فکر
 و تردد میں گزرتا ہے +

تشخیص - جب شکم میں پانی کی مقدار اوسط ہوتی ہے تب بڑھا ہوا نظر آتا ہے
 بیمار کھڑا ہو تو ناف کے نیچے کا مقام خوب اونچا نظر آوے گا جب لیٹا ہوتا ہے
 تب شکم دہنی اور بائیں جانب سے سمیٹ کر نکلا ہوا نظر آتا ہے + جب بیمار
 دہنی یا بائیں کروٹ پر ہوتا ہے تب وہ جانب زیادہ اونچی نظر آتی ہے جس
 کروٹ پر لیٹا ہو + لیکن پانی کی مقدار خوب زیادہ ہوتی ہے تب بیمار کے
 اوہر اوہر ہونے سے شکم کی بالیدگی میں فرق نہیں پڑتا یعنی بیٹ چاروں طرف
 سے برابر اونچا ہوتا ہے + بلکہ اونچائی شکم کی سینہ کی طرف اس قدر ہو جاتی ہے
 کہ کوڑھی کی کتری کی نوک یا سر کی طرف اُبھرتی ہے + تہیکی لگانے سے ٹاہنوں
 کو پانی کی لہر میں محسوس ہوتی ہیں +

ٹھونخنے سے شکم کے اوپر آواز صاف پیدا ہوگی کیونکہ رووے پانی کے اوپر
 تیرتے ہیں + لیکن جب پانی اس قدر زیادہ پیدا ہوتا ہے کہ رووے - سن - ٹری
 کے سبب کچھ رہتے ہیں اور پانی اُنہر چڑھ جاتا ہے تب شکم کے چاروں طرف
 سے ٹھوس آواز پیدا ہوتی ہے ایسے اور او - وحی - وحی - واٹ - ڈراپ - سی
 میں جو فرق ہے اُس وقت بتلایا جاوے گا کہ جب او - دی - ری کی بیماریوں کا
 ذکر ہوگا +

انجام جب کسی مضمونہ رونی کی ساخت کی بیماری کے سبب سے پٹ پن پانی

پیدا ہو جاتا ہے تب انجام ہمیشہ بُرا ہوتا ہے لیکن جب صرف سرس کے
سبب گردن میں اجتماع خون کا ہو جاتا ہے اور اس سبب شکم میں پانی پیدا
ہوتا ہے یا دل کی خرابی یا خون کے رقیق ہو جانے سے اس - سائے شش کا مرض
ہو جاتا ہے تب چندان اندیشہ کی بات نہیں ہے لیکن دل جزا اور گردن کی خست

کے مرض میں شکم کے اندر پانی بہر جاتا ہے تب ہمیشہ انجام بد نکلتا ہے *

علاج اس بیماری کے علاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح پانی جذب ہو سکے

چنانچہ یہ بات تیز سہلات مددات اور سیما کے استعمال سے حاصل ہو سکتی ہے

چنانچہ دوسرے تیسرے ڈیزہ ڈرام کپاؤنڈ پاؤڈر اف جلیپ ہیرا ایک یا دو

قطرہ کروٹن - آئسل کے پلاوین یا اسی - لا - ٹی - ری - ام کے ساتھ استعمال

کریں - نسخہ - اسی - لا - ٹی - ری - ام ۳ گریں - سفوف مسخ مریج و گریں *

کیا - لو - مل ۲ گریں - ایکٹرکٹ اف ٹائیو - سیس ۱۰ گریں - شب کو ملا کر بارہ

گولیوں میں تقسیم کریں *

خوراک - دو گولیاں اور نئے فار - ما - کو - بیا کامرب کپاؤنڈ پاؤڈر اف ایلاٹیز

کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس مرض کے لئے بہت عمدہ مددات یہ ہیں کہ

اسے - ٹیٹ اف پو - ٹاش - ڈی - جی - ٹی - لیش + اسکویٹل اور جو س اف بروم

ٹا - یس چنانچہ

نسخہ اول اسے - ٹیٹ اف پوٹاش ۴ ڈرام - سرپ اف اسکویٹل ۶ ڈرام +

ٹائیٹرک - ایٹر ۳ ڈرام - ٹینکچراف ڈی - جے - ٹی - ریش ۳۰ بوند سے ایک ڈرام

تک - جو س اف یروم - ٹا - ٹین ۶ ڈرام - پانی ۸ آؤنس + بکوکا کر اس عرق

کا چٹا حصہ چہ چہ یا آٹھ آٹھ گھنٹہ بعد پلاوین + قلب اور جگر پالے - ری - ٹو - لی - ام

کی دراب - سی - یں یہ نسخہ نہایت فائدہ کرتا ہے *

لشخہ دوم سفوف اسکوئیل ۶ گرین ۶ سفوف برگ ۶ ڈی۔ جی۔ ۶ لے۔ ۶ ریش ۸ یا
۸ اگرین ۶ بیو۔ پیل ۳۰ گرین ۶ سبکو ملا کر بارہ گولیوں میں تقسیم کریں اور اسکی ایک گولی
صبح اور ایک شام کھا دیں ۶

لشخہ سوم۔ جگر اور دل کی ڈراپ۔ سی مین یہ تیسرے نسخہ نہایت مفید ہے لاسیکو اور ڈیو
ایک ڈرام ۶ نائیٹ۔ ریش۔ ایتر ۶ ڈرام ۶ ٹنکچر آف سیفرن ۳ ڈرام ۶
انفیوژن آف ڈی۔ جی۔ لے۔ ۶ لیش ۴ ڈرام ۶ سرپ ۶ ڈرام ۶ پانی ۸ آونس ۶
سبکو ملا کر اس عرق کا چٹا حصہ دسین تین دفعہ پلا دیں ۶ چوتھا نسخہ بھی خوب بدر ہے
لشخہ چہارم۔ کو۔ پی۔ ۶ وایرن ۴۰ گرین ۶ ریکٹی۔ ٹائیڈ اسپرٹ ۲ ڈرام ۶
اسپرٹ آف سکورا۔ فارم ایک ڈرام ۶ بیو۔ سلج اف اکاشیا ایک آونس
پانی ۶ آونس ۶ سبکو ملا کر اس عرق کا چٹا حصہ دسین ۳ دفعہ پلا دیں ۶ اور جب
جگر اور طحال کے سبب ڈراپ۔ سی ہو جاتی ہے تب یہ نسخہ مدد اور مقوی مفید پڑتا ہے
لشخہ ہمار۔ ٹریٹ اف ایرن ۶ اگرین ۶ اسٹار۔ ٹریٹ اف پوٹاش ۱۵
گرین ۶ اسے۔ ٹم۔ سلی ۵ بوند ۶ نائیٹ۔ ٹرس۔ ایتر ۳ بوند ۶ پانی ایک آونس ۶
سبکو ملا کر چار چار یا چھ چھ گھنٹہ بعد پلا دیں اور بعض دفعہ ڈی۔ جی۔ لے۔ ۶ ریش کے
پتوں کا پولٹس یا پولٹس ڈی۔ جی۔ لے۔ ۶ ریش کے پتوں کے انفیوژن سے بنا ہوا
جب شکم پر لگایا جاتا ہے تو خوب کھلکھلایا جاتا ہے ۶

یاد رہے کہ جب ڈراپ۔ سی گردہ کی بیماری کے باعث پیدا ہوتی ہے تب اسکوئیل
سے بڑا نقصان ہوتا ہے اور خاص کر پارے کے مرکبات تو اسکو نہایت مضر پڑتے
ہیں اسصورت میں مقویات اور مفرحات کی کام میں لانا چاہئے جیسے گرم پانی یا گرم
پانی کا ہبہارا ۶ بعض دفعہ اساسی۔ ریش کی بیماری میں باؤن اور ٹانگیں سوج کر رہتا
ہیں اسصورت میں ان مقاموں پر بچھنے لگا دیں تاکہ پانی رستار ہے اور

فوطہ اگر پھل جاوے تب بھی اس عمل کو کریں :

جب کسی ترکیب سے مرض رُفَع نہیں ہوتا اور بیمار کو دم لینے میں کمال تکلیف ہوتی ہے تو پیٹ پر ہید کر پانی نکال دیتے ہیں اس عمل کو اصطلاح میں پے - راسن - ٹے سٹر اب - ڈا - ٹے - فٹر کہتے ہیں یہ ترکیب اس عمل کے کرنے کی یہ ہے کہ بیمار کو کسی پر بٹھا کر اس کے شکم کو چادر سے لپیٹ دیں اور چادر کے دونوں سروں کو دو دو گارڈز کے ماتھے پکڑا دیں بعد ازاں ناف سے ایک یا دو ٹرہ انچ نیچے چادر میں سوراخ کر کے اوسط مقدار کے ٹرو - کار اور کے - نیو - لا داخل کریں جب ٹرو - کار نکال لیا جاتا ہے تب کے - نیو - لا کے سوراخ سے پانی نکلتا شروع ہوتا ہے اس وقت جن جن نکلتا جاوے وہ تو آدمیوں کو چادر کے دونوں سروں کو کھینچنا چاہئے - اور مریض کی نبض پر ماتھے رکھنا چاہئے تاکہ نبض کی حرکت معلوم ہوتی رہے یہ نبض کمزور ہو جائے تو یونیا اور روم کا استعمال کریں جب دیکھیں کہ پانی حسبِ مناسب نکل گیا ہے اور تکلیف تنفس رُفَع ہو گئی اس وقت کے - نیو - لا نکال لیں اور شکم کے سوراخ کو اسٹیکن کی بٹی سے بند کر دیں بعد ازاں شکم کو اسی چادر سے خوب لپیٹ کر باندھ دیں اس عمل سے ایسا نہ سمجھنا چاہئے کہ بیماری جاتی رہتی ہے بلکہ علامات تکلیف دہندہ جن سے بیمار کے جلد مرجانے کا خوف ہوتا ہے اس عمل کے کرنے سے وہ رُفَع ہو جاتی ہیں اور پانی تو اکثر عمل کے بعد ہی بہرید یا ہونا شروع ہوتا ہے :

او - وی - رمی - ان ٹراپ - سی

او - وی - رمی یعنی حقیقۃ الرحم دودھ دہوتے ہیں رحم کے دہنے بائیں دونوں کو کھ کے مقام پر پہنچتے ہیں اور انہی میں مادہ جنین کا ہوتا ہے جب اس غدد میں بیج پڑی ہوئی ہے تب سارا یا کوئی حصہ اسکا بد کردہ بیج کی شکل پکڑ لیتا ہے اور تجربہ سے

ثابت ہے کہ اوہ وی۔ ری کی تہلیان مادہ جنین سے بنتی ہیں دگرا۔ فی۔ ان
 سے۔ سی۔ کل (کبھی تو اوہ وی۔ ری میں صرف ایک ہی مگر اکثر کئی تہلیان ہوتی
 ہیں اور بڑھ کر بہت بڑی بڑی ہو جاتی ہیں ان میں جو رطوبت ہوتی ہے اس میں کثرت
 سے البیومن ہوتا ہے ۛ

علامات۔ اس مرض کی ابتدائی علامتیں ایسی خفیف ہوتی ہیں کہ جب تک شک
 بہت بڑھ نہیں جاتا ہے تب تک بیمار کی توجہ مرض کی طرف رجوع نہیں ہوتی ہے اور
 تب بھی درد اور تکلیف اس قدر کم ہوتی ہے کہ مریض کو گمان حمل کا ہو جاتا ہے مرض
 کا خیال بالکل نہیں ہوتا یا وہ یہ قیاس کرتی ہے کہ پیٹ ریح یا چربی کے پیدا ہونے
 سے بڑھ گیا ہے اور جب تک۔ رسولی بل۔ وس میں ہوتی ہے تب تک بول براز کی وقت
 مثلاً اور ریکٹم کے دب جانے سے تکلیف ہو سکتی ہے بوجہ ہی معلوم ہو سکتا ہے
 درد کی ٹیس جانب ماذف کی ران تک پہل جا سکتی ہے مگر ایسی علامتیں بہت ہی
 کم ظاہر ہوتی ہیں مگر اور سیکم کے مقام پر بھی بعض دفعہ درد ہوتا ہے لیکن راتوں
 کو چونکہ اس قسم کا درد اکثر ہوا کرتا ہے اس واسطے علاج کی طرف کم رجوع لاتی ہیں اس سبب
 میں حیض باقاعدہ آتا ہے مگر بعض دفعہ یا تو قلت یا کثرت سے آتا ہے اور کبھی بند
 ہی ہو جاتا ہے جس سے حمل کے گمان کو اور بھی تقویت ہوتی ہے اور مریض بے فکر
 ہو جاتی ہے۔ لیکن جب رسولی اس قدر بڑی ہو جاتی ہے کہ چھب نہیں سکتی تب
 درد ہونے لگتا ہے اور تب حیض ہی یا تو بے قاعدہ آنے لگتا ہے یا بالکل بند ہو جاتا
 ہے۔ مریض لاغر ہوتی جاتی ہے۔ قبض ہوتا ہے۔ ماضیہ بگڑ جاتا ہے۔ پیشاب تھوڑا
 تھوڑا اور بار بار آتا ہے۔ بہوک جاتی رہتی ہے۔ مریض راتوں کو بے چین ہوتی ہے
 اور روز بروز لاغر اور کمزور ہوتی جاتی ہے۔ جب کئی تہلیان پانی سے پھر ہو کر فوب
 بڑی ہو جاتی ہیں تب تہبکی لگانے سے پانی کی لہریں ہاتھوں کو صاف محسوس ہوتی ہیں

لیکن بانی جب کم ہوتا ہے تب لہریں بھی کم معلوم ہوتی ہیں۔ اور رسولی کی چاروں طرف ہونے کے آواز ٹھوس پیدا ہوتی ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس رسولی کے ساتھ اس سائی - ٹش بھی ہو جاتا ہے۔ مگر کچھ عرصہ بعد ایسا تو ضرور ہو جاتا ہے کہ ناف کے نیچے کی جگہ نام نہانی کی لمبن راین اور ٹانگیں سوج جاتی ہیں، اور اب ٹیکلیفین بھی بڑھنے لگتی ہیں یعنی رسولی کے بڑھ جانے سے مریضہ اچھی طرح جل پھر نہیں سکتی رہتی بے خوابی میں گزرتی ہیں۔ اور دم لینے میں استعد رکٹیف ہوتی ہے کہ بستر پر لیٹ نہیں سکتی + بعض دفعہ پیشاب بند ہو جاتا۔ سرور اور گھونٹنے لگتا ہے تشنگ اور بیہوشی طاری ہو جاتی ہے اور نہایت ضعف کی حالت میں مریضہ اس دار فانی سے دار

جاد فانی کو کوچ کر جاتی ہے *

تشخیص اس بیماری کی آسان نہیں ہے۔ ابتدا میں مریضہ کو اسباب کا ہم دگمان بھی نہیں ہوتا کہ اسکو کوئی مرض ہے لیکن جب رسولی بہت بڑھ جاتی ہے تب سارے پیٹ میں پھیل جاتی ہے۔ جب تھیلی ایک ہی ہوتی ہے تب شکم ہوار اور کیساں ادبھا نظر آتا ہے لیکن جب کئی تھیلیاں ہوتی ہیں تب شکم کہیں سے ادبھا کہیں سے بجا اور کہیں سے سخت اور کہیں سے پلپا محسوس ہوتا ہے + جب صرف ایک ہی تھیلی ہوتی ہے تب رطوبت کی لہریں ہاتھوں کو خوب صاف محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن رطوبت جب قدر گھٹا رہی ہوگی لہریں جی ہاتھوں کو کم محسوس ہونگی۔ اور بخیر ان صورتوں کے ہونے کی ٹھوس آواز سارے شکم سے پیدا ہوتی ہے یعنی جب کوئی ٹکڑا روده کا شکم کی دیوار اور رسولی کے باہر آ جاتا ہے یا جب رسولی ٹاپ کی گئی ہو تب ہوا پھر جا سکتی ہے + یا جب رسولی کی رطوبت بذریعہ زخم کے روده میں آ گئی ہو اور روده سے ہوا اس میں داخل ہو گئی ہو۔ عرض این صورتوں میں ہونے کی آواز صاف پیدا ہو سکتی ہے ورنہ قاعدہ یہی ہے کہ آواز ٹھوس نکلتی ہے *

علاج۔ پانی نکال کر سیٹ پر پٹی باندھ دین اور مہینوں تک کلورٹ آف پوٹاش
ہمراہ آیوڈائیڈ آف پوٹاشیسم کے کھلاوین بعض دفعہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ پانی نکال کر
آبہ ڈین کی بچکاری کرتے ہیں اور جب رسولی چھوٹی ہوتی ہے اور شکم کے کسی عضو کے
ساتھ جڑی نہیں ہوتی ہے تب شکم کو چاک کر کے نکال لیتے ہیں +

مقالہ ششم امراض جگر

مختصر تشریح جگر کی۔ جگر کی بیماریوں کے بیان کرنے سے پہلے جگر کی تشریح
اور جگر کا کام کیا ہے۔ ان باتوں کا بیان کرنا نہایت ضرور ہے۔ پس واضح ہو کہ جگر خاصہ کورنی
ٹائی۔ پلوکان۔ ڈریاک۔ ری۔ جن اور اپے۔ گس۔ ٹرک۔ ری جن میں واقع ہے اور
جسم انسان کے کل غدودوں کی نسبت جگر سب سے بڑا غدود ہے کیونکہ آٹھویں ماحت
اسکی قریب بارہ انچ کے ہوتی ہے اور سامنے کے کنارے سے لیکر پیچھے تک قریب
سات انچ کے ہوتی ہے۔ جو ان تندرست آدمی کا جگر ۱۔ وائٹمز۔ ڈو۔ پانچ وزن کے
م سے ہم پاؤنڈ تک وزن میں ہوتا ہے مگر بعض دفعہ اس وزن میں کمی بیشی بھی پائی
جاسکتی ہے۔ غذا کے ہضم کے وقت جگر کا حجم بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس وقت اس میں
خون کی زیادتی ہوتی ہے ۔

جگر میں ان قسم کی رنگین ہوتی ہیں۔ بڑے عروق جاؤ۔ (ہلم۔ فائٹک) بکثرت ہوتی ہیں
اور صفرا کی نالیان (بائیل۔ ٹوکٹ) اور پور۔ ٹل۔ دین اور ہے۔ پائٹک شریان
ہو۔ پائٹک۔ ریڈیکل شاخیں اور صفرا کی نالیوں کی شاخیں ایک دوسری سے ملکر دو شاخیں بن جاتی
ہیں۔ ایک صفرا کی نالیوں کی جگر کے دہنے گوشہ سے اور دوسری شاخ بائیں گوشہ

نکلتی ہے۔ یہ دونو شاخیں جگر کے ٹرانس - ورس - نے - شتر سے نکلا کر ایک بن جاتی ہیں جیسے ہے - پارٹیک - ڈکٹ سس - ٹیکٹ - ڈکٹ سے ملکر صفرا کے ایک واحد بھری بن جاتی ہے جسکو اصطلاح میں ڈک - ٹنس - کیسو - نٹس - کو - لی - ڈو - کٹس کہتے ہیں۔ یہ ڈکٹ اور بلبہ کی بھری (پیکریاٹ - ڈکٹ - ڈکٹ) دونو اس سوراخ میں جا کھلتی ہیں جو معاً اثنا عشرہ (ڈیوڈ - ڈینیم) کے اترتے ہوئے حصہ میں واقع ہے جو پورٹل - وین اور ہے - پارٹیک - آر - ٹری بھری و رفل ہوتی ہیں اور بھاری صفرا اور ہے - پارٹیک وریڈین جگر سے خارج ہوتی ہیں جو پورٹل وین بھری وہ خون پہنچاتا ہے جس سے صفرا بنتا ہے - اور جگر کے غلاف کے پردوں کی پردہ کی پردہ کے لئے (کی شیل) اور صفرا کی نالیوں کی دیواروں کے واسطے اور جگر کی اندر کی دیواروں کے لئے اور جگر کے دیگر حصوں کی پردہ کے واسطے ہے - پارٹیک شریان خون صاف پہنچاتی ہے جگر جس صفرا کو پورٹل وریڈ کے خون سے یا تو صاف کر دیتا ہے یا بناتا ہے اور صفرا کو بائیل - ڈکٹ جگر سے لیجاتے ہیں اور باقی کا خون ہے - پارٹیک وریڈون کے ذریعہ جسم کے اور خون کے ساتھ ان - فے - رسی - آر - سی - ٹا - کے - وایمن جاگرتا ہے جگر کا بڑا بھاری کام صفرا پیدا کرنے کا ہے اور دوسرا کام شکر پیدا کرنا ہے جو جب کہا نا زیادہ کہا یا جاتا ہے اور جب زیادہ مصالحوہ و غذا کھائی جاتی ہے اور شراب پی جاتی ہے اور گرمی کے سبب سے اور ریاضت کے کرنے سے صفرا زیادہ پیدا ہوتا ہے - غذا اٹکی کھائی جاوے شراب بالکل نہ پی جاوے اور ریاضت کرنے سے علی الصبح اٹھ کر سیر کرنے سے صفرا کم پیدا ہوتا ہے - ان اودیات کے استعمال سے صفرا کے پیدا ہونے میں تحریک ہوتی ہے جیسے مرکبات سیما اور پوٹاش فلین اور ٹے - رائگ - سی - کم اور رو - بارب یعنی ریونڈینی اور تو شادرا و کل معدنی تیزاب اور بن - زائیٹک - برٹ اور جن وداؤن کے استعمال سے صفرا کم پیدا ہوتا ہے

وہ یہ دین آئیو۔ ڈائیڈ اور برو۔ مائیڈ اف پو۔ ٹائسم اور مرکبات ایون اور غذا کے ہضم کے وقت جب بائیں کار۔ بونٹ اف سوڈاکا استعمال کیا جاتا ہے جن بیماریوں میں جگر بڑھ جاتا ہے وہ یہ ہیں مثلاً کن۔ جش۔ چن اور مائی۔ پر۔ ٹرو۔ فی اور انفڈ میشر۔ اور دہنل اور جگر کی ساخت جب چربی میں بدل جاتی ہے تب بھی دیگر بڑھ جاتا ہے۔ حالات مفصلہ ذیل میں جگر کے بڑھ جانے کا خیال دل میں پیدا ہو سکتا ہے مثلاً نپت کی ہڈی کے خم کہا جانے میں جب پیدائش سے جگر بڑھول پیدا ہوتا ہے یا کسی طرف کو بے قاعدہ واقع ہوتا ہے۔ سینہ کی بیماریوں کے سبب سے جیسے پلو۔ ری سی میں پانی بہر جانے سے اور پے۔ ری۔ کار۔ ڈیسم میں پانی بہر جانے سے اور سینہ کے اندر رسولی کے پیدا ہونے سے کیونکہ ان صورتوں میں پر وہ ڈار۔ یا۔ نزام پیچے کو دب جاتا ہے اور سینہ بھول جاتا ہے اور جگر چوٹا ہو جاتا ہے + شکم کے اعضا کی بیماریوں کی سبب سے بھی جگر بڑھتا ہو معلوم دے سکتا ہے کہ جب جگر اور دیگر اعضا سے اوپر کو چڑھ جاتے ہیں اور اس سبب سے سینہ کی مقدار گھٹ جاتی ہے +

حالات مفصلہ ذیل میں جگر کی مقدار چھوٹی ہو جاتی ہے سی۔ روئیس کی بیماری میں ادراکیوٹ اور کرانک اٹرو۔ نی میں +

۱۔ کو۔ لیا

جب کسی سبب سے صفر خارج نہیں ہونے پاتا یا پیدا نہیں ہوتا ہے تب خون میں ملکر ترہر کی علامتیں پیدا کرتا ہے چنانچہ صفر کے نہ ہر ہو جانے کے پہلے درجہ میں بیمار

کی طبیعت میں جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ شدت سے ہڈیاں اور تشنج ہونے لگتا ہے اور تب روعی مسلمانین پیدا ہو جاتی ہیں چنانچہ پہلے اونگہ اُٹتی ہے اور تب بتدریج بیہوشی طاری ہونے لگتی ہے اور ساتھ ہی ان مسلمانوں کے معدے اور دودن کے میوے کس پردہ سے خون بھی جاری ہونے لگتا ہے جسم پر خون کی چٹیان یا وہیے پیدا ہو جاتے ہیں اور اکثر یرقان بھی ہو جاتا ہے *

علاج - تیز خطاب دیکر اگر موقع ملے دیکو نکہ یہ بیماری اکثر مہلک ہو جاتی ہے (ذوالنسخہ نکال استعمال کریں چنانچہ

نسخہ - بن - زہ - راک - اسٹم سے - مگرین مک - گھاسی - سی - رین حسب ضرورت دو دو کو ملا کر ایک گولی بنا دیں اور دینین تین دنہ کھلا دیں یا *
نسخہ - نوشادر - مگرین - اکثر کٹ اف ٹے - راگ - زہی - کم - ہاگرین *
کیناؤٹھنکچر اف جن - شن ایک ڈرام - الفیوژن اف سنا - آڈنس *
سبکو ملا کر دیا تین دنہ دیکو بلا دیں *

کن جش چین آف - وی - لیور

علامات دہنی طرف پسلیوں کے نیچے بوجہ اور سختی معلوم ہوتی ہے جگر بڑھ جاتا ہے اور کنارہ اسکا پسلیوں کے نیچے محسوس ہوتا ہے - چہرہ زرد اور بعض دفعہ آنکھیں بھی زرد ہو جاتی ہیں - بہوک مر جاتی ہے - زبان میلی اور پافاف قبض رہتا ہے *

علامات تشریحی بعد وفات - لاش کے ہتھان سے جگر بڑا اور خون سے پر معلوم ہوتا ہے جب اجتماع خون کا ہے - پاٹکا - اور پورٹل - وینس میں یکساں نہیں ہو سکتا ہے تب جگر کہیں سے گہرا اور کہیں سے سرخ ہوتا ہے مگر جب

صرف پیسا۔ ملک دین دین اجتماع ہو گا ہوتا ہے تب جگر کے لابیول کے کن رو
کی رنگت ہلکی اور درمیانہ حصہ کی گہری ہوتی ہے لیکن جب صرف پورٹل۔ دین
میں خون جمع ہو جاتا ہے تب جگر کے لابیول کے کنارہ دین کی رنگت گہری اور درمیانہ
حصہ کا رنگ ہلکا ہوتا ہے ۔

اسباب۔ قلب یا شش کی بیماری اور شش میں کسی سوئی کا ہونا بگڑ جانا
بیکٹر کے فعل کا اور اس باعث کم پیدا ہونا صفرا کا۔ لے۔ ریا کا اثر پر۔ پیو۔ را
کی بیماری زیادہ کہانا اور کثرت سے شراب پینا۔ شرابیوں کے جگر بچا رہ کو دوم
لینے تک کی بھی فرصت نہیں ہوتی رات دن خون سے پڑ رہتا ہے ۔

علاج۔ بیمار کو ہم یا د گرین کیا۔ لو۔ مل کہلا کر یا آگنٹھ بعد ایک تیز ٹیکن جلا
دیوین۔ مناسب ہو تو جگر پر چوکیں لگا دیں اور فو۔ من۔ ٹے۔ شن کرین۔ غذا ہلکی
دیوین اور خمر سے احتراز کریں ۔

اشعار۔ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ سردی کے موسم میں جب بدن پر کپڑے کم ہوتے
ہیں یا کسی صبح سے سردی لگ جاتی ہے تب بعضہ نو جگر اور معدہ میں ہڑ ہڑ کر دینا
دینا اور اور جلن ہونے لگتی ہے۔ بیمار بے چین رہتا اور پست ہمت ہو جاتا ہے یوں
تو جلن برابر ہوتی رہتی ہے مگر غذا کے بعد زیادہ ہو جاتی ہے اور تب درد کو بھی
شدت ہوتی رہتی ہے لیکن عایم اور پتلی غذا کے کھانے سے اس قدر تکلیف نہیں ہوتی
ہے کہ جقد معمولی تغیل چیزوں سے ہوا کرتی ہے۔ پاخانہ قبض رہتا ہے۔ پیشاب زرد
رنگ کا آتا ہے۔ آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں اور چہرہ پر بھی زردی چھا جاتی ہے۔
اشتہا کم ہو جاتی ہے مگر بالکل مفقود نہیں ہوتی ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سردی کے
لگنے سے جگر اور معدہ میں کن۔ جش۔ چن ہو جاتا ہے ۔

علاج۔ د۔ گرین کیا۔ لو۔ مل کہلا کر کٹا لیل یا سنا اور نمک جلا دین تاکہ پانچ

سات وست خوب کھل کر آجاردین۔ بعد از ان ڈائیلوٹ۔ ٹائیڈرو۔ کلورک اسٹڈ اور چراتیکا استعمال کریں۔ لیکن جب تک غذا کا اچھا بندوبست نہیں کیا جاتا ہے تب تک دوا سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ پس تغیل اور تیزخیزون سے جسے گوشت روٹی گرم مصالحہ خمر وغیرہ سے پرہیز کرادیں صرف پیتلا سا گوشت یا اراروٹ ہمراہ دودھ کے یا کھیر کھانے کو دیں۔ مینٹھے سے طبیعت ہٹ جاوے تو بتلی گھونٹی ہوئی کچڑھی کھلاوین جگر اور معدہ کے مقام پر فو۔ مین۔ لے۔ شن کریں دروزیا وہ ہواؤنٹیک اوکے تو ایک کریں مار۔ فیا کھلاوین »

ایکبوٹ ہے۔ پے۔ ٹائی ٹرس

اسباب۔ زیادہ کھانا خاص کر گوشت کا اور گرمی میں پہنا بدن کی گرم حالت میں دفعتاً سرد ہوا کا لگنا اور یہ بیماری ڈوئی۔ سن۔ ٹری کے مرض میں بھی ہو جاتی ہے وجہ اسکی یہ بتلاتے ہیں کہ ڈوئی۔ سن۔ ٹری کی بیماری میں بڑے رودون کے میو۔ کسر پر وہ سے پیپ وغیرہ بدلیہ و ریدون کے گرد کر جب جگر میں جاتا ہے تب اس عضو میں انفلامیشن برپا ہو جاتا ہے اور شاذ و نادر جگر میں چوٹ لگنے سے پہلے پے۔ ٹائی ٹرس ہو جاتا ہے۔ لے۔ ریابھی باعث اس مرض کا ہوتا ہے اور اس بات کے بتلانے کی کیا ضرورت ہے کہ شراب پینے سے بھی جگر میں انفلامیشن ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تو اس کبجخت کا عہدہ ہی ہے کہ سب سے پہلے جگر ہی کا ستیاناس کرتی ہے۔ اس کے لئے ایسا سیدھا راستہ بنا ہوا ہے کہ معدہ میں پڑی نہیں جگر میں داخل ہوئی نہیں ماحیثیت۔ بعض دفعہ جگر کے خلاف ہی میں صرف انفلامیشن ہو جاتا ہے

دھکی۔ سٹن۔ کیشیول (اصصورت میں دہل بہت کم پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اکثر خاھر جگر کی ساخت میں انفلامیشن ہوا کرتا ہے اور گاہے گاہے تو انفلامیشن سارے جگر

میں ہو جاتا ہے کہ جسمین جگر کی ساخت یا قیوٹا ٹم ہو جاتی ہے یا سخت لیکن اکثر وہ
 انفلا میشن محدود رہتا ہے اور تب اکثر ڈنبل پیدا ہو جاتا ہے * جگر کے انفلا میشن میں
 جو جو تغیرات پیدا ہوتے ہیں انکو ڈاکٹر مورٹھ صاحب نے ایسے عمدہ طور پر بیان کیا
 ہے کہ میں اس موقع پر اس بیان کا خلاصہ دینا مناسب جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ جگر
 کی ساخت کے انفلا میشن کے پہلے درجہ میں جگر خون سے پُر ہو جاتا ہے اس حالت میں جگر
 کو تڑا شے تو اس سے خون ٹپکنے لگتا ہے۔ انفلا میشن یہیں تک ہو کر رفع ہو سکتا ہے
 اور جو رفع نہ ہو تو جگر کے لا۔ بیول کے مابین لف پیدا ہونے لگتا ہے۔ جب تک یہ لف پتلا
 رہتا ہے تب تک تو اس کے جذب ہو جانے کی امید ہو سکتی ہے اور مرض بھی رفع ہو سکتا
 ہے یا تو مائیت اسکی جذب ہو کر ہنجر حصہ کا ناجی۔ برس ٹے۔ شیو بنجائیگا * یا
 دوم وہ جا ہوا حصہ پر پتلا ہو کر جذب ہو جائیگا۔ نہیں تو سوم ہو کر کرپ بنجائیگا *
 جس مقام پر لف پیدا ہوتا ہے وہ جگہ علامہ ہو کر گلجاتی ہے اور اس خول کے اندر
 ایک پردہ اس کے طور پر دپائی۔ او۔ جی۔ نکٹ ممبرین بنجاتا ہے جس سے اس
 خول میں برابر پیچھا ہوتی رہتی ہے یعنی اس جگہ میں خاصہ ڈنبل پیدا ہو جاتا ہے
 تب جگر بڑھ کر ہونے لگتا ہے اور ڈنبل پہلنے لگتا ہے۔ پہلے پہلے جب کسی متصل
 کے عضو کے ساتھ جا لگتا ہے تب وہاں پر خفیف انفلا میشن ہو کر لف پیدا ہو جاتا ہے
 جس سے ڈنبل کی دیوار اس عضو کے ساتھ بڑھ جاتی ہے اس جگہ زخم پیدا ہو جاتا
 ہے تب وہ ڈنبل اس عضو کے اندر ہوٹ جاتا ہے۔ پس یہی ترکیب ہے جس سے جگر کا
 ڈنبل یا تو پھٹے میں یا معدہ میں یا اثنا عشرہ میں یا دل کے خلاف میں یا پردہ
 پے۔ ری۔ ٹو۔ نی۔ ام میں یا باہر کی طرف ہوٹ جاتا ہے۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ صرف
 ایک ہی یا دو ڈنبل پیدا ہوتے ہوں بلکہ کئی پیدا ہو جاتے ہیں اور آپس میں ملکر ایک
 بنجائے ہیں۔ بعض دفعہ ڈنبل جگر کی سطح کے قریب اور بعض اوقات خوب گہرا جگر کے اندر

پیدا ہوتا ہے اور بہ نسبت بائین کے دہنے ہی گوشہ میں ڈنبل اکثر پیدا ہوا کرتے

مین *

علامات - ابتدا میں جگر کا مقام دیکھنے لگتا ہے اور جب اس کا غلاف بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تب درد زیادہ ہوتا ہے چون چون بیماری بڑھتی جاتی ہے بخار کی شدت زیادہ ہوتی جاتی ہے - جسم گرم ہو جاتا ہے - نشگی شدت سے ہوتی ہے اور پیشاب کم بعض دفعہ بخار رومی ہو جاتا ہے - جگر کے بڑھ جانے سے دہنا ماتی - بو - کان - ڈرسی - ام اور بچا ہو جاتا ہے اور اسپرٹھونکے سے آواز ٹھوس پیدا ہوتی ہے جگر کے مقام پر تھوڑا بہت درد ہوتا ہے اور یہ درد دبانے یا زور سے دم بکھینچنے یا کھانسنے سے زیادہ ہو جاتا ہے اور بیماریا میں کرڈ لیٹ نہیں سکتا لگا ہے لگا ہے انکھ کے پردہ کن - چٹنک ٹاماتی - دوا میں گوند زردی آ جاتی ہے لیکن بعض دفعہ وہ پردہ بالکل زرد ہو جاتا ہے * دم لینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے بعضی شرکت کے سبب کہا لٹی اورتے ہوتی ہوا کر کٹر چکیان نہایت ستاتی ہیں لیکن یاد رہے کہ جب انفلامیشن جگر کے غلاف میں ہوتا ہے تب بخار اور درد اور بے چینی زیادہ ہوتی ہے اور جب جگر کی خود ساخت میں ہوتا ہے تب کم اور یہ کہ جب درد زیر اور شدید ہوتا ہے تب جگر کے غلاف میں انفلامیشن سمجھا جاتا ہے اور جب دھیرا اور جگر میں کچا دم معلوم ہوتا ہے تب یہ بات جگر کی خود ساخت میں ہونے کے سبب سے پیدا ہوتی ہے علاوہ ازیں جب انفلامیشن جگر کی سطح پر ہوتا ہے تب کہا لٹی اور تکلیف تخفص زیادہ ہوتی ہے اور جب جگر کی مقعر سطح مرض میں مبتلا ہوتی ہے تب تے اور دیگر علامات معدہ کی خرابی کی زیادہ نمایان ہوتی ہیں اور یہ بات نو مشہور ہے کہ جگر کی بیماریوں میں دہنا کندہ اور دہنی نسل کی بڈھی میں چبانے کے طور کا شرکی درد ہوتا رہتا ہے لیکن جب جگر کے بائین گوشہ میں انفلامیشن ہوتا ہے تب درد بائین کندہ ہے میں

ہونے لگتا ہے +

جس صورت میں انفلمیشن بڑھ کر ڈنبل پیدا ہو جاتا ہے اسوقت علامات ذیل ظاہر ہوتی ہیں چنانچہ بیمار کو لڑھکتا ہوتا ہے علامات رکٹ رکٹ فیور کی پیدا ہوتی ہیں معدہ بگڑ جاتا ہے شکم کے عضلات پڑھکتے رہنے سے درد ہوتا ہے اور وہ عضلے تنے ہوتے محسوس ہوتے ہیں۔ جگر کے مقام پر بوجہ معلوم ہوتا ہے اور کہانی ہوتی ہے۔ جہاں ڈنبل ہوتا ہے وہ جگہ اونچی محسوس ہوتی ہے۔ چون چون رکٹ رکٹ فیور بڑھتا جاتا ہے بیکار اور روز بروز کمزور اور نڈھال ہوتا جاتا ہے آخر کار یا تو ڈا۔ یا۔ ریا یا ڈی۔ سن۔ ٹری ہو جاتی ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیماری پوشیدہ طور پر بڑھتی جاتی ہے چنانچہ اس صورت میں صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ مریض کی ہیک مر جاتی ہے اور وہ کمزور ہو جاتا ہے اور کارڈیٹ سو طبیعت متضرر ہو جاتی ہے یا گاہے گاہے پھر بری معلوم ہوتی ہے یا جگر کے مقام پر بے چینی یا بے آرامی معدوم ہوتی ہے۔ شدید علامتیں صرف اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب ڈنبل اوپر کی طرف بڑھتا آتا ہے اور ہم نے بعض بیمار ایسے بھی دیکھے ہیں کہ زندگی میں کوئی بھی سلامتی ایسی نہیں پائی گئی ہے کہ جس سے گمان جگر کے ڈنبل کا ہو سکتا مگر جب وہ مرے میں اور ان کی نفش کو امتحان کیا ہے تب جگر میں ایک یا کئی بڑے بڑے ڈنبل پائے گئے ہیں +

نماذج - یا تو ری۔ زو۔ لیو۔ شن ہو کہ یہ مرض رفع ہو جاسکتا ہے یا کل جگر میں پیپ بڑھ جاسکتی ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جگر کے محدود مقامات میں ڈنبل پیدا ہوتے ہیں اور جگر مر رہا ہو پڑ جاسکتا ہے۔ جگر میں بعض دفعہ آنا بڑا ڈنبل پیدا ہو جاتا ہے کہ جبین کئی پائینٹ پیپ ہو سکتی ہے +

الحاج جگر کے ڈنبل کا اکثر بڑا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ پیپ کی مائت جذب ہو گئی ہے اور پیپ کیسے بدل گئے ہیں اور اس ترکیب ڈنبل رفع ہو گیا ہے

جگر کا ڈنبل جب بڑھ چلے۔ ری۔ ٹو۔ فی۔ ام میں پھوٹ جاتا ہے تب مرض پلے۔ ری۔ ٹو۔ نمائی۔ لٹس ہو کر بیمار مرتا ہے اور چند دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈنبل مجری صفیر میں پھوٹا ہے اور پیپ اسکی معاشنا عشرہ میں سے بکر پاخانہ کے ہمراہ نکل جاتی ہے اور معدہ یا بہتر کے یا قولون میں بھی نمل کا پھوٹا چھن برا نہیں ہے گو تب بھی بیمار مرتا ہے لیکن ٹو۔ مایا دل کے خلاف میں اسکا پھوٹنا اچھا نہیں کیونکہ اس سے بیمار فوراً مرتا ہے * انفلامیشن کے سبب سے بعض دفعہ جگر مردار بھی پڑ جاتا ہے *

علاج۔ اس بات پر اطمینان کا صواب ہے کہ اس بیمار میں کوئی علاج ایسا کرنا چاہئے کہ جس سے بیمار کمزور ہو جاوے پس بذریعہ قصد کے خون لینا اور سیلاب کا استعمال کرنا اس مرض کو مضر پڑتا ہے بلکہ ایسا علاج کریں جس سے بیمار کی حالت قائم رہے۔ میں ابتدا انفلامیشن میں اگر مرض شدید ہو اور بیمار طاقتور تو جگر کے متعلق پر چند جو کون کا نگنا مضامینہ نہیں اور بعد چھوٹ جانے جو کون کے جگر قوی میں ٹھیک کریں اور عین ابتدا انفلامیشن میں مہلات سے پہنچا مذہ ہوتا ہے کیونکہ دستوں کے آنے سے پور۔ ٹل۔ دین کی عروق شیریہ کا دوران خون تیز ہو جاتا ہے کہ جس سے جگر کے شریان کی عروق شیریہ میں اجتماع خون کا نہیں ہونے پاتا + جب اس بات کا شک ہو کہ پور۔ ٹل۔ دین کے عروق شیریہ میں اجتماع خون کا ہو گیا ہے کہ جسکے ہونے سے بیمار کی زبان پھندہ رنگ کا خرم جاتا ہے پاخانہ اور پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہے اور جلد کی رنگت نرم و میل ہو جاتی ہے تب ڈاکٹر موروڈ صاحب فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی مقدار میں بلو۔ مل ہمراہ اپنے۔ بکٹ کے یا اکثر کٹ اف ٹے۔ راگ۔ نرمی۔ کم ہمراہ کار۔ پونٹ اف سوڈا کے دینے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کپڑے کی گدھی ڈائی۔ لوٹ۔ نایٹرو۔ ٹائیڈر۔ و۔ کلورک۔ اسٹین ترک کے جگر کے مقام پر لگا دین

ڈاکٹر اسکین صاحب اپنے رنگت کو اس خوراک میں دینا فائدہ مند سمجھتے ہیں کہ جو
 مٹی - سن - ٹری میں دیجاتی ہے یعنی ۲۰ یا ۵۰ گرین جبہ چھ یا آٹھ گنٹھ بعد
 اس مرض کے شدید درجہ میں چوتھائی گرین مار - ٹمار - اے - ٹکٹ ہمراہ ۵ اگرین یا ٹری کے
 آدھ آدھ گنٹھ بعد دینے سے فائدہ ہوتا ہے بطور انو - ڈیشن کے ہسپون کا استعمال
 بہر حال کرنا چاہئے - ابتدا مرض میں بیمار کی غذا ملکی ہوتی جاتی ہے اور مرض کو کم کرنا چاہئے
 جگر کے مقام پر فو - من - لے - ٹیشن اور پوٹش باندھنی چاہئے ۔

جب وٹنل پیدا ہو یا ہوتا ہو تب ادویہ اور غذا یہ مقوی سے علاج کرنا چاہئے مثل دودھ
 شوربہ بیضہ فولاد کو مین معدنی تیراب اور بارک - اگر دودھ اور بے چینی بہت ہو تو
 افیون کا استعمال کریں اور روہیرب یا روہیرب اور انوڈرکھا کر ربع قبض کریں اور
 بیمار اگر کمزور ہو جاوے تو خمر کا استعمال کریں وٹنل باہر ہوئے والہ ہوا اور جلد کے
 ساتھ جڑ بھی گیا ہو تو ٹرو - کار - اور کے - نیو - لاسے اسکو جدید کرپ نکال لیں لیکن
 اس عمل کے کرنے سے پہلے اکس - پلو - ونگ - مینڈل سے شخص کامل کر لیں لیکن وٹنل
 کو نہ جڑ نہ ہی بہتر ہے اسکو خود بخود پہٹنے دینا چاہئے لیکن ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب
 وٹنل کی پیپ کو بندر فیہ اش - پائی - رے - ٹر کے نکالا گیا ہے تب اکثر فائدہ ہوتا ہے
 غرض ہر حالت میں اسی پچکار ہی کو آزمانا چاہئے اس عمل کے کرنے کے لئے وٹنل کو
 شکم کی دیواروں پر بالکل جڑ جانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے بعد نکالنے پر یکے
 وٹنل کے خول کو یا تو عرق کار - با - لکٹ - اسٹیا آرمیوٹین سے دھو ڈالنا چاہئے ۔

پے - ری - ہے - پے - ٹامی - ٹن

جب جگر کے خلاف لینے لگی - سنس کیپ - شیول میں انفامیشن ہو جاتا ہے تب اس
 مرض کو پے - ری - ہے - پے - ٹامی - ٹن کہتے ہیں ۔ مرض پے - ری - ٹو - ٹامی - ٹن

مین یا جگر کی ساخت کی بیماریوں کے ہمراہ یہ مرض ہو جاتا ہے، اور ضرب و زخم کے سبب یا سردی کے لگنے سے بھی اور متصل کے اعضا کا انفلا میشن بھی اس غلاف مین سرایت کر جا سکتا ہے۔

علامات - جگر کے مقام پر درد معلوم ہوتا ہے بعض دفعہ یہ درد اس قدر ترس ہوتا ہے کہ بیمار نتو اچھی طرح کہاں سکتا اور نہ گہری سانس لے سکتا ہے مگر جگر کے فعل مین چند ان غل بنین واقع ہوتا - اس مین قدر کے قلیل بخار بھی ہو جاتا ہے جب یہ مرض مزمن ہو جاتا ہے یا جب بار بار ہو جاتا ہے جیسے آتشک یا دل کی غریز بیماریوں میں ہو کر رہتا ہے تب پورے مین کے دوران خون مین رکاوٹ پڑ جاتی ہے اور جگر چوٹا بھی ہو جا سکتا ہے۔

علاج - اس مرض کا مثل اور انفلا میشن کی بیماریوں کے کرنا چاہئے۔

سوم اکیوٹ یلو-اٹرو-نی

اسباب - یہ بیماری کم دیکھنے مین آتی ہے مگر اکثر حمل کے ایام مین یہ مرض ہو جاتا کرتا ہے اور زکرو ترو دوسے بھی اور ٹائپل سفش فیویر اور اسکارلے - ٹے - نا اور دیگر بخار دن مین بھی جب خون مین زہر سرایت کر جاتا ہے یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے اور اس کا سبب لے - لے - ریبا بھی ہے۔

ماہیت - جب جسم مین کسی قسم کا زہر ہو جاتا ہے اور اس سبب سے جسم کی خود ساخت مین انفلا میشن ہو جاتا ہے تو تھکے چوٹا ہو جاتا ہے (اٹرو-نی) **ماہیت تشریحی** - اس مرض مین جگر کا وزن اور اس کی مقدار بھی گھٹ جاتی ہے اور اس کی مائت ڈیپیلی ہو کر عام ہو جاتی ہے، اور رنگت اس کی سیلی زردی یا لیل ہو جاتی ہے۔

علامات - یہ تھان ہو جاتا ہے اور فم محدہ اور دھنسی لیلی کے مقام پر دو داور
 تھے ہوتی ہے اور قبض ہوتا ہے۔ بخار بہت نہیں ہوتا مگر قبض سیرج ہو جاتی ہے۔ یہ رکھ کر
 اور نڈہال ہو جاتا ہے۔ طحال اکثر بڑھ جاتی ہے جسم کے مختلف مقامات میں خون
 بہ جاتا ہے اور عصبی کماتین پیدا ہوتی ہیں جیسے دوسرے کمال ضعف اور بے چینی بعد
 از ان ہدیان ہو کر شنج ہونے لگتا ہے اور حالت بیہوشی میں بولن براہ خطا ہو جاتا
 ہے۔ زبان خشک اور زنگت اسکی ہو رہی ہو جاتی ہے۔ اور سوڑون پر سار۔ ڈینر
 جم جاتا ہے۔ محدہ اور رودون میں خون جاری ہو جاتا ہے۔ جلد پر خون کی چھپان
 پڑ جاتی ہیں اور گاہے گاہے نکسیر بھی ہوٹ پڑتی ہے۔ یہ بیماری اکثر جھلک
 ہو جاتی ہے۔

علاج - تیز جلایا بن تاکہ خوب کہل کر دست آجاوین بعد از ان گرم ہوا کے ہسپار
 اور معرقات کا استعمال کریں تاکہ کہل کر پسینہ آتا رہے۔ کن پٹی پر چوکیں اور گردن
 پر بلٹرنگا وین اور دیگر علامتوں کا علاج حسب مناسب کریں۔

مقالہ صفت جگر کی نمرن بیماریاں

اول نمائے پر۔ ٹرو۔ فی اور اٹرو۔ فی

انے۔ میاکی بیماریاں میں بعض دفعہ جگر بڑھ جاتا ہے اور گاہے گاہے ڈا۔ یا۔ بے۔ ٹینر
 میں بھی سوا سے جگر کے بڑھ جانے کے کوئی اور علامت نہیں پائی جاتی۔
 جگر کے بڑھ جانے اور نفاذ کشی کے سبب یا جگر کی کسی قسم کا دباؤ پڑنے سے وہ عضو چھوٹا
 ہو جاتا ہے (اٹرو۔ فی)۔

دوم نمے۔ لے۔ لیو چربی میں بدل جانا جگر کا

تھامی۔ سس اور دیگر ایسی بیماریوں میں جگر چربی میں بدل جاتا ہے جنہیں مریض لاغر ہو جاتا ہے جیسے کنسر یعنی سرطان۔ معدہ کا زخم اور کرائیک ڈیسن۔ طبعی پختہ نش اور دل کی فزمن بیماریوں میں جنہیں خوں اچھی طرح صاف نہیں ہو سکتا چکنی چیرفول کا بکثرت استعمال کرنا جیسے گہی۔ مکھن یا چربی اور تیز شراب کا کثرت سے پینا یا مالمیت تشترکی۔ جب یہ بیماری اچھے طور پر پیدا ہو جاتی ہے تب جگر بڑھ جاتا اور بہا رہی بھی ہو جاتا ہے اور کھارے اس کے موٹے اوگول ہو جاتے ہیں اور جگر کی سطح خوب چکنی اور رنگت تہوڑی بہت نمد۔ ساخت جگر کی ایسی عام ہو جاتی ہے کہ وہانے سے اسپر انگیلون کے ذائقے پڑ جاتے ہیں اور روزہ زور سے وہاں سے تو جگر کے ریشے آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ چیرے سے گھر چنے یا جاذب کا غذا لگا یا اتھر لگاتے تو جگر میں چربی کا ہونا صاف ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بیماری خفیف ہوتی ہے تب چربی کا ہونا صرف باریک بین سے ثابت ہو سکتا ہے۔

علامات۔ جگر کی چربی میں بدل جانے کی کوئی بھی خاص علامتیں نہیں ہیں۔ ماضیہ اکثر خراب رہتا ہے جگر نیچے کی طرف بتدریج بڑھتا جاتا ہے وہاں سے تو جگر کا مقام مایم محوس ہوتا ہے۔ بیمار کمزور ہوتا جاتا ہے اور جلد کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔

علاج۔ دوا اور غذا متقوی دین جسے مرکبات فولاد و اسٹرکینیا یا مائٹرو میو۔ ریا۔ ٹمک اسٹہمراہ کرڈوسی نباتی ادویات کے۔ غذا یہ بھی دے

سوم جگر کا مٹی۔ ڈوا۔ ٹڈ۔ میو۔ م

ماہیت - ایک قسم کا گرم جگہ میں داخل ہو کر تھیلی کی شکل کی رسولیان پیدا کرتا ہے
 چنانچہ ان تھیلیوں کا نام ٹائی - ڈائیڈ سیٹ ہے اور جب گرم ان تھیلیوں کی پیدا
 کرتے ہیں انکو اسی - کائی - نو - کاک - کس - ٹا - مے - رٹن بولتے ہیں یہ بیماری بہت
 شاذ و نادر دیکھنے میں آتی ہے ۔

چهارم سی روس آفدی لیو

ماہیت اور صنوختال تشریحی - اس مرض میں پہلے پہل ایسا ہوتا ہے کہ پورے ٹن وئر
کی شناخت اور جگر کے کیسوں کے درمیان خفیف انفلاشن ہو کر لف پیدا ہو جاتا ہے جس سے
سے جگر بڑھ جاتا ہے اور چون جون اس لف کا فانی - بریس ٹے ریشہ بنتا جاتا ہے توں توں
پورے ٹن وئر اور ہے - یا ٹنک شریان اور جرجری صفر کی نالیان تنگ ہوتی جاتی ہیں ان کے
تنگ ہو جانے سے جگر کے خود خود کیسے سکڑ کر چوٹے ہو جاتے ہیں یا جرجری میں بل
جاتے یا دانہ دار ہوتے جاتے ہیں یا جگر کے بعض مقامات کے کیسے باخلفیت
و نابود ہو جاتے ہیں اب جگر سخت ہو کر سکڑا کر چوٹا ہونے لگتا ہے مگر سکڑنے وقت
کے میں سے زیادہ اور کہیں کم سکڑتا ہے کیونکہ کہیں تو لف زیادہ اور کہیں کم ہوتا ہے
اس واسطے ہی - رورس کی بیماری میں جگر سکڑ کر سخت اور دانہ دار وہی ہو جاتا
ہے گویا اسے کسی نے کل پیچن چڑھی ہیں اس واسطے کہ رورس کے جگر کو اب نیل چکر
ہی کہتے ہیں - اس بیماری میں پورے ٹن وئر کا دوران خون سست ہو جاتا ہے -
اس واسطے معدہ اور امعاء کے میوہ کس پر وہ کی عروق تغیر یہ خون سے پڑ ہو جاتی ہیں

تب یا تو خون کی شے آتی ہے (ہے - ما - ٹے - مے - سس) یا پاخانہ کی راہ
خون آنے لگتا ہے (مے - لے - نا) اور اس صورت میں چونکہ پروہ پنے رسی ٹوٹنے
کی عروق شیعہ یہ بھی خون سے پُر ہو جاتی ہیں اس واسطے پے - رسی - ٹو - ٹی - ام
کے جوف میں بانی پیدا ہو جاتا ہے یعنی ا - سائی - رٹن کی بیماری ہو جاتی ہے *
سی - رو - سس میں جگر حالت صحت کی نسبت اس قدر چھوٹا ہو جاتا ہے کہ صرف
تین پاؤ یا سیر بہر کا رہ جاتا ہے اور رنگ اسکا پھیکا پڑ جاتا ہے * اس قسم کے جگر
کو اگر تراشے تو سخت اور ٹھوس محسوس ہوتا ہے اور سخت فائی - برس ٹے شیعہ
جو اس بیماری کے جگر کے اندر پیدا ہوتا ہے اسکی باریک باریک پیکرین سکڑے
ہوئے گوشوں کے درمیان نظر آتے ہیں اور ان پیکرون کے محاذی جگر کی سطح پر
جگر کا غلاف بھی سکڑ جاتا ہے *

اسباب - یہ بیماری بھی دخت رز کی عنایت سے پیدا ہوتی ہے یہ ایسی
چھال ہے جو کوئی اسکے فریب میں آ جاتا ہے بنائی اپنی جان گنوا تا ہے پہلے تو شعبہ
دکھاتی ہے آخر کار اپنے عاشق کی جان لیکر چھوڑتی ہے - امانت کا یہ شعر دخت رز کی
نسبت کیا خوب راست آتا ہے -

یہ وہ مصری کی ٹلی ہے کہ نبات اسکی کرے
نیکو کیا کہا کے مرے اسکو زبا پر نہ دہرے
خدا کی پناہ تشک بھی جو اکثر بیخوش شراب خواری کا ہے اس مرض کو پیدا کرتی ہے اور
بعض دفعہ مے - لے - یا کے سبب بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے *

علامات - ابتدائی علامتیں اس بیماری کی یہ ہیں کہ بیمار کا ہاضمہ بگڑ جاتا ہے
جی متلاتا اور دکا ہے گا ہے تے ہوتی ہے اور خفیف قھارض یرقان کی باقی جاتی ہیں اگرچہ
یہ علامتیں کم بھی ہو جاتی ہیں لیکن جگر کی غرابی بڑھتی جاتی ہے اور تیدید بیمار کا ہار
کر ڈالتی ہے - ہاضمہ کمزور رہتا ہے اور خفیف معدہ کی جگہ بوجہ امداد ہوتا ہے - یکلو جھلکا ہے

پیٹ میں یخ بھر جاتی ہے اور قبض ہوتا ہے۔ بیمار لاغر اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ جسم گرم پیلا یا زرد اور جلد خشک ہوتی ہے۔ پیٹ بڑھنے لگتا ہے اور اس میں پانی پیدا ہو جاتا ہے جگر چوڑا اور طحال بڑھ جاتی ہے + شکم میں پانی یا یخ بھر جانے کے سبب بیمار کو دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور چون چون یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے محدہ اور امعاء سے خون جاری ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ شکم کے اوپر کی ورید خون سے پُر ہو جاتی ہیں جس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ پورے محل۔ دین کا دوران خون رک گیا ہے۔ بیماری کے اخیر درجوں میں خفیف بخار کی علامات پیدا ہوتی ہیں اور اکثر دست بھی لگ جاتے ہیں جس سے بیمار مر جاتا ہے لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیو۔ مو۔ نیایا پے۔ رمی۔ ٹو۔ نامائی۔ ٹین کے باعث بیمار مر جاتا ہے اور کبھی کبھی یرقان کی علامتیں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں اور جسم پر سرخ سرخ دھبے پیدا ہو جاتے ہیں تب ہڈیاں اور شنج ہونے لگتا ہے اور حالت بیہوشی میز بیمار رحلت کر جاتا ہے +

تشخیص۔ اگر بیمار کی عمر ۳۰ برس سے زیادہ ہو اور عرصہ سے شراب کی پوجا کرتا ہو اور اسکے چہرہ کی خفیف زردی مائل ہو اور اگر اُسکے دہنے پہلے میں خفیف درد یا کسیدہ رہے چینی ہو اور ساتھ ان علامتوں کے کسیدہ بخار بھی آتا ہو تو اس مرض کے ہونے میں کسی طرح کا شک نہیں ہوتا۔ انجام اس مرض کا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے + ایک اور ترکیب اس مرض کے پہچانے کی یہ بھی ہے کہ مریض کو چیت لٹا کر جگر کے مقام پر شکم کو اپنے ماتھوں کو انگلیوں سے دقتاً و باکھوچڑ دین مگر انگلیوں کو اسی مقام پر رہنے دیں۔ اسکے کرنے سے ایسا ہوگا کہ انگلیوں سے دقتاً و بانے سے سی۔ رو۔ سبب کا سکڑا ہوا چھوٹا سا دانہ دار جگر دقتاً شکم کے پانی میں غوطہ کھا کر اوپر کو تیر ٹریگا اُس وقت تمہاری انگلیوں کو اسکے دانے محسوس ہو سکتے ہیں +

علاج شراب سے بالکل پرہیز کرادین غذا ہلکی اور مقوی ملیوین مصالح یا ایسی شے

پر ہر کرین کہ جن سے جگر میں خراش پیدا ہو جگر کے مقام پر درم اور بے چینی ہو تو جو کین لگا دیں اور تھکید کرین اور ہلکے ٹیکین مہملات کا استعمال کرین جی متلاتا یا تے ہوتی ہو تو کائیدر و سیانک اسٹم بلا - دو - نا - مار - فیا - یا اسکرکٹ ان نکس و امیکا کا استعمال کرین - درو ہو تو جگر کے مقام پر جو کین یا گلاس لگا دیں اور ٹیکین جلات جیسے سلفٹ ان گمنے ششیا یا مائی - ٹار - ٹریٹ ان پوٹاش کا استعمال کرین - سبقا ہو جاوے تو ہلکے مدد رات کو کام میں لا دیں *

علاوہ جگر کی ان فرمن بیماریوں کے جنکا ذکر اوپر ہوا ہے - جگر میں سرطان کی بیماری ہی ہو جاتی ہے اور آشک کا مادہ بھی جگر کی ساخت کو خراب کر دے سکتا ہے اور اس کی بیماری کے ہمراہ جگر میں ٹیو - بریکل کا مادہ بھی پیدا ہو سکتا ہے *

مقالہ ہشتم

گال - بلاڈر کی بیماریاں

واضح ہو کہ گال - بلاڈیٹی پیڈین کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں مثلاً بیت جمع ہو کر مرارہ پھول جا سکتا ہے - پتہ میں کیوٹ انفلامیشن ہو کر پیپ پڑ جا سکتی ہے اور کرائک انفلامیشن کے سبب پتہ میں سیرم پیدا ہو کر ڈراپ - سی ہی ہو جا سکتی ہے اور پتہ سرطان لینے کانسر کی بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے * لیکن اس موقع پر صرف دوسرے مرض کا ذکر کیا جائیگا جسکو اصطلاح میں کہتے ہیں -

۸۸۸
بے۔ لی۔ اری کیاں کیو۔ لاسی

یعنی
گال۔ اسٹون

ماہیت یہ تہ میں صفر کی پہرین کیونکہ بجاتی ہیں اسباب میں اہلباکی مائے مین
اختلاف ہے چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ صفر اکی رطوبت خشک ہو جاتی ہے اور تب
صفر اجم جاتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے * بعض کی یہ رائے ہے کہ صفر کے
بعض اجزاء معمول سے زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی طبیب یوں کہتے ہیں کہ
صفر جب پہلے تیار ہوتا ہے اسوقت یا بعد میں چند تغیرات کے سبب اس
صفر میں غیر معمولی کمیائی اجزاء پیدا ہو جاتے ہیں جس سبب بعض اجزاء اس صفر
کے اس قابل نہیں ہوتے کہ دیگر صفر اسی اجزاء کے ساتھ لکڑی پور سیال کے رہ سکیں
بلکہ ان سے علیحدہ ہو کر دُر کے طور پر تہ نشین ہو جاتے ہیں اور تب جم کر پتھری کی شکل
پکڑ لیتے ہیں مثلاً ایسا قیاس کرتے ہیں کہ جب صفر کے اندر سوڈا کی کمی ہوتی ہے اور
صفر اسی حموضات کے کثرت تب صفر اجم ہو جاتا ہے یا ایسا ہی خیال کرتے
ہیں کہ صفر کے اندر چونکہ زیادتی جب ہوتی ہے تب اسکی رنگت علیحدہ ہو کر
جم جاتی ہے۔ بعض بعض محققین ایسا ہی خیال کرتے ہیں کہ تہ میں پہلے بلغم کے غلط
یا بے ہتے۔ لی۔ ام کے چپکے یا کوئی اور غیر جنس جمع ہو جاتا ہے تب اس صفر کے
اجزاء جتے جتے پتھری بجاتی ہے جیسے مثلاً کے اندر پشیا کے اجزاء جم جانے سے پتھری
پیدا ہو جاتی ہے *

پرمی۔ ٹوپو۔ زنگ کانہ۔ زیادہ عمر میں یہ بیماری اکثر پیدا ہوتی ہے
اور عورتوں کو اور ان لوگوں کو جو شست عادت کے ہوتے ہیں یا جگہ شست

رکھتا ہے اور شراب اور گوشت کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں انکو بھی یہ مرض اکثر ہو جاتا ہے اور جگر اور پتہ اور مجاری صفرا کی ساخت کی ایسی بیماریوں -

یہی صفرا کی پتھری بن جاتی ہے جو صفرا کے خارج ہونے میں مداخلت کرتے ہیں ۔

صورت حال تشریحی - اکثر تو صفرا کی پتھریاں بہت ہی میں پیدا ہوتی ہیں ۔

چاہیں تو صفرا کی نالیوں کے یاخو و جگر کے کسی حصہ میں بھی پیدا ہو جاویں ۔ مقدار و انکی سیکڑوں بلکہ ہزاروں تک کی بھی ہو سکتی ہے ۔ مگر اکثر کئی پتھریاں تو سرور ہی ایسی جاتی ہیں ۔

مقدار ان پتھریوں کی مختلف ہوتی ہے ۔ جب بکثرت ہوتی ہیں تب چوٹی چوٹی اور جب چند ہوتے ہیں تب آپس میں ملکر ایک طبری سی پتھری بن جاتی ہے ۔ پہلے

پہلے شکل ان پتھریوں کی گول یا بیضوی ہوتی ہے لیکن جب بکثرت ہوتی ہیں تب ایک دوسرے سے رگڑ جانے کے سبب سے بکسر ٹوکیلی یا چوڑی یا متعبر ہوتی ہیں ۔

جب صفرا کی نالیوں میں پیدا ہوتی ہیں تب پتھریوں کی شکلیں عجیب و غریب بن جاتی ہیں اور شاخدار ہو جاتی ہیں ۔ قاعدہ تو یہی ہے کہ رنگ صفرا کی پتھریوں کا ہو یا

یا زرد یا ہلکا پسری ہوتا ہے مگر کہیں سفید یا سیاہ یا سینا یا سنرا یا سرخ یا کوئی اور رنگ کی پتھریاں بھی پائی جاتی ہیں ۔ بعض دفعہ ایسی عظیم ہوتی ہیں کہ ترشے تو آسانی سے

کٹ جاتی ہیں بعض دفعہ ایسی کڑکوں کہ کوٹنے تو چرہ ہو جاتی ہیں ۔ جب حال کی ہوتی ہیں تب اکثر پانی میں ڈوب جاتی ہیں اور بعض اوپر تیرتی ہیں اور سوکھ جانے سے

اکثر پتھریاں پانی پر تیرتی ہیں ۔

ان پتھریوں کے کیمیاوی اجزاء میں اختلاف ہے لیکن ان میں یہ اجزاء اکثر پائے جاتے ہیں چنانچہ کولرلش ۔ طرین اور صفرا کی رنگت اور ساتھ انکے قدر سے چونکہ یا گھنے ۔ مشما

بھی ہوتا ہے علامہ ان میں یہ بھی چیزیں بشمول اجزاء کورہ بالا کے پائی جاتی ہیں جیسے چونکہ ہمراہ ملی ہوئی صفرا اور روغن کے حموضات اور فاس ۔ فٹ اور پوٹاش

کے مرکبات بھی اور بعض قسم کے دوائی اجزاء بھی پاس کئے جاسکتے ہیں جیسے فولا اور تانیا اور
منگے۔ نیز۔

یا درہے کہ جیسی پیشاب کی ریت ایسی صفرا کی بھی ریت پائی جاسکتی ہے کہ جنہیں کوہلن ٹریز
اور صفرا کی رنگت ہوتی ہے۔ گال اسٹون کے سبب سے امراض مفصلہ ذیل پیدا ہو سکتی
ہیں پتہ یا صفرا کی نالیوں میں رسی۔ ٹلے۔ شن ہو جاسکتا ہے یا انفلامیشن ہو کر زخم اور سپ
پڑ جاسکتی ہے اور اس پیپ سے پتہ یا نالیان چب جاسکتی ہیں چنانچہ اعضا سے مفصلہ ذیل
چب جاسکتے ہیں چنانچہ خاصکر معدہ اور ڈیوڈی۔ نچم یا پروہ پلے۔ رسی۔ ٹو۔ نی۔ ام اور
پہوٹ کر تہری شکم کے باہر بھی جاسکتی ہے یہ گاہے گاہے کوہلن اور پورٹل۔ وین اور
پروہ پلور اور دھننے گردہ اور عورت کی اندام نہانی میں بھی تہری پہوٹ جاسکتی ہے۔
تہری جگر کے اندر رک جادے تو وہاں ڈنبل پیدا ہو جاسکتے ہیں۔

علامات اس موقع پر صرف انہیں علامتوں کا ذکر کرنا مناسب ہوتا ہے
جو صفرا کی تہری کے گال۔ ٹوکٹ سے رودہ میں گزرنے کے وقت پیدا ہوتی ہیں جس
حالت کو اصطلاح میں ہے۔ پا۔ رگٹ کا۔ لکٹ کہتے ہیں یہ علامتیں ہمیشہ نہیں مگر اکثر
شہید ہوتی ہیں۔ پس واضح ہو کہ ہے۔ پا۔ لکٹ کا۔ لکٹ کے حکم کیوت (یعنی اس
وقت کہ جب تہری صفرا کی نالی سے رودہ میں گزرتی ہے) دہنی پسلی کے نیچے
(رائیٹ۔ ہائی۔ پلو۔ کن۔ ڈریٹم) دفعتاً ایک شدت کا درد اٹھ کھڑا ہوتا ہے
بعض صورتوں میں تو یہ درد اس شدت کا ہوتا ہے کہ بیمار ماہی بے آب کی طرح تڑپنے
لگتا ہے اور اکثر بعد کہا نا کہانے کے یا کسی کام کے لئے حرکت کرنے سے پیدا ہوتا ہے
ٹیل س درد کی سارے پیٹ پر اور گھوم کر پشت پر یا دھننے شانہ تک محسوس ہوتی ہے
مریض درد کی شدت کے سبب دوہرا ہو جاتا ہے اور پیٹ کو دبا کر چھین مارنے لگتا ہے
تب کیسے قدرافاقہ ہوتا ہے۔ اس طرح رہ رہ کر درد کی فوہیں ہونے لگتی ہیں ہر تہ

کے بعد بیمار نہ ہال ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ روحی حالت طاری ہو کر لرزہ ہی ہونے لگتا ہے۔ چہرہ تکلیف زدہ اندک مہمند ہو جاتا ہے۔ غش آنے لگتا ہے اور بعض دفعہ سن - کو - پی ہی ہو جاتی ہے اور شکم کے عضلات اینٹھنے لگتے ہیں۔ اس مرض میں بخار اکثر نہیں ہوتا مگر شدت کی تے اکثر ہوا کرتی ہے اور بعض دفعہ ہچکیاں بے تحاشا سناؤتی ہیں۔ ایک یا دو دن کے بعد جب پتھری ٹوک - سٹس - کمیو - لن - کی - ڈو - کٹر - مین گزر جاتی ہے تب صفر کے رستہ کے مسدود ہو جانے سے یرقان کی علامتیں اکثر پیدا ہو جاتی ہیں اور جب تک اس تہ بند رہتا ہے جان - دس ہو جو در ہوتا ہے پتھری کی ڈیو - ڈی - نم روہ میں مجروح و نسل ہوتے ہی ساری تکلیفیں رفع ہو جاتی ہیں اور بیمار کو بالکل آرام آ جاتا ہے تب یرقان کی علامتیں بھی تبدیل رنج ہونے لگتی ہیں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ روہ میں داخل ہو کر پاخانہ کے ہمراہ صفر کی پتھری خارج ہو جاتی ہے اور اجابت کو دہو کر چیلنی یا باریک مل کے کپڑے میں چاہا کر علیہ کیج سکتی ہے مگر شاد و نا و ایسا ہی ہوتا ہے کہ پتھری محدہ میں گزر کر تے کے ساتھ نکل آتی ہے۔ واضح ہو کہ مدد کی شدت پتھری کی مقدار پر منحصر نہیں ہے بلکہ اسکے نوکیلے ہونے پر زیادہ حصر ہے اور یہ کہ جب چھوٹی نالی سے گزر کر پتھری کا - من - ڈوگٹ میں گزر جاتی ہے تب درد خفیف ہو جاتا ہے کیونکہ یہ نالی بہ نسبت صفر کی اوڑنالیوں کے فراخ ہوتی ہے لیکن جب پتھری ڈیو - ڈی - نم روہ کے سو علاج کے قریب آ جاتی ہے تب پھر درد کی شدت ہونے لگتی ہے اور یہ کہ اس بیماری میں یرقان کا ہونا کوئی ضروری امر نہیں ہے اور جو بھی تو کم کیونکہ جب پتھری نوکیلی ہوتی ہے تب اسکے اوگرو سے صفر روہ میں گزر جاسکتا ہے یا ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ پتھری شڑپ سی روہ میں آگرتی ہے اور یرقان ہونے نہیں پاتا مگر ان جب پتھری نالی کے اندر پھنس جاتی ہے تب یرقان شدت سے ہو کر عرصہ تک رہ سکتا ہے۔ اجابت کو دہو کر پتھریوں کو

نکال کر دیکھنا چاہئے تاکہ انکی شکل اور مقدار اور تعداد کے ملاحظہ سے اسے دی جاسکے ۔
 جب کوئی بڑی سی پتہری گزر جاتی ہے تب چھوٹی چھوٹی پتہریوں کے گزرنے میں چند ان
 تکلیف نہیں ہوتی ۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ درد تو رفع ہو جاتا ہے مگر کوئی بھی
 پتہری نہیں خارج ہوتی اس صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ پتہری پہر تہ میں لوٹ جاتی
 ہے ۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتہری کے ڈیو ۔ ڈی ۔ نم میں گزرنے کے بعد بھی
 درد اور دکھن ہتی ہے کیونکہ مریض کے نازک مزاج ہونے کے سبب پتہری کے گزرنے
 کی وقت آستہ میں اعصاب کو خراش ہوتی ہے اس سبب یا انفلامیشن کے سبب
 بھی درد اور دکھن کچھ عرصہ تک باقی رہ سکتی ہے ۔

یا در ہے کہ صفر کی ریت یا گاڑھی صفر کے گزرنے سے بھگی ہے گا ہے ہے ۔ یا ۔ کٹ
 کا ۔ کٹ کی علامتیں پیدا ہو سکتی ہیں اور یہ بھی یا در ہے کہ صرف درد کی شدت
 سے یا اس شدت کے درد کے سبب سے جو روی حالت پیدا ہوتی ہے اس
 باعث بھی بیمار مر جا سکتا ہے ۔

علاج ۔ اس بیماری کے علاج کے دو مطلب ہیں ایک تو رفع کرنا اور دوسرا
 کا بندوبست کرنا ۔ دوسرے صفر کی پتہریوں کا خراج کرنا اور انکی پر پیدا ہونے دینا ۔
 مطلب اول کے حاصل کرنے کے لئے بیمار کو آب گرم میں بٹھا دین اور شکم پر اس
 نسخہ کا لپ کرین ۔

نسخہ کٹرکٹ آف بلا ۔ ڈو ۔ نا ۔ م ۔ اگرین ۔ کٹرکٹ آف ۔ پا ۔ پیرم ۔ آؤنس ۔
 مرپ ان ۔ پا ۔ پیر ایک آؤنس ۔ سبکو ملا لیں ۔ اس لپ کو لٹکا کر درد کے مقام
 پر پلٹس باندھیں اور اس نسخہ کو پلا دین ۔

نسخہ لائیگوار ۔ مار ۔ فیما ٹائیڈرو ۔ کلورس ۔ سو بوند ۔ اسپرٹ اف کلورار فارم
 ایک ڈرام ۔ اسپرٹ اف ایتھر ۔ سو بوند ۔ ٹنکچر اف بلا ۔ ڈو ۔ نا ۔ م ۔ بوند ۔

یرقان جگر کی خرابی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے مگر ایسی بیماری سلامت ہے کہ اسکوا ایک متعل بیمار ہی تصور کرتے ہیں اور اصل میں یرقان کے معنی میں خون میں صفرا کی رنگت کا جمع ہو جانا اور اس سبب سے جلد اور جسم کی دیگر ساخت کی رنگت کا بدل جانا۔

اسباب۔ جان ٹوس کی بیماری دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ جو مجری صفرا کے مدد سے پیدا ہوتی ہے کہ جس میں صفرا مجری سے گزر نہیں سکتا اور دوسری جس میں کسی قسم کا روک ہینن ہوتا۔ پس

اول یرقان بسبب کاوٹ کے

ہے۔ پاٹکٹ وکٹ یا کا۔ من بائیل ڈکٹ میں کوئی غیر شے کا پھنس جانا جسے ٹن لینے صفرا کی تہری یا کاٹھا صفرا یا صفرا کی ریت یا بلغم شاذ و نا در صفرا کی نالی میں جگر سے یا اسکی مجری سے یا رودہ سے کرم نگار داخل ہو جاتا ہے اور اسکا منفذ بند کر دیتا ہے اور بہت شاذ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رودہ سے میو جات کے بیج یا کوئی اور غیر شے مجری صفرا میں داخل ہو کر اس کے منفذ کو بند کر دیتے ہیں۔ انفلامیشن کے سبب یا کسی اور سبب سے مجری صفرا یا ڈیو۔ ٹوی۔ نم رودہ کے سوراج میں ایسٹم کا تفر پیدا ہو جاتا ہے جس سے منفذ تنگ ہو جاتا ہے اور جب ان پوجاٹ سے مجری صفرا دب جاتی ہے جیسے کسی رسولی کے سبب سے پورٹل نے۔ شرمین غدد و دوا کے بڑھ جانے سے یا البلبہ کی بیماری جب ڈیو۔ ٹوی۔ نم رودہ کو مبتلا کر لیتی تب اس سبب سے یا خاص پے۔ رمی۔ ڈی۔ فی۔ ام یا اسکے پیچھے رسولی کے پیدا ہونے سے یا کو۔ لن۔ رودہ میں سڈون کے جمع ہو جانے سے یا حمل یا کسی اور سبب سے رحم اور او۔ وی۔ رمی کے بڑھ جانے سے یا گردہ میں کسی رسولی کے پیدا ہونے سے بھی

مجرئی صفراؤب جاتی ہے اور اسکا منغذ مسدود ہو جاتا ہے اور صفرا خارج ہونے
 نہیں پاتا ۔

ماہیت۔ صفرا کیونکر پیدا ہوتا ہے اسباب میں محققین کی رائے میں اختلاف
 ہے چنانچہ بعض کہتے ہیں کہ صفرا کے حموضات اور رنگت جگر میں بنتے ہیں اور بعض فرماتے
 ہیں کہ صفرا کی رنگت ساری کی ساری یا کچھ حصہ اسکا خون میں بنتا ہے۔ جگر کا کام
 صرف اس رنگت کو خون سے علیحدہ کرنے کا ہے۔ پس بموجب ان دورائے کے
 اس قسم اول کے جان۔ دس کے پیا۔ ہونے کے باب میں اطباء کا اختلاف ہے چنانچہ
 بعض فرماتے ہیں کہ یرقان کی بیماری میں جو بلد و غیرہ کی ساخت کی رنگت بدل جاتی
 ہے تو سبب اسکا یہ ہے کہ جگر میں جو صفرا پیدا ہوتا ہے اسکو دریا درلم۔ نما۔ جگر جناب
 کر کے دوران خون میں پہنچا دیتے ہیں اور دوسری جماعت بطیبون کی یہ رائے ہے
 کہ جب جگر خون سے صفرا کو علیحدہ نہیں کرتا ہے تب صفرا کی رنگت خون ہی میں رہ
 جاتی ہے اور یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے مگر اگلی رائے کو غلبہ ہے کیونکہ ایسا دیکھا جاتا ہے
 کہ صفرا جقدر زیادہ پیدا ہوتا ہے یرقان بھی اسقدر شدت سے ظاہر ہوتا ہے ۔

دوم وہ یرقان جو باکسٹم کے روک کے پیدا ہوتا ہے

اسباب۔ خاص قسم کے بخار جیسے یلہ فیورہ۔ ری۔ مے۔ ٹنٹ اور ان۔ ٹنٹ۔ مے۔ ٹنٹ
 اور ری۔ لپ۔ سنگ۔ فیور اور شاؤنا اور ٹائی۔ فائیڈ اور ٹائی۔ فشر اور اسکارلٹ
 بخاروں میں بھی اس قسم کا یرقان ہو جاتا ہے ۔ جب خاص قسم کے زہر خون میں موجود
 ہوتے ہیں جیسے پانتی۔ میا کی بیماری کا زہر یا سانپ کا زہر یا فاس۔ فو۔ رس اور سیسما
 اور برش یا انٹے۔ منی کا زہر اور کڈیرا۔ فارم اور ایٹھر کے سونگھنے سے بھی اس قسم کا یرقان
 ہو جاتا ہے ۔ جگر کے اٹرو۔ فی اور کسی سبب سے جگر کی ساخت گھبائی جاتی ہے اور

جگر کے کن جش چین کے سبب سے بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ پنج وشم اور فک و تردو کے باعث جب نظام عصبی کو صدمہ پہنچتا ہے، خون جب کافی طور پر صاف نہیں ہونے پاتا ہے جیسے نیو-مو-نیا کی بیماری میں یا نہایت یا نہایت نہیں بچہ میں یا تنگ تار یک مکان میں چہان ہوا گاگر اچھی طرح نہیں ہونے پاتا بود و باش کرنے سے جب صفر اہایت کثرت سے پیدا ہوتا ہے اور جب عرصہ دراز تک قبضہ میں ہے تب بھی یہ آمان ہو جاتا ہے۔

حاجیت۔ اس امر میں اطباء کی رائے یہ ہے کہ جگر خون سے صفر اعلیٰ نہیں کرتا یا خون میں اس قدر صفر جذب ہو جاتا ہے کہ اس کے اخراج اور ہضم نہیں ہو سکتے اور بعض طبیب یہ فرماتے ہیں کہ خون کی رنگت یعنی ہے۔ مائین صفر کی رنگت میں بدل جاتی ہے اور عصبی صدموں سے جو یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اس کی نسبت طبیبوں کی یہ رائے ہے کہ جب عصبی نظام میں صدمہ پہنچتا ہے تب صفر اچھے طور پر پیدا نہیں ہونے پاتا اس صدمہ کے سبب پورٹل-رین کی حالت بدل جاتی ہے یا خون میں صفر کا تجزیہ اچھے طور پر نہیں ہونے پاتا۔

صورت حال تشریحی۔ جب جان-ٹوس کی بیماری اچھے طور پر پیدا ہو جاتی ہو تب صرف جلد اور آنکھوں کے کن-جنگ-ٹائی-واہی کی رنگت نہیں بدل جاتی بلکہ اکثر بافت اور اعضا سے اور رطوبت جسم کی رنگت میں بھی فرق آ جاتا ہے صفر کی رنگت جلد کی ری-ٹے-میو-کو-زم میں جمع ہو جاتی ہے اس سبب پسیٹہ پیدا کرنے والے حد وہی مبتلا ہو جاتے ہیں عصبی ساخت میں کم اثر پہنچتا ہے اور اس سے کم اثر میو-کس پر وہ اور بطن پر ہوتا ہے مگر بخون کے ڈولن اور خون کے سرم میں بھی صفر کی رنگت پاتی جاتی ہے مگر صفر کے حموضات نہیں پاتے جاتے اور جب یہ بیماری عرصہ تک قائم-ہتی ہے تب خون اچھی طرح جمنے نہیں پاتا اور اس کے

کیسوں کی خاصیت بھی بدل جاتی ہے اور مختلف بافت میں رنگوں سے خون تبادلاًش
 پا کر یہ بھی جاتا ہے ۔ جب یرقان رُکاوٹ کے سبب سے پیدا ہوتا ہے تب بعض
 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہل جگر چاروں طرف سے براہِ بڑھ جاتا ہے اور رنگت اُس
 کی زرد یا ہلکی بنر ہو جاتی ہے اور جگر کی نالیان صفر سے پُر ہو کر ہل جاتی ہیں کچھ
 عرصہ بعد صفر کی رنگت کے ذراۃ جگر کے کیسوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور جبے کاوٹ
 صفر کی کارمن ٹوکٹ میں ہوتی ہے تب پتہ صفر سے پُر ہو کر ہیل جاتا ہے ۔ اگر
 روک منع نہ ہو سکے بلکہ قائم رہے تب جگر میں ایسی تری پیدا ہو جاتی ہے جس سے
 جگر چوٹا ہو جاتا ہے (اٹرو-فی) اور رنگت اُسکی نہایت گہری بلکہ سیاہ ہو جاتی
 ہے اور ساخت جگر کی مائیم اور کیسے اُسکے نیت دبا لود ہو جاتے ہیں اور عرصہ کی
 بیماری میں گردے بیچاروں میں بھی بڑے بڑے تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً
 رنگت انکی سیاہی مائل ہو جاتی ہے ۔ انکی نالیوں میں ایک شے سیاہ ہوئے رنگ
 کے جمع ہو جاتی ہے اور گردن کے جن کیسوں سے پیشاب پیدا ہوتا ہے اُن کے
 اندر صفر کی رنگت کے خرد خرد دانے پائے جاتے ہیں یا آخر کار ایسا ہوتا ہے کہ وہ
 کیسے نیت دبا لود ہو جاتے ہیں ۔

علامات یرقان میں تین باتیں بڑی بیماری پائی جاتی ہیں کہ جسم کی گت
 بدل جاتی ہے ۔ پیشاب کی خاصیت میں فرق آ جاتا ہے اور دونوں کے اندر صفر کے
 نہ پہنچنے سے خرابیاں برپا ہو جاتی ہیں ۔ پہلا اثر اس مرض کا پیشاب میں پایا جاتا ہے
 اور تب آنکھ کے پردہ کن ۔ جٹنگ ۔ ٹائی ۔ واپر سب سے پیچھے وہ اثر حلیہ پختیاں
 ہوتا ہے چنانچہ جلد یا تو خفیف زرد یا پوری یا بنر یا لسیا ہی ہو جاتی ہے اور جہاں
 کی جلد کا پردہ اپنے ۔ ڈر ۔ میں باریک ہوتا ہے وہاں کی رنگت خوب گہری ہوتی ہے
 پیشاب کی رنگت یا تو خفیف زعفرانی یا خوب گہری ہو جاتی ہے اور تار درہ جب عرصہ

نمک تھیرا رہتا ہے تب رنگت اسکی سنہری بل ہو جاتی ہے۔ اسکے کف کا رنگ زرد
ہوتا ہے۔ اسپین کپڑا یا جاذب کاغذ ڈبوئے تو وہ زرد ہو جاتا ہے۔ کیمیائی ترکیب سے
تارورہ کی شناخت کیجئے تو صفرا کی رنگت نامے۔ ٹرک اسڈ سے اور صفرا کے محفوظ
سلفیو رک اسڈ اور شکر سے ثابت ہو سکتی ہیں (دیکھو اس کتاب کا حصہ اول
باب تارورہ)

جب صفرا و دودن تک پہنچنے ہینین پاتا تب قبض ہو جاتا ہے فضلہ خشک بدبودار
اور سفید بھر یا مٹی کے رنگ کا خارج ہوتا ہے۔ شکم میں بدبودار سوج پیدا ہو جاتی ہے
اور بار بار خارج ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً یا تو کھلے دست آنے لگتے ہیں یا ڈی۔ سٹری
کی بیماری ہو جاتی ہے یہوک اکثر جاتی رہتی ہے اور روغندار چیزوں سے بیمار کی طبیعت
متصفّر ہو جاتی ہے۔ ڈکار بار بار آتے ہیں اور مزہ اُکنا کڑوا ہوتا ہے۔

گاہے گاہے ایسا ہی دیکھا گیا ہے کہ پسینہ اور دودہ اور یہوک اور آنسوؤں میں بھی صفرا
ہوتا ہے۔ چونکہ اس بیماری میں صفرا کے محو ضات خون میں ہوتے ہیں تو بدن
میں خارش ہوتی ہے۔ دل کی حرکت اور نبض کمزور ہو جاتی ہے اور نبض کی ضربان ۵۰
یا ۴۰ یا ۳۰ بلکہ اسقدر گھٹ جاتی ہے کہ ایک منٹ کے اندر نبض بیس ہی دفعہ جلتی
ہے۔ بیمار کمزور پست ہمت اور بے حوصلہ ہو جاتا ہے اور کاروبار کی طرف سے طبیعت
متصفّر ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ بیمار کا فالج چڑھتا ہو جاتا ہے اور کبھی مریض دنگھلا رہتا
ہے۔

اس بیماری میں بعض دفعہ جلد پر ار۔ لٹے۔ کے۔ ریا یا لائی۔ کن یا ڈنبل یا کار۔ بنجھ
یا خون کی پتیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ مگر بہت شاذ و نادر بیماری کی آنکھ میں پیشانی
نزدک نظر آتی ہیں۔

بعض اوقات اس مرض میں روحی مسامتین ظاہر ہو جاتی ہیں اور بیمار نہایت ڈھال ہو جاتا

ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معدہ اور رودون میں جریان خون نکلا ہو کہ مریض تلف ہو جاتا ہے۔
علاج۔ اس بیماری کے علاج کے مطالب یہ ہیں کہ جس سبب سے یہ مرض پیدا ہو سکا تدارک
کرین اور ممکن ہو تو اس روک کو رفع کریں جسکی فراحت سے صفر خارج نہیں ہونے پاتا۔ ایسی
دواؤں کا استعمال کریں جس سے صفر پیدا ہو جیسے یو۔ ڈا۔ غلین + اور لٹ۔ راگ۔ زمی۔ کم +
اور کسکے۔ را۔ سگ۔ را۔ ڈا + جلیپ + الیز + روبرب + مرکبات سیاب جیسے زیادہ
بیکٹریو پیل + پل + پل + وغیرہ + صفر زیادہ پیدا ہو تو اسکا تدارک کریں + بیمار کی غذا کی
طرف خوب متوجہ ہوں مثلاً اس بیماری میں زیادہ روغن اور زیادہ مصلح کا استعمال
منع ہے اور میٹھی چیزیں بھی زیادہ نہ کھانی چاہئیں اور شراب کا تو نام ہی نہ لو اس کفایت
سے کہ سو بہاگہ + رودون میں صفر کے نہ پہنچنے سے قبض یا نفع شکم ہو جائے تو اس کا
علاج کریں جیسا کہ بعضھی اور قبض کے بیان میں پہچے بتلایا گیا ہے + مدرات اور معرقات
کا استعمال کریں تاکہ شیب اور سینہ کھل کر آجاء۔ یہ بیماری مرمن ہو جاوے تو مقویات
کا استعمال کریں پیچھے کوئین فولاو وغیرہ + علامات ردیہ کا علاج مفرحات سے کریں
عصبی نفا مت کے اندر پہنچنے سے مرض ہو گیا ہو تو مسہکات و مدرات اور
معرقات کا استعمال کریں + خون کے جریان کے روکنے لئے قابضات اور ادویات
سما بس الدم کا استعمال مناسب ہے + جلد کی خواش رفع کرنے کے لئے سوڈا
یا یو۔ ٹاش کے مرکبات ہمراہ انسین کے دین + اس مرض کے علاج
میں یہ بات یاد رہے کہ بعد رفع ہو جانے روک کے بھی کچھ عرصہ تک چہرہ
اور جسم پر زردی قائم رہتی ہے۔ پس جب دیکھیں کہ روک ہٹ گیا ہے
تب ادویات کا استعمال موقوف کر دیں۔ جسم میں صفر کی موجودگی پائی جاوے
تو لگا ہے لگا ہے جلاب دین +

اک۔ ٹے۔ رَس۔ مینو۔ نا۔ ٹورم

چھوٹے بچوں کو بعد پیدائش کے یرقان ہو جاتا ہے اور تین دن کے اندر خوب بڑھ کر سات سو چودہ دن کے اندر رفع ہو جاتا ہے پیشاب رسیمن زرد اور پاخانہ سفید ہوتا ہے۔

اسباب۔ جگر کی باریک رگوں میں صفرا کا جمع ہو جانا اور گاہے گاہے بند ہو جانا یا سکر جانا یا پیدا نہ ہونا بھری صفرا کا یا بند ہو جانا صفرا کی نالی کا گٹھاڑ ہی بنت کے سبب *۔

علاج۔ چوتھائی یا نصف گرین کیا۔ لو۔ مل کہلا کر کٹر ایل کا جلاب دیوین *۔

ان۔ لائج۔ منٹ آف می۔ اپیلین

علامات۔ محال یا تو اوپر یا نیچے کی طرف بڑھ جاتی ہے اور کبھی تو علامت اور کبھی بڑھ کر سخت ہو جاتی ہے بڑھتی ہوئی تلی پر بڑھنے سے آواز ہٹوس پیدا ہوتی ہے مین لینے میں تکلیف اور خشک کہانسی ہوتی ہے اکثر توفیق لیکن بعض دفعہ دست لگاتے ہیں بجایر لاغر و کمزور اور کل علامات انے۔ میا کی پائی جاتی ہیں۔ اور یہ مرض اکثر تپ لرزہ کے باعث پیدا ہوتا ہے *۔

علاج۔ اگر درد کی سیقت شدت ہو اور بیمار طاقتور تو مقام درد پر دیکھتے ہیں جو کین لگا دین اور تکمید کریں نہیں تو ٹیکر آف آئیڈ۔ ٹوین لاپڈ آئیڈ۔ آئیڈ۔ آف مکرری کی مالش کریں اور یہ نسخہ کہانے کو دیوین *۔

لنسخہ۔ سلفٹ اف ایرن ۴ گرین ۴ کوئین ۴ گرین ۴ ڈا بیکیوٹ سلفووک اسٹ
۱۰۔ بوند * پانی ایک آونس * دن میں تین دفعہ پلاوین۔ قبض ہو تو اس نسخہ کی
فی خوراک میں دو ڈرام سلفٹ اف گٹنے شیا ملاوین اور اس مرض میں

ایوڈائیٹڈ اف ایرن اور سائٹریٹ اف ایرن - انڈا کوئین اور سائٹریٹ اف ایرن
 انڈا - ایمو - نیبا بھی میسے - بیمار کی غذا ہری ترکاری اور گوشت کی ہونی چاہئے ۔

اب - ڈا - مے - نل - اینو - ریزم

شکم کا ہی اینو - ریزم طبیعت کے ماحظ میں آتا ہے جو شکم کے حصہ ایار - ٹامین پیدا ہوتا ہے
 لیکن سی - لی - راکٹ - راکٹ - سبس میں یا اسکی کسی شاخ میں خاصکر اسکے جگر کی شاخ
 میں یا کسی مے - سن - ٹری کی شریان یا گڑھے کی شریان یا کسی جانب کی ای - لیاک
 شریان میں بھی اینو - ریزم پیدا ہو سکتا ہے ۔

علامات شکم کا اینو - ریزم ایار میں کسی حصہ میں پیدا ہو سکتا ہے مگر اکثر
 ایک ہی جانب کو پڑتا ہے خاصکر بائیں جانب اکثر معلوم ہوتا ہے - یہ قاعدہ ہے
 کہ شکم کے اینو - ریزم کی شکل اکثر گول سی ہوتی ہے اور ابھار ہوتا ہے اور دبائے
 سے دب چہی جاتا ہے - یہ بھی قاعدہ ہے کہ شکم کا اینو - ریزم اکثر ایک ہی جگہ پر قائم
 رہتا ہے ہلائے تو اوپر اوپر حرکت نہیں کرتا اور نہ دم لینے سے اس میں حرکت پیدا
 ہوتی ہے ۔ شکم کے اینو - ریزم میں دل کی پہلی حرکت کے ساتھ خاصکر اور گاہے گاہے
 دوسری حرکت کے ساتھ بھی ضربان محسوس ہوتا ہے - ہٹو نکلے تو اُس سے آواز ٹھوس
 پیدا ہوتی ہے ۔ شکم کے اینو - ریزم کے ہونے کی علامتیں اکثر پشت کی طرف بائیں جاتی
 ہیں ۔ اس مرض میں عصبی درد اکثر ہوا کرتا ہے - بعض دفعہ یہ درد نہایت شدید اور دیر
 اوپر پہنچتا ہے اور دباؤ کے سبب کوہلے کے جوڑے کے فکڑے مسلسل کچ جاتے ہیں
 اور پشت کے فقرات چہل جانے کے سبب سے گہرا درد اور چھین سی ہوتی رہتی ہے
 ای - لا - راکٹ - ویدون یا پور - ٹل - دین کے دب جانے سے ایک یا دو ٹانگیں سوج
 جاتی ہیں گہرے گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیشاب دقت سے آتا ہے اور گردن

کی دیرید کے دب جانے سے پیشاب میں البیہ۔ من بھی پایا جاسکتا ہے دباؤ کے سبب سے جب اس پر۔ مایہ ناک شریان دب جاتی ہے تب دونوں حصے سکڑ کر چپٹے ہو جاتے ہیں * اینوریزم جب جگر کی شریان میں پیدا ہوتا ہے تب مجری صغیر اور پورٹل وینز کے دب جانے سے یرقان اور استسقا ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں ماضیہ بگڑ جاتا اور بعض دفعہ قبض بھی ہو جاتا ہے *

علاج۔ مریض کو بستر پر آرام سے لیٹے رہنا چاہئے اور اسکی غذا کا ایسا بندوبست کریں جس سے خون کا دورۂ تیز ہونا پادے مثلاً وزن کر کے برابر وقتوں میں صرف ہسٹید کہانے پینے کی چیزیں دیں جس سے مریض کی جان بچی رہے اور خون کی حالت ایسی ہو جاوے جس سے وہ آسانی سے جم جا سکے اور جہانک ہو سکے پینے کی چیزیں بہت کم دینی چاہئیں اور شراب کو گولی مارنی چاہئے۔ دوا کے طور پر ایسی ادویات کا استعمال کرنا چاہئے جن سے دل کی حرکت تیز نہ ہونے پادے اور خون جم جا سکے مثلاً ڈی جی ٹی ٹیٹز اور بلاٹ۔ دونوں یا ایکو۔ ٹائیٹ کا استعمال مناسب ہے *

مقالہ نهم

امراض اعضاے بول

ان امراض کے بیان سے پہلے گردن کی مختصر تشریح اور پیشاب کیونکر پیدا ہوتا ہے یہ بتا کر بتلانی ضرور ہیں۔ پس واضح ہو کہ گردے دو ہوتے ہیں اور لم۔ برسی۔ جن میں سوجان شپ کے چپ و راست قائم ہیں۔ شکل انکی قریب اندون کی سی ہوتی ہے اور ہر ایک گردے چار سے پانچ انچ تک لمبا اور دو انچ چوڑا ہوتا ہے۔ لمبا تھی سے تڑپتے تو دھجے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک بالائی اور دوسرا اندرونی * بالائی حصہ کو صطلاح میں گارڈلے کل پریشن

اور اندرونی حصہ کو مے - ڈیو - لری پور - شن کہتے ہیں یہ مادر ہے کہ کار - فٹی - کل
 پور - شن میں قریب سارے کا سارا سامان پیشاب پیدا کرنے کا ہوتا ہے اور
 مے - ڈیو - لری پور - شن میں قریب سارے کا سارا سامان اُس پیشاب کے بہا
 لے جانے کا ہوتا ہے چنانچہ کار - فٹی - کل پور - شن میں چھوٹے چھوٹے غدود ہوتے ہیں
 جنکو اصطلاح میں مل - پے - گی - ان - با - ڈیز اور عربی میں اجسام مل - نے - جیاتی
 کہتے ہیں - یہ غدود اسطور سے بنے ہیں کہ ان پر ایک غلافی خول ہوتا ہے اور اس خول
 کے اندر ایک شریان (ری - سن - ار - ٹری) ہوتی ہے - شریان مذکور کی شاخیں
 مل - پیچ کہا کر پہنچتی کے طور پر بجاتے ہیں اور اس گھنٹہ نما پہنچتی سے (مل - پے - گی - ان -
 با - ڈیو) دین لینے و ریدتہ ہو کر ان - فے - ری - ار - وی - نما کے - دایم
 خون لجاتی ہے *

جس غلافی خول کے اندر اجسام مل - نے - جیاتی ہوتے ہیں وہ ان سے پیشاب کے باریک
 نالیوں شروع ہو کر (ٹیو - بیو - لائی - یو - ری - نے - ٹرائی) گردہ کے اندرونی حصہ
 لینے مے - ڈیو - لری پور - شن میں اکٹلتے ہیں مگر وہ ان کا مے - ڈیو - لری پور - شن کئی
 حصوں میں منقسم ہے - محل ان حصوں کی مخروطی ہوتی ہے اور وہ بنتے ہیں پیشاب کی
 باریک باریک نالیوں سے جو شروع ہوتی ہیں اجسام مل - نے - جیاتی کے غلافی خول
 سے - ان مخروط حصوں کی نوکین مثل عورت کے پستان کے پٹھنوں کے ہوتی ہیں
 اور جیسے سر پستان میں ویسے ہی ان میں بھی پیشاب کے خارج ہونے کے لئے باریک
 باریک سوراخ ہوتے ہیں جن سے پیشاب قطرہ قطرہ ٹپک کر پیل - بوس - آف - کڈنے
 میں جمع ہوتا ہے اور وہ ان سے مجری بول کے راستہ مثلاً میں آگرتا ہے *

اوپر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ہر ایک گردہ میں ایک ایک ری - سن - ار - ٹری لینے گردہ
 کے شریان ایار - ٹا سے نکل کر جاتی ہے اور غلافی خول مذکورہ بالا کے اندر اُسکی

شافین بل پچ کہا کر ہندنی کی شکل بنجاتے ہیں جس پر وہ سے وہ غلافی خول بنتا ہے اس
 میں خور و خور کیسے ہوتے ہیں۔ کام ان کیسوں کا یہ ہے کہ شریان مذکور سے پیشاب کی
 مائیت یعنی پانی کو جذب کرتی ہیں۔ اور پیشاب کی باریک نالیوں کے پردہ میں
 جو کیسے ہوتے ہیں وہ قارورہ کے منجھ اجڑا یعنی پوریا اور پورک اسٹ وغیرہ کو
 اسی رسی بنن اور ٹری کے خون سے علیحدہ کرتے ہیں اور پیشاب کی مائیت کے ہمراہ
 گردہ کے پل۔ ویش میں بہا دیتے ہیں۔ پس یاد رہے کہ پیشاب بنتا ہے رسی۔ نل
 اور ٹری کے خون سے اور یہ کہ اس خون سے پیشاب کا پانی مل پے۔ گی۔ ان با۔ ڈیز
 میں بذریعہ غلافی خول کے کیسوں کے علیحدہ ہوتا ہے اور یہ کہ پیشاب کے منجھ اجڑا
 پوریا اور پورک اسٹ وغیرہ میں پیشاب کی باریک نالیوں کے چوٹے چوٹے کیسوں
 کے ذریعہ خون سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ قارورہ کے ملاحظہ سے مریض کی حالت اور نیز
 بیمار کی نسبت بھی بڑی بڑی باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن قارورہ کا ملاحظہ اس
 ترکیب سے نہ کیا جاتا ہے جس سے ویسی طبیب دیکھا کرتے ہیں کہ آپ تو گنا دیکھ لگا کر حقہ
 کی نئے منہ میں رکھ کر فرش کے پرلے سرے پر بیٹھے رہتے ہیں اور مریض بیچارہ گودات
 کا سیدھی کیوں نہ بولب فرش سے ہی چار قدم برسے ہنگامی کیطرح قارورہ کی شیشی ہاتھ
 میں لئے ہانا نہ تھا ہے کہ مبا و پیشاب کی چھوٹ سے کہیں حکیم جی کا فرش ناپاک نہو جائے
 حکیم صاحب دور سے اس قارورہ کی طرف ایسی تکی لگاتے ہیں جیسے کوئی بندہ ق کی
 شست لگا تا ہے اور سر ملا کر ذرا ہون کان کر کے اپنے ارد گرد کے شاگردوں کو فرماتے
 ہیں کہ میان دیکھنا اس قارورہ میں وہ قشورہ نظر آتے ہیں اور وہ رسوب دیکھنا ہی فیتہ
 ہیں حکیم صاحب نے کیا خاک دیکھا قشورہ اور رسوب و بڑے بڑے عربی لفظوں کے
 بولنے کے سوا اگر دن کی کوئی حالت دریافت کی۔ پھر طرفہ یہ کہ لوگوں میں مشہور
 کرتے ہیں کہ ڈاکٹر لوگ قارورہ کی بابت کچھ بھی نہیں جانتے اور نہ انکو نبض دیکھنی آتی ہے

قربان انکی عقل کے۔ اس کتاب کے حصہ اول میں تھوڑی اور نبض کا بیان کرنا ہے۔
 انہو ملاحظہ فرما دیں تو انکے مین کھل جاویں کہ کان تھوڑے کا امتحان اس طرح کرتے ہیں۔
 اور نبض سطح دیکھتے ہیں جبکہ تشریح سے واقفیت زمین سے وراثت یا توڑا گیا ہو۔
 سکتے ہیں۔ انانیت اور سہل دہرجی اور بات سے اور نصف اور۔

اول یو۔ رمی۔ میا

تشریح سے یہ بات ظاہر ہے کہ انسان کے جسم میں جو فضل یعنی میل پیدا ہوتا ہے گروسٹا ہوتا ہے۔
 بذریعہ پیشاب کے جسم سے خارج کر دیتے ہیں اور یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ پیشاب میں
 جو اجزا ہوتے ہیں وہ جسم کا میل ہوتا ہے۔ اگر خون سے علیحدہ نہ کیا جائے اس میں رہ جا
 تو ضا و بر پا کرتا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ بیماری کے سبب سے اگر گردے بٹکا رہا ہو بہتر
 تو پیشاب اچھے طور پر پیدا ہوگا اور جسم کا میل جسم ہی کے اندر رہ جائیگا۔ غرض اگر
 کی بیماری کے سبب جب پیشاب اچھے طور پر پیدا نہیں ہوتا ہے تب خون پیشاب
 اجزا جمع ہو کر اسکو نہ ہر لاکر دیتے ہیں۔ جب یہ نہ ہر لاکر خون جسم میں دور کرتا ہے۔
 انواع و اقسام کی اندیشناک علامتیں پیدا ہوتی ہیں اور نظام عصبی میں خرابی پیدا ہوتی
 ہے چنانچہ جب کسی سبب سے انفرائی۔ ٹس کی بیماری ہو جاتی ہے اور پیشاب کے ہونا
 البیہ۔ من بکثرت اخراج پاتا ہے تب یو۔ ریا اور یو۔ رک اسٹڈ خارج نہیں ہونے پاتے
 بلکہ خون ہی میں رہ کر ہلکے سلا متین پیدا کرتے ہیں کیونکہ پیشاب کے یہ دونو جزوہ
 کے قسم سے ہیں تندرستی کی حالت میں یہ دونو موذی مادے پیشاب کے ذریعہ جسم سے
 خارج ہوتے رہتے ہیں۔ مگر جب خون میں رہ جاتے ہیں تب اسکو نہ ہر لاکر دیتے ہیں کہ
 جس سبب سے یو۔ رمی۔ رکٹ کو۔ مادے خون میں یو۔ ریا اور یو۔ رکٹ لگائے گئے رہتے
 سے جو بیہوشی پیدا ہوتی ہے اور یو۔ رمی۔ رکٹ کرن۔ دل۔ شن دینے خون میں یو۔ ریا

اور یو۔ رک۔ اسٹڈ کے ٹرکے رہ جانے سے جو تشنج پیدا ہوتا ہے (پیدا ہوتے ہیں۔
یو۔ ریادریو۔ رک۔ اسٹڈ کے خون میں رک جانے سے تین طور کے زہر کی علامتیں
پیدا ہو سکتی ہیں مثلاً ایک قسم تو وہ ہے جس میں نشہ تدریج یا دفعتاً ہو جاتا ہے اس
حالت سے بیمار بیکل ہوشیار ہوتا ہے لیکن آخر کار بالکل بیہوش ہو جاتا ہے
اور دم خراٹے سے لیتا ہے جیسے اینون کے زہر میں ہوا کرتا ہے + دوسری قسم اس
بیماری کی وہ ہے جس میں بیمار کے سارے جسم میں دفعتاً مرگی کی طرح تشنج ہونے لگتا
ہے اور جب تک فوت جاری رہتی ہے تب تک بیمار بالکل بیہوش رہتا ہے + تیسری قسم
میں بیہوشی اور تشنج دونوں ایک ہی دفعہ شروع ہو جاتا ہے + یو۔ ری۔ میا اور خاص
مرگی کے تشنج میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بیہوشی ایسی گہری ہو سکتی ہے کہ بیمار ہوشیار
نہیں ہو سکتا یا بیکل ہوش میں آتا ہے اور تشنج فوت فوت ہو کر رہتا ہے چہرہ
بیمار کا پیلا پڑ جاتا ہے جسم مرطوب اور حالت صحت سے کم گرم اور پتیلیاں اکثر پہلی ہوتی
ہیں لیکن یو۔ ری۔ میا کی خاص علاماتوں کے شروع ہونے سے پہلے چند علامات مندر
پیدا ہوتی ہیں چنانچہ

علامات مندرہ۔ پہلے دروسر ہوتا ہے۔ اور نگہ۔ آتی ہے۔ سوتے وقت
خراٹے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تھوڑے عرصہ کے لئے گاہے گاہے خیالات منتشر
ہو جاتے ہیں بیمار دفعتاً اندھا ہو جاتا یا بصارت دھندلی ہو جاتی ہے لیکن یہ بات
تھوڑے عرصہ تک رہ کر رفع ہو جاتی ہے جس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ مریض کمزور
ہو جاتا ہے۔ صفر کا غلبہ ہوتا ہے مردی معلوم ہوتی ہے جی متلاتا ہے ہوتی ہے۔
گاہے گاہے شدت سے دست لگاتے ہیں۔ بعد منہ منہ سے بوا میو۔ نیا کی آتی ہے۔
پس یاد رہے کہ جب گردن کی بیماری میں ان علامات مندرہ میں سے کوئی علامت
پیدا ہو جاوے تب یہ معلوم کرنا چاہئے کہ پیشاب کے اخراج کا زہر یا تو نظام عصبی

یا خون میں سرایت کر گیا ہے اور اگر بیہوشی یا تشنج ہو جاوے تو اسی نہ ہر کے سبب سے ہو جاتا ہے ۔

تشخیص - پیشاب کے اخراج سے زہر ہونا بعض دفعہ شکل سے پہچانا جاتا ہے یعنی اگر احتیاط سے دیکھا جائے تو ان بیماریوں کا معاملہ ٹپسکتا ہے جن میں بیہوشی اور تشنج ہو کر رہتا ہے چنانچہ اس بیماری میں سرنگ - اور - پو - پلکسی اور ہنس - ٹے - ریا اور شراب اور ایفون کے زہر کی غلطی ہو سکتی ہے - لیکن گردوں کی حالت اگر دریافت کی جاوے تو یہ مرض آسانی سے پہچانا جاسکتا ہے کیونکہ پیشاب کے اخراج کے خون میں رک جانا کے سبب سے جب بیہوشی یا تشنج ہونے لگے تو اکثر یہ پایا جائیگا کہ پیشاب یا تو بالکل بند ہو گیا ہے یا تھوڑا تھوڑا آتا ہے اور اس میں کثرت سے البیو - من ہوتا ہے یا پیشاب ہلکے رنگ کا پھیکا ہوگا اور اس میں یو - ریا کم اور البیو من ہی برائے نام ہوگا اور جب چہرہ یا ہاتھ پاؤں میں درم بھی ہوتا ہے تب اس بیماری کے ہونے میں شک نہیں رہتا ۔ یو - رسی - سیا کی بیہوشی اور - پو - پلکسی یا ایفون یا شراب کی بیہوشی میں یہ فرق ہے کہ یو - رسی - میا میں بیمار کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے اور جسم کی حرارت کم جاتی ہے - پتیدیاں آنکھوں کی پھیلی رہتی ہیں - قلع نہیں ہوتا ہے جس کو بھی مغفود اور کبھی کم ہو جاتا ہے اور عضلے ہلکتے ہیں ۔

علاج - اس بیماری کے علاج میں دو باتیں مد نظر رکھنی چاہئیں - اول خون کو یو - ریا اور یو - رک اسڈ سے پاک کرنا - دوم گردوں کو حالت صحت پر لانا تاکہ اپنا معمولی کام حقہ ممکن ہو قریب صحت کی حالت کے کر سکیں ۔

کو - ما اور کن - ول - شن کے ظاہر ہونے سے پہلے اگر مرض ہمارے علاج میں آوے تب مریض کو فوراً تاکہ دہرین کہ بستر پر لیٹا رہے حرکت نہ کرے گاؤ اسکے پیشاب میں تھوڑا ہی کیون نہ البیو - من آتا ہو - کیونکہ کچھ عرصہ آرام سے پیشاب میں

ایہ من کم آئے لگتا ہے اور حرکت سے البیو من بہت زیادہ خارج ہوتا ہے۔
 اس کی خفیف قسم اسکار - لے - ٹے - نا اور ووف - ہے۔ دریا اور جل کی حالت میں
 سردی کے سبب بابرش میں ہیگنے سے پیدا ہوتی ہے۔ غرض اس خفیف قسم
 یو - سی - میا میں کچھ عرصہ تک بستر پر آرام کرنے سے مقدار البیو - من کی کم ہو جاتی
 ہے اور بلو - دریا اور یو - رگ - اسٹ زیادہ خارج ہونے لگتا ہے۔ علاوہ آرام کے
 اس جاری میں غذا کا بھی بڑا پرہیز چاہئے مثلاً گوشت، مچھلی، انڈے وغیرہ حیوانی
 اغذیہ ایک قلم موقوف کر دینا چاہئے۔ مگر دودھ کا چندان مضایقہ ہین - بجا کر کومرف
 بنائی غذا کہانی چاہئے۔ کیونکہ عرف بناتی غذا کے استعمال سے جسم میں یو - رگ - اسٹ
 بہت کم پیدا ہوتا ہے۔ اس پر آؤر بیماریاں بہت کم عارض ہوتی ہیں اور گودوز
 پر سخت ہن بہت کم پڑتی ہو کہ گوشت کی غذا سحر - دریا زیادہ پیدا ہوتا ہے اور اس ہر کے
 خارج کرنے کے لئے گردن کو سخت ہی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔

۱۰۔ اسکے باب میں سل - فٹ - ان - گنے - شیا کا استعمال کرنا چاہئے مثلاً نسج
 سلفٹ - ان - گنے - شیا ۱۲ اڈام - صاف پانی ۳ - آونس - بمقدار ایک ایک انز
 کے چار چار گھنٹہ بعد پلا دین تاکہ شب و روز کے اندر پانچ چھ دست خوب کھل کر آجائیں۔
 اس خفیف قسم کے مرض میں معرات کے استعمال کی ضرورت ہین پڑتی - یو - سی - میا
 میں بنض اکثر سخت ہوا کرتی ہے۔ غرض بنض کے پھیلانے کے لئے سسی - لی - سے لٹ - ان
 سو - ٹیم نہایت عمدہ دراہے۔ اسکے استعمال سے خوب کھل کر پسینہ آجاتا ہے اور
 اس پسینہ کے ذریعہ خون سے یو رگ - اسٹ خارج ہو جاتا ہے کیونکہ خون میں یو رگ - اسٹ
 کے ہونے سے بنض سخت ہو جاتی ہے اور کن - ول - شن ہونے لگتا ہے۔ ساتھ ہی اسکے
 سلفٹ - ان - گنے - شیا کا بھی استعمال جاری رکھ سکتے ہیں۔

ملاحظہ کر کہ کہ ساری نسبت اور رگ کے زیادہ تر سخت ہو مثلاً جیسا مرض سکاٹے - ٹے - نا

کے بعد یا ایام حمل میں یا کسی اور سبب سے ہوا کرتا ہے پیشاب میں البیو۔ من
بجھرت موجود ہوتا ہے۔ چہرہ اور ناہتوں پر درم ہوتا ہے۔ دروسر رہتا ہے۔
بعض دفعہ نہایت شدت سے آنکھوں کے سامنے کھیاں اڑتی سی نظر آتی ہیں
بیہوشی کا سرگرم ہوا معلوم ہوتا ہے۔ بصارت میں فرق پڑ جاتا ہے اور چہرہ کے
عضلے اکثر ہلکتے رہتے ہیں۔ اس اخیر کی علامت پر خاص توجہ کرنی چاہئے۔
مثلاً پیشاب میں البیو۔ من بجھرت ہو۔ بات چیت کئے وقت بیمار کے چہرہ کے
عضلے ہلکتے ہوں تو یقین جان لو کہ اب کوئی دم میں کن۔ دل۔ شن۔ ادو کو۔ ہا۔ دینا
ہونیوالا ہے۔ پس ایسی صورت میں مریض کو بستر پر لٹا دینا چاہئے اور آتش جو یا دو۔ ۵
یا آب گرم یا صرف ساوا پانی پلانا چاہئے۔ اب ایسی دو دین جس سے خوب کھلکے پسینہ
اور اجا بہت جائے مثلاً ۱۰ اگر بن کیا۔ لو۔ مل۔ ۳۰ گرین نا کے۔ ٹر اور اس میں
ایک قطرہ کر۔ وٹن آئیل کا چوڑ کر فوراً کھلا دین۔ بیمار کو خوب گرم لحاف اڑنا دین
اور ہلدی و نعیم گرم باقی کی بوتلیں لگا دین۔ اس علاج سے پسینہ اور پاخانہ خوب
کھلکے آجائیگا اور ساتھ لنگے بہت ساحصہ یورک اسٹک کا بھی خارج ہو جائے گا
جسکے خون میں ہونے سے کن۔ دل۔ شن ہو جاتا ہے۔ پے۔ لو۔ کار۔ پین کا استعمال
بھی کر سکتے ہیں لیکن جب یورسی۔ میا بعد بچہ پیدا ہونے کے ہو جاتا ہے تب
بعض دفعہ اس دوا سے بحوض فائدہ کے نقصان متصور رہے کیونکہ ایسا دیکھا گیا ہے
کہ جب یہ دوا اس حالت میں دی جاتی ہے تب کن۔ دل۔ شن جلد شروع ہو جاتا
ہے۔ شاید اسکا سبب یہ ہے کہ اسکے استعمال کرنے سے دم لینے میں تکلیف
ہوتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دم گٹھ جاتا ہے یہی سلامتین کافی ہوتی ہیں
کن۔ دل۔ شن کے پیدا کرنے کی۔ بر تقدیر پے۔ لو۔ کار۔ پین کا استعمال کرنا
بھی منظور ہو تو ایک کام کرین کہ جلد کے اندر پے۔ لو۔ کار۔ پین کی پچکار دی کرنے سے

نصف گنیشہ پہلے مار۔ فائین کی پچکاری کر لین اور تب پے۔ لو۔ کار۔ پین کی پچکاری
 کریں کیونکہ مار۔ فائین مدد دیتا ہے پے۔ لو۔ کار۔ پین کے اثر کرنے کو اور کنڈلشن
 کی طرف طبیعت کے میلان کو بھی روکتا ہے۔ غرض اس علاج سے اجابت کہل کر آجاتی
 ہے اور پسینہ بھی بکثرت آجاتا ہے اور بغض جو پہلے سخت تھی جلد ملائم ہو جاتی ہے خون
 سے زہریلے مواد جلد خارج ہو جاتے ہیں کیونکہ اجابت اور پسینہ کہل کر آجانے سے مریض
 کو پیاس معلوم ہوتی ہے اور وہ اُن عرقیات کو خوب طرح پتیا ہے جنکا ذکر اوپر کیا گیا
 ہے جس سے زہریلا مادہ رقیق ہو کر آسانی سے خارج ہو جاتے ہیں اور پیشاب میں البیوسین
 کی مقدار بحد کم ہونے لگتی ہے اور گروے اپنا معمولی کام پھر شروع کرنے لگتے ہیں
 بیمار کے بستر پر فوراً لیٹ جانے پر نہایت تاکید کرنی چاہئے لیکن کس ترکیب سے لیٹنا
 چاہئے۔ اس بات پر ضرور توجہ کرنی چاہئے۔ مثلاً ہم جانتے ہیں کہ گردن کی بیماری
 کے سبب سے جب رانا۔ سار۔ کا ہو جاتا ہے تب صبح کے وقت بستر خواب سے
 اٹھتے ہی سر اور چہرہ پر زیادہ درم دکھائی دیتا ہے اور اسوقت در دوسر ہی زیادہ
 ہوتا ہے۔ سبب اسکا بہت صاف ہے کیونکہ لیٹے رہنے کی حالت میں پانی
 کا میلان و دماغ کی طرف زیادہ ہوتا ہے جس سے دماغ اور اُس کے پردوں میں زہر
 زیادہ مقدار میں رجوع کرتا ہے۔ پس دماغ کو دو طور سے صدمہ پہونچتا ہے یعنی ایک
 تو پانی کے دباؤ سے اور دوسرے بکثرت یو۔ ریا اور لیورک اسٹ کے ہونے سے
 پس بیمار کے لیٹنے کی ترکیب پر ضرور توجہ کرنی چاہئے۔ وہ ترکیب یہ ہے کہ پلنگ
 کے سرے کے کو بہ نسبت پائنتی کے اونچا رکھنا چاہئے مثلاً ایک فٹ یا ۱۸ انچ
 اونچا ہونا چاہئے۔ اس ترکیب کا نیک اثر جلد ظاہر ہو جاتا ہے یعنی سر کا درم
 بلند رفع ہو جاتا ہے۔ پانی کا میلان سر کی طرف کم ہو جاتا ہے اور دماغ پر کا دباؤ مٹ
 جاتا ہے اور زہریلے مادہ کا بہت حصہ کم ہو جاتا ہے۔ ورنہ بیمار کا سر اونچا نہ رکھو گے

بود و سر پڑھتا جائیگا۔ چہرہ زیادہ سو جتا جائیگا۔ بنیائی آن کے آن میں کم ہوتے
 جائیگی اور دماغ میں زہریلے مادوں کا غلبہ ہوگا۔ مگر یہ ساری باتیں سر کے اوپر کھینچنے
 سے نہیں ہونے پاتیں۔ کیا۔ لورسل اور کرو۔ جن۔ آئیل اور نائٹھر کے استعمال سے
 جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے جب ست آجا دین تب سلفٹ اف گئے شیا کے ذریعہ
 دستوں کو جاری۔ کہنا چاہئے۔ اور ضرورت ہو تو گرم کپڑے اڑا کر اور گرم
 گرم عریات پلا کروں تک پسینہ جاری کہہ سکتے ہیں اور اس بات کی مدد کے
 لئے سی۔ لی۔ سی۔ لٹ۔ اف۔ سو۔ وٹیم۔ سے کوئی اور دوا بہتر نہیں ہے۔ لیکن فرض
 کرو مریض تمہاری حاملہ ہے۔ پشیمین اسکے البیو۔ من بکثرت ہے اور ساتھ ہر
 کے کو۔ ما اور کن۔ دل۔ شن بھی ہوتا ہے۔ غرض ایسی حالت میں ایک تہائی یا نصف
 گرین مار۔ فائین کی بچکا رہی جلد کے اندر فوراً کر دین۔ ضرورت ہو تو دوبارہ کرین۔
 سر مریض کا بہ نسبت باؤن کے ڈیڑھ فٹ اونچا رکھیں اور۔ اگر گرین کیا۔ لورسل میں ایک
 یا دو بوند کر دین آئیل کے ملا کر۔ ۳۰ سے ۶۰ گرین نائٹھر کے ہمراہ کہلا کر مریض کو لمحوں
 میں لمبیٹ دین اور پہلوؤں پر آب گرم کی بوتلیں رکھ دین۔ جب مار۔ فائین کی
 بچکا رہی سے کن۔ دل۔ شن رک جاوے اس وقت تمہاری مرضی ہو نو ایک گرین کے
 چٹے یا نصف گرین پے۔ لو۔ کار۔ پن کی بچکا رہی جلد کے اندر کر دو۔ جب مرض کے
 ابتدائی اندیشہ دور ہو جاوین تب سلفٹ اف گئے شیا کے استعمال سے دستوں
 کو جاری رکھیں اور سی۔ لی۔ سی۔ لٹ۔ اف۔ سو۔ وٹیم کے استعمال سے پسینہ جاری
 رکھیں اور بیمار کو اس ترکیب سے لٹائے رکھیں جس سے سر بہ نسبت ٹانگوں کے اونچا

دوم اکیوٹ سپوری۔ ٹیو نفرائی ٹس

علامات۔ مکر کے ایک یا دو طرف گہر اور د اور بے چینی معلوم ہوتی ہے۔ ہر درد کی ٹیس رائون اور حسیون تک پہنچتی ہے۔ بار بار بھی متلاتا ہے اور ابکائی آنی مین۔ پیشاب تھوڑا بہت منج رنگ کا اور ساتھ درد کے آتا ہے شدت کا بھاری ہوتا ہے پیشاب مین پیپ پائی جاتی ہے۔ اگر ڈنبل پیدا ہو جاوے تو گردہ کے پل۔ دس مین بہوٹ سکتا ہے اور پیپ اسکی نائزہ کے راہ خارج ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ ڈنبل گہرا و چڈون مین بہوٹ جاتا ہے اور جب گردہ مین ڈنبل پیدا ہوئیہ الہا ہوتا ہے تب علامات کٹ۔ ٹکٹ فیور کی پیدا ہوتی مین اور اسی حالت مین بیمار اکثر مر جاتا ہے **اسباب** خون کا بگڑ جانا۔ ضرب و زخم۔ پیشاب کا بند ہو جانا۔ گردہ مین تھہری کا پیدا ہونا۔ اور تیز نہر کا کہنا۔

علاج۔ کمر چوکیں یا گلاس لگا دین اور بیمار کو آب گرم مین بٹھادین۔ اور ایک زوڈا ٹر نکلیں یا آب ویکوڈ برس پاؤڈر اور اسے۔ ٹٹ اف ایونیا کا استعمال کریں اور مرض کے اخیر درجہ مین کونین اور معدنی تیزاب کام مین لادین اور غذا مقوی مین۔

سوم برائی ٹس ڈوینز

یہ بیماری دوسم کی ہوتی ہے ابسا اکیوٹ یعنی حاد۔ دوسری کرائاک یعنی مزمن۔

اول اکیوٹ برائی ٹس ڈوی۔ نیز

اسباب کثرت شراب خواری۔ فاذکشی۔ سردی کا لگنا۔ یا بارش مین ہیگنا۔ مرض اس کے پیشاب ہاضمہ کا زہر وغیرہ۔

مامیت - اکیوٹ برائی - اُس ڈیزیز میں حقیقت اُس پلے - تھے - لی - ام کے
 کیسے بنتا ہو جاتے ہیں جو پیدار بار بار بک پیشاب کی نالیوں دٹیو - بیو - لائی
 یو - رمی - نے - خرائی) کے اندر ہوتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کیوں کو بک
 ایسے غیر طبعی مادہ کی علیحدہ کرنا پڑتا ہے جو حالت صحت میں نہیں پیدا ہوتی اگر وہ مادہ
 طبعی ہی ہو پھر ہی اس مرض میں کثرت سے پیدا ہوتا ہے - غرض اس کثرت کار کے
 سبب سے ان کیوں میں تغیرات واقع ہو جاتے ہیں اور انکی پرورش میں بھی خلل
 جاتا ہے تب جلد جلد پیدا ہو کر کیسے جھڑنے لگتے ہیں اور جمع ہو کر پیشاب کی نالیوں
 کو جو گروہ کے مے - ڈیو - لری یوریشن میں ہوتے ہیں بند کر دیتے ہیں - اس ترکیب سے
 جب وہ نالیان مسدود ہو جاتی ہیں تب فاسد مادہ پیشاب کے راہ خارج ہونے نہیں
 پاتا بلکہ خون ہی میں رہ جاتا ہے اور وہ خون بگڑ جاتا ہے جس سبب سے بیماری اُڑ بھی
 ترقی پکڑ جاتی ہے علاوہ ازیں اس بیماری میں آذر خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ
 مل - پے - گے - آئن باڈیز (اجسام مل - نے - جیائی) کے دوران خون میں کاوٹ
 پڑ جاتی ہے جس سے پیشاب کی نالیوں کے خول میں خون کا فاسی - برین اور سیرم
 جمع ہو جاتا ہے - نتیجہ اسکا یہ ہوتا ہے کہ وہ سیرم پیشاب میں مل جاتا ہے اور اس واسطے اس
 مرض کے پیشاب میں البیو - من پایا جاتا ہے) اور فاسی - برین حسب قاعدہ جب جھن
 لگتا ہے تب اپنے - تھے - لی - ام سے جڑے ہوئے کیوں کو بھی اپنے ساتھ پہانس
 لیتا ہے اور اُسی منجمد حالت میں کیوں کو پہانسے ہوئے اور پیشاب کی نالیوں کے خول
 کی شکل میں سمیٹوں کی طرح بک پیشاب کے ساتھ خارج ہو جاتا ہے چنانچہ اس واسطے جب
 مرض کے پیشاب کے تلچھڑ کو بار بک میں سے دیکھتے ہیں تب اپنے - تھے - لی - آل
 کاسٹ نظر آتے ہیں جنکی تصویر اس کتاب کے حصہ اول میں دی گئی ہے (حیکو دیکھو)
 علاوہ ان سائچون کے اُس پیشاب میں خون کے کیسے بھی پائے جائینگے - جب یہ بیماری

ٹھہک ہو نیوالی ہوتی ہے تب دونوں گردے خون سے پُر ہو جاتے ہیں مگر اکثر بڑھ کر
 بہا رہی ہو جاتے ہیں اور رنگ اُنکا ہلکا زرد ہو جاتا ہے اور اُن پر جا بجا بے ہوشے
 خون کے دھبے پائے جاتے ہیں۔ باریک بین سے دیکھیں تو وہ پیچہ پریشاب کی
 نالیان جو گردہ کے بالائی حصہ پر ہوتی ہیں (کارٹیکل پوریشن) پھیل جاتی ہیں اور
 اینین اُپے۔ تپے۔ لی۔ ام کے چڑھے ہوئے کیسے اور ایک قسم کا داند دار مادہ بھی کثرت
 سے ہوتا ہے جس سبب سے وہ نالیان بند ہو جاتی ہیں مگر جو حصہ ان پیشاب کی نالیوں کا
 گردوں کے مے۔ ڈیلو۔ لمری حصہ میں ہوتا ہے اُس میں بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے
 کہ جیسے اسکار۔ لیٹ فیور اوپر چھپک کی بیماری میں بدن پر بہت کم یا بالکل ملنے
 نہیں پیدا ہوتے ہیں اسی طور پر اس بیماری میں اگرچہ پیشاب میں البیو۔ مین پایا
 جاتا ہے اور ڈراپ۔ سی کی علامتیں بھی موجود ہوتی ہیں تاہم اُس پیشاب میں
 اُپے۔ تپے۔ لی۔ ام کے کیسے نہیں ہوتے۔ لیکن اس صورت میں ایسا ضرور ہوتا ہے
 کہ مریض کا خون نہایت درجہ پر زہر ملا ہو جاتا ہے اور مرض کی علامتیں بھی نہایت
 زور و شور سے ظاہر ہوتی ہیں کیونکہ طبیعت اُس موذی مادہ کو دفع نہیں کر سکتی ہو۔
علامات۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب مرض اکیوٹ شروع ہوتا ہے تب بیمار کو جلا
 چڑھ آتا ہے بعد ازاں بخار ہو جاتا ہے۔ سر درد کرنے لگتا ہے۔ بے چینی ہوتی ہے۔ کمر
 میں بوجہ اور دیمبا دیمبا اور دیمبے لگتا ہے۔ بیمار کا جی متلاتا اور تپے ہونے لگتی ہے
 اور اس بیماری میں شروع ہی سے انا۔ سمار کا کی علامتیں پیدا ہونے لگتی ہیں
 چنانچہ پہلے چہرہ سوخ جاتا ہے اور تبارے بدن کے کن۔ کنک۔ ٹیوٹے ریشو میں
 پانی پیدا ہونے لگتا ہے اور بعض دفعہ پلو راکھی تھیلی اور دیگر سیرس ممبرین کے جوف
 میں بھی پانی جمع ہو جاتا ہے لیکن شاذ و نادر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مرض میں استسقا
 نہیں بھی ہوتا ہے لیکن یہ بات تب ہوتی ہے کہ جب اس مرض میں صرف ایک ہی

گردہ مبتلا ہوتا ہے کیونکہ جب تک ایک گردہ تندرست رہتا ہے اور خون میں لیسہ مادہ کو جمع ہونے نہیں دیتا ہے تب تک ڈراپ۔ سی کی بیماری بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ لیکن چاہے انے۔ سارے کا ہو یا نہ ہو بیماری کو پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہو اور پیشاب تھوڑا تھوڑا اور سیاہی مائل آتا ہے اور بعض دفعہ بالکل پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ برائی۔ ٹس ڈیزیز میں جو پیشاب خارج ہوتا ہے اس میں خاصیت برائی جاتی ہیں۔

پیشاب کی خاصیت برائیں ڈیزیز میں

خون کے ہونے سے اور رنگت کے بکثرت ہونے سے پیشاب کا رنگ سیاہی مائل یا ہو ر یا میلا مٹیج ہوتا ہے۔ اس پیشاب کی ایسی۔ سی۔ ٹیٹ گرائی زیادہ ہوتی ہے چنانچہ ۱۲۵ یا ۱۲۱ یا ۱۲۰ بلکہ اس سے بھی بعض دفعہ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ پیشاب ہمیشہ ترش ہوتا ہے۔ بواسکی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے گوشت کے دیوں کی ہوتی ہے۔ پیشاب کے نیچے ہو رے رنگ کی تلچھٹ بکثرت بیٹھ جاتی ہے اور یورٹم کے مرکبات بھی کثرت سے نشین ہو جاتے ہیں۔

کیمیائی ترکیب امتحان کریں جس ترکیب کو دیکھو حصہ اول باب قارورہ میں (تقریباً) پیشاب میں اس کثرت سے البیو مین پایا جاتا ہے کہ جوش دیتے ہی بعض دفعہ سارے کا سارا پیشاب جم جاتا ہے۔ اس میں یو۔ ریہ کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے لیکن کیکسٹ کی مقدار قریب صحت کی حالت پر ہوتی ہے۔

تلچھٹ کو بالیک پیچ سے دیکھیں تو پیشاب میں خون کے کیسے پائے جائینگے بعض صورتوں میں ان کیپوں کی خاصیت بدل جاتی ہے اور گردوں کے پائے۔ تے۔ لی۔ ام کے کیسے تھوڑے بہت پہلے ہونے یا غبار کی طرح یا دانہ دار یا کینڈر فوٹے

ہوئے ہوتے قاحی۔ برین کے خرد و ذرات اور پہلے پہل خون اور اپنے ہر مین کے سانچے (دیکھو تصویر باب قار و رہ مین) بکثرت پائے جاتے ہیں اور جب گرا۔ نیو۔ لہر کا سٹ بھی (دیکھو تصویر باب قار و رہ) یا تو کھلے طور پر یا پھر مین پہننے ہوئے ہوتے ہیں۔

یاد رہے کہ اس مرض میں جس قدر زیادہ نقصان گردون کو پہونچے گا اور یہ بیماری جس قدر زیادہ اکیوٹ ہوگی اسی قدر پیشاب کی مقدار بھی کم ہوگی اور اسی قدر خون بھی زیادہ زہریلا ہو جائیگا اور بیمار کو ماک کی حالت میں ہو کر جلد تر مر بھی جائیگا۔ جب یہ مرض رو بصحت لائیو الا ہوتا ہے تب پہلے پہل پیشاب تین بتی کے آثار نظر آتی دیتے ہیں یعنی اسپین البیو۔ من اور اپ۔ تے۔ لی۔ ام کے کیسے کم ہونگے اور وہ اجزا زیادہ ہو جائیگے جو ابتدا مرض میں کم ہونگے تھے خاص کر پانی اور یو۔ ریا اور کلورائیڈ کی قسم کے نمک پیشاب میں زیادہ پائے جائیگے۔ پیشاب میں ان چیزوں کی مقدار جو خون زیادہ ہوتی جاتی ہے ڈراپ۔ سی کی علامتیں بھی جلد تر رفع ہونے لگتی ہیں۔ اس حالت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض شب و روز کے اندر چار سے چھ پانیٹ تک پیشاب کرتا ہے جو پیشاب صحت کامل تر بات اور دن میں دو یا ڈھائی یا تین پانیٹ سے زیادہ نہیں آتا۔

تشخیص۔ اس بیماری کے پیشاب میں البیو۔ من ہوتا ہے اور پیشاب کی لائیو کے سانچے پائے جاتے ہیں لیکن البیو۔ من کے ہونے سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ گردون کی ساخت بگڑ گئی ہے کیونکہ گردون کی ساخت کے بگاڑ کے علاوہ پیشاب میں ان سببوں سے بھی البیو۔ من پایا جاسکتا ہے جیسے خون کے پتلا ہو جانے سے جیسے انے۔ میا میں ہو جاتا ہے۔ اور گردون کی عروق شریحہ میں اجتماع خون کے ہو جانے سے خواہ سردی کے سبب خواہ چھپک یا رو۔ پیو۔ لا کے سبب یا کسی

انڈرونی عضو کے انفلامیشن کے باعث اور ان بیماریوں میں بھی پیشاب میں
 البیو-مین پایا جاسکتا ہے چنانچہ دل اور جگر کی پُرانی بیماری میں ویریدون کے دوران
 خون میں جب مڑکا وٹ ہو جاتی ہے اور ہوسے-سے پیلیجیا اور پیے-را-پلی جیا
 کی بیماریوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ گردون کی رگوں پر جو اعصاب کی شاخیں
 ہوتی ہیں اور جنکے اثر سے وہ رگیں پسلیتی اور مسکرتی ہیں وہ شاخیں مافی ہو جاتی
 ہیں تب گردون کی رگیں تنو اچھی طرح پسلی سکتی اور نہ سسک سکتی ہیں غرض بصورت
 میں بھی پیشاب کے انڈر البیو-مین پایا جاسکتا ہے۔ اور پل-وس کی بیماری اور
 گردے کی یوری-ٹرائڈرمانڈ اور نائزہ کی بیماریوں میں بھی بعض دفعہ پیشاب میں البیو-مین
 پایا جاتا ہے۔

اور جب شکم کی کوئی رسولی یا رحم محمولہ دی-نا-کے-وایا گردون کی ویریدون کو دباتا
 ہے اور گردون کے کینک-یٹو-ٹے ریشیو کی بیماری میں بھی پیشاب میں البیو-مین
 پایا جاسکتا ہے۔

اگرچہ یہ ساری باتیں درست ہیں مگر بھی پیشاب میں عرصہ دراز تک البیو-مین
 آتا رہتا ہے سبب اسکا اکثر گردہ کی ساخت کا مرض ہوتا ہے لیکن اس صورت میں
 علاوہ البیو-مین کے پیشاب میں سانچے بھی پائے جاتے ہیں۔

انجام اس بیماری کا اگرچہ نیک ہو سکتا ہے مگر بھی محال ہے کہ دل میں ان بالوں
 کا اندیشہ رہتا ہے کہ اس بیماری میں گردون کی ساخت ایسی بگڑ جاتی ہے کہ وہ
 اپنی خدمت بجا نہیں لاسکتے اس سبب تشنج اور بیہوشی ہو جاسکتی ہے (یوری-میا)
 اور کسی سیرس پرودہ میں یا ہوا کی نالیوں میں یا خوشش میں انفلامیشن پیدا ہو سکتا
 ہے۔ اس مرض میں بعض دفعہ شدت سے دست رفتے جاری ہو جاتے ہیں بعض
 دفعہ دماغ کے بطون اور پرودہ پایا-مے-ٹرمین بھی پانی جمع ہو کر ہمارا-لو-پلکسی کے

مرض کے سبب مرجا سکتا ہے، فرض کیا کہ ان ساری آفات سے جان برہو ہو جاوے تاہم گردن کی ساخت میں اسقدر خرابی پیدا ہو سکتی ہے کہ صرف اسی سبب سے بیمار ہلاک ہو جا سکتا ہے۔ پس اس مرض کے علاج کے باب میں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ جب تک صبح پیشاب نہ آنے لگے تب تک دو اندر چھوڑیں بعض دفعہ یہ بات چہہ ہینے یا یا اس سے بھی زیادہ عرصہ میں حاصل ہنیں ہوتی +

علاج۔ اس بیمار ہی کے علاج میں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہئے کہ پہلے پہل خون کی حالت بگڑ جاتی ہے اور وہ بگڑا ہوا خون گردن کو بیمار ہی میں مبتلا کرتا ہے اور جب گردن میں مبتلا ہو جاتا ہے تب خون میں پیشاب کے اجزاء کے رہتے ہیں جس سے وہ خون اور بھی بگڑ جاتا ہے۔ پس علاج کے دو مطلب ہونے چاہئیں کہ اول ماؤف گردن کو آرام دین اور دوم بذریعہ دیگر صفائی کے اعضا کے خون کو صاف کرنا ان مطالب کے حاصل کرنے کے لئے بیمار کو آرام سے بستر پر لٹا رکھیں۔ غذا اسکی ملکی کر دین اور چار یا آتش جو اور پانی پینے کو دین تاکہ پسینا اچھے طور پر پیدا ہو مرض کو گرم ہوا یا گرم پانی کا ہیا رہا ہر روز یا دوسرے روز دین اور معرقات کا استعمال کریں مثلاً سے۔ لی۔ سی۔ لٹ اف سوڈا یا ڈو۔ ورس۔ پاؤڈر بمقدار ۱۵ گریں کے دن میں تین یا چار دفعہ دین یا اس نسخہ کا استعمال کریں۔

نسخہ۔ لائیکور۔ ایمو۔ نیا۔ سے۔ ٹے۔ ٹین ایک ڈرام + ٹائے۔ ٹرہ گریں +
نایٹرک۔ ایتر۔ ۳ بوند + پانی ایک آونس + سبکہ ملا کر تین تین یا چار چار گتے بعد پلاوین + اور نمکین جلابون کا استعمال کریں چنانچہ

نسخہ۔ سلفٹ اف گلنے۔ شیا ڈیرہ آونس + کار۔ پونٹ اف گلنے۔ شیا ۲۰،
گریں + پے۔ پیرمنٹ وائرہ آونس + سبکہ ملا کر اس نسخہ کا چھ حصہ بیمار کو ہر روز صبح کے وقت پلاوین یا اس گولی کو ہر روز رات کی وقت کھلا دیا کریں +

لشخہ - پوڈا - فلیمن - گرین - سفوف - رو - برب - گرین - اکثر کٹاف ہن بن
 ۳۰ - گرین - سب کو ملا کر دو گویان بناوین یا بطور حساب کے اس لشخہ کو کام میں لاوین -
 لشخہ - بانجی - کار - پونٹ اف سوڈا - ہر گرین - ٹار - ٹرے - ٹڈ - سوڈا - ۱۲۰
 گرین - ان دونوں کو ملا کر ہر آونس پانی میں حل کر کے اور دوسرے گلاس میں
 ہر آونس پانی لیکر اس میں ۲۰ گرین ٹار - ٹارک یا ساسی - ٹرک اسٹیل کیسے
 دونوں عروق کو ملاوین اور جب جوش کھانے لگے تب مریض کو بلاوین - اس لشخہ کو سڈلٹرن
 باؤڈل کہتے ہیں اور بعض دفعہ ای - لا - ٹے - ریم کے استعمال سے خوب کھل کر دست آجاتے
 ہیں تب بڑا فائدہ ہوتا ہے چنانچہ

لشخہ - ای - لا - ٹی - ام ڈیرہ گرین - سفوف شخہ - گرین - اکثر کٹاف ہن بن
 ۱۸ - گرین - سب کو ملا کر بارہ گویان میں تقسیم کریں - اور انہیں سے دو گویان کھلائیں
 زیادہ دست لانے منظور ہوں تو مقدار ای - لا - ٹے - ری - ام کی دگنی کر دیں
 ای - لا - ٹے - ری - ام سے جو غشیان پیدا ہوتا ہے وہ شخہ - گرین کے ملانے سے رک
 جاتا ہے - لیکن بچہ چھوٹا ہو تو کپاؤڈ - باؤڈل اف جلیب - ۱ سے - ہر گرین کی مقدار
 ایک کھلانا ہر سہ - کمر پوڈا - کپنگ کرین اور تھکید کرین یا السی کی پول - ٹل
 باندھیں - اس بیماری میں تیز درات کا ہرگز استعمال نہ کرنا چاہئے اور برداشت
 کے دینے کی نہایت ہی ضرورت ہو تو ڈی - جی - ٹے - لٹ سے بہتر کوئی دوا نہیں
 ہے کیونکہ اس سے گردن کو خراش نہیں ہوتی ہے - بعض دفعہ مرض کے اس درجہ
 کو قابضات سے فائدہ ہوتا ہے جیسے ٹامک اسٹڈ اور گیا - لکٹ اسٹڈ - بغور
 نفع ہو جانے بخار اور دیگر شدید علامات میں کے فو لا کا استعمال کرین تاکہ خون کھینچ
 بہتر ہو جائے اور پیشاب میں البیہ - من کی مقدار کم ہو جائے مثلاً بیمار کو شکم پر ہاتھ
 چلاوین یا سائٹریٹ اف انڈ کوئین کا استعمال کرین - غذا معوی اور میریج الہفم دین

خمر پر لنت بھیجیں بیار کو سردی اور بارش میں بیگنے سے بچا دیں »

دوم کرانک برائٹش ڈے - نینر

دفعہ ہو کر انک برائٹش ڈی - نینر میں گروہ کی تین مختلف بیماریاں شامل ہیں جن ساروں میں پیشاب کے اندر البیو میں پایا جاتا ہے اور استحقا بھی پیدا ہو سکتا ہے » وہ تین امراض یہ ہیں کہ اول دانہ دار گروہ (گرا - نیو - لر کڈ - نے) دوم چربی کا گروہ (رفے - لے کڈ - نے) سوم رلار - ڈی - شش کڈ - نے) مونی گروہ

اول گرا - نیو - لر کڈ - نے

گرا - نیو - لر کڈ - نے کے معنی میں دانہ دار گروہ کے - اس قسم کی بیماری مردوں ہی کو اکثر ہو جاتی ہے اور ۳۰ سال کی عمر سے پہلے بہت کم ہوتی ہے - بعض دفعہ ساتھ اس بیماری کے جگر چوٹنا اور طحال کا غلاف موٹا ہو جاتا ہے اور یہ بیماری نہایت آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے » گروہ کی یہ حالت پرانے نقرہ کی بیماری کے سبب سے پیدا ہوتی ہے اور زیادہ عیاشی اور کثرت شہر انچواری کے سبب سے بھی پیدا ہو سکتی ہے دل کے کیواڑ دن کی بیماری کے باعث جب وریدوں میں عرصہ تک اجتماع خون کا ہو جاتا ہے تب بھی گروہ دانہ دار ہو جاسکتے ہیں - بعض دفعہ یہ مرض ایسے پوشیدہ طور پر پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیشاب کا امتحان نہ کیا جائے تو بیماریا کے مرتے دم تک یعنی جب پیشاب کے بند ہو جانے سے مرنے پر ہوتا ہو کر منت میں نہیں آسکتا » ڈاکٹر جانس کا یہ قول ہے کہ اس مرض میں عرصہ تک گروہ کا اپنے - تے - لیم چھڑتا رہتا ہے اور پیشاب میں تھوڑا بہت ٹوٹا ہوا پایا جاتا ہے جس سے پیشاب کی پاکیزہ نالیوں کا انتہائی جواپے - تے - لیم سے بھرا ہوا ہوتا ہے بتدریج نابود ہوتا جاتا ہے اس واسطے

وہ مایہ ناپ تیلی ہوئی تو بنی مین یا کسی سے مادہ سے چمک جاتی تین مگر کہ وہ کانک - ایک - چٹ
 ٹے ریشیوٹا ہوتا جاتا ہے اور اسکی دیگر بابت گہتی جاتی مین اور گردہ فی نو کی رگوں مین
 یہی تغیر واقع ہوتا جاتا ہے چنانچہ خاکہ جو بی شراین کی دیو این سوٹی ہوئی ہوتی راتو مین اور
 عروق شیعہ یہ سکر جاتی ہیں اور اس مین سے بہتری باکل مسدود بھی ہو جاتی ہے اور
 گردہ سخت ہو کر چوڑا ہو جاتا ہے اور ۲ - پے - گے - ان باؤں ہی چوٹی ہو جاتی ہیں
 بعد وفات کے امتحان کرنے سے گردہ - علی - مقدر سے آدہ رہ جاتے ہیں انکی سطح نامہوار
 اور جابجاست سکر ٹھی ہوئی ہوتی ہیں غلاف موٹا نظر آتا ہے اور ان پر ایسا جھٹ رہتا ہے کہ
 چمک کر آراہنہ میں جا سکتا خاص کر انکا کار - ٹے - کل حصہ نہایت سکر اہوا ہوتا ہے ۔

اس بیماری مین پیشاب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس مین اکثر سیدھے البیو مین پا جاتا ہے اور
 بہ نسبت صحت کے رنگ اسکا پیکھا مقدار اسکی زیادہ اور ہے - سی - نمک گراڈ کی کمی ہوتی
 ہے یعنی ۱۰۰ سے ۱۵۰ - نمک - اگر پیشاب کو باریک مین سے دیکھیں تو یہ مین گجڑے
 ہوئے - پے - تھے - لیم کے ذرات اور کثرت سے دانہ وار میوہ اور سانچے جو واقعی
 مین پیشاب کی مالیون سے آتے ہیں پائے جاتے ہیں - ان سانچوں کو
 اصطلاح مین گرا - نیو - لہ - پے - تھے - لی - آل - کاشٹس کہتے ہیں اس
 مرض کے سبب کچھ اندر بڑے بڑے تغیرات آتے ہوتے ہیں اور چونکہ ان تغیرات کے باعث
 مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں چنانچہ سب سے زیادہ مایہ پر پڑو - فی - اف - سی - مائے
 (مل کا موٹا ہو جانا) اور سرس پر دوکھا انفڈیشن یا سٹینڈنٹ پیسہ رہنا اور ان - سار - کچا ہو جانا
 ہے آخر کار دماغ اور حرام مغز کی ساخت یا فعل مین متور رہ پا ہو جاتا ہے ۔

علامات - اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیماری عرصہ تک قائم رہتی ہے
 تاہم کوئی بھی علامت اندیشناک نہیں پیدا ہوتی ایسا بھی ہو سکتا ہے
 کہ کوئی بھی علامت پیدا نہ ہو اور یہ مرض پوشیدہ طور پر بڑھتے بڑھتے

تھلک ہو جاوے چنانچہ گردہ کی یہ حالت جب پُرانی فقرص کی بیماری کے سبب سے
 پیدا ہو جاتی ہے تب ایسا ہی ہوتا ہے + ایسی صورتوں میں جب گردے دائرہ دار
 ہو جاتے ہیں تب اکثر اس قسم کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں کہ بیمار لاغر اور کمزور ہوتا
 جاتا ہے جلد کھردری خشک اور پیلی پڑ جاتی ہے - اشتہا متلون ہو جاتی ہے یعنی
 کبھی تو اچھی اور کبھی کم - اور بعض دفعہ بیمار کو پریشانی ہوتی ہے - مریض سست رہتا ہے
 جو دغین و دہوتا ہے پیش میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے - ناک سے اکثر خون
 جاری ہو پڑتا ہے - اور بعض دفعہ معدہ اور دماغ سے بھی خون آتا ہے اور جیسے گردوں
 کے اور امراض مزمنہ میں ہوتا ہے ویسے ہی اس میں بھی بصارت میں فرق پڑ جاتا ہے
 چون جو یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے بیمار لاغر ہوتا جاتا ہے لیکن گاہے گاہے ایسا ہی
 ہوتا ہے کہ جسم کے تہجج کے باعث وہ لاغری معلوم نہیں ہو سکتی مگر اس بیماری میں
 استھکا ہونا ایک اور ضروری نہیں ہے کیونکہ بارہا ایسا دیکھا گیا ہے کہ مریض
 اس بیماری سے مر گئے ہیں اور مرتے دم تک استھکا کی کوئی بھی علامت پیدا
 نہیں ہوتی ہے + بعض دفعہ صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ چہرہ اور پوٹوں پر تھوڑا
 سا تہجج ہو جاتا ہے اور بیمار کے کھنکے کی مقدار سوچ جاتے ہیں لیکن بعض ہی وقت
 ستمانی ہے - بعض دفعہ غشیان نہایت تکلیف دیتا ہے لیکن اسہال اکثر نہیں ہوتا
 پیشاب بہ نسبت صحت کے زیادہ اور بار بار آتا ہے اور امتحان کرین تو رنگ اور
 خاصیت اور اسپسی - سی - خاک گردی اس کی حالت صحت کے طور پر ہو سکتی ہے
 مگر خون نہیں ہوتا اور اس مرض کے ابتدا اور جرمین پیشاب کے اندر البیو - من کا ہونا
 کچھ ضروری امر نہیں ہے لیکن یہ قاعدہ ہے کہ اس بیماری میں پیشاب کا رنگ کبھی
 اور البیو - من کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی اسپسی - سی - خاک گردی کم ہو جاتی ہے
 باریک بینی امتحان سے اس میں ہمیشہ زائد و مادہ کے چھوٹے چھوٹے ڈلے اور پیشاب

کی نالیوں کے اندر کے خلاف کے ڈیٹے پہونے اپنے سے تھے۔ لی۔ ام جو پیشاب سے
 نہ ہلکا رہا نہ نکلتا تھے مین دکھائی دیتے مین اور چون چون یہ بیوڑی بڑھتی جاتی ہے پیشاب
 مین اپنے۔ تھے۔ لی۔ ام کثرت سے پایا جاتا ہے اور اس مین تھوڑا بہت البیو۔ من
 بھی ہوتا ہے۔

علاج۔ اس بیماری کے علاج کے مطلب یہ ہے کہ خون کے جس ناسزاوہ کے سبب اور
 طبیعت کی جس خرابی کے باعث یہ مرض پیدا ہوتا ہے اس کے دفع کرنے کی تدبیر کریں مثلاً
 جب یہ مرض نتیجہ کا دھبہ بیماری کا ہو تب بیمار کی غذا کا بند دسب کرین شیرینی اور خرست
 پر مہر کر دین بیمار کے جسم کو گرم رکھیں اور گاٹے گاٹے یا تو آب گرم سے بیمار کو غسل دیں
 اور گرم پانی یا گرم ہوا کا ہپہارا دین اور معرقات کا استعمال کریں۔ ملیات کو کام ہیز
 لا دین اور مکر پر پاؤ ڈرائی۔ کپٹنگ کریں یا رانی کی پٹی لگا دین اور مقویات مثلاً کوئین اور
 فولاد بھی نافذ نہ مند مین۔ مرکبات سیما اور بجز ڈی۔ جے۔ ٹے۔ اس کے ہر قسم کے
 مددات یہی مرض مین قطعی منع ہیں اور امیون کا استعمال بھی نہایت احتیاط سے کرنا
 چاہئے کیونکہ اس دوا کی تھوڑی مقدار مین استعمال کرنے سے بھی پیشاب کا پیدا ہونا بند
 ہو جاسکتا ہے کہ جس سے بیمار ہلاک ہو جاسکتا ہے۔ جب اس مرض مین شفا ہو جاوے
 تو ان سہلات کا استعمال کرنا چاہئے جن سے پانی کے طور پر تیلے دست آوین مثلاً
 امی۔ لا۔ ٹے۔ رمی۔ ام اور کم۔ لوج اور حلب اور اسکا۔ سوئی وغیرہ۔ لیکن سہلات
 کی اکثر ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس بیماری مین استقناشاؤنا دہو اکرتا ہے بعض دفعہ
 اس مرض مین خود بخود دست جاری ہو پڑتے مین غرض ان دستوں کو روکنا چاہئے
 تا وقتیکہ بیمار کمزور نہ ہو جاوے۔ بیمار اگر عرصہ بعد کمزور ہو جائے تو سہلات کو ترک کر دین
 اور انکے عوض مین رات کی وقت ایک خوراک کسی معرق دوا کی کہلا دین یا ہر شب یا ہر
 دوسری شب بیمار کو گرم ہوا کا ہپہارا دین اور مقویات کا استعمال کریں اور غذا بھی

غوی مین - بیمار کو مری سے بچا دین اور تبدیل آب و ہوا سے بھی اس بیماری کو فائدہ
ہوتا ہے ۱

دوم نے - لے کڈنے

یعنی چربی کا گروہ

دماغ ہو کہ صحت مین گروہ کی آپے - تھے - نی - ال کیس مین تھڑی سی چربی ہوا کرتی ہو
لیکھا - بعض زمین کہ جسکا بیان اب ہو رہا ہے - مقدار اس چربی کی بہت بڑھ جاتی ہے -
چربی کا گروہ دو قسم کا ہوتا ہے - ایک تو وہ جس مین گروہ بڑھ جاتا ہے - اور دوسری
قسم وہ جس مین گروہ سکڑ جاتا ہے - ایسی بیماریوں مین گروے چربی مین مبدل ہو جاتے
مین کہ زمین کمال درجہ کی کمزوری لاحق ہوتی ہے جیسے ٹیو - بر - کل - باکسٹر کی بیماری
مین اور بعض فائدہ بڑھاپے مین بھی گروہ کی ساخت چربی مین بدل جاتی ہے - دماغ
ہو کہ جب چربی کا گروہ سکڑ جاتا ہے تب یہ مرض نہایت خطرناک ہو جاتا ہے یہاں تک
کہ مہلک ہو جاتا ہے کیونکہ گروہ کی مقدار - اور وزن کم ہو جاتا ہے اور پیشاب
کی نالیوں کے کیسے ررغن کے قطرات سے پُر ہو جاتے مین اور خود وہ نالیان بھی
کوہین - سکڑ جاتیں اور کسی مقام سے پھیل جاتی مین ۲

اسباب - ایکوٹ لف - رائجی - ٹیس کی بیماری کے سبب گروہ کی ساخت چربی
مین بدل ہو سکتی ہے اور بعض فائدہ اس صورت مین بھی گروے چربی مین بدل جاتے
مین کہ جب دل کے گوشت کے ریشے چربی مین بدل جاتے مین اور جب چربی مین بدل
جاتا ہے تب اکثر گروہ کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے اور اسکا - فیوسلا کی بیماری مین
یا - ب - م - ٹیو - بر - کل کا دماغ کے پردہ یا شش مین جمع ہو جاتا ہے تب بھی گروے
چربی مین بدل جا سکتے مین - گاہے گاہے یہ بیماری امراض جدری یعنی چیچک وغیرہ یا خرا

غذا یا سردی یا رطوبت یا زیادہ شراب خوری کے سبب بھی پیدا ہو جاتا ہے۔
علامات - بیمار کی طاقت روز بروز گھٹتی جاتی ہے اور وہ کمزور ہو جاتا ہے۔
 چہرہ اور گل حیم بیمار کا پیلا پڑ جاتا ہے اور چہرہ پر ورم اُتر آتا ہے۔ شرابی کی جلد
 بار بار ہوتی ہے یہاں تک کہ بیمار کو شب کی وقت کئی مرتبہ بشیاب کیلے اٹھنا پڑتا
 ہے۔ ماضیہ کی شکایت رہتی ہے اور بار بار رتے ہوتی ہے۔ بعضہ دفعہ سر میں شدت
 کا درد ہوتا ہے۔ بصارت میں فرق پڑ جاتا ہے اور نوبت نوبت سر گھومتے ہوئے رہتا ہے۔
 اور اس بیماری میں ہمیشہ سی۔ رتس پر دونوں کے انفکامیشن کا اندیشہ رہتا ہے جیسے
 پے۔ رمی۔ کار۔ ٹوائی۔ ٹس اور پے۔ رمی۔ ٹو۔ ٹائی۔ ٹس اور سے۔ رتس۔ جانی۔ ٹس
 اور پلو۔ رانی۔ ٹس اور اس مرض میں گاہے گاہے مریض کو ا۔ مو۔ دو۔ سس بھی ہوتا ہے
 ہے۔ سبب ایک یہ معلوم ہوتا ہے کہ پردہ رے۔ ٹے۔ ناچربی میں تبدیل ہو جاتا ہے بیمار
 کے ماتھے پاؤں سوج جاتے ہیں اور جسم کے مختلف جوف میں پانی پیدا ہو جاتا ہے شاذ و
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیرپرون میں پانی پیدا ہو جاتا ہے تب بیمار کو دم لینے میں تکلیف
 ہوتی ہے سفیان بہت تکلیف دیتا ہے اور تشنج ہو کر بہیدشی طارن ہو جاتی ہے تب
 اسی حالت میں مریض راہی ملک بقا کا ہو جاتا ہے۔ اس بیماری میں بشیاب ہوتا ہوا
 آتا ہے اور اس میں کثرت سے البیو۔ من ہوتا ہے اور اس کا وزن متناسبہ بھی بہت
 کم ہو جاتا ہے۔

علاج - اس بیماری کو علاج سے کم نادر ہوتا ہے یعنی مسلمانوں کی تخفیف کے
 لئے کوشش کرنی چاہئے۔ چنانچہ غذا کا بندوبست اسطوریہ کریں کہ بیمار کی مسکرات اور
 شیرینی اور روغن سے بالکل پرہیز کریں چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب خون سے یو۔ ریا
 ہے طور پر نہیں علاج ہوتا ہے تب اینوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ اس بیماری
 میں اینوں نہ دینی چاہئے۔ کیونکہ اس میں بھی یو۔ ریا خون سے اچھے طور پر خارج نہیں ہوتا

ہے۔ جب نامکون میں دم زیادہ ہو تو اسپر تھپنے لگا وین اور بیمار کو صاف دستہ رکھینا

سوم لار۔ ڈمی شش گردہ نے یعنی مونی گردہ

یہ بیماری پوشیدہ طور پر نظر آتی ہے اور اپنے بیمار کو عرصہ تک ستاتی ہے کیونکہ برص کے بعد جھک ہوتی ہے۔

حالات مفصلہ ذیل میں گردہ کی ساخت موم میں بدل جاتی ہے جیسے ستل کی بیماری میں پرانے آتشک میں عرصہ دراز تک پیچے جا رہی ہنہ میں خاصہ مرض اسکا۔ فیو۔ لاکے سبب جب ہڈیاں زخمی ہو جاتی ہیں۔ پس ان حالات میں جب گردہ کی ساخت موم میں بدل جاتی ہے تب بیمار کی حالت گھٹنے لگتی ہے۔ تشنگی کی شدت ہوتی ہے پینا کی حاجت بار بار ہوتی ہے۔ شام کے وقت بیمار کے پاؤں اور ٹخنے سوج جاتے ہیں لیکن رات کی استراحت کے بعد وہ سوجن رفع ہو جاتی ہے۔ کمزوری جون جون زیادہ ہوتی جاتی ہے بیمار کا جگر اور طحال بڑھتے جاتے ہیں۔ پیشاب کے امتحان سے اس میں البیو۔ من کثرت سے پایا جاتا ہے۔ رزن مناسبہ اسکا کم ہوتا ہے۔ رنگ بولنگا پھیکا ہوتا ہے اور اس میں حموضات پائے جاتے ہیں۔

علاج۔ غذائیں البضم دین اور بطور دوا کے مرکبات فولاد کا استعمال کرین اگر آتشک کا شک ہو تو آیو۔ ڈائیٹا۔ ف۔ پو۔ ٹا۔ سیم کا استعمال کرین۔

لے۔ تھے۔ ا۔ س۔ س۔

یعنی

پیشاب میں ریت کا آنا

ماہیت۔ ریت کیا چیز ہے اور کیونکر پیدا ہوتی ہے۔ اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے
چنانچہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ آدمی ریت غذا کے ساتھ کھا جاتا ہے اور گردے اس کو
پیشاب کے راہ خارج کر دیتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ ریت غذا کے اجزاء
سے اسطور پر پیدا ہوتی ہے کہ جب ماضمہ بگڑ جاتا ہے تب غذا اچھے طور پر تحلیل نہیں ہوتی
چنانچہ کثرت سے جب شراب پی جاتی ہے اور گوشت کھا جاتا ہے اور ریاضت کم یا بکلی
نہیں کی جاتی ہے تب یوریا اور یو۔ رک اسٹڈ کثرت سے پیدا ہوتا ہے اور بیاض نقرص
کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جوڑوں میں وہ مادہ جمع ہو جاتا ہے
اور وہی مادہ پیشاب میں بھی کثرت سے ہوتا ہے کیونکہ بیچارے گردے جو جسم کی صفائی
کے لئے وارد و مقرر ہیں ان موذی مادوں کو خارج کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب ان
کی کثرت ہو جاتی ہے تب پیشاب میں مائیت کم اور ان موذی مادوں کا غلبہ ہوتا ہے
ہے جس سبب سے وہ جم کر ریت یا کنکری کی شکل پکڑ لیتے ہیں۔ جب ان مادوں کا
نہایت غلبہ ہوتا ہے تب گردن ہی میں جم کر کنکری بن جاتی ہے نہیں تو جب مثلاً
میں پیشاب ٹہیرا رہتا ہے تب انکو اچھا موقع کنکری کے بنانے کا ملتا ہے اور
وہی ریت یا کنکری کی شکل پکڑ لیتے ہیں۔ مثلاً نہ میں جب کنکری عرصۂ تک پڑی رہتی
ہے تب اُسکے گرد وہی مادہ جمع ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے اُس کنکری کا
بڑا سا پتھر بن جاتا ہے یعنی اب بیا پتھر کی کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
ماضمہ ہی کے بگڑ جانے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خون میں چونہ کے مادوں کا
غلبہ ہو جاتا ہے۔ بیچارے گردے انکو بھی پیشاب کے راہ خارج کرنے لگتے ہیں۔

کوجہ غلبہ زیادہ ہوتا ہے تب یہ مادہ بھی جم کر ریت یا کنکری کی شکل بچھ لیتے ہیں۔
 پشیا ب میں کئی قسم کی ریت پائی جاسکتی ہے پہرہی طبیب کے علاج میں اکثر وہ
 جو قسم کی ریت آتی ہے۔ ایک نادرہ ریت یا سترخی مال۔ دوسری سفید چونہ کے طور پر
 سترخی مال ریت تو اٹھکوتی ہے۔ یہ زیادہ شراب پیتے اور کثرت سے گوشت کھاتے ہیں
 اور نہ زیادہ کھاتے۔ یہ اذیت زینہ کرتے۔ اس قسم کی ریت حموضات سے بنتی ہے۔
 یہ ہے۔ رک۔ اسٹرو وغیرہ۔ چونکہ قسم کی ریت ان لوگوں کے پشیا ب میں آتی
 ہے کہ کئی غذا کم یا خراب ہوتی ہے یا زیادہ عیاشی کے سبب جیکے تو کمزور ہوجاتے
 ہیں۔ اس قسم کی ریت میں اکثر فاس۔ فٹ ان لائم اور فاس فٹ ان گلے شیا
 کا غلبہ ہوتا ہے۔

جنکو سترخی مال ریت یا کنکری یو۔ رک۔ اسٹکی آتی ہے وہ لوگ اکثر نقرص کے مرض میں
 مبتلا ہوتے ہیں۔ ماضیہ انکا بکڑا ہوا ہوتا ہے پہرہی عادت بد سے باز نہیں آتے یعنی
 شراب پیتے ہیں اور گوشت بھی خوب کھاتے ہیں جب تک تو بار بار یا بار بار رے ریت
 کے پشیا ب کے ساتھ خارج ہوتے رہتے ہیں تب تک چند ان تکلیف نہیں ہوتی لیکن
 کنکری بنکر مچری دل سے جب مشا کی طرف آنے لگتی ہے تب انکو شراب پینے اور گوشت
 کھانے کا مزہ چکھاتی ہے چنانچہ وہ کیسا مزہ ہے اس بات کا ذکر نیچے کیا جائیگا۔ اب
 دوسری قسم کی ریت کا حال سنو لیکن پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ گوشت
 کھاتے اور نہ شراب پیتے ہیں پہرہی پشیا ب میں یو۔ رک۔ اسٹکی ریت پائی جاتی ہے
 اس صورت میں دریافت کر دے تو یہ پاؤں کے کہ یہ مرض انکے باپ دادا سے چلا
 آتا ہے یا یہ کہ وہ لوگ گرم اور خشک ملک کے رہنے والے ہیں۔

جس کسی کے پشیا ب میں چونکہ کی ریت آتی ہے وہ لوگ ضعیف الجسم ہوتے ہیں۔ بعض
 کمزورہ آواز کمزور کمزور ٹانگوں میں درد۔ کاروبار کی طرف سے طبیعت منفرد کمال درجہ

کی لاغری آنکھوں میں حلقے پڑ جاتے ہیں۔ رخسارے دب جاتے۔ ناک نکل پڑتی ہے۔
جہان پیشاب کرتے ہیں وہ جگہ ایسی سفید ہو جاتی ہے کہ گویا یہی گدھا موت گیا ہے۔
یاد رہے کہ حلق اور کثرت مباشرت کے سبب جب بعضی فطرت میں ضعف آ جاتا ہے
تب بھی پیشاب میں چونہ کے قسم کی ریت پائی جاتی ہے۔

علامات - دو نوشتہ کی ریت میں جو جو علامتیں عرصہ ناک پائی جاتی ہیں انکا
تکرار دہر ہو چکا ہے اب نوبت کیوقت مریض پر جو کچھ گزرتا ہے اسکو دھیان نگاہ کر سنا۔ اگر
یہ پوچھتے ہو کہ نوبت کس تباکی تو یا در کہو کہ جینک رت بار یک ہوتی ہے تب تک تو
بلا تکلیف مجری بول سے مشابہت میں اور مشابہت سے نائیزہ کے راہ پیشاب کے ساتھ خارج ہوتی
رہتی ہے لیکن جب بہت سے ذرات ریت کے آپس میں ملا کر ٹکڑی بن جاتے ہیں اور جب
وہ کنکر گروہ سے کہکساں کی مجری بول کے راہ مشابہت میں آنے کا ارادہ کرتی ہے تب اس
کا سے محفوظ رکھے قیامت دکھادیتی ہے۔ اسکو کنکری کے گزرنے کی نوبت کہتے ہیں
اور اصطلاح میں مریض نال کا۔ لاک بولنے میں کیونکہ کنکری عرصہ عرصہ بعد نوبت نوبت

گزر کرتی ہے۔ یس

علامات مریض نال کا - لاک یعنی کنکری کے مجری بول سے گزرنے کیوقت کی
جب کوئی کنکری مجری بول کے خول کی نسبت کیقدر بڑی اُس نالی سے گزرنے لگتی ہے
تاکہ مشابہت میں آ جاوے اسوقت ایسی شدت کا درد ہوتا ہے کہ بیمار مایہ آ ب کی طرح ہنر
پر تر پینے لگتا ہے۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ جب گروہ کے پل۔ دوش سے کنکری کہکساں کی پیشاب
کی نالی کے اندر آ جاتی ہے تب اُس نالی کے گوشت کے ریشوں میں اُس کنکری کے سبب
تشنج ہونے لگتا ہے جس سے مجری بول کی نالی کا منفذ تنگ ہو جاتا ہے اور وہ کنکری
دب جاتی ہے اسوقت شدت کا درد ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد جب ریشو کا تشنج کم ہو جاتا
ہے تب کنکری آگے کو قدم بڑھاتی ہے اسوقت درد کم ہو جاتا ہے لیکن کچھ عرصہ بعد

جب ریشہ مذکور پہر کھڑے کئے جاتے ہیں تب پہر شدت کا دور ہوتا ہے۔ غرض اسطرح جڑ نکالنے
 کنگری شانہ کے اندر داخل نہیں ہو جاتی ہے تب تک مجری بول کے گشت کے ریشہ نکالتے
 اور پہلے ریشے میں جس سبب سے درد بھی کہی نہ یادہ اور کبھی کم ہوتا ہے حتیٰ کہ جب
 کنگری شانہ میں داخل ہو جاتی ہے تب درد کبہ دور ہو جاتا ہے۔ اسکو انگریزی میں
 فٹ انفیو۔ دل یا رسی نزل کا۔ نام بھی کہتے ہیں یعنی کنگری کے گزرنے کی نوبت
 جب تک کنگری شانہ میں داخل نہیں ہو لیتی ہے تب تک نوبت بنوبت شدت کا دور
 ہونے لگتا ہے اور بیمار نہایت بے چین رہتا ہے۔ بنیاب کی حاجت یا بار بار بولی
 رہتی ہے مگر تھوڑا سا نہایت سُرخ رنگ کا گاڑا مادہ بودار بنیاب آتا ہے اور خارج ہو
 رہی اکثر جرم کریت کی شکل پکڑ لیتا ہے۔ مد کی ٹیس گروہ سے مجری بول کی طوالت
 تک بلکہ حقیقہ اور رانون تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ بنض تیز نہ بان میلی اور جب کم تھوڑا
 گرم ہو جاتا ہے اور بنض رہتا ہے۔ بعض دفعہ جی متلاتا اور تھکے ہی ہوتی ہے بعض
 دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کنگری کی مقدار نہ بادہ ہوتی ہے تب وہ گز نہیں سکتی
 بلکہ مجری بول میں پھنسی رہتی ہے اور اسکے منفذ کو بند کر دیتی ہے۔ اب بنیاب شانہ میں
 گز رہیں سکتا مگر مگر کر گروہ کے چل۔ دوش میں جمع ہونے لگتا ہے اسصورت میں
 گروہ پہلے اسقدر بڑھ جاتا ہے کہ طیب کی استحقا کا گمان ہو جاتا ہے۔ اس بیماری
 کو اصطلاح میں غایمڈرو۔ لفٹ۔ رو سیس کہتے ہیں۔

علاج مثل دیگر نوبتی بیماریوں کے اس مرض کا بھی علاج دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا
 ہے۔ ایک نوبت کی وقت کا۔ دوسرے وقفہ کا پس

علاج رسی نزل کا۔ لاک کی نوبت کی وقت کا۔ مجری بول سے
 جو قوت کنگری گزرنے لگتی ہے اور درد کی شدت ہوتی ہے اسوقت دوا سے بہت ہی کم
 فائدہ ہوتا ہے۔ بنیاب میں رنگ گروہ کی بیماری نہایت کثرت سے ہوتی ہے اور

طیب کو اس کے علاج کا موقع بھی بہت ملتا ہے۔ پس اس موقع پر مین اپنا طریقہ علاج کا بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تھے نہوتی ہو تو کسٹریٹل کا جلاب دیدیتا ہوں نہتو کسٹریٹل اور نارچین کا حقہ کرتا ہوں۔ بعد ازاں بیاہ کو آب گرم مین بیٹھاتا ہوں اس سے اکثر آرام آجاتا ہے درنہ نہتو کسٹریٹل مین لاٹا ہوں۔

لشجہ - لائیگور - مار - فیا - ٹائیڈرو - کلوراس - ڈرام - سیلفورک - ایتھر - ہونڈ + پانی ایک آونس + سکولاکر بلا دیتا ہوں - پیتے ہی بیاہ کو نیند آجاتی ہے جب اثر ہوا کا گزر جاتا ہے تب اکثر درد کو بھی خالقہ ہو جاتا ہے نہتو دوبارہ اسی نسخہ کو پہرلاتا ہوں اور درد کے متھام پر پوست کی تکیہ کرتا ہوں اور ڈائیو - رسی - ٹاک کے طور پر اس نسخہ کو کام مین لاٹا ہوں۔

لشجہ - ٹائیڈریٹ اف پو - ٹاش - اگرین - ٹائیڈریٹ - ایتھر - ہونڈ + پانی ۲ آونس + سکولاکر تین تین یا چار چار گھنٹہ بعد پلاتا چاہئے - تیج بہر ہرگز رش جو پانا چاہئے تاکہ بیشاپ خوب کھلا آتا رہے اور کھلکھلی اور ریت خارج ہوتی رہے درنہ مثانہ مین جمع کر پتھری پیدا ہو جائیگا اندیشہ ہے - غرض جب اس ترکیب سے نوبت رفع ہو جاتی ہے تب وقفہ کیوقت کا علاج اسطو - پر کرتا ہوں -

علاج وقفہ کیوقت کا مطلب اس علاج کا یہ ہوتا ہے کہ ریت پیدا نہو ناپاؤ مگر مین تم سے چح کہتا ہوں کہ بارہا علاج کرتے کرتے تھک گیا ہوں پہر ہی ریت کا پیدا ہونا موقوف نہتو کسٹریٹل ہے کچھ تو یہ سبب ہے کہ بیاہ رووا کی مداومت نہتو کرتے پہر اپنے عیش و عشرت مین لگ جاتے ہین کیونکہ انسان کی قوم بہت ناشگورگزار ہے مرض کی تکلیف نہ درست جب رفع ہو جاتی ہے تب دوا تو دوا بلکہ خدا اور رسول تاک کو بھی آدمی یاد نہیں کرتا دوا کچھ کہہ رہا ہے کہ کثیر اوقات یہ بیاہ رسی باپ دادنے سے جلی آتی ہے کیونکہ کئی مرتبہ اتفاق ہوا ہے کہ ایک ہی خاندان مین کیون کا علاج پہلے

تو ریت کا کیا ہے اور تب مثلاً نہ چہرہ کر آن کی بہری نکالی ہے نہ سر پہی مرتے دم تک انکلی
 ریت آتی رہی ہے اور ایسا بھی دیکھا ہے کہ بچہ پن سے ریت آتی شروع ہوئی ہے اور
 ساری عمر آتی رہی ہے۔ یہ باتیں میں تم کو اس واسطے بتاتا ہوں کہ تم اس بیماری کے
 رفع کرنے کے لیے کا کہیں دعویٰ نہ کر بیٹھو + جس ترکہ سے میں دفعہ کا علاج کرتا ہوں تاکہ ریت
 پیدا نہ ہوئے باوے اب اسکا بیان سنو۔ اوپر میں بتلا چکا ہوں کہ اگرچہ کئی قسم کی
 ریت ہوتی ہے پر مطلب میں اکثر وہی قسم کی ریت کے علاج کا موقع ملتا ہے ایک
 سرخ یا زردی ٹیل بننے پر۔ رکن اسد کے اور دوسری صنف۔ یعنی ناس۔ منٹ کے
 قسم کے۔ پس

علاج سرخ یا زردی ٹیل ریت کا۔ دخت زد کے آشنا اس قسم کی
 ریت کی بیماری میں اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں پس انکی مٹرا بہ چڑاؤں۔ گوشت ت پر ہیر
 کر اوں۔ غذا سیدھی سا دج چہین کم مصالحہ اور گھی ہو دال اور ترکاری کھائیں۔ ایسے
 لوگ اکثر شہتی ہی ہوتے ہیں جھپٹے نہ دین۔ مٹوب ریاضت کر اوں۔ تیرش چیزوں کے
 کھانے پینے سے بھی پرہیز جائے کیونکہ بیشیاب میں جمودات کا غلبہ ہوتا ہے + جب
 غذا اور ریاضت کا پکا انتظام ہوئے تب ایسی دوا تجویز کریں جس سے خون میں حرمت
 جمع نہ ہونا پاوین پس پانچویں نسخہ اچھا ہے۔

نسخہ۔ بائی۔ کار۔ بونٹ۔ اف۔ پٹاش۔ مگرین۔ دوائی۔ نم۔ کال۔ چمی۔ سائی۔ بانو
 بانی۔ م۔ آونس۔ سبکو مار۔ دغین۔ تین۔ دفعہ۔ ملا دین۔ سوتے۔ وقت۔ رات۔ کو۔ ایک۔ ٹرام
 بائی۔ کار۔ بونٹ۔ اف۔ پٹاش۔ اٹھ۔ یا۔ دس۔ آونس۔ بانی۔ میں۔ حل۔ کر کے۔ ملا دین۔ تاکہ صبح
 کو پیشاب پتلا آجایا کرے اور بعض بائی۔ کار۔ بونٹ۔ اف۔ پٹاش کے ٹیکو۔ پٹاشی
 کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک۔ اوردو۔ سائی۔ ٹریٹ۔ اف۔ لے۔ ہیما ہے۔ یہی
 جبری نہیں مگر یاد رہے جب تک غذا اور ریاضت کا اچھا بندوبست نہ ہوگا تب تک اسے

کچھ بھی فائدہ نہ ہو گا مگر پرہیز کی شدت سے اور بکثرت کھار دوا کے استعمال سے کمزوری ہو جاوے تو ہوا بہت گوشت کھانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ مگر تازی ترکاری کے ساتھ اور شراب کا تو نام ہی نہ لو گولی مارو۔

عسلج سفید قسم کی ریت کا۔ جبکہ اس قسم کی ریت آتی ہے وہ اکثر کمزور ہوتے ہیں اور انکے پیشاب میں کھار ریت زیادہ ہوتی ہے۔ پس نخی غذا متعمومی نہی چاہئے اور دوا ترش، چنانچہ ایسا کرین کہ جیسا کہ گوشت کی غذا، تازی ترکاری اور میوہ جات کھلا دیں اور دوا کے طور پر اس نسخہ کا استعمال کریں۔

نسخہ۔ ڈائملوٹ سفید رنگ اسٹڈ ۱۵ بوند، نیکچر آف جن۔ شن ۲۰ بوند، نیکچر آف کلنبا ۲۰ بوند، ہانی ڈیڑھ آونس، سبکو ملا کر دن میں تین دفعہ پلا دیں۔ دن میں نے اس قسم کی ریت میں فیون کو نہایت فائدہ مند پایا ہے۔ چنانچہ میرا قاعدہ یہ ہے کہ ایک یا ڈیڑھ گریں فیون کی گولی بھی ہمراہ نسخہ بالا کے دن میں تین بار دفعہ کھلایا کرتا ہوں۔ اس سے پیشاب ترش ہو جاتا ہے۔ کمر اور ماتھ پادوں کے دور کو آرام آ جاتا ہے۔ اس بیماری میں جو پست ہمتی ہو جاتی ہے وہ بھی منع ہو جاتی ہے گویا کہ بیمار میں جان پڑ جاتی ہے۔

ھے۔ ما۔ میو۔ ریا

علامات۔ عربی میں اس بیماری کو بول الدم کہتے ہیں۔ اس مرض میں پیشاب کے ہمراہ خون آتا ہے۔

اسباب۔ یا تو یہ بیماری زخم پیدا ہوتی ہے یا کن۔ تھا۔ روی۔ ڈوس اور ٹرین۔ ٹامین وغیرہ کے استعمال کرنے سے ہو جایا کرتی ہے اور ان سببوں سے بھی ہو جاتی ہے کہ گردہ یا اعضا سے بوائے یا کسی اور مقام کے میو۔ کس ممبرن میں اجتماع

خونکے ہونا۔ لف۔ رائی۔ ٹن کی بیماری۔ گیدہ مچری بول نشانہ یا نائیز مین تہری کا ہونا۔ کمر چوٹ کا لگنا۔ پریسٹٹ گلند کی بیماری نشانہ کے میو۔ کس ممبر مین حن ہونا۔ ایک انفلیمیشن کا ہونا یا اس عضو مین کنسر کی بیماری کا پیدا ہو جانا۔ بعض دفعہ اسکر۔ وی۔ ٹائی۔ فس اور سکار۔ لٹ فیور مین ہی پیشاب کے ہمراہ خون آتا ہے بعض مقامات مثلاً مصر اور مو۔ ری شمس اور کیپ آف کڈ۔ ہوپ مین یہ بیماری اون۔ ڈی۔ مک ہے۔ اور اعضا کے بول مین ایک قسم کے کرم کے ہونے سے بھی یہ مرض پیدا ہوتا ہے +

تشیخص جس پیشاب مین خون ہوتا ہے رنگت اسکی یا تو خوب سرخ یا سیاہی مائل ہوتی ہے اور اس مین خون کے ڈلے پائے جاتے ہیں جب خون گردہ سے آتا ہے تو گردہ کے مقام پر درو ہوتا ہے اور پیشاب کے ہمراہ خون اچھے طور پر ملا ہوا ہوتا ہے اور باریک سوت کے طور پر پیشاب کی نالیوں کے سانچے پائے جاتے ہیں جب خون نشانہ سے آتا ہے تب پہلے حصہ پیشاب مین اکثر خون ہینا ہوتا اور باقی مین ہوتا ہے مگر رنگ اس خون کا سیاہی مائل اور سا تھہ اس کے نشانہ کا پتھر بھی ملا ہوا ہوتا ہے اور جب خون بغیر پیشاب کے قطرہ قطرہ دھار بندہ کر مٹنی رنگ کا آتا ہے تو وہ نائیز کا ہوتا ہے +

علاج۔ سبب پر موقوف ہے۔ سبب اس مریض کا ضرب و زخم ہو یا بیمار کا مزاج و طبی تو کمزور ہو یا اس کا مزاج اور ہیکل مس ہوا ہو لیون اگر کنکری کے سبب سے خون آتا ہو تو خاص علاج اسکا کریں اور بیمار کو آتش جو ملا دین یا لعاب ہیڈنا اور ریشہ خطمی کا استعمال مین اگر نشانہ مین خون جمع ہو جاوے اور اس سبب سے پیشاب مین تکلیف ہو تو سلطان کو کام مین لایون۔ اگر خوراک نہ آوے تو چھ آؤس پانی مین ۲۰ گر مین شوا۔ کراف۔ لڈ اور دو ڈرام وایم۔ اور پیامی ڈاکٹر نشانہ کے اندر چھکاری کریں یا

ایک آؤنس پہنکرتی :۔ سینٹ ہائیڈین حل کر کے :۔ یکم کے اندر اس عرق کی بھکاری
کرین اور بناتی قابضات مثلاً :۔ ناک :۔ اسٹڈ گیارک :۔ اسٹڈ کامی :۔ نوکے :۔ ٹیکو
وغیرہ کہلاوین :۔ بیمار کے جسم میں خون کی کمی ہو تو ٹیکچر آف اسپیس کا استعمال کریں :۔
مثلاً زمین پتھری کے ہونے سے خون آتا ہو تو لیٹرک جارج کے حوالہ کروین :۔

ڈا۔ یا۔ بے۔ ٹیٹر۔ ٹے۔ لے۔ ٹس

عربی اصطلاح میں اس مرض کو ڈا یا بے کہتے ہیں :۔

ڈا۔ یا۔ بے۔ ٹیٹر۔ ٹے۔ لے۔ ٹس کی بیماری دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے ایک
تو وہ حسین تھوڑے عرصہ کے لئے پیشاب میں ندر سے شکر باقی جاتی ہے مگر علمی تاثیر
ہنیں ظاہر ہوتی ہیں جیسے بعضہ فہ کورا :۔ فارم شگھانے کے بعد یا کثرت شرنی کے
کے استعمال کے بعد اور ہو :۔ شکر کا خور یا دبا مرگی کی نوبت کے بعد پیشاب میں
تھوڑے عرصہ کے لئے ندر سے شکر باقی جاتی ہے :۔ یہ کو یا کہ اتفاقی بیماری ہوئی :۔
مگر دوسری قسم کے بیماری میں شکر کثرت سے آتی ہے :۔ عرصہ دوازہ تک آتی رہتی ہے
اور مریض کی صحت میں بڑا فرق پڑتا ہے :۔ دوسری قسم کی یہ :۔ دوسری قسم میں
تقسیم ہو سکتی ہے ایک تو وہ حسین عرصہ تک شکر کثرت سے آتی رہتی ہے اور پیشاب
بھی نہایت کثرت سے آتا ہے :۔ اسکی ابتداء :۔ ناتوانی لاغری اور دیگر ہلکے علامتیں
پیدا ہوتی ہیں :۔ دوسری نوع اس بیماری کی وہ ہے جس میں مسامقین خداج نماک
ہنیں پیدا ہوتی ہیں :۔ پیشاب میں شکر کبھی زیادہ کبھی کم بعضہ فہ عرصہ تک آتی رہتی ہے
اور کبھی آتے آتے تم جاتی ہے اور پھر آنے لگتی ہے :۔ مریض اسپین اگرچہ کمزور ہو جاتا
ہے لیکن پیاس نہ زیادہ ہنیں ہوتی اور نہ مریض لاغر ہو جاتا ہے بلکہ فریب رہتا ہے پیشاب
تھوڑا ہی زیادہ یا صحت کی مقدار پر آتا ہے :۔ اس قسم کی بیماری ہلکے ہی ہنیں

اور اکثر جوانی کے بعد پیدا ہوتی ہے ۔ پہلے ہم قسم شدہ کا بیان کرینگے اور تب خفیف قسم کی بیماری کا ذکر ہوگا ۔

اسباب - پری - ڈسپو - زنک - بے نسبت عورتوں کے یہ بیماری مردوں کو زیادہ ہوتی ہے ۔ مگر جوانی تک تو زن و مرد دونوں کو یکساں ہوتی ہے لیکن شباب سے لیکر بڑھاپے تک مرد کو نسبت عورت کے زیادہ ہوتی ہے ۔ جوانی اور اوٹیر عمر میں اکثر ہو جاتی ہے اور اگرچہ پانچ سال کی عمر میں کم ظاہر ہوتی ہے مگر بعض دفعہ چوٹے بچوں کو بھی ہو جاتی ہے ۔ بلوغت میں جب مباشرت کی قابلیت پیدا ہوتی ہے اور جب اسکی کثرت ہوتی ہے تب زن و مرد دونوں اس مرض میں مبتلا ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں ۔ اکثر مرد اس مرض سے ۴۵ اور ۵۰ برس کی عمر میں مرتے ہیں اور اکثر عورت ۴۵ اور ۵۰ سال کی عمر میں ۔ شہری لوگ اس بیماری میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں نسبت دیہاتی کے ۔

علی العموم اگرچہ یہ بیماری موروثی نہیں ہے تاہم بعض بعض دفعہ خاندانوں میں نسلاً بعد نسل چلی آتی ہے ۔

اکسائیٹنگ کائر - یہ سبب اس بیماری کا اکثر دریافت نہیں ہو سکتا مگر بہت دفعہ بسا دیکھا گیا ہے کہ سردی اور بارش میں بیگنے کے سبب یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے اور بعض دفعہ گرمی کھال میں سرخ جھروں کے پینے سے ہو گئی ہے ۔ شیرینی کا کثرت سے کھانا ۔ اور شدید بخار کی بیماریوں کا ہو جانا ہی باعث اس مرض کے ہیں ۔ بعض اوقات رنج و غم فکر اور تردد سے بھی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے ۔ ضرب زخم خا صکر سر پر چوٹ لگنا ہی سبب اس مرض کا ہوتا ہے ۔ تم اگر پوچھو کہ شراب کا پینا اس مرض میں کیسا ہے تو سنو تینے پیچھے دیکھ لیا کہ شراب معدہ کا کیسا ستیاناس کرتی ہے اور یہ بھی تم نے دیکھ لیا کہ شراب سے جگر کباب ہو جاتا ہے اور یہ بھی تم نے

دیکھ لیا کہ اسی شراب کے پینے سے گردے بیماروں کا کیسا بڑا حال ہو جاتا ہے۔
 پہر کیا پوچھتے ہو۔ کیا زیادہ میس کی بیماری شراب کے پینے سے نہیں پیدا ہوتی
 واہ کیا خوب جب شراب بگل بیماریوں کی مان ہے تو پہر اسکو اس بیماری کے ختم
 کیا دیر لگتی ہے۔ یہ مرض ہی شراب کے پینے سے ضرور ہو جاتا ہے ۔

علامات۔ اکثر یہ بیماری ایسی پوشیدہ طور پر شروع ہوتی ہے کہ مریض کو
 ہفتوں بلکہ مہینوں تک اسکی خبر تک نہیں ہوتی اگرچہ طبیعت ابتدا میں کسمند ہو جاتی
 ہے مگر چونکہ اشتہا اچھی رہتی ہے اسواسطے ابتدائی علامتوں کا مریض بالکل خیال
 نہیں کرتا۔ آخر کار جب پیشاب بار بار اور کثرت سے آتا ہے اور تشنگی شدت سے
 ہوتی ہے تب اسکی توجہ اس مرض کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ بعض دفعہ یہ بیماری چند
 ہفتوں کے اندر نہایت زور شور پکڑ جاتی ہے۔ جون جون یہ مرض برپا جاتا ہے پیاس
 زیادہ لگنے لگتی ہے۔ کھانک کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ جلد خشک اور کھردری ہو جاتی ہے۔

بیمار لاغر ہو جاتا ہے۔ ناتوانی اپنا زور جتا رہی ہے اور خاموشی شور مچاتی ہے چہرہ
 دب جاتا اور اسپر تکلیف کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ فم معدہ کا مقام لسیا معلوم
 ہوتا ہے کہ گویا دب جاتا ہے۔ زبان چکلی خشک اور اسپر خط پڑ جاتے ہیں منہ کے اندر
 لیسڈار بنم جمع ہو جاتا ہے۔ پیشاب ہم گنہہ کے اندر آٹھ یا دس یا بارہ یا بیس
 یا اس سے بھی زیادہ آتا ہے۔ رنگ اسکا بچالی کے طور کا ہلکا ہوتا ہے۔ اسکی
 اس۔ بے۔ سی۔ فکٹ گراوٹی ۱۰۳۵ سے ۵۴۰ یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے
 اور امین کثرت سے شکر ہوتی ہے۔ باہ کم ہو جاتی ہے یا بالکل جاتی رہتی ہے اور
 طبیعت کی تیزی یا تو کم یا بیمار بالکل سُست رہتا ہے ۔

علاج سے مرض نہ رکاوٹ اور علامتوں کو شدت ہوتی ہے بیمار نہایت لاغر اور کمزور
 ہو جاتا ہے۔ تل کی عملتیں پیدا ہو کر جلد مر جاتا ہے یا دست لگ جاتے ہیں ۔

ذوق (بکٹ) ٹھیک فیوہ ہو جاتا ہے اب پیشاب کی مقدار گھٹنے لگتی ہے۔ اور شکر کے عوض اب اسپین البیو۔ من آنے لگتا ہے۔ پاؤں سوج جاتے ہیں۔ آخر کار مرض یا تو کمال ضعف کے باعث یا بیشمار عارضات کے سبب سے اس دار فانی سے دور جاودانی کو رحلت کر جاتا ہے۔

ان میں سے بعض لانتوں کا مفصل بیان کرنا ضرور ہے چنانچہ

پیشاب - زیا بطوس کی بیماری کے پیشاب میں یہ دو باتیں خاص ملاحظہ جاتی ہیں ایک تو مقدار اسکی زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے اسپین شکر ہوتی ہے چنانچہ شکر کی مقدار فیصدی ۸ سے ۱۲ حصہ تک ہوتی ہے۔ شکر انگوری ہوتی ہے نئی شکر کی ہینن علی النوا شب و روز کے اندر پیشاب ۵ سے ۱۵ آؤنٹ تک آتا ہے مگر دوپائینٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ آسکتا ہے اور برعکس اسکے صرف ایک ہی آؤنٹ یا اس سے بھی کم آسکتا ہے۔ مقدار شکر کی غذا کی بعد زیادہ اور فاقہ کی حالت میں کم ہوجاتی ہے۔ اور میٹھی اور اسٹارج والی چیزوں کے کھانے سے زیادہ اور گوشت وغیرہ حیوانی غذا کے بعد کم۔ خفیف قسم کی بیماری میں اور ہر قسم کے مرض کے ابتدائین کر شکر اور اسٹارج پر مبنی کیا جائے تو پیشاب شکر سے پاک ہو جاسکتا ہے۔ لیکن جب یہ بیمار میٹھک مویاتی ہے تب اگرچہ غذا صرف حیوانی ہی دی جائے تاہم پیشاب شکر سے خالی نہیں ہوتا گو مقدار اسکی کم ہوجاتی ہے۔ اس صورت میں کہ جب بالکل نہ دیجاوے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شکر جیم کے ریشوں سے پیدا ہوتی ہے۔ وزن متناسبہ پیشاب کا ۱۰۴۰ سے کم یا زیادہ ہوتا ہے مگر ۵۰۰ یا ۶۰۰ تک بڑھ جاسکتا اور ۱۰۱ تک کم بھی ہو جاسکتا ہے پیشاب کی شناخت دیکھو پیچے باب قارورہ آشنا سے مرض میں اگر کوئی انفلامیشن یا بخار کی بیماری ہو جائے تب شکر کی مقدار کم ہو جاسکتی ہے یا شکر بالکل دور ہو جاتی ہے اور موت کے قریب بھی شکر کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔

روزانہ مقدار پیشاب کی آٹھ یا پندرہ پائینٹ کے درمیان ہوتی ہے مگر بعض دفعہ ۳۲ پائینٹ بھی ہو جاتی ہے مگر غذا جب صرف گوشت کی کہانی جاتی ہے تب مقدار پیشاب جاری پانچ پائینٹ تک گھٹ جاتی ہے۔ پیشاب کی مقدار ان سیال چیزوں کی مقدار کے قریب برابر ہوتی ہے جو پینے میں آتی ہیں۔ جب پیشاب زیادہ آتا ہے تب رنگ اسکا ہلکا پیالی کے طور کا ہوتا ہے اور دیکھنے سے جھکڑا نظر آتا ہے مگر ہوا لگنے سے جلد کی مقدار گدلا ہو جاتا ہے اور چند گھنٹہ کے اندر اس میں حمیرا اٹھ آتا ہے۔ جب پیشاب کی مقدار بار یا پانچ پائینٹ سے زیادہ ہین ہوتی ہے تب اکثر صبح فارورہ کے طور کا ہوتا ہے۔ بیماری جب بڑھ جاتی ہے تب پیشاب میں تھوڑا سا البیومینز اور خون بھی ہو سکتا ہے۔ یہ علامت بد ہے۔

سپیس - یہ علامت عین ابتدا سے پیدا ہوتی ہے اور برابر جاری ہتی ہے اور اسی سے یہ مرض اکثر گزرت میں آ جاتا ہے۔ اس بیماری کا مریض ۸ سے ۱۲ پائینٹ تک پانی پی جاتا ہے لیکن بعض دفعہ ۴ بلکہ ۵ پائینٹ تک بھی پی جاتا ہے۔ پہر بھی سپیس ہین نہیں سمجھتی بلکہ اذہبی بڑھ کر اٹھتی ہے اور جب قدر پانی پی جاتا ہے اس قدر رنہ اور گلا خشک ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بیماروں نے اس سپیس کے بچھانے کے لئے اپنا پیشاب پی لیا ہے۔ غلبہ خشکی کا خون میں شکر کے ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔

بہوک - مثل سپیس کے کہانے کا بہوک اکثر ہین ہوتا بلکہ اثناء مرض میں بہوک مر بھی جاتی ہے اور غذا سے بیمار کو نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ بات خاصہ کموت کے عنقریب ہوتی ہے جس سے بیمار کی حالت بہت جلد ردی ہو جاتی ہے۔

لاغری - اس مرض میں بیمار اکثر لاغر ہو جاتا ہے اور بیماری جب قدر رشید اور طول پکڑتی ہے اس قدر لاغری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ صرف چربی ہی کے کم ہونے سے

لاغری ہینن پیدا ہوتی بلکہ بدن کا گوشت اور خون تلب ہی لاغر ہو جاتا ہے۔ اور لاغری کا یہ بھی سبب ہے کہ جب پانی جسم کے ریشوں سے بکثرت بہتا ہے تب یہ ریشے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اور چونکہ آلات انہضام اس مرض میں بگڑ جاتی ہیں تو غذا خون میں تحلیل نہیں ہونے پاتی۔

جلد۔ اس مرض میں جلد کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمیشہ خشک ہتی اور پسینہ ہینن آتا مگر بعض دفعہ بیماروں کو پسینہ کہلکہ آہی جاتا ہے۔

اس بیماری میں جسم پر گناہ ہے جو نسل پیدا ہو جاتے ہیں اور علاوہ ذیل کے جلد پر سو۔ راحی سس اور ام۔ پے۔ ٹامی۔ گو کے دانے بھی پیدا ہو جاتے ہیں گاہی مائیسو کا سورج سبب آنے شکری پیشاب کے سُرخ ہو جاتا اور چہل ہی جاتا ہے جس سے بیمار کو نہایت تکلیف ہوتی ہے اور عورتوں کے اندام نہانی میں گرمی اور خارش استعد پیدا ہوتی ہے کہ ان کو نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ اس بیماری میں ٹانگیں اکثر سوچ جاتی ہیں۔

مثلاً دیگر حصص جسم کے اس مرض کے بیمار کا منہ اکثر خشک رہتا ہے۔ زبان اکثر سُرخ اور اعتدال سے ضابطہ ہتی ہے۔ اور چہلی ہوئی اور پھٹ ہی جاتی ہے۔ لیکن جب بیماری خفیف قسم کی ہوتی ہے یا جب علاج سے مرض شدید کو تخفیف ہو جاتی ہے تب زبان مرطوب اور اسپر با یک سفید زردی مائل فرچٹا رہتا ہے۔ اکثر بیماروں کے دانت زخمی ہو جاتے ہیں رکے۔ رینر (سٹورے) پہلو لکڑی ہو جاتے اور دانتوں سے علیحدہ ہو کر ان سے خون جاری ہونے لگتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ منہ مضبوط ہی رہتی ہیں۔

اعضائے انہضام۔ زیادتی غذا کے باعث ماضعہ بگڑ جاتا ہے۔ فم معدہ پرورد اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ متعام گویا دبا جاتا ہے۔ شکم میں نفخ ہو جاتا اور گاہے تہہ بھی ہوا کرتی ہے۔ پاخانہ اکثر قفص رہتا ہے۔ براز کا رنگ سفیدی مائل ہوتا ہے۔

بیماری جب بڑھ جاتی ہے تب بعض دفعہ دست لگجاتے ہیں۔ یہ علامت ہلکا ہونے کا
عقل اور ہوش وحواس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ طبیعت بیماری ہوتی ہے۔ کایا
کیطرف سے نفرت ہو جاتی ہے اور گاہے گاہے بیمار دست ہو کر اور گھٹنے لگتا ہے۔
باہ میں فرق پڑ جاتا ہے یا آدمی نارود ہو جاتا ہے مگر علاج سے جب یہ بیماری رفع ہو جاتی ہے
تب تو تباہ بھی لوٹ آتی ہے۔

خون میں شکر کثرت سے ہوتی ہے اور پاخانہ پسینہ آنکھوں کی رطوبت آنسو تھوک اور
گشکر جو سینہ بھی شکر ہوتی ہے۔

دور مدت اور حجام اس بیماری کی۔ درحقیقت یہ بیماری فرمن ہوتی ہے
پہنچنے بلکہ برسوں تک جاری رہتی ہے۔ لیکن علی العموم ایک سال سے تین سال
تک رہتی ہے۔ مگر بعض دفعہ ایسی جلد بڑھ جاتی ہے کہ چند گھنٹے یا ہفتہ میں مر بھڑکا
خاتمہ ہو جاتا ہے۔

بعض دفعہ علامات پوشیدہ طور پر ظاہر نہ ہو کر دفعتاً شروع ہو جاتی ہیں پہلے پہل
علامتوں کی بڑی شدت ہوتی ہے لیکن جب بیماری عرصہ کی ہو جاتی ہے تب شدت
علامتوں کی کم ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ مرض دو یا تین برس کا ہو جاتا ہے
تب ہونک پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔

عارضات۔ اس مرض میں تل کی بیماری اکثر عارض ہو جاتی ہے اور پورے روئی
نیو۔ مو۔ نیا اور پے۔ ری۔ ٹو۔ نائی۔ ٹس بھی ہو جاتا ہے۔ جسم کے جابجا دھنسل
پیدا ہو جاتے ہیں یا خون و پیپ پڑ کر گلجالتے ہیں اور کار۔ بنگل بھی پیدا ہو جاتے
ہیں۔ بینائی یا نوکم ہو جاتی ہے یا موتیا بند کا مرض ہو جاتا ہے۔

صورت حال تشریحی بعد وفات۔ جب اس بیماری کی ماہیت فرما۔ یا بلجی
کی رو سے دیکھی جاتی ہے تب ہم کو یہی مہر ہوتی کہ موت کے بعد جگر یا سم۔ پے۔ تے۔ ٹاک۔

نزد مین کوئی نہ کوئی خرابی پائی جاوے گی۔ مگر اسل مرصن تحقیقات سے بہت مدد ہنیں
ملتی کیونکہ اب تک نتو جگر نے اپنا بہید دیا اور نہ نزو نہ کور نے اس بیماری کے پیدا کرنے کے
باب مین کچھ اپنے دل کا حال کہا۔ بعد موت کے جب جگر کا متحان کیا جاتا ہے تب اسکی ایک
سچی حالت ہنیں پائی جاتی ہے یعنی جگر اکثر معمولی حالت پر ہوتا ہے مگر بعض دفعہ کس قدر
چھوٹا یا بڑھتا ہوا۔ بعض دفعہ خون سے پر بعض دفعہ خالی۔ گاہے گاہے اسکی ساخت مین
شکر ہوتی ہے لیکن کبھی ہنیں ہی ہوتی *۔

اگر دے اس بیماری مین اکثر بڑے ہو جاتے ہن اور بعض دفعہ انکی ساخت ایسی بدل جاتی ہے
جیسے برائیسس ڈیزیز مین ہوا کرتی ہے۔ سعدہ اکثر بہید ہوا اور اسکا میوہ کس روپہ
موتا اور علامت پایا جاتا ہے *۔

مرض کی تفسیر اور ماہیت۔ اسباب مین حکما کی رائے مین اختلاف ہے چنانچہ
بعض کہتے ہن کہ شکر معدہ مین پیدا ہوتی ہے لیکن فرانسی کے ڈاکٹر برنارڈ کی رائے کو اب
علی العموم غلبہ ہے چنانچہ انکے تجربوں سے یہ ثابت ہے کہ اگر کسی حیوان کو مار کر امتحان کر لیں
تو اسکے ہے۔ پا۔ ٹکٹ دین مین اکثر شکر پائی جاوے گی اور پور۔ ٹیل وینوں مین ہنیں اور
جگر سے ایک شے جیکو نکلائی۔ کو جین کہتے ہن علیحدہ کی جاسکتی ہے جب اس خیر مین تھوک
اور بیکریا۔ ٹکٹ طوبت اور خور اور جگر کی ساخت وغیرہ کا اثر ہوتا ہے تو اسمین انگوری
شکر کی خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہن ان تجربات سے صاحب موصوف یہ نتیجہ نکالتے ہن
کہ صحت کی حالت مین ہی جگر کے اندر شکر پائی جاتی ہے اور شکر جگر سے ہے۔ پا۔ ٹکٹ ویز
مین آجاتی ہے۔ اور جب اسکا گڑ بہتر و خن ہوتا ہے تب کار۔ پا۔ ٹکٹ رسد اور پانی
مین تبدیل ہو کر بڑا دگی دم کی ہوا کے ساتھ نکل آتی ہے پس اس اصول کے بموجب یہ صفا ظاہر
ہے کہ حالت صحت کے اندر جو شکر جگر مین پیدا ہوتی ہے شش اسکو ذیل کر دالتا ہے اور یہ کہ
پیشاب مین شکر اسوقت پائی جاتی ہے کہ جب جگر کے شکر پیدا کر نیکان عمل ٹھہرتا ہے نسبت شش کے

زائل کر دینے کے فعل کے کیونکہ بعض حالت غیر طبعی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جگر میں اس مقدار زیادہ
 شکر پیدا ہو جائے کہ خون کے ایک ہی دورہ کے ساتھ سارے کا سارا یہ پٹرے میں زائل ہو سکے
 تب وہ زائد مقدار شکر کی خون کے ساتھ طیارگی اور گردے اسکو جسم سے علیحدہ کر دینگے۔ علاوہ نیز
 جگر میں اگرچہ حالت صحت کی مقدار میں شکر پیدا نہیں ہوتی لیکن شش میں اگر کوئی بیماری ہوگی
 تو اسے وہ مقدار شکر کی زائل ہو سکیگی۔ پس نہ شکر خون میں بجا دیگی لیکن ڈاکٹر پیوسی کی رائے
 یہ ہے کہ مادہ گلائی کو جین حالت صحت میں جگر کے اندر شکر میں تبدیل نہیں ہوتا بلکہ انکادیا میں
 ہے کہ مادہ مذکور کو چربی میں بدل جانا چاہئے اور یہ کہ جب جگر کا فعل بکھرتا ہے جیسا کہ دیا۔ بے ٹیز
 کی بیماری میں ہوا کرنا بہت گلائی۔ کو جین شکر میں بدلتا ہے پس نتیجہ ان تجربوں کا یہی معلوم ہوتا ہے
 کہ جگر کے فعل کے بکھڑ جانے سے اس عضو میں شکر پیدا ہوتی ہے اور خاص بگاڑ کا ایک
 سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نیمبو۔ گیا شرک نرود اور دماغ میں خراش پیدا ہوتی
 ہے تب یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ ڈاکٹر برنارڈ نے دماغ کے چوتھے بطن میں کہ
 جہان سے نیمبو۔ گیا شرک نرود شروع ہوتا ہے خراش پیدا کر کے ڈایا۔ بے۔ ٹیز کی
 بیماری کو پیدا کیا۔ اور ڈاکٹر ہار۔ نے اسی نرود کی شاخوں میں خراش پیدا کر کے
 اس مرض کو پیدا کیا۔ اور ڈاکٹر گلڈن نے بارڈیہ دیکھا کہ جب مہر میں صدمہ
 پہنچا ہے تب ڈایا۔ بے۔ ٹیز کے بیماری پیدا ہوتی ہے۔
 اب حال کی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ شکر پنکریاس (لب لبہ)
 میں پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب لب لبہ شکم سے نکال
 لیا جاتا ہے تب شکر کا پیدا ہونا موقوف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی
 ذرا سا ٹکڑا بھی اس غدود کا شکم میں باقی رہ جاتا ہے تب بھی شکر پیدا ہوتی
 جاتی ہے۔ اور جب اس ٹکڑے کو بھی نکال ڈالا جاتا ہے تب شکر کا پیدا ہونا بھی
 ٹوک جاتا ہے۔

انجام نیک بد کی پیشین گوئی۔ انجام اس مرض کا اکثر بُرا ہوتا ہے کیونکہ یہ بیماری اکثر ٹھہک ہو جاتی ہے لیکن بہتوں کو شفا ملی بھی ہو جاتی ہے انجام نیک بد کی پیشین گوئی کے وقت کئی باتوں کا لحاظ رکھنا چاہئے مثلاً بیمار کی عمر بقدر کم ہوگی انجام اس مرض کا اسیقدر بُرا ہوگا۔ بڑھاپے میں یہ بیماری بیسوں تک جاری رہتی ہے اور یہ بات قابل یاد رکھنے کے ہے کہ کچھ اور شجیم آدمی کو جب یہ مرض ہوتا ہے تو بسنت کاغذ کے کم خطرناک ہوتا ہے۔ پیشاب میں شکر ہو مگر اور ار کم ہو تو وہ کم خطرناک ہوتا ہے۔ بسنت اسکے جس میں اور زیادہ ہوتا ہے حقد ر عر مدہ راز کا یہ مرض ہوتا ہے اسیقدر اسکا انجام بھی بُرا ہوتا ہے اور اسکی علامتیں جس قدر شدید ہوتی ہیں اسیقدر علاج سے کم فائدہ ہوتا ہے۔ جب یہ مرض فکر و ترود یا ضرب و زخم کے سبب سے پیدا ہوتا ہے تب امید شفا کی زیادہ تر ہوتی ہے۔ بسنت اسکے کہ جب کوئی بھی سبب اسکا دریافت نہیں ہو سکتا۔ اس مرض کے پیشاب میں اگر البیو۔ من پایا جاوے یا بیکٹیریا یا دیگر ذرات ہو۔ شفا بہت مشکل ہوتی ہے۔ من ضعف بصارت اور بے ہوشی وغیرہ صدمات غیر محمودہ ہیں۔ اس کیونکہ جب کسی بیمار میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں تب شفا کھلی کی امید نہیں ہوتی۔ اس مرض کے بیمار کو کار بنگل ہو جاتا ہے تب اکثر ٹھہک ہو جاتا ہے گو موت ہو جائے تب بدل آب دہو اسے بعض اوقات کار بنگل کا زخم اچھا بھی ہو جاتا ہے مین بہر حال اس بیماری میں کار بنگل کا ہونا ایک نہایت بُری علامت ہے۔ اس کے اکثر بعض خوب پتے ہیں۔ نیک علامات اس مرض کی یہ ہیں کہ شیریں یا شادبک کے قسم کی چیزیں اگر بہتر کر دیا جائے اور اس پر پیریز سے پیشاب میں شکر نہ پائے جائے۔ اگر کم پائی جاوے۔ اگر باقی جسمانی غذا کے کھانے سے بھی پیشاب میں شکر نہ پائے جائے تو سمجھنا چاہئے کہ مرض بہتر ہو گیا ہے۔ جلد اگر مرطوب ہو اور پسینہ نہ ہو تو یہ نیک بھی اگر وہی مرض یہ تب

ایک جسم جار سے تو یہ علامات نیک ہیں لیکن کہبات کو یا در کہنا چاہئے کہ اگرچہ علاج سے
جاری ہو کر جا رہے ہیں لیکن کی جان خطرہ میں رہتی ہے کیونکہ باقی میں ہیک
جناور۔ یا سہری لگ جاوے زیادہ سخت کرنی پڑے تو انھیں مشین کی بیماریاں رطوبت
ہو کر مریض کو جلد ہلاک کر دیتی ہیں *

تفصیل - اس مرض کی ایسی آسان ہے کہ اسکا بیان کرنا ضرور نہیں سمجھتے *

علاج - چونکہ ہم کو ٹیسک یہ معلوم نہیں ہے کہ کس عضو کی خرابی سے یہ مرض پیدا
ہو رہا ہے لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ اسکا استیصال کس علاج سے ہو سکتا ہے مگر یہ جاننا نہیں کہ
شدت کی وجہ سے اسکا علاج اس آغری اور کثرت سریشاب کا آنا خون میں شک کے جمع ہو جانے سے
پیدا ہوتا ہے یا واسطے سی تدبیر کرتے ہیں جس سے شک کی مقدار کم ہو جاوے اور چونکہ
ایسا عمل چھ کر ہی ہو سکتا ہے دو انہیں جانتے ہیں کہ شک پیدا ہونا پاوے اس واسطے غذا کی
پرہیز پر زیادہ در لگاتے ہیں یعنی جارا کو ایسی چیزیں کھانے نہیں دیتے جنہیں شک
ہو جاتی ہے یا اس اجزاء میں سے ہیں جو شک میں تبدیل ہو جاسکتے ہیں اور عادات
کی اصلاح کر دیتے ہیں کہ اگرچہ شفا کئی ممکن ہو مگر وہی نہیں کہ سکتے ہیں یہی غذا
اور کہ باتوں کی پرہیز سے بعض دفعہ شفا ہو بھی جاتی ہے ورنہ اتنا تو ضرور ہوتا
ہے کہ بیماری ختم ہو جاسکتی ہے۔ تکلیفیں رفع ہو جاسکتی ہیں اور مریض کی عمر وراثت
ہو جاسکتی ہے *

تذکرہ - اس تجویز کرنے کے باب میں ہماری یہ صلاح ہو کہ مریض کو ایسی چیزوں سے پرہیز
کراوین جنہیں شک ہو اس میں ایسے اجزاء جو دھون جو شک میں بدل جاسکتے ہیں آدمی
صرف جو انی غذا پر تندرست اور توانا رہ سکتا ہو۔ پس جہاں تک ہو سکے مریض کو جلدی
غذا کھانے کی تاکید کریں کیونکہ اکثر نباتات میں جراثیم کا ہوتا ہے جو جسم کی
روطات سے مل کر شک میں بدل جاتا ہے۔ مگر روٹی اور چاول وغیرہ اگر وہ نہیں ہو سکتا اور یہ

دو نو چترین اس بیمار می بین معین کینہ کاران دولون بین نشت سے اسٹایج ہوتا ہے
 اس وقت کے رفع کرنے کے لئے قسم قسم کی روٹیاں تیار کرنے کی ترکیبیں مایح ہو سکی ہیں۔
 بخاک ڈال کر کیا بیگیا جیونی غذا کی قسم ہیں۔ یہ بیمار۔ یہ کچھ کھا سکتا ہے مگر شیرش ہدا اور
 یہ کبھی کو نسبت شک ہو کر کونکران بین سندھوتی ہے۔ کشت ہر قسم کا پتیر کہن و غن طیلور
 چھلی اور انڈے جقدر طبیعت چاہے بیا رکھا سکتا ہے دودھ بھی چن دان مضر نہیں
 گواں میں بھی قدر سے شکا ہوتی ہو گی کہن کی روٹی کے عوض بیا کو ہو سکی کی روٹی کہانی
 چا ہر چین اسٹایج بالکل نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کپ۔ لرن کانٹہ اس روٹی کے بنانے کا یہ ہر
 نسخہ۔ یہ ہر ہو سکی لیکر پاؤ پاؤ گندہ لکٹ و وضع پانی میں جوش دین اور دو نو دفع چھلی سے
 چھان لین۔ اب اسی چھلی میں ٹنڈا پانی چھڑتے جاوین اور خوب مل لکھو ہوتے جاوین۔
 جب تک چھلی سے پانی صاف گزرنے لگے۔ اب ہو سکی کو چھلی سے کسی کپڑے میں لیکر خوب
 چھڑین تاکہ جہاں تک ہو سکے اسکا پانی نچڑ جاوے بعد ازاں چھلی کے برتن میں پہلا دین
 اور ہنور کی نرم آبیچ پڑھنا کرین مثلاً رات بھر رہنے دین صبح کو جب سو کہہ کر مضر ہی ہو جاوے
 تب پس لین اور تھک کی باریک چھلی میں کسی برش سے رگڑ کر چھان لین ورنہ تار کی چھلی
 کے سولج اسقدر باریک ہوتے ہیں کہ بغیر برش سے رگڑ چکے ان کے اندر سے سفوف گذر
 نہیں سکتا۔ جب یہ باریک سفوف ہو سکی کا تیار ہو جاوے تو اس میں سے ۳ آونس لے
 ہیں اور یہ چترین ملا لیں۔ یعنی ۳ عدد دان سے انڈے۔ ڈیڑھ یا دو آونس کہن۔ و سولج
 اونس دودھ تھوڑے سے دودھ بین انڈوں کو پھینٹ لین اور باقی میں کہن ملا کر سارے
 کی ملت بنا لیں۔ اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا لیکر تین کے پانچوان من جن میں انگریزی مٹھائی
 بنا کر تی ہے بہر دین اور کوہے کے تھال میں رکھ دین اور گندہ کے بعد جب پک جاوے
 تھال لین اور بیا کو صبح و شام ہمراہ گوشت اور پنیر کے کھلا دین۔ یہ ہو سکی کو دھونے اور
 خشک کرنے کی ترکیب جو کجا بیان اور پر کیا گیا ہے ابھی طح پابند ہونا چاہیے۔ تاکہ ہو سکی

کل اسٹاپج خوب طرح ذہل جاوے اور وہ آسانی سے پسی جا سکے۔

علامہ بہوسی کی روٹی کے اس مرض کا بھار گھو۔ ٹین کی روٹی بھی اہا سکتا ہے۔ اس کے تیار کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ گہوہن کے آٹے کو اس قدر روہوئین کہ اسکا سارا اسٹاپج ذہل جا۔ جی۔ باقی جو گھو۔ ٹین رہے اسکی روٹی کچھ الین اگر بھاری طبیعت این مین سے کسی روٹی سے ہٹ جاوے تو ایسا کہین کہ ڈبل روٹی کی پہلی پہلی تاشین تراشش کر انکو اس قدر سکین کہ قویب سین وہو جاوے تاکہ بہت ساحصہ اسٹاپج اور گھو۔ ٹین کا گرمی سے زایل ہو جاوے۔ ہر قسم کی رانی اور اوٹ ساگو دانہ۔ جوار۔ باجرا۔ اور دیگر قسم کے افاج مین اسٹاپج ہوتا ہے اور اسے اس طرح یہ سب چیزین منع ہیں میوہ جات جیسے آم۔ انگور۔ ناشپاتی۔ سیوہی۔ شہت۔ ت۔ انجیر اور دو۔ آلو بخارا۔ آرڈو۔ پھوپھو۔ کشمش وغیرہ وغیرہ نہ کھانا چاہیو۔ غرض کل تازہ میوہ جات سے پوہنیز کرنا چاہئے۔ بان پستہ اور بادام۔ اور اخروٹ کا مضایقہ نہیں اور ترکاڑی کی قسم سے یہ ترکاڑیاں منع ہیں آلو۔ پھندہ۔ گاجر۔ شلغم۔ مٹر۔ بیم۔ البتہ ساگ کا کچھ مضایقہ نہیں خاصکر سرسوں کا ساگ میتھی۔ پالک۔ گوبہی۔ پیاز۔ ترانترک۔ پانی سے یک لخت پوہنیز کرنا چاہئے اور نہ حد سے زیادہ پلانا چاہئے۔ چاء اور کافی بھی مریض پی سکتا ہے مگر بغیر شکر کے لیکن نان شکہ کے عوض گلانی۔ سی۔ رین یا سے۔ کے۔ رین وادے سکتے ہیں پیاس کے روکنے کے واسطے ڈائیکوٹ فاس۔ فارک اسٹد جہراہ پانی کے اور اسٹڈ ٹار۔ ٹرمیٹ اف پوٹاٹر پانی مین جس کے پلاوین۔ بجاوے کو سردی اور بارش مین بھیگنو سے بچنا چاہئے اور جہانگت ممکن ہو گرم کپڑے پہنے چاہئین تاکہ پسینہ تار ہے اور گاہے گاہے آب گرم کا غسل بھی کرنا چاہئے۔

کسی مرض کے علاج کا بیان کر نیکا جیشہ سے یہ قاعدہ چلا آتا ہے کہ پہلے دو اکاذکر کرتے ہیں بعد ازاں غذا وغیرہ بتلاتے ہیں مگر اس بیماری مین ہم نے اس قاعدہ کا خلاف اس واسطے برتا ہے کہ اسکو غذا کی پرہیز سے جبکہ رنائدہ ہوتا ہے واداسے نہیں ہوتا۔ واپس ہے کتنی

نہیں فائدہ مند ہوتا و نیشکار جیہ غذا کا پھینک کر سے فائدہ ہرگز نہیں ہوتا۔ پس یاد رکھو
 کہ جب زیادہ بطن کی بیماری کا علاج کہ وہ بطن کی غذا کا سب سے پہلے بندوبست کر دو ورنہ
 اس سے علاج سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا جو چیزیں اس بیماری میں منع ہیں انکو ہرگز نہ کھانا
 نہ پینے پہلے اس قسم کی پرہیز سے بیمار کی طبیعت گہرا تر ہے مگر جب اس پرہیز سے فائدہ
 ہے تب خود بھی مصنوعات سے احتراز کرتا ہے۔ اب دو اکا حال سنو۔ کوئی ایسا بیمار
 ہے جس کا شک کا پیدا ہونا اتنا کم ہو کہ اس کے لئے دوا کی پرہیز سے رک سکتی ہے۔ پس غذا کی پرہیز
 نہ کرنا چاہئے اور دوا کو اس بیماری میں ورنہ دوا پر تصور کرنا چاہئے۔

اس بیمار میں اس بیماری میں فیسول کے استعمال سے شک کا پیدا ہونا نہیں رک سکتا
 ان کو کھانی جاتی ہے تب مقدار پیشاب کی ضرورت گھٹ جاتی ہے بیمار کو چھین
 تر نکھین میں منع ہو جاتی ہیں۔ اس بیماری میں فیسول کی بہت برداشت
 ہے۔ نیچے چاروں میں تین دفعہ فی روز ایک مین دو دو تین تین بلکہ پانچ پانچ گزین تک فیروز
 دینا ہرگز نہ گزشتہ نہیں ہوتا +

یہ دوا کی بہت تریف کرتے ہیں مگر ان سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ایضاً یہ چیز
 فاسٹ ہیں۔ اپنا طبعی علاج کا یہ ہے کہ میں پہلے بیمار کی غذا کا پکا بندوبست کرنا ہوتا
 ہے۔ مگر وہاں سے شکا کو روکا ہو یا بیمار کو پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ اور تب کا ڈیوٹو
 مین بھرہ خواہ دے استعمال کرنا ہوتا ہے تاکہ بیمار کی طاقت قائم رہے اور خون بہا
 ہونا باوجود کیونکہ طبیعت میں جب تک طاقت رہتی ہے تب تک بیمار کو جیلے جاتی ہے۔ مگر
 مرض میں جب یہ مضمون کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تب اس نسخہ کا استعمال کرنا ہوتا ہے +
 نسخہ - سیاہی - کر - بونٹا ف پوٹاش ڈاگرین + ڈائیوٹ - ٹائیڈرو - سیاہی - اسٹ
 مٹھو - انفیوژن اف کلینا ڈیوٹ - آؤٹن سبکو ہاکر وین ۳ دفعہ دین + فولاد کے
 پین - سیاہی - ف ایون کر مین اچھا جانتا ہوتا ہے اور اس اچھا ڈوا - یا - لائینٹرو - اورن کو

سمجھتا ہوں چنانچہ سلفٹ اف ایرن کا یہ نسخہ میں پرانا ہوں ۔

لشخہ - سلفٹ اف ایرن ایک گرین ، کوئین ایک گرین ، افیون ایک پاؤنڈ گرین
سکولہا کر ایک گولی بنا دیں اور دن میں تین دفعہ کھلائیں ، ٹینچر آف اسٹیمپل کی دین سوئے
ایچا پھین جائے گا کہ اس میں کسیتھد رڈا - یو - رسے ٹمک اثر موجود ہے ۔

ڈایا - لائینڈ - ایرن کو بعد از ۳۰ یا ۴۰ یا ۵۰ قطر سے ہمارے ٹینکے دھین تین مرتبہ پلاتا ہوں
رفع قبض کے واسطے تھوڑا سا کٹریٹل یا سڈ - لٹرو یا پوڈیا گریم ، ریز یا پوڈیا کا استعمال
کرتا ہوں ۔ نشنگی کم کرنے کے لئے اسڈ - مار - ٹریٹ اف پوٹاش کو کام میں لاتا ہوں
چنانچہ دو ڈرام ایک بڑی بوتلی میں ملا کر پلاتا ہوں ۔ جب بیمار کو کھانے کا ہوتا ہوگا
ہے اور فم معدہ کے متعام پر پے چینی کی سکایت کرتا ہے تب اس ہینگ کی گولی کو
دن میں دو یا تین دفعہ کھلاتا ہوں ۔

لشخہ - ہینگ ۳ یا ۴ گرین ، اکٹرکٹ - اف جن - شن ۳ گرین ، ایک گولی بنا دیں
ملک اسٹریکے ایک ڈاکٹر آئیو - ڈو - فارم کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور اس نسخہ کو کام
میں لاتے ہیں ۔

لشخہ - آئیو - ڈو - فارم ایک گرین ، ڈو - رس - پاؤڈر ۴ گرین ، اکٹرکٹ - اف
جن - شن ۴ گرین ، ایک گولی بنا کر دین تین دفعہ کھلاتے ہیں ، چھکڑا اس واسطے
آزمانے کا حوصہ اب تک نہیں ملا ۔ مگر کچھ مضائقہ نہیں دوا یہ اچھی ہے اور قطع نظر اس کے
چونکہ یہ بیماری دوا کے قابو نہیں آتی ہے تو آئیو - ڈو - فارم کے استعمال کرنے میں
کچھ بڑا ہی نہیں ، بعض کو - ڈا - یا کی یہی تعریف کرتے ہیں ۔ مگر افیون اس سے بڑہ کر
فائدہ مند ہے ، شکریا بھی اس بیماری کو مفید ہو سکتا ہے جسے ماڈ - ارس - سو - لیوٹن
ڈا - پے ٹینر کی بیماری میں سے - لی - سی - لٹ - اف سوڈا بھی مفید ہے چنانچہ نسخہ آئوڈین
لشخہ - سے - لی - سی - لٹ - اف سوڈا ، اگرین ، ٹمک آف ٹمکس ، دایکا - ۵ منم ۔

الغیر ذوق اف جن شش ایک آؤنس بہ سکو ملا کر ایک خوراک کرین اور چار چار گنہٹ
بعد ملا دین لیکن غذا پر ہنر نہ جیسا کہ اوپر بتلایا ہے اسی طرح دینی چاہئے۔

۱۔ پیا۔ لے۔ ٹیڑگی خفیف قسمین۔ معمولی بیماری اور ان قسم خفیف میں
یہ فرق ہے کہ یہ اکثر ٹھمک ہنہن ہوتی ہیں۔ ان میں تشنگی بہوک کا ہوتا اور لاغری کم ہوتی
ہے پیشاب کی مقدار تھوڑے عرصہ کے لئے زیادہ ہو جاتی ہے۔ انکی مدت تھوڑی ہوتی
ہے اور عیلاج پذیر بھی ہیں شکر ان میں کم یا آتی ہی نہیں اور آتے آتے رُک جاتی ہے اور
پہر آتی ہے اس خفیف مرض کی تین قسمیں علاج میں آتی ہیں۔

قسم اول۔ پیشاب میں ہمیشہ شکر موجود ہوتی ہے ایسے سی۔ بک گراؤنی ۱۰۰ سے
۳۴۰ تک پیشاب کی مقدار تھوڑی ہی زیادہ ہوتی ہے اس میں نہ تو زیادہ تشنگی اور
نہ بہت بہوک لگتی ہے اور نہ بیمار زیادہ کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے مگر سارے ایام
مرض میں ایک سا رہتا ہے۔

قسم دوم۔ اس قسم کی خفیف بیماری میں شکر یا تو تھوڑے عرصہ تک آکر خفیف ہوتی
ہے یا آتے آتے رُک جاتی ہے اور پہر آنے لگ جاتی ہے پیشاب کی مقدار یا تو زیادہ ہوتی
ہے یا تھوڑی ہی زیادہ ہوتی ہے بیمار بہت ہی کم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے اس
قسم کی بیماری فکر و تردد سے یا سردی و رشت پر چوٹ لگنے سے پیدا ہوتی ہے اور
آخر کار بالکل جاتی رہتی ہے۔

قسم سوم۔ یہ وہ قسم بیماری کی ہے جو بڑھون کو ہوا کرتی ہے بیمار اوسط درجہ پر
موتہ تازہ ہوتا ہے۔ پیشاب کی مقدار اوسط درجہ پر ہوتی ہے شکر کی مقدار بھی بہت
ہنہن ہوتی پیشاب میں یورک اسڈ کے ذرے بکثرت جمع ہو جاتے ہیں ایسے لوگ نفوس
کے مرض میں اکثر مبتلا رہتے ہیں بعض غذا برسوں تک پیشاب میں شکر آتی رہتی ہو اور
بعض دفعہ نوبت نوبت آتی ہے انجام اس قسم مرض کا مختلف ہوتا ہے۔

کالی لیس یورین

یہ بیماری اکثر گرم ملکوں میں ہوا کرتی ہے۔ پیشابِ اسمین اکثر سفید گدلا مانند دودھ کے آتا ہے۔ مگر بعض دفعہ خفیف گلابی رنگ کا بھی آتا ہے۔ بسببِ ملجانے کی سیصد خون کے اور گاہے خون کے ڈبلے بھی اسمین ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب یہ پیشاب تھوڑے عرصہ تک ٹھہرا رہتا ہے تب جسم کو مثلِ فولاد کے ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ اس قسم کا پیشاب مٹانہ ہی میں جم جاتا ہے۔ اس صورت میں پیشاب کی وقت نہایت تکلیف اور درد ہوتا ہے۔ اس پیشاب میں کائیل کے روغنِ اخیرا ہوتے ہیں۔ اسمین اتیر ملانے سے روغنِ حل ہو جاتا ہے اور پیشاب صاف اور شفاف مثلِ تندرستی کے ہو جاتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسمین خون کا قافیہ۔ برین روغن اور البیو۔ میں ہوتا ہے اور صبحِ تازہ کی اجزا بھی معمولی مقدار میں ہوتی ہیں مگر اسکی اسپے۔ سی۔ ٹکٹ گراوٹی معمول سے کم ہوتی ہے اس عجیب بیماری کے پیشاب میں کیلوس ملا ہوا ہوتا ہے۔

اس مرض کا دور بے قاعدہ ہے کبھی تو تیز سے پیدا ہوتا ہے اور کبھی بسببِ گرجانے اور سخت محنت جسمی یا دماغی کے بعد ناگہاناً پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی عرصہ تک برابر جاری رہتا ہے اور کبھی رک کر پھر ظاہر ہوتا ہے اور دفعہ کے ایام میں صبح آتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب بیمار آرام چین سے رہتا ہو اور قاعدہ سے ہوتا ہے تب یا تو پیشاب میں کائیل کم یا بالکل نہیں ہوتا اور بعض دفعہ شبِ روز کے اندر جب بیمار پیشاب کرتا ہے تب ہی اس میں کائیل ہوتا ہے اور صبح کی وقت پیشاب صبح یا کائیل ملا ہوا کرتا ہے اور باقی کے تمام روز سفید دودھ کے طور آتا رہتا ہے خاص کر بعد غذا کے بیمار کی صحت میں مختلف طور پر فرق پڑ جاتا ہے یعنی بعض بیمار موٹے تازے رہتے ہیں اور بعض لاغر جاتے

[illegible]

ہوتی ہیں تو حد سے زیادہ بڑھ جانے کے باعث پہلے جاتی ہیں اور اس مقام پر یہ
سورخ مثل ناسور کے رہ جاتا ہے جس سے بر وقت پھیلنے کا سارلیقہ کے کانٹوں یا
لف کہلے طور پر پہنے لگ جاتا ہے ایک عارضی اخویہ یعنی تہلی سی بجائی جس سے
وقتاً فوقتاً کانٹے نکل کر یا تو گردہ کے چلے - رس یا لہ - سی - خمد مجری بول یا شائیز
جاگرتا ہے اور کان سے پیشاب کے ساتھ ملکہ یا نیزہ کے رستہ خارج ہوتا ہے
بعض ایسا ہی خیال کرتے ہیں کہ اس سارلیقہ میں ایک قسم کا کرم پیدا ہو جاتا ہے
اور یہ کرم انہیں سورخ کر دیتا ہے جس سے لف یا کانٹے نکل کر پیشاب کے منفذ و نمین مہلت ہے
علاج بعض دفعہ سعی علاج سے یہ بیماری نہیں جاتی مگر گیارہ ایک اسٹڈ اور انہوں
کی گولیان اسکو میٹھا پڑتی ہیں - اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کرم باعث اس مرض کا ہے
تو کوئی دو اکرم کش جیسے روغن برچین کا استعمال کرنا چاہئے ۔

وا - یو - سی - س

یا

پو - لی - یو - ری

غلی سے اس بیماری کو بعض ڈاکٹر - یا - بے - ٹیزان - سی - بے - ڈور ہی کہتے ہیں ۔
علامات اس بیماری کی اکثر دو ہی علامات بیماری ہوتی ہیں ایک شدت
کی پیاس دوسری کثرت سے پیشاب کا آنا - بعض دفعہ پیشاب میں لہ - ری - اور
کلورائیڈ آف سوڈیم - ام کی زیادتی ہوتی ہے ۔

علاج قاحضات کا استعمال کریں جیسے نسخہ ٹینکچر آف اسٹیل ۵ ابوند ۔
ڈائیلوٹ - ہائیڈرو - کلورک اسٹڈ - ابوند - پانی ۴ ادرام - بکس ما کرچہ ۲۰ جم
گھنٹہ بعد پلاوین اور یہ نسخہ بھی چہا ہے -

نسخہ - ہشکری ۹۰ گرین - سلفٹ - ایرن - ۲۰ گرین - کونین - ۲۰ گرین -

ڈائیکلوٹ - سلیفورک اسٹڈ ایک ڈرام + پانی ۸ آؤنس + سبکی ملائیں +
 خوراک آٹھواں حصہ بعد غذا کے دغین تین دفعہ دو آؤنس پانی کے ہمراہ پلاوین + لیفٹ
 ایفون کے استعمال سے اس بیماری کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر ٹرو - ساوی لے ری آؤ
 کی بڑی تعریف کرتے ہیں چنانچہ دے - لے - ری - آؤ کا سفوف دس یا پندرہ گرین کی مقدار
 میں پہلے دغین تین دفعہ اور تب چار یا پانچ یا چھ دفعہ دغین جب تک اثر اس کا ظاہر نہ ہو دینا
 چاہئے + بیمار اگر باخراور کمزور ہو تا جاوے تو کا ڈیور - آؤس ملاوین اور اس نسخہ کا استعمال کریں
 نسخہ - ڈائیکلوٹ - فاس - ٹارک اسٹڈ ڈیڑھ ڈرام + ٹینکراف ٹیکس - وائیکا ایک
 ڈرام + کیناؤڈ ٹینکراف سنکونا ۳۳ ڈرام + پے - پریمنٹ واطر ۸ آؤنس + سبکی ملا کر
 چھٹا حصہ کہانے سے دو گنٹہ پہلے دغین تین دفعہ پلاوین + پانی کم پلاوین اور غذا مقوی میں +

امراض مشانہ

سش - ٹائیٹس

یعنی

مشانہ کا انفلاشن

مشانہ میں انفلاشن بہت کم ہوتا ہے اور ایکوٹ قسم کی بیماری تو بہت ہی کم
 دیکھنے میں آتی ہے بلکہ طبیب کے مشاہدہ میں کرائک سش - ٹائیٹس ہی
 اکثر آیا کرتی ہے مگر یہ بیماری بہت ہیلی ہوتی ہے +

اول کیوٹ سس۔ ٹالی لٹس

اگرچہ یہ بیماری کل مشانہ میں ہو سکتی ہے، پر یہی مشانہ کے کسی کسی حصہ کے میوہ کس پر وہ
میں مگر خاص کر مشانہ کی گرون ہی میں زیادہ ہوتی ہے *

اسباب - بعض دفعہ یہ بیماری زخو و پید ا ہو جاتی ہے مگر اگر انک انفلامیشن کے
سبب سے اکثر ہو جایا کرتی ہے۔ نائیزہ رحم اور خستہ الرحم کا انفلامیشن پہلے کہ مشانہ کو
مبتلا کر سکتا ہے اور مرد میں سوزاک اور سٹرکچر اور نائیزہ میں کسی تیز دوا کی پچکارہی سے
بھی یہ بیماری پیدا ہو جا سکتی ہے، ضرب و زخم رحم یا دہی - رسی کی کسی سولی کا
دباؤ مشانہ میں پتہری * کن - تہے - رسی - ڈش وغیرہ تیز چیزوں کا استعمال اور
مشانہ میں عرصہ تک پیشاب کا رکا رہنا بھی بعض دفعہ اس بیماری کا باعث
ہوتا ہے *

علامات - بیمار کو سری معلوم ہو کر مشانہ میں شدت کا درد پیدا ہوتا ہے
نائیزہ میں جلن معلوم ہوتی ہے اور بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی رہتی مگر پیشاب تھوڑا
تھوڑا آتا ہے - شدت کا بخار ہوتا ہے جی متلاتا ہے اور بیمار پست ہمت ہو جاتا ہے
مشانہ میں اس شدت کا درد ہوتا ہے کہ ٹیٹل سکی سکیون نائیزہ بلکہ رانوں تک
پہنچتی ہے - پیشاب جب آ جاتا ہے درد کو تخفیف پہنچاتی ہے لیکن پیشاب کے
جمع ہونے ہی درد پر شدت پکڑ جاتا ہے - مشانہ کی خراش سبب اتصال کے
بیکٹرم تک اکثر پہنچتی ہے جس سبب سے پچش کے ساتھ آؤن اور لہو آتا ہے
دو یا تین دن میں انفلامیشن نہ رکا جاوے تو درد کی شدت نہایت بڑھ جاتی
ہے - پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے مگر پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے اور اب
چونکہ مشانہ کی دیوار کمزور ہو جاتی ہے اس واسطے پیشاب اُس میں جمع رہتا ہے

پیشاب سرخ رنگ کا بدبودار اور کھانا ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس میں فاسی - برین کی وجہ سے ہوتا ہے جن میں پیپ اور خون کے کیسے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ سبب انفلیمیشن کچھ عرصہ تک جا رہی - رہتا ہے تب متصل کے اعضا میں پھیلنے لگتا ہے جیسے بحری بول رحم وغیرہ اور اب بچہ روز بروز نڈھال ہوتا جاتا ہے جسم سرسید سے معرق رہتا ہے - تب نفس کمزور ہو جاتی ہے ہڈیاں ہونے لگتا ہے اور مرض کے ساتویں دن سے بارہویں دن کے اندر بیمار تلف ہو جاتا ہے۔ بیمار ہی جب بہت شدت کی پہنچ ہوتی ہے تب بعض دفعہ شفا بھی ہو جاتی ہے بامیو - کس پر دین جسم بڑھ کر اور خرابیاں پیدا کرتا ہے۔

علاج - مثانہ کے مقام پر بڑی بڑی پولٹس باندھیں یا پوست کی تکمید کریں اور مریش کو بار بار آب گرم میں بٹھا دیں - تبض ہو تو کسٹرائیل کا حباب دیں - پیشاب کے رک جانے کی تکلیفیں پیدا ہوں تو سلمائی کا استعمال کریں ورنہ سلمائی داخل نہ کرنی چاہئے - غذا نہایت ہلکی دیں جیسے آش جو دودھ - ساگو دانہ - لعاب ریشہ خطمی دہیدانہ مگر چارہ کافی اور خمر سے احتراز کریں -

مقدمین بلا ٹو - نا اور نسیون کی سپا - نرمی - ٹری رکھیں -

نشہ - اکثر کٹ اخ - پیم ایک سے مگرین تک - اکثر کٹ ان بلا - ڈونا - مگرین - موم - مگرین - سکو ملا کر سپا - نرمی - ٹری کی ایک گولی بتالین +

دوم کرائیکسٹن ٹائیٹس

یہ بیماری بہتر سے سببوں سے پیدا ہوتی ہے چنانچہ بعض دفعہ تو ایکوٹ بیماری کرائیکسٹ ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ رو - ما - ٹیٹرم اور گاوٹ کے مادہ کے سبب یا پیشاب کے بگڑ جانے کے باعث یا پیشاب میں نمکین مرکبات کے زیادہ ہونے کے سبب

کے علاج میں دیا گیا ہے۔ اور سکرم پر بلا۔ ڈو۔ نا پلا سٹر بھی فائدہ کرتا ہے۔
 بیماری کی طاقت زایل نہو نا پاوے۔ مضمہ بگڑ گیا ہو تو اسکا تدارک کرین اور
 غذا ملکی اور مقوی دین ۴

مشانہ کی خراش

مشانہ میں خراش ہے یا نہیں۔ یہ بات اسوقت رکھی جاسکتی ہے کہ جب مریض کو
 بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے چنانچہ گروہ مشانہ پر اس۔ ٹٹ گلاٹ یا
 یا ناسرہ میں جب انفلامیشن یا ڈنبل یا رسولی یا کنسر یا اسٹریچ ہو جاتا ہے تب
 پیشاب بار بار آتا ہے۔ رحم کے ٹل جانے یا ایام حمل میں جب رحم مشانہ کو دباتا
 ہے اور مشانہ میں رسولی یا پتھری کے ہونے سے بھی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔
 مضمہ کے بگڑ جانے یا گروہ یا مشانہ کی بیماری کے سبب سے جب پیشاب میں
 یووک اسٹڈیا کوئی مرکب یورٹ یا از قسم انڈرلٹ کے ہوتا ہے تب بھی مشانہ میں
 خراش پیدا ہو کر پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے ۵

علامات۔ پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے بیمار سے آدہ گنہٹہ تک
 ہی پیشاب روکا نہیں جاتا۔ روکنے کی کوشش کرے تو نہایت بے چینی اور
 درد ہوتا ہے ۶ جب یہ بیماری عرصہ کی ہو جاتی ہے تب مشانہ سکڑ کر چوڑا ہو جاتا
 ہے جس سبب سے اس کے اندر دو تین آؤنس پیشاب بھی سما نہیں سکتا حالانکہ
 صحت میں پندرہ یا بیس آؤنس تک بھی آ جاتا ہے۔ ہر حالت میں پیشاب کو
 امتحان کر کے دیکھنا چاہئے کہ اسٹڈیا انکلی ہے اس میں مرکبات از قسم یورٹ یا
 فاس۔ فٹ یا انڈرلٹ کے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں کہ پیشاب میں پیپ یا البیو میں
 یا سکریما کوئی آؤنہ فاسد ماوہ ہے یا نہیں۔ اس امتحان سے سبب بیماری کا

معلوم ہو جاتا ہے *

بچوں کا پیشاب جو خطا ہو جاتا ہے ران - کان - ٹکے - شش - اف - یو - رن - تو وہ بھی مشانہ کی خراش کے سبب سے ہوتا ہے - ہین تو ریٹیم مین کرم کے سبب یا جب بچہ کو البیو - مے - نو - ریا یا ڈا - یا - بے - ٹیز کی بیماری ہو جاتی ہے تب انکا پیشاب خطا ہوتا رہتا ہے - اور جب طبیعت یو - رن - اسٹک کے پیدا کرنے میں مایل ہوتی ہے تب بھی یہ مرض ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ جب سونے سے تھوڑے عرصہ پہلے بہت سا پانی پی لیتے ہیں یا جب پیشاب ہینن کر کے سونے جاتے ہیں تب بچہ نے مین موت دیتے ہیں - ہم نے ایسا بارہا دیکھا ہے کہ جب یہ سادت بچہ پین مین پڑ جاتی ہے تب ساری عمر رہتی ہے *

علاج - گرم خیر کھانے یا پینے کو زہین - پیشاب کھارہ یا بہت ہی کم ترش ہو تو اس نسخہ کا استعمال کریں **لشخہ ڈائیکوٹ** - **نایٹرو** - **ٹائیڈرو** - **کلورک** - **اسٹڈیڈ** - **ڈرام** - **ٹینکچر** - **اف** - **بلاڈونا** - **ایکڈرام** - **لے** - **کوئڈ** - **اکٹر** - **کن** - **اف** - **پیرا** - **ایکڈرام** - **ڈیکاک** - **شن** - **اف** - **پیرا** - **آؤنس** - **سبکو** - **ٹاکر** - **اسکاچ** - **ٹھیک** - **لین** - **گولڈ** - **مین** - **سے** - **ایک** - **گولی** - **کے** - **ساتھ** - **چہ** - **گنہ** - **بعد** - **پلا** - **وین** - **لشخہ گولیوں کا** - **بن** - **زائیک** - **اسٹ** - **م** - **گرن** - **قد** - **رے** - **گوند** - **کے** - **ہمراہ** - **ٹاکر** - **چہ** - **گولڈ** - **مین** - **تقسیم** - **کریں** - **پیشاب** - **بہت** - **ترش** - **ہو** - **تو** - **اس** - **لشخہ** - **گولڈ** - **مین** - **لشخہ** - **ٹائیڈ** - **ل** - **پوٹاسی** - **اسے** - **ا** - **بوند** - **ٹاک** - **ٹینکچر** - **اف** - **بن** - **بن** - **بوند** - **ٹائیڈ** - **اف** - **بیو** - **کیو** - **م** - **ڈرام** - **سبکو** - **ٹاکر** - **مین** - **تر** - **دفعہ** - **پلا** - **وین** - **یہ** - **صرف** - **ایک** - **خوراک** - **ہے** - **رات** - **کی** - **وقت** - **متعد** - **کے** - **اندر** - **میں** - **ون** - **کی** - **سپا** - **زنی** - **ٹری** - **مخل** - **کریں** - **یا** - **پانچ** - **سات** - **گرن** - **اکٹر** - **کٹ** - **اف** - **بن** - **بن** - **کی** - **گولی** - **کھان** - **یز** - **یا** - **ایا** - **ا** - **بوند** - **ٹینکچر** - **بلا** - **ڈونا** - **ہمراہ** - **میں** - **اندہ** - **اسی** - **کے** - **پلانے** - **سے** - **بیا** - **ڈرام** - **سے** - **سوتا** - **ہے** - **بیماری** - **سخت** - **اور** - **ہٹیلی** - **ہو** - **تو** - **سلائی** - **سے** - **پیشاب** - **ٹاکر** - **ایک** - **آؤنس** - **پانی** - **میں** - **ایک** - **گرن** - **مار** - **میں** - **اصل** - **کر** - **کے** - **مشانہ** - **میں** - **اُسکی** - **پکڑی** - **کرنے** - **سے** - **بہت** - **فائدہ** - **ہوتا** - **ہے** - **مکرو** - **رہی**

ہو تو مرکبات خواجہ کا استعمال کریں۔ نسخہ مذکور حسب کسی عدا سے فائدہ نہیں ہوتا ہے تب
یہ نسخہ مفید پڑتا ہے نسخہ شکر پراں کرتا ہے۔ رسی ٹرس ۵۰ بونڈ ۱۰ ٹیکٹرا فاسٹیلن ایاد
جو فہم پانی آئے آؤٹس ۳۰ سیکو عا کر ایک خوراک کریں اور دسین تین دفعہ علاوین ۴
بچہ کشا پیشاب اکثر اس سبب سے بچہ نے میں خفا ہو جاتا ہے بچہ ذکر اور پک کیا گیا ہے تاہم
بہاوی سبب بچہ نے میں مرتبہ کا بر عاوت سے اور یہ عاوت بد اس وقت زیادہ مستحکم
ہو جاتی ہے کہ جب سونے سے بچہ بہ بہت رہا پانی یا کوئی اور تیلی جنیری جاتا ہے یا
رات کے وقت اسکو سردی لگ جاتی ہے یا جب چیت سوتا ہے ۴

علاج - پانی یا کوئی اور جنیری یا کہ نہ سلا یا کریں۔ رات کو اٹھا کر دو تین دفعہ
پیشاب کرایا کرتے ٹیکٹرا فاسٹیلن ہمواد تھوڑی تو بڑی مقدار بلا ٹو۔ نا کے پلا کر
طاقت بخشین اور کمر اور کمر مٹی پر بلا۔ ڈونا یا بلا۔ ڈونا یعنی منٹ کی لٹر
بھی مفید ہے۔ کرم اس مرض کا باعث ہوتا ہے اسکا علاج کریں غذا کی غلطی ہو تو اس
کو درست کریں ۴ بعض دفعہ پیری۔ جیوس جب بہت لینا اور اس میں
چوٹا سا سوراخ ہوتا ہے تب بھی پیشاب خفا ہو جاتا ہے اس صورت میں
خطہ کر دینا چاہئے ۴

بستر پر پیشاب خفا ہو جانے کے باب میں بعض طبیب کی یہ رائے ہے
کہ جب بچہ کے مثانہ کا اس۔ خفا۔ ٹر مسل کمزور ہو جاتا ہے تب پیشاب نہ نرہ
کے اوپر کے حصہ میں آکر ٹھہر رہتا ہے جس سے آسانی سے نکل پڑتا ہے اور مثانہ کے پیر
ہو جانے سے یہ بات نہیں ہوتی کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ دو گھنٹہ بعد سو جانے کے پھر پوٹ
دیا کرتے ہیں۔ پس اس علاج اسکا یہ ہے کہ چار پائی کے پائنتی کے دونو بایون کے
نیچے اینٹ رکھ دین تاکہ بہ نسبت ٹھنڈے کے پائنتی ادھی سے۔ البتہ پیشاب کر کر بچہ کو
سکنا چاہئے اور سوتے وقت پانی نہ پلانا چاہئے ۴

مِس - ٹر - جس
یعنی جہلی

اُم - پو - ٹن - سی - حسنی - نامری

اور
اس - پر - مے - لو - ریا
یعنی
جہان منی

واضح ہو کہ خلق سے بڑھ کر کوئی عادت ایسی بُری نہیں ہے جس سے علاوہ نامردی اور جویان منی کے صدہا قسم کی بیاریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور یہ ہجرت کی بات ہے کہ صرف لڑکے ہی نہیں بلکہ مرد و مشین بھی جیسے مبی کے تار اور منہ روت کے پو باری پسین مبتلا ہیں۔ تم نہتے ہو گے اور کہتے ہو گے باین ریش و فیش۔

علامات۔ جبکہ خلق کی عادت ہوتی ہو انکو یا تو رات کو سوتے وقت یا دن کو وقت اور بعض دفعہ غصہ و تناسل کے ذرا سی رگڑ یا خراش سے بھی منی ٹپک پڑتی ہے اس مرض کا بیاہر ہمیشہ بے چین نشست بزدلا اور منحوم رہتا ہے درو سر اور در دوران سر کی شکایت کرتا ہے۔ کانوں میں آواز زین سنائی دیتی ہیں بصارت میں فرق پڑ جاتا ہے پتلیاں پہیل جاتی ہیں دل دھڑکنے لگتا ہے ذرا سی حرکت سے سانس چڑھ آتی ہے ادنی سی آواز سے بیاہر چونک پڑتا ہے اور ادنی سی بات سے چڑ جاتا ہے اور انکو کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گشت سے آب سر و ٹپک کا ہوا جسم پر چونٹیاں رنگیتی ہیں یا ہاتھ مکر و ڈور شل

تلا آؤ زندہ رکے پوجاری کا نام رت نکدیتھین حیرت کیوں آئی۔ حافظ کا قول
تھے کہ کہتا ہے ۔

شعر

و این جلوہ بر محراب و ممبر میکنند چون بر خلوت میفرزد آن کار و دیگر می کنند۔
مگر ایک ایسی باجی اور نامقول عادت ہو کہ چٹنگ ایک خاص ڈھنگ اور ایک
خانہ ۔ جو صرف تجربہ سے حاصل ہو سکتی ہے دریافت نہ کیا جو چار ہرگز اس کا
اقتدار ۔

ع کی عادت کو ترک کر دینا چاہئے ورنہ علاج سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا
یہ قاعدہ ہر کچھ شب کے خیرش ہو اگر کتی ہے اور نیند ٹوٹ جاتی ہے مگر مجاور
آنکھیں بند نہ نیم خواب میں پڑا رہتا ہے اور اس وقت شہوت انگیز
باتوں کا نظیر اپنی عادت بد کا متکب ہوتا ہے۔ مریض کو کسی غیر خواہ برگ
آدمی کے پاس لے کر حرکت بد کے وقت اُس کو روک دے سکے ہر روز غسل کر لے
خزاید ہی سلن اور کم مصالحہ دار کھلاوین کہانے پینے کی گرم چیزوں سے
پرہیز کرادین نہ دین۔ دوا کے طور پر مقویات کا استعمال کرادین۔ چنانچہ
دوا کے باب میں ذکر کرنا ہوں وہ یہ ہے کہ ابتدا میں معدنی مقویات جیسے
نولا اور فاس۔ ہ مضر پڑتے ہیں۔ ان سے شب کے وقت خیرش زیادہ
ہوتی ہے اور خور جاتا ہے۔ پس میرا یہ قاعدہ ہو کہ چار کو پہلے ایسی دوا
دیتا ہوں جسے شہواور خیرش نہ ہونا پادے۔ چنانچہ۔

شعہ۔ برو۔ مائیم۔ ایک ڈرام ہا سرپ۔ ایک اونس۔ پانی ڈالو
سب کو لاکر بقدر لکین مین ۳ دفعہ پلاوین۔ مگر تیسری خوراک سونے وقت
پلانا چاہیے۔ ہفتہ دو۔ اس قدر کم ہو جاتی ہے کہ خیرش تک نہیں ہوتی
بہاقی مقویات کا اس پر چنانچہ۔

بجاردن کو براہِ شیش - فاس - نوٹو این پاتا تھا نگار کر کے لی گویوں کو اس سے زیادہ مفید دیکھتا ہوں چنانچہ نمبر کی گویوں کا استعمال اسطرح کرنا ہوں کہ ایک گولی صبح کی غذا کے بعد ایک قریب دو بجے بجار کو کچھ کھلا کر اور تیسری گولی شب کی غذا کے بعد کھلاتا ہوں۔ دو تین ہفتہ تک فی خوراک مین صرف ایک ہی گولی کا استعمال کرتا ہوں۔ بعد ازاں ہر خوراک مین دو دو گولیاں کھلاتا ہوں۔ ان گویوں کو علاوہ معدہ مین نہ کھلانا چاہئے اور تاکہ ان سے فائدہ ہو عرصہ دراز تک استعمال کرنا چاہیو اور یہ کہ ہفتہ دو ہفتہ استعمال کر کے پانچ سات روز ترک کر دینا چاہیو تب پھر استعمال کرنا چاہیو اسطرح عرصہ دراز تک گویوں کا استعمال جاری رکھنا چاہئے۔ مباشرت سے پرہیز رکھنا چاہیو۔ قبض نہ ہونے دینا چاہئے۔ علاوہ نمبر کی گویوں کے ایسے تیز تر گویوں نمبر ۱۴ اور نمبر ۱۵ کی بھی کھلاتا ہوں۔

اگر گرم خنسنے سے تکلیف ہو تو انکا دفعہ کرین اور بواسیر کا علاج مناسب کرین اور کوئی جلدی مرض عضو تناسل پر ہو تو خاص علاج سے انکا دفعہ کرین اور ایسی بیماریاں جیسے تنگ ہو جانا مقعد اور ناتنہ کا یا شق ہو جانا مقعد کا جراح کے حوالہ کر دین۔

آتشک

اس مضمون کا لکھنا مین نے اس واسطے مناسب سمجھا کہ لوگوں کا خیال آتشک کی نسبت نہایت غام ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آتشک ایک نہایت ادنی مرض ہے جب اسکا ابتدائی زخم خش ہو جاتا ہے تب کوئی بھی برائی اس مرض کی جسم اندر نہیں رہتی ہے نتیجہ اس غم خیالی کا یہ ہوتا ہے کہ ہزار ہا آدمی جنکو الٹ نہ آتشک ہو جاتی ہے ساری عمر اسکی برائی مین مبتلا رہتے ہیں چنانچہ ہم اس بات کو ذیل مین ثابت کر دینگے۔

حکاک اس سیات پر اتفاق ہے کہ جسم حیوانی مین سے شل سم آتشک کوئی نہر ایسا تیز نہیں ہوتا جس طرح انسان کا جسم تیز اور ناقص ہو جاتا ہے اور یہ کہ نہر ایسا جدید ہو کر اپنے

مریض کو عرصہ دراز تک دین غریبہ کے کاموں سے نکلنا کر دیتا ہو اور اپنا اثر بیکار
 مریض کے اعضا سے بیکار ہونا ہر کردیتا ہے چنانچہ اکثر امراض مزمنہ ایسی آتشک کے سبب
 پیدا ہوتے ہیں اور ان سے بیکار ہونے کی وجہ بیکاریاں جو بے معلوم طور پر اپنے مریضوں کا
 کرتی ہیں ایسی آتشک کے سبب پیدا ہوتی ہیں۔ اور بیکاریاں کی بیماریاں اور جلد اور
 میوہ کس ممبرین کے وہ زخم جو نہایت بھلی ہوتے ہیں اور جلد کے ثبور جو دو آتشک کے تابوین
 وقت سے آتے ہیں اور مختلف قسم کے دروس اور عصبی بیماریاں اور نامردی اور اسقاط
 حمل اور مر جانا جنین کا جسم اندر یہ ساری خوابیاں ایسی نجیہ آتشک کے سبب
 پیدا ہوتی ہیں *

یورپ میں یہ بیماری سبب لوہین شفیض کی گئی اور اس زمانہ کے ابلتے اس مرض کے
 جو علامتیں اپنی تصنیفات میں دیح کی ہیں اُسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مرض اس
 زمانہ میں بہ نسبت زمانہ حال کے زیادہ تر شدید تھا اور اپنے بیماروں کو جلد تر ہلاک
 کرتا تھا لیکن یہ کچھ ضرور ہمین ہے کہ سبب اسکا یہ تھا کہ زہر اس مرض کا اُس زمانہ
 میں تیز تر تھا لیکن غالباً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اُس زمانہ میں کثرت سے شراب
 پیتے تھے اور جسم کی صفائی کی طرف کم متوجہ ہوتے تھے حکیم اصلاح دیر سے پتے ہو اور
 ابلتے اسکا علاج اچھے طور پر نہیں سمجھتے تھے۔ مشرہ صمدی میں ابلتے اس مرض کو سو درجہ
 میں تقسیم کیا تھا یعنی درجہ اول (پرائی سے۔ ری) درجہ دوم (سکن۔ ڈری) اور
 درجہ سوم (ڈرٹ سے۔ ری)۔ درجہ اول میں ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کے بعد یا آتشک کے
 پپ سے ٹیکا لگانے سے زخم پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسکی پپ کے قریب آتشک کا
 اثر خون میں سرایت کر جاتا ہے۔ اور دو یا تین ہفتہ یا لکھی ہفتہ بعد خشک
 ہو جانے زخم کے۔ دوسرے درجہ کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور یہ
 قاعدہ ہے کہ آتشک کا زخم جلد دیر تک رہتا ہو اور وہ زخم جلد زیادہ

ہوتا ہے علامات درجہ دوم کی بھی اسی قدر زیادہ تیز و تند پیدا ہوتی ہیں مزید برآں
آتشک کے زخم کے پیدا ہونے کے وقت بیمار کی صحت جلد زیادہ بگڑتی ہوئی ہوگی اس
موزی مرض کا زہر بھی اسی قدر جسم میں زیادہ جلد سرایت کر جائیگا اور درجہ دوم
کی علامتیں بھی اسی قدر زیادہ رومی پیدا ہونگی۔

یاد رہے کہ یہ کچھ ضرور نہیں ہے کہ اندام نہانی پر جو زخم آتشک کا ہوتا ہے دینی شکر
اس کے ذریعہ اس بیماری کا زہر جسم کے اندر سرایت کر جاوے کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ
میسو کس مہرین کے دائرہ کی رطوبت سے یا کسی اور مقام کے تیز آتشک کے زخم کے سبب
سے سخت قسم کا شکر پیدا ہو سکتا ہے چنانچہ ایسا بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بلا مجامعت
کے بھی نیک کا زخم پیدا ہوا ہے مثلاً جب ان لمون کا بوسہ لیا گیا ہے جس پر آتشک کے
وانے ہوں یا جب اس حلقہ کو پیایا گیا ہے یا اس پیالہ میں پانی پیایا گیا ہے جس میں آتشک
کے بیمار نے پیا ہو تب بھی یہ بیماری پیدا ہوئی ہے۔ اور آتشک کے نطفہ کے بچہ کو ڈوہ
چلانے سے بھی مرضہ کو آتشک ہو گئی ہے اور آتشک کے مواد سے ٹیکا لگانے سے بھی یہ
بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ایسا قیاس کرتے ہیں کہ جس شخص کو آتشک ہوئی ہو اس کی
مٹی کے ذریعہ عورت کو بھی آتشک ہو سکتی ہے اور اس میں تو کچھ بھی شک نہیں ہے کہ آتشک
کے نطفہ کا جنین اپنی ماکہ بھی اس مرض میں مبتلا کر سکتا ہے۔

علامات درجہ دوم۔ اس مرض کے دوسرے درجہ میں امراض مفصلہ ذیل پیدا
ہوتے ہیں جسم پر گلابی رنگت کے دھبے یا پے۔ پو۔ لریٹس۔ ٹیو۔ رقص کی پنہ پان
ایسے۔ لے اور اور زخم کے دانے پیدا ہو سکتے ہیں (دیکھو امراض جلدی) علاوہ ازیں
پیر مرض آئے۔ کیا اور جسم پر زخم اور حلق زبان اور لمون وغیرہ پر کان۔ ٹومی۔ لو۔ ما
بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور ٹان۔ سل۔ گلا ندھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ مہر
مرض آئی۔ راتی۔ ٹن۔ بھی پیدا ہو جاسکتا ہے اور ہڈیوں کے پڑے۔ ری۔ ٹن۔ ٹن۔

مین انفلا میشن ہو جاسکتا ہے ۛ اندام نہانی کے زخم کے خشک ہو جانے کے بہت عرصہ بعد اور کچھ عرصہ بعد رفع ہو جانے علامات درجہ دوم کے تیسرے درجہ کی علامتیں ذیل پیدا ہوتی ہیں مثلاً جلد پر وہ پیا کی بیماری اور گہرے گہرے زخم پڑ جاتے ہیں۔ اور مالوحتی زبان اور عورت کے اندام نہانی نہایت جلد گھٹنے لگتے ہیں۔ ہڈیوں کے پر وہ پے۔ رمی۔ آس۔ لٹے۔ آٹم مین انفلا میشن ہو جاتا ہے اور این پر نوٹ۔ پید ا ہو کر پھیلے تو وہ زخمی اور تب ہڈیاں مُردار پڑ جاتے ہیں اور اعضا کو رُخسہ ہوتا ہے بڑا ستور پڑ جاتا ہے ۛ اور غالب ہے کہ جن شخصوں کو تیسرے درجہ کی آتش ہا جاتی ہے اور ان کے نطفہ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی طبیعت امراض اسکا فیولہ اور سیل اور لٹے۔ بش۔ مے۔ بن۔ لٹے۔ ریکا اور ٹامڈر وکفٹس مین مبتلا ہونے کے لئے مائل رہتی ہے ۛ

علامات۔ جب آتش کا زہر جسم مین سرایت کر جاتا ہے تب علامات مفصل ذیل پیدا ہوتی ہیں چنانچہ ابتدائین بیماریاں کے جسم اندر نہایت ہل چل مچ جاتی ہے یعنی بیمار ہو جاتا ہے مریض بہت اور زٹٹا ہل ہو جاتا ہے ورت و پا اور جوڑون مین درد ہو نہ لگتا ہے۔ شدید درد سر اور بے خوابی ہوتی ہے اور رنگت جلد کی چلی پڑ جاتی ہو آتش کے بیمار اور دردوں کو اکثر رات کے وقت شدت ہوتی ہے اور بربساں کے بیمار کا خون تپلا پڑ جاتا ہے دانے۔ میا، دم لینے مین اسکو تکلیف ہوتی ہے۔ دل دھکن لگتا ہے پاؤں پر دم اڑتا ہے اور تب جسم پر داغ نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ اگر علاج سے روکنا ہو یا رمی کا بدل جاوے تو تھیک کے سخت ہونے کے ہفتے یا مہینے بدشکم اور دیگر امعا مزاج جسم پر گلابی رنگ کے بخارات خوشون کی طبع منور ہو جاتے ہیں این کو دبائے تو مٹ جاتے ہیں لیکن اس مقام پر زردی مائل ایک داغ رہ جاتا ہے کہ جس مین بالکل خارش نہیں ہوتی اور ساتھ ہی اس کے مالو کا مقام سُرخ ہو جاتا ہو

اور خلق میں خراش اور جنگی پیدا ہوتی ہے اور شاید تھوڑے بہت بال بھی جھرنے لگتے ہیں چڑ سے اور گردن کی گلیٹیاں بھی بڑھ جاتی ہیں یہ علامات جمعی کی شدت میں بہت اختلاف ہے۔ تھوڑے عرصہ کے بعد گلابی رنگ کے دھبے مرجھانے لگتے ہیں لیکن تب کوئی نہ کوئی اور قسم کے بھار پیدا ہونے لگتے ہیں مگر بچے۔ پیو۔ لڑکھ کے بھار چہرہ سر جسم اور ماہتہ پاؤں پر اکثر نمودار ہو جاتے ہیں۔ رنگ ان بھارات کا تانبے کا سا ہوتا ہے۔ اور جب وہ بڑھنے لگتے ہیں تب ان پر چمکے پیدا ہو جاتے ہیں یعنی مرض سو۔ رائی۔ سبب کی سعل پڑھتے ہیں بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے۔ پیو بڑھ کر اونچے بیو۔ برکل بن جاتے ہیں اب ملائم تالو اور حلق میں غم پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یا ٹان۔ سل گلاڈ میں گہرے گہرے زخم پڑ جاتے ہیں اور خلق کے میو۔ کس پر وہ پرمٹھہ کی باجھون میں اور عورت کے اندام نہانی کے اندر اور بیون پر بھی اور سیون کے مقام پر اور مرد کے فوطن اور مقعد کے گرد داغ پیدا ہو جاتے ہیں اور بال اس قسم کے گر جاتے ہیں کہ بیمار گنبا ہو جاتا ہے یا اسکے سر میں کثرت سے بھا پیدا ہو جاتا ہو۔ اکثر بیمار بہرے ہو جاتے ہیں۔ بعد ازاں کیف دست و پا پر سو۔ رائی۔ سبب اور زبان کے کنارہ پر زخم پیدا ہو جاتے ہیں ای۔ رائی۔ ٹرن کی بجاری بھی اکثر ہو جاتی ہے یہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوش بچے۔ پیو کے حوض ابتدا ہی سے جلد پر پھسیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور جب وہ پھسیاں جا بجا اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ان پر موٹا سیاہ رنگ کا کھڑنڈ بندھ جاتا ہے تب بیمار نہایت بد شکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ بیمار چمکے دانوں کے طور پر نمودار ہو جاتے ہیں جلد کی وہ بجاریاں جو آنشک کے سبب پیدا ہوتی ہیں علاج سے مشکل رفع ہوتے ہیں اور توجہ کے ساتھ علاج نہ کیا جاوے تو برسوں تک جاری رہتی ہیں۔ ان امراض جلدی میں اور انہیں جو آنشک کے سبب نہیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ فرق ہے

کہ انکا دنگ تاجو کا سا ہوتا ہے اور ان میں نہ تو خارش اور نہ گرمی ہوتی ہے اور اکثر بچے کے طور پر پہلے ہی ہین کو تشخیص کامل کے لئے حلق اور منہ کو بھی ملاحظہ کرنا چاہیو اور چڑون اور گلو کی گلیٹھون کو بھی دیکھنا چاہیو۔ اس مرض کے ابتدا میں جلد پر طے جلے بخارات اکثر پید ہو جاتے ہیں یعنی دمی۔ سیکھل اور پس۔ ٹیول اور اس۔ کو۔ ا۔ سن قسکم بخارات ایک ہی شخص میں پائے جاتے ہیں لیکن یاد رہے کہ ایسا کم ہوتا ہے کہ جلد پر بخارات پیدا ہوں اور اس بیماری کے دیگر آثار نہ ظاہر ہوں جیسے جھڑ جانا بالون کا۔ بدل جانا آواز کا۔ زخمی ہو جانا زبان کا۔ نسخ ہو جانا حلق کا۔ راتوں کو تھوڑے دست کا درد کرنا۔ سینہ کی ہڈی کے نیچے درد کا ہونا۔ گوشت یا ہڈی پر نوٹس کا پیدا ہونا۔ مرض آئی۔ رائی۔ ٹن کا ہو جانا وغیرہ۔ علاوہ ازیں تشخیص کو اس بات سے بھی مدد مل سکتی ہے کہ جب جلد کی بیماریاں آنشک کے سبب پیدا ہوتی ہیں تب سیلاب اور آئیوٹین سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو نہیں *۔

کان۔ ٹومی۔ لو۔ مے۔ ٹا یعنی جلد اور میو۔ کس پر وہ کا اہٹا۔ خامک عورتوں میں اس قسم کے اہٹا مرض آنشک کے عین ابتدائی علامات ہیں۔ کیونکہ ان کی اندام نہانی کی بیون اور بیون اور مقعد کے گردیہ اہٹا پیدا ہو جاتی ہیں اور مردوں کی مقعد کے گردیہ جھڑون کے بائیں اور دائیں اور خشفہ پر بھی اہٹا پیدا ہو جاتے ہیں یہ بعض دفعہ تو زنگ انکا سفیدی مائل ہوتا ہے جو کویا کسی نے انپر ٹیسٹریٹ اف سلور لگایا ہے لیکن بعض دفعہ زنگ کا تاجو کا سا ہوتا ہے اور اسے ایک تیز اور گندہ طوبت جاری رہتی ہو *۔

یہ بات بھی ممکن ہے کہ بٹا شکر کے ہی جسم پر اہٹا پیدا ہو جاسکے ہیں۔ مثلاً ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو سخت شکر (ڈائابٹیس) ہو جاوے اور بٹا ہر جسم پر کوئی بھی علامت آنشک کی موجود نہ ہو۔ فرض کرو کہ اب وہ شادی کرے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بعد چھ مہینے کے اسکی بیوی کے بدن پر بے شمار کان۔ ٹومی۔ لو۔ مے۔ ٹا پیدا ہو جاسکتے ہیں۔

چٹوون کی نگلیان پھیل جاسکتی ہیں سلق بن زخم ٹپ جاسکتے ہیں اور تب جسم پر دھبہ
دوم کے بخارات پیدا ہو جاسکتے ہیں۔ گو شوہر اسکا اس مرض میں دوبارہ مبتلا نہ ہوا ہو
اس مثال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے خاوند کے خون میں آتشک کا زہر فحشی طور
پر موجود تھا جس سبب اسکی بیوی اس مرض میں مبتلا ہو گئی۔

اس مرض کے درجہ دوم میں خاص رحم کے اندر بھی بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہو جاسکتی ہیں
چنانچہ عورت بانج ہو جاسکتی ہے اور حمل ٹھہر ہی جاوے اس کے شکم کا بچہ اس بیماری
میں مبتلا ہو جاسکتا ہے۔ اس عورت میں ایسا ہوتا ہے کہ رحم کا وہ حصہ جو اندام نہانی
کی نالی کے اندر ہوتا ہو بڑا کر دے لگتا ہے۔ اندام نہانی کی لیدیں پہو کر سخت بھاتی
ہیں۔ رحم کا منہ ایک یا کئی جگہ سے چھلک زخمی ہو جاتا ہے اور رحم سے ایک رطوبت
مثل سب کے برابر جاری رہتی ہے۔ اب سلق اور جلد پر بھی اس بیماری کے آثار پیدا
ہونے لگتے ہیں +

پر وہ آئی۔ رس کا انفلا میشن۔ جب آتشک کے سبب پر وہ آئی۔ ریش
میں انفلا میشن ہوتا ہے تب درجہ دوم کی اور علامتیں خاصہ جلدی بخارات بھی پیدا ہوتے
ہیں۔ تیسرے درجہ مرض میں آئی۔ ریش کی بیماری فرمن ہو جاتی ہے اس وقت بہاری
علامتیں اسکی یہ ہوتی ہیں کہ وہ پردہ مکر رہ جاتا ہے پتلی آنکھ کی دھندلی اور ٹھہری اور
بیکگی ہو جاتی ہے اسپر لف کے دانے پیدا ہونے لگتے ہیں اور یہ دانے بعض وقت اتنے بڑے
بڑے ہوتے ہیں کہ حد تو کے سوراخ کو بند کر دیتے ہیں یا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ
لف کا ایک پردہ سانک تبا۔ ریج موٹا ہوتا جاتا ہے چہرہ قرینہ یا تو شفاف رہ سکتا ہے
یا اسپر بھی چوٹے چھوٹے دانوں کے پیدا ہو جانے سے وہ پردہ مکر رہو جاسکتا ہے۔
رگون کا ایک حلقہ پر از خون پر وہ اس۔ کچے۔ را۔ لکھتے پر نجاتا ہے۔ لیکن مع مفاصل
کے سبب جو آئی۔ رائج۔ ٹین کی بیماری ہو جاتی ہے اور اس سبب آنکھ کا سارا ڈوبیلا

سرخ ہو جاتا ہے۔ وہ بات آتشک کی آہنی۔ رانچی۔ ٹش مین پین باجی جالی علاوہ ازین
شل دیگر اقسام آہنی۔ رانچی۔ ٹش کے تنواری مین بہت درد ہوتا ہے اور نہ بہت کم نراشت
روشنی کی ہوتی ہے۔

بالون کا جھڑ جانا۔ تا وقتیکہ دیگر علامات اس مرض کی پیدا ہون بال اکثر کم جھڑا
کرتے ہیں اور یہ بیماری صرف سر ہی کے بالون میں محدود نہیں رہتی بلکہ ہون پینیاں
موجہ اور ڈھاڑ ہی کے بال ہی آتشک کے سبب جھڑ جاتے ہیں اور ساتھ اس کے ایسا
بھی ہوتا ہے کہ انگلیوں کے ناخن سکڑ جاتے اور انکے کنارے چٹنے لگتے ہیں۔
آتشک کے تیسرے درجہ کی علامتوں کو بعض اطباء آتشک کے ستاچ شمار کرتے ہیں مگر تیسرے
درجہ کا شدید یا طول ہو جانا۔ دوسرے درجہ کی شدت اور طوالت سے تعلق نہیں رکھتا
کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے درجہ بہت تھوڑے عرصہ تک رہتا ہے اور اسکی علامتیں ہی
بہت خفیف پیدا ہوتی ہیں لیکن تیسرے درجہ نہایت خطرناک ہو جاتا ہے یہ بتا سکتا ان
عورتوں میں اکثر ہو جاتی ہے جنکے جسم میں آتشک کے نقطہ کے وسیلہ سے اس مرض کا اثر پڑتا
کر جاتا ہے۔ تیسرے درجہ میں بجا ہمیشہ لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے اور چہرہ کا رنگ ہلا جاتا ہے
بعض دفعہ تو یہ درجہ بس یہیں تک رہتا ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عرصہ بعد جسم پر بوجی
قسم کے زخم پیدا ہو کر جلد گلنے لگتے ہیں۔ تالو میں زخم پڑ کر چھید ہو جاتا ہے اور وہ
زخم جلد حلق تک پہنچا تے ہیں بڈیوں پر نوٹس پیدا ہو جاتے ہیں یا کوئی عصبی
بیماری پیدا ہو جاتی ہے یا کوئی عضو رئیس اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

جو زخم حلق اور لوزیتین میں پیدا ہوتے ہیں وہ اکثر گہرے ہوتے ہیں اور ان پر خاکی رنگ کے
جھڑے لگے رہتے ہیں اور انکے گرد کے میو۔ کس پردہ کی رنگت پھسکی ہو جاتی ہے
گا ہے گا ہے یہ زخم گلنے لگتے ہیں انہیں درد بہت کم ہوتا ہے مگر لگنے میں چند دن تکلیف نہیں
ہوتی گو انکے پیدا ہونے سے بیمار کی طبیعت نہایت کمزور ہوتی ہے۔ جب لا زنگس اس

مرض میں مبتلا ہوتا ہے تب پہلے اس کے سیو۔ کس پر وہ میں زخم پیدا ہوتا ہے اور یہ زخم رفتہ رفتہ استعد رہ کر ہو جاتا ہے کہ وہ کل کا ٹوس لے کہا کر کیون تک پہنچ جاتا ہے اور انکا ہی ناس کر دیتا ہے اب بیمار کی آواز سیڑھ جاتی ہے اور کہاںسی ہونے لگتی ہے لیکن درد بہت کم ہوتا ہے۔ بیمار کے اس درجہ میں ناک کے اندر بھی زخم پیدا ہو جاتے ہیں اور کثرت سے پسپہ ہونے لگتی ہے اور استعد رہد بولتی ہے کہ ناک نہیں ٹھرتی۔ ناک کا زخم آخر کار کیون اور ہڈیوں تک پہنچ جاتا ہے اس وقت بیمار نیکساں لگتا ہے۔ اس مرض میں زبان نکلیہ حال ہوتا ہے کہ جابجا سے چسکر زخمی ہو جاتی ہے اور آپس پر ایک بناتی وہ کہنے ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ زبان کی یہ خرابیاں دو سبب سے پیدا ہو سکتی ہیں ایک تو آتشک اور دوسری سیاہی استعمال سے۔ اسکا سبب جب آتشک ہوتا ہے تب علاوہ زبان کے جسم پر بھی زخمی کی اور علامتیں ہی پائی جاتی ہوتی ہیں اور جب بارہ کے استعمال سے زبان بہت کہ زخمی ہو جاتی ہے تب جھڑکے نیچے کی گلیٹان پہ لکڑی رو کرنے لگتی ہیں۔ آتشک کے سبب زبان کے کنارے پر جو زخم پیدا ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں اور ان پر میلی زرد رنگ کی رطوبت ہوتی ہے کسی تیز خیر کے کہانے یا پینے سے دور کرنے لگتی ہیں اور کبھ۔۔۔ ہوئے نظر آتے ہیں۔

نوٹس۔ جب آتشک کا زخم جسم کے ہر رگ ریشہ میں خوب طح پوست ہو جاتا ہے تب ہڈیوں کے اوپر کا پردہ جسکو اصطلاح میں پے۔ رسی۔ آس۔ آس۔ آس کہتے ہیں اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے چنانچہ پہلے اس میں انفلا میشن ہوتا ہے جس سبب سے ہڈی اور اس پردہ کے مابین ایک رطوبت جمع ہو جاتی ہے اور وہ مقام پہ لکڑی اور دم کے طور پر بن جاتا ہے جسکو نوٹس کہتے ہیں۔ اکثر تو ان ہڈیوں پر نوٹس پیدا ہو جاتے ہیں جبہ بھر پوست کے گوشت بنیں ہوتا مگر گاہے گاہے اور ہڈیوں پر ہی ہو جاتے ہیں۔ جب کہو پڑی کی ہڈی پر نوٹس پیدا ہوتے ہیں تب پردہ پے۔ رسی۔ کرے۔ نی۔ آس۔ ہڈی سے جدا ہو جاتا ہے اور وہ ہڈی زخمی ہو کر مڑا رہ جاتی ہے۔ اس جگہ کے نوٹس میں رطوبت زیادہ

ہوتی ہے اس واسطے وہ پھیلے ہوتے ہیں ۴۔ یہ بات یاد رہے کہ آتشک کے سبب سے جب ہڈی اور پے - رسی - آتش ٹیٹھ میں کوئی بیماری ہوتی ہے تب اس میں ایسا درد ہوتا ہے کہ جس سے بیمار کو نہایت تکلیف ہوتی ہے - یہ دروزات کی وقت اور گرمی کے سبب سے زیادہ ہوتا ہے اور آئیوڈائیڈراف یو - ٹائسم سے اسکو تخفیف ہو جاتی ہے ۵۔

آتشک کا نہ جڑیم میں جب سہریت کر جاتا ہے تب ان اعضا کو اکثر تکلیف ہوتی ہے جیسے گردے انٹین جگر دماغ اور اسکا پردہ ڈیو - رائے - ٹرہ نخاع عصابیہ ردو پھپڑے ۶۔

تشخیص - اس بیماری کے اول اور دوسرے درجوں کی علامتیں جیسے درجہ سے پیدا ہوتی ہیں

۱۔ سیکھہ راس مرض کی تشخیص میں پہلی یادہ ترقی پڑتی ہے ۲۔ آتشک کے سبب سے جب جلد کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تب بیمار کے حلق اور تالو میں بھی زخم پیدا ہو جاتے ہیں اور ان جلدی بیماریوں کی رنگت تانبے کی سی ہو جاتی ہے ۳۔ آتشک کے سبب سے

چہرہ پر جب کوئی پھنسی پیدا ہو کر پھوٹ جاتی ہے تب سین اور لو - پش میں ضرور فرق کرنا

چاہئے چنانچہ آتشک کی پھنسی کا زخم بہ نسبت لو - پش کے زخم کے زیادہ تر گہرا اور کھرا ہے

۴۔ اسکے بارے میں ہوتے ہیں اور رنگ بھی اسکا سیلا ہوتا ہے ۵۔ تشخیص میں شک ہو اور

بیمار کے بال بچے بھی ہوں تو انکی صحت کا حال دریافت کرنے سے وہ شک رفع ہو سکتا

ہے کیونکہ آتشک کے بیمار کے بال بچوں میں بھی کوئی نہ کوئی علامت آتشک

کی ضرور پائی جاتی ہے ۶۔

انجام - آتشک بُری بلا ہے جیسا کہ علاج مناسب طور پر نہیں کیا جاتا ہے تب ہلکا

ہو جاتی ہے کیونکہ جب اس کجحت مرض میں ایسے ایسے اعضا مبتلا ہو جاتے ہیں جیسے

لے - رنگس جگر طحال گردے دماغ نخاع اور اعصاب تب اکثر مرض

تلف ہو جاتے ہیں اور آتشک کے سبب سے پھپڑے بھی روت کا بھی بُرا حال ہو جاتا ہے

کیونکہ ان میں ٹیو - بر - کل پیدا ہو جاتے ہیں اور بیمار مفلوج ہو کر مر جاتا ہے ۷۔

علاج سے آتشک کے زہر کا کامل استیصال ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس بات کا جواب
 ہم بے و شکر یہ دیتے ہیں کہ نہیں ہرگز نہیں۔ جب یہ موزی زہر رگ وریشہ میں پیوست
 ہو جاتا ہے تب اس کی بیخ کنی ممکن نہیں۔ لوگ تم سے یہ کہینگے کہ دیکھو مجھے آتشک لگی تھی
 اور نکلنے چوکی یا فقیر کی رو کی تھی اب میں بالکل تندرست ہوں۔ لیکن جب تم حکمت کے
 ناعدہ سے دیکھی صحت کا حال دریافت کرو گے تب تم کو یہ معلوم ہو جائیگا کہ یا تو انکا ماضیہ
 درست نہو گا یا ذرہ سی بارش میں بہینگے یا سردی کے لگنے سے جوڑن یا جسم کے کسی ذرحصہ
 میں درو ہو جاتا ہے۔ باکمانی ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بدن پر تیزگی جبا جاتی
 ہے وہ حوصلہ اور ہمت نہیں۔ ہتی ہے جو اس مرض سے پہلے تھی۔ انکے لفظ سے جو اولاد
 پیدا ہوتی ہے ایسی تندرست اور توانا نہیں ہونی جیسے صحیح البدن کے لفظ کی اولاد
 ہوتی ہے۔ بہر حال کئے کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ آتشک نے ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دیا حقیقت
 تو یہ ہے کہ آتشک کا زہر جسم میں بیکار پڑا رہتا ہے اور جب موقع ملتا ہے تب اپنا
 زور جلتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بلا مجامعت کے صرف اسباب خارجی کی باعث ہی
 وہ لوگ جنکو یہ مرض کبھی ہو گیا ہو اس بیماری میں دو دو بلکہ تین تین اور چار چار دفعہ مبتلا
 ہوئے ہیں اور بڑی موت مرے ہیں۔ خدا اس بلا سے بچا دے۔ درست تو درست ہے
 دشمن کو بھی یہ بیماری زدے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آتشک کی ماکون ہے تو ہم پکار کر
 کہینگے کہ آتشک شراب کی بیٹی ہے گو اور بہتری برائیوں کی مان بھی ہے۔ اگر تم میرے
 سے پوچھو کہ آخر آتشک کا کوئی علاج ہے ہی یا نہیں تو لوسنو۔ بتانا ہوں مگر یہ دعویٰ
 نہیں کرتا کہ اس علاج سے بیماری کی بیخ کنی ہو جاتی ہے مان اتنا تو البتہ ہو سکتا ہے کہ مریض
 اگر بد پرہیزی نہ کرے تو ساری عمر تک اوسط درجہ کی صحت کا مالک بن سکتا ہے۔ اسیکو
 غنیمت جان لو کہ یہ زہر بڑا خبیث ہے۔ پس
 علاج۔ شراب کا نام نہ لے کر ایسا سٹے نہیں کہ جب یہ موزی سرخ ہوتا ہے تب

عقل کا چراغ گل ہو جاتا ہے اور نشہ کھالت میں آدمی اندھ ہون کی طرح گھنٹی عورتوں پر جا پڑتا ہے بلکہ سوا سٹے ہی اس ناچیز کو منہ نہ لگنا چاہئے کہ اسکے سینے سے خون کا دورہ نکلنا چاہتا ہے اور آتشک کا زخم جو پہلے قصب پر پیدا ہوتا ہے اس سے عروق جاؤں اور خون کی مرگین آتشک کے زہر کو لیکر خون میں پہنچا دیتی ہیں اور وہ خون تیز رہونے کے سبب سے ان کے آن میں جسم کے ہر رگے ریشہ میں اس زہر کو نہر کو پہنچا دیتا ہے۔ غذا بیمار کی سیدھی سادی اور میوے البضم ہونی چاہئے۔ چار کافی اور دیگر گرم چیزوں سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اور دوا کے طور پر سیلاب کا استعمال کرنا چاہئے۔ بعض طبیب اسکو برا جانتے ہیں مگر یقین کرو اس سے بہتر کوئی دوا آتشک کی نہیں ہے۔ اس مرض میں بارہ کا استعمال و طور سے کیا جاتا ہے ایک قاری دوسرے داخلی +

اس بیماری کے دوسرے درجہ میں کہ جب نٹک کے زخم سے آتشک کا زہر خون میں سرایت کر جاتا ہے اور جسم پر پھوٹ پڑتا ہے تب کیا۔ لو۔ مل یا بلو۔ پل کا استعمال کرنا چاہئے تاکہ سوڑے مسخ ہو جاویں اور کسینفہر مہنہ ہی آجاوے۔ یہ چاہو کہ مہنہ جلد آجاوے تو سیلاب کی دالش بھی کرنی چاہئے۔ یہ ہم نے بارہ ایسا دیکھا ہے کہ جب پارکے نے اپنا اثر سوڑوں پر ظاہر کیا ہے تب جلد کے بخارات بہت جلد رفع ہو گئے ہیں +

بیماری جب بڑھ کر تیسرے درجہ کی علامتیں پیدا کرتی ہے تب گرین۔ آئیو۔ ڈائیڈ یا ریڈ۔ آئیو۔ ڈائیڈ اف مرکری یا پر۔ کلورائیڈ اف مرکری سے فائدہ ہوتا ہے چنانچہ نسخہ۔ گرین آئیو ڈائیڈ اف مرکری ۴۰، گرین ۱۰، کٹرکٹ اف فائین ۴۰، گرین ۱۰، کٹرکٹ اف اوپیم ۴ سے ۵ گرین تک + سبکو ملا کر چوبیس گویان بنادین اور ایک ایک گولی دن میں تین یا چار دفعہ کھلا دیں +

نسخہ۔ ریڈ آئیو ڈائیڈ اف مرکری ایک سے ۴ گرین تک + ڈائیڈ رو۔ کلورٹ اف مار۔ فیا ایک گرین + کٹرکٹ اف جن۔ رشن ۱۰، گرین ۱۰، سبکو ملا کر بارہ گویان بنادین

اور ایک گولی دن میں دو دفعہ کھلاوین اور ہر ایک گولی کے ساتھ چار یا پانچ
آؤنس کیناؤنڈ ڈمی۔ کاک۔ شن اف سار۔ ساپلاوین *

اس بیماری میں ناک کے اندر زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو زخم صرف ناک کے میتھ کر
پر دہ پر محدود رہتا ہے لیکن رفتہ رفتہ پہلے کڑی اور تب ناک کی ہڈی زخمی ہو جاتی ہے
ناک سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے اس سے سٹری ہو آتی ہے کیونکہ ہڈی خشک
مڑا پڑ جاتی ہے۔ غرض ایسی حالت میں ناک کے اس مرض میں مبتلا ہوتی ہے
آب گرم کی پچکاری سے ہر روز دو مرتبہ صاف کریں اور نسخہ ذیل کا سفوف بطور نوار
کے پانچ سات مرتبہ ہر روز استعمال کریں چنانچہ

نسخہ۔ بائی۔ کار۔ بلونٹ اف سوڈا۔ ۴ گرین * لائیٹ۔ کار۔ بلونٹ اف گلیسٹ
۳۰ گرین * منتھال۔ ایک گرین * ٹائیڈرو۔ کلورٹ اف کوکین۔ ۴ گرین *
شیرگراف ملک ڈیڑھ ڈرام * سکونبا کرسفوف بنالین۔

نسخہ۔ پریکلورائیڈ اف مر۔ کری ایک گرین * نوشار ۳ گرین * آئیوڈائیڈ اف پوٹاسیم
۴ گرین * کچی کوئیڈاکٹر کلٹ اف سار۔ ساپلاوین * شن اف سار۔ سا
۸ آؤنس * سب کو ملالین۔ اس عرق کا سولہواں حصہ دو آؤنس پانی میں ملا کر دن
میں تین دفعہ ملاوین *

اشارہ۔ ریڈ۔ آئیوڈائیڈ اف مرکری کو عرق کے طور پر پلانے کے لئے نسخہ بالا
نہایت عمدہ ہے *

نسخہ۔ ریڈ۔ آئیوڈائیڈ اف مر۔ کری ۳ گرین * آئیوڈائیڈ اف پوٹاسیم ۴۰ سے ۲۰
گرین تک * ریکٹی۔ ٹائیڈ اسپرٹ ایک ڈرام * سرپ اف جیو۔ ۴ ڈرام *
ڈیٹیلڈ واٹر ۱۲۔ آؤنس * سب کو ملا کر اس عرق کے ۳ قطرے دو آؤنس پانی
میں ملا کر دن میں تین دفعہ ملاوین *

لشجہ - پرہکلو ایٹڈ اف - مر - کمری ایک گرین - نو شادوہ - گرین - ٹیکٹڈ اکٹر کٹ
 اف سار - سا ۲ اڈرام - کپناؤنڈ - ڈوکیکشن اف سار - سا - ۱۳ - آؤنس - سبکو ملا کر
 بمقدار ایک آؤنس کے دن میں تین دفعہ پلا دین - علاوہ نسخجات بالا کے یہ چند نسخہ بھی
 بہت مفید ہیں - خاصہ کہ جب آتشک کے سبب سے اس - کو - ا - مے جماعت کی بیماریا
 جلد پر پیدا ہو جاتی ہیں ۔

لشجہ - ڈا - نو - وٹس - سو - لیوشن - ۲۰ سے ۳۰ بونڈ تک - ٹنچکر اف جیو ایک ڈرام -
 بائی ایک آؤنس - سبکو ملا کر ایک خوراک کرین اور بعد غذا دن میں دو دفعہ پلا دین -
 لشجہ - آیوڈائیڈ اف پوٹاسیم - ۲۰ سے ۳۰ گرین تک - ٹنچکر اف سرپین - ۱۷ - ری -
 ۳ ڈرام - گوکرم - یکسچر - آؤنس - سبکو ملا کر اس عرق کا چھٹا حصہ دن میں تین دفعہ پلا دین
 لشجہ - آیوڈائیڈ اف سوڈی - ۱۰ ام - گرین - کپناؤنڈ - ڈوکیک اف سار سا ۸ اؤنس
 سبکو ملا کر اس عرق کا چھٹا حصہ دین میں تین دفعہ پلا دین ۔

لشجہ - آیوڈائیڈ اف ایرن - ۶ سے ۸ - گرین تک - گلائی - سی - رین - ۲ اڈرام -
 اکیفونرن اف گلبنا - آؤنس - سبکو ملا کر اس عرق کا چھٹا حصہ دین میں تین دفعہ پلا دین -
 آتشک کے نوٹس پر ٹنچکر آف آیو - ڈین یا آیوڈائیڈ اف کڈ - مے - اُم کی مرہم
 کی مالش کرین - بیمار کو سردی سے بچا دین اور ہڈیوں یا جوڑوں میں درد ہو تو رات
 کے وقت اینون یا ڈو - وٹس - پاؤڈر کھلا دین ۔

آتشک کے تیسرے درجہ میں سیاب کا بہا ہر بھی بہت مفید پڑتا ہے جسکی ترکیب یہ ہے کہ
 بیمار کو کسی کُرسی پر بٹھا دین اور اس کُرسی کے نیچے دو چوڑے چوڑے مٹی یا لوبیہ کے چوڑے
 رکھ دین اور ان چوڑوں کے اندر اسبرٹ کی ایک ایک تہی رکھ دین اور ایک پر چوٹی سی
 پتیلی میں پانی بہر کر دین اور دوسرے پر ایک چوٹا سا توار کہہ دین اس تو سے پر ۶۰
 گرین سے ۸۰ گرین تک پانی - سل فینوٹ اف مرکری ٹیڈ اکسڈ اف - مر - کمری

چہرہ اورین۔ لیکن آتشک کے سبب سے جلد پر بخارات نکلے ہوں یا انہیں میں بیماری ہو یا ہڈیوں میں مرض ہو تو اس تو سے پرہیز کریں سے ۳۰ گرین تک گرین آئیوڈائیڈ ان مرکری یا ۳۰ گرین ریڈ آئیوڈائیڈ اف مرکری اور ۹ گرین بائی۔ سیلفورٹ اف مرکری رکھ دیں ۴۔ اب ایسا کریں کہ مرغیوں کے ڈربے کی شکل کا بانس کی کبیا چھینچ کر ایک ڈھانچا اتنا اونچا اور اتنا چوڑا بنا کر مریض کے اوپر رکھ دیں جو گردن سے لیکر زمین تک آجائے اور کسی سے لیکر قریب ڈیڑھ فٹ چارون طرف گھیر لے۔ اب اسکو کھنسل اور لھا فون سے اسطور پر لپیٹ دیں کہ صرف بیمار کا سر کھلا رہے جب یہ سب کچھ چھوڑے تب ڈربے کے اندر کرسی پر بیمار کو بٹھا کر اس کرسی کے پیچے کی دونوں بتیوں کو روشن کر دیں تاکہ پانی اور سیلاب کا بخار پیدا ہو تاکہ اسے اور بیمار کے بدن میں نفوذ کرنا جاوے ۵۔ ۵۔ امنٹ بعد پینہ شروع ہو جاتا ہے اور ۱۰ سے ۱۵ امنٹ بعد کثرت سے پسینہ آنے لگتا ہے۔ اب بتیوں کو بجھا دیں اور جب بیمار کا بدن کیستہ رہتا ہو جائے تب خوب طرح پہنچ کر خشک کر ڈالیں ۶۔ اب چار پانچ آونس گرم گرم دیکو کٹن اف گوکم یا سار۔ ساپا کر مریض کو تھوڑے عرصہ تک آرام کرنے دیں ۷۔

آتشک کے بیماری اطفال میں

بچوں کو آتشک کا مرض کئی طور سے ہو سکتا ہے یعنی بچہ اس مرض کا ورثہ یا تو اپنے باپ سے حاصل کر سکتا ہے یا یہ بیماری اسکو دودھ پلانے والی امّا سے ہو سکتی ہے مثلاً مرض کیجئے جب کسی عورت کو حمل رہ جاوے کہ جسکے جسم میں آتشک کا زہر موجود ہو تو وہ بچہ لگا کہ ایام حمل میں بچہ کے جسم میں جو خون اسکی ماں کا واسطے اسکی پرورش کے جائیگا اس سے وہ بچہ اس مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے یا اثر آتشک کا اس جنین نے اپنے باپ سے حاصل کیا ہو یا جب ماں اور باپ دونوں اس مرض میں مبتلا ہوں غرض اس حالت میں

جو چھل قرا، ابا ہے اسکا بچہ ضرور آتشک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب عورت کے اندام نہانی میں آتشک کا زخم ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت بچہ کو اس زخم کی چھت لگ جاتی ہے یا جس مرضہ کے جسم میں آتشک کا زخم ہوتا ہے اور بچہ جب اُسکا دودھ پیتا ہے تو اُسکے ہی آتشک کی بیماری ہو جاتی ہے یا جب کسی بچہ کو ایسے شخص کے مواد سے ٹیکا (درک - سی - نے - شن) لگایا جاتا ہے جسکے جسم میں آتشک کا زخم موجود ہو تو اُس ٹیکا یا قحط بچہ کو ہی آتشک ہو جاتی ہے *

علامات - دو یا تین مہتہ بعد پیدائش کے طفل بظاہر تندرست نظر آسکتا ہے مگر نہین تو شاذ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی بچہ کی جلد کی رنگت بدلی پڑ جاتی ہے اور چہرہ مسکڑا کر ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے بڑبڑ کا ہوتا ہے لیکن فرض کیجئے پیدائش کی وقت بچہ میں کوئی علامت آتشک کی نہ پائی جاوے تاہم ایک ہی مہینے کے اندر اُس بچہ میں زکام کی علامتیں بتدیر سچ ظاہر ہونے لگتی ہیں اور ساتھ ہی اس زکام کے دم لیتے وقت چیخنے کی آواز نکلتی ہے اور خشک کہانسی ہوتی ہے۔ دودھ پیئے میں کسیتھہ رکٹیف ہوتی ہے اور دہن اور لبیدن اُس بچہ کی خشک ہتی ہیں اور تب جلد اُسکی خشک اور سخت ہو جاتی ہے۔ آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ اور دہن اور حلق کے اندر چہلے پیدا ہو جاتے ہیں اور ناخن بھی پھٹ جاتے ہیں اور جنسے علاج کے یہ مرض بڑھتا جاتا ہے تب بدن کے جا بجا پورے رنگ کے دہیتے نمودار ہو جاتے ہیں۔ جلد کے اوپر کھانڈھڑنے لگتا ہے۔ ناک کے نپتے سیون کا مقام مقعد کے گرد اور جوڑوں کے خم پر شقوق پیدا ہو جاتے یا وہ مقامات چھل بھی جاتے ہیں شقوق اور چھلی ہو جاتی ہیں کا رنگ تانبے کا سا ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا اثر کمکھون میں بھی پیدا ہو جاتا ہے جس سبب بصارت میں فرق پڑ جاتا ہے اور پوٹون کے کنارے زخم پیدا ہو جاتے ہیں بال باریک ہو کر خشک ہو جاتے یا بھڑنے لگتے ہیں۔ آتشک کے بچوں کا منہ جڑ بڑا

ہو جاتا۔ رات و دن کہن کہن کرتا رہتا ہے کبھی سا دیکھو تھے آتی ہے اور مرض لاغر
 و کمزور ہوتا جاتا ہے جن بچوں کے جسم میں آنتیں کا زہر ہوتا ہے انکی طبیعت طبع طرح
 کی بیمار و نحس ہونے کے لئے مایل رہتی۔ یہ بچہ جگر شہ کر سخت ہو جاتا ہے۔
 پیڑ و نمین نیو۔ مو۔ نیما کی یا رسی پیدا ہو جاسکتی۔ یہ بچہ کا زہر یا زخمی ہو جاسکتا
 ہے۔ سماعت میں فرق پڑ سکتا ہے یا مریض بالکل بے ہوش ہو جاسکتا ہے وغیرہ وغیرہ
علاج۔ ماکو آنتیں ہو تو کسی موضع کا دوزہ پلاوین۔ سمعوئی غذا سے اس بچہ
 کی پرورش کریں۔ بچہ سے آنتوں کا تشک ہو جاوے تو کہیں۔ زہرست و امی کا دودھ
 بھادین۔ مرض کی کوئی بھی ہمدامت شروع ہو جاوے تو ہر آسباب کا استعمال شروع
 کریں۔ مثلاً حسب عمر جو تھوچی یا ایک گرین کا تیسرا یا نصف گرین کیا۔ لو۔ مل بہراہ
 ارو۔ ما۔ ٹاک۔ پاؤڈر و تہہ چاک کے دھین تین دفعہ بھادین۔ دست یا بھیش شروع
 ہو جاوے تو بعض کہلانے کے سیاب کی مالش کریں۔ ترکیب جسکی یہ ہے کہ ظالیز
 انکی کسی دھچی پر تھوڑا سا سیاب کا مرہم لگا کر بیٹھی کے طور پر بچہ کے شکم پر باندھ دیں
 اس کے ہلنے چلنے سے خود اس مرہم کی مالش ہو جائیگی۔ جلد بچوں کی چونکہ نازک ہوتی
 ہے تو سیاب ان کے خون میں جلد نفوذ کر جاتا ہے۔ سیاب کا دینا نامناسب ہو تو
 اس نسخہ کا استعمال کریں۔

نسخہ۔ آیوڈائیڈ اف پوٹاسیم نصف یا ایک گرین۔ شربت۔ ۳۰ قطرے۔
 پانی۔ ۳۰ قطرے۔ سکولاکر دھین تین دفعہ بھادین۔ یہ نسخہ ایک ہفتے کے بچہ
 کے واسطے موزون ہے۔ یا اس نسخہ کا استعمال کریں۔

نسخہ۔ آیوڈائیڈ اف پوٹاسیم ایک گرین۔ کلورٹ اف پوٹاش ڈیڑھ گرین
 کپاؤڈ پیکوٹان سنکو ماہ بوند۔ شربت ایک ڈرام۔ پانی ایک ڈرام۔
 سکولاکر تین دفعہ دھین بھادین۔ یہ نسخہ تین ہفتے کے بچہ کے واسطے موزون ہے۔


چھلے ہوئے نہ تمام دین اور نہ تمام پر یا تو اکسا لیتا آف زہک کا مرہم یا ایک آدن
سفید مرہم میں ایک ڈرام سٹ - رن آیت نہ منٹ ملا کر لگا دین - بچہ کو ہر روز
ایک - دوا میں دوا دین اور صاف پھر کر کہیں ۔

باب ششم امراض جلدیہ مقدمہ


امراض جلدیہ کے بیان سے پہلے میرا ارادہ جلد کی مختصر تشریح کے لیا کرنے کا ہے پھر
سنو - لبض آدمی جلد کو ایک ہی چیز سے جھکا اسکے صاف ستھرا کہنے پر بالکل توجہ دینا
کرتے جس سبب سے انواع واقسام کی بیماریاں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ۔

جلد بھی نمبر لہ ایک عضو ریش کے ہے کیونکہ اسکے تعلق بڑی بڑی خد متین ہیں - ایک
عکڑا جلد کا کاٹ کر کسی باریک بین کے نیچے دیکھیں تو اس میں کئی عجیب غریب چیزیں
دکھائی دینگیں جہاں پہ دیکھو تصویر الفہ اور ب - ان تصویروں میں جو ہندسہ آ کا
ہے وہ جلد کے اوپر کے پرت کو دکھاتا ہے - اور ہندسہ م دکھاتا ہے اس سے نیچے
کے پرت کو - اور ہندسہ س اور تے دکھاتے ہیں اصل جلد کو جسے اصطلاح میں
چڑ - مس کہتے ہیں ہندسہ ہ کا چربی کے کیسے دکھاتا ہے - اور ہ کا ہندسہ پنیہ پیل
کو نکالا ایک غدود کے پیچوں کو دکھاتا ہے اور ت کا ہندسہ اسی غدود کی مجری کو دکھاتا
ہے - اور آ وہ جگہ ہے جہاں جلد کے اوپر مجری نہ کو نہ آکھلتی ہے یعنی مسام ۔

تصویر (الف)



تصویر (ب)



دوسری تصویر ایک ٹکڑا جلد کا دکھلاتی ہے جس میں بالوں کی دروغنی مادہ (سے - بے ریش) پیدا کرنے والے غدود نظر آتے ہیں۔ ہندسہ ۱۴ اس ٹکڑے جلد کے گوشت کے ریشوں کو دکھلاتا ہے۔ ۱۵ مابین تہہ کی طرف جو تہہ کا ہندسہ سے وہ بال کی جڑ کے خلاف بتلاتا ہے۔

اس بات کو یاد رکھنا چاہئے کہ جلد میں دو قسم کے غدود ہوا کرتے ہیں ایک پسینہ پیدا کرنے والے اور دوسرے وہ جن سے روغن دار مادہ پیدا ہوتا ہے اور علاوہ ان کے جلد میں بال کی جڑیں بھی ہوا کرتی ہیں۔

جسم کی صفائی کے لئے خدا تعالیٰ نے ان تین اعضا کو مقرر فرمایا ہے۔ ایک شیش دوسرے گردے۔ تیسرے جلد۔ یعنی خون کا پانی اور کار - بانک اسٹو اور یوریا اینز تینوں اعضا کے ذریعہ خارج ہوتا ہے۔ لیکن جلد کچھ تو پیڑا اور کچھ گرد نکالنا کام بھی دیتی ہے کیونکہ مثل پیڑے کے جلد اکسے - جن کو جذب کرتی ہے - اور

کار - بانک اسٹو اور پانی کو خارج کرتی ہے اور مثل گردوں کے پوریا اور نمکین اجزا بھی جلد سے خارج ہوتے ہیں لیکن فعل کے لحاظ سے جلد بہ نسبت

شش کے گردون ہی سے زیادہ تر شاہت رکھتی ہے۔ پس جب پیٹ سے یا گردون کے کام میں ہرج واقع ہوتا ہے تب وہ کام ہیچا رہی جلد ہی کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ گرمی کے موسم میں جب پسینہ زیادہ آتا ہے تب بیشاب کم پیدا ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا التیام موسم سرما میں اسکا خلاف وقوع میں آتا ہے۔ پس دیکھا تم نے جلد کسی عضو اندون سے مرتبہ میں کچھ کم نہیں ہے * اسکی صفائی کی طرف غور کرنا انواع و اقسام کی بیماری کا مول لینا ہے *

بعد اس تمہید کے اب ان سببوں کا بیان سنو جن سے جلد کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پس واضح ہو کہ کُل امراض جلد یہ دو سببوں سے پیدا ہو سکتی ہیں ایک داخلی دوسری خارجی *

اول باب داخلی۔ اول بعض بیماریاں اور ورثہ یا میلان طبع جبکہ مریض نے اپنے باپ دادا دونوں سے حاصل کیا ہو جیسے مرض اکن - تھیوسیس اور اکن - زئی - ما اور لامٹی - کن بھی تھوڑی بہت موروثی امراض میں گنے جاتے ہیں *

دوم چھپک وغیرہ امراض جدی کا زہر جب خون میں سرایت کر جاتا ہے تب خاص قسم کے دانے جلد پر نمودار ہو جاتے ہیں *

سوم اندرونی اعضا کے طبعی فعال کے سبب یا ان اعضا کی ساخت کے بگڑ جانے کے باعث جلد پر بخارات نمودار ہو جاسکتے ہیں مثلاً یہ سبب جانتے ہیں کہ حیض اور حمل کے ایام میں اور بچوں کے دانت نکلنے کے ایام میں اور شکم میں کرم کے ہونے سے جلد پر دانے نکل آتے ہیں *

چہارم۔ عمر اور جنسیت بعض بعض جلد کی بیماریوں کے پیدا کرنے اور جاری رکھنے میں دخل دیتی ہے * مثلاً گو - پس کی بیماری بہ نسبت مردوں کے عورتوں ہی کو اکثر ہو جاتا کرتی ہے اور پو - راتی - گو جو ایک متعدی مرض ہے اکثر بچوں ہی کو ہو جاتا کرتا ہے

اور ایک - نے سسم - پکس کی بیماری اکثر اسے ۴۵ سال ہی کے اندر ہو جاتی ہے
 علاوہ ازیں بعض خفیف قسم کا ایک - نے رو - زمی - ششیا خاصکر عورتوں ہی کو اکثر
 ہو جاتا کرتا ہے اور سانی - کو - سس کی بیماری خاصکر مردوں ہی کو ہو جاتی ہے *
 بچہ - بعض امراض عامہ مثلاً رو - ما - ٹیفرم اور گاوٹ ایسے ہیں جنکے ہونے سے
 ایک - زمی - ما اور سو - رانی - سس کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں *

ششم - بعض غذائیں اور دوائیں ایسی ہیں جنکے کھانے سے جلد پر بھجرات پیدا
 ہو جاتے ہیں یا اسکی میت بدل جاتی ہے - مثلاً شرب کے پینے سے شدید قسم کا
 مرض ایک - نے رو - زمی - ششیا پیدا ہو جاتا ہے اور بشرابی کا چہرہ مثل ڈبر بوزنہ
 سرخ ہو جاتا ہے اور بعض میوہ جات اور چنگڑی مچھلی کے کھانے سے یقین (در - ٹے - کے دینا)
 اچھل آتے ہیں * اور دواؤں کا حال یہ ہے کہ سنکھیا سیاب بلا ڈونا اور کو - پے - وا
 وغیرہ کے استعمال سے بعض طبیعت کے آدمیوں کی جلد پر بھجرات نمودار
 ہو جاتے ہیں *

دوم - سبب خارجی - اول - جلد کو صاف نہ رکھنا اور بچوں کو میلا کچھلا
 رکھنے سے جلد پر طح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں *
 دوم - جلد پر جب کوئی دوا خراش پیدا کر نیوالی لگائی جاتی ہے یا کوئی ایسا
 کپڑا پہنا جاتا ہے جیسے نشینہ اور بعض بعض پیشے بھی ایسے ہیں جن سے آدمی کے بدن
 پر خراش پیدا کرنے والی چیزیں لگ کر جلد کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں *
 سوم - گرم اور نباتی مادہ بھی ایسے ہیں جو باہر سے انسان کی جلد میں سرایت کر کے
 بیماریاں پیدا کرتے ہیں *

چہارم - تغیرات موسم کے سبب بھی بعض جلدی امراض پیدا ہوتے ہیں *
 جلد کی بیماریوں کی تشخیص - اول - جب کسی جلد کی بیماری کی تشخیص کرنی

ہو تو سارے بدن کے دانوں کو خوب طرح دیکھنا چاہئے کیونکہ صرف چند دانوں کا دیکھنا کافی نہیں ہے۔

دوہم تشخیص کے وقت اس بات کو ہرگز نہ بھولیں کہ خارش کے سبب بہتری جلد کی بیماریوں کی شکل بدل جاتی ہے اور یہ کہ خارش کی علامت کے ہونے سے بہتری جلد کی بیماریوں کی تشخیص بھی ہو سکتی ہے مثلاً اگن - زمی - ما اور لائی - کن اور اسکے بیز اور پرد - راجی - گو مین ہمیشہ کھلی ہو کر رہتے ہیں مگر خشک کے سبب جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں شانڈونا خارش ہوتی ہے۔

سوم تشخیص کے وقت اس بات کا بھی بیان ہے کہ بہتری جلد کی بیماریوں کے بخارات اکثر بے جگہ پیدا ہوتے ہیں مثلاً ار - لٹے - کے - ریا کے ساتھ بہتریے اور تم کے بخارات بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور اگن - زمی - ما کے ساتھ اسکے - بیز کے دانے اور گاہے گاہے سو - راجی - سس کا مرض بھی پیدا ہو جاتا ہے۔

چہارم - اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہئے کہ بہتری جلد کی بیماریوں کے بخارات کامل طور پر نمودار نہیں ہوتے مثلاً ہر - پیر زاس - ٹر کے جو دانے پیچھے نکلے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بلکہ نکلے ہی سکر کر خشک ہو جاتے ہیں۔

پنجم تشخیص کے وقت بیمار کی عمر - وہ عورت ہے یا مرد - کیا کام کرتا ہے - کس طرح اوقات بسر کرتا ہے - جسم میں اسکے کوئی بیماری ہے یا نہیں - اسکے جسم کے کونے حصہ کی جلد پر مرض ہے - ان ساری باتوں کا لحاظ رکھنا چاہئے ایسا نہ کرنا چاہئے کہ مرض کے صرف چند دانوں کو دیکھ کر اسکی تشخیص کریں ایسے غافل طبیب اکثر بدنام ہو جاتے ہیں۔

علاج جلد کی بیماریوں کا - ان بیماریوں کے علاج کی نسبت پہلی بات یہ دریافت کرنی چاہئے کہ بیمار کس حالت میں ہے - تندرست ہے یا کسی مرض میں مبتلا مثلاً جلد کی اکثر بیماریوں میں مریض کمزور اور دانے - میا کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے - پس

اصورت میں دوا اور غذا دونوں ہی چاہئے۔

اکثر عورتوں کو حیض بے قاعدہ آیا کرتا ہے اور فولاد کے استعمال سے انکو فائدہ چھوٹا ہے۔ اگر اس حالت میں کسی عورت کو ایک - نئے - رو - زمی - شیا کی بیماری ہو جائے تو بے قاعدگی حیض کے خاص علاج کو بدلنا نہ چاہئے۔ بلکہ سبات کی امید کھنی چاہئے کہ جب علاج سے حیض اپنے قاعدہ پر آتا رہیگا تب جلد کی بیماری یا تو کم یا بالکل رفع ہو جائیگی۔ ان مرضوں کے علاج کی وقت سبات کو بھی ضرور یا در کھنا چاہئے کہ تہری جلد کی بیماریاں ایسی ہیں کہ انہیں صرف جلد ہی مبتلا ہوتی ہے اور باتوں سے مرض بالکل تندرست معلوم ہوتا ہے مثلاً آگ - زمی - ما اور اسکے - نیزین اکثر ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ ان صورتوں میں صرف خارجی علاج سے فائدہ ہوتا ہے گویہ بات درست ہے کہ ایسی حالت میں ہم اکثر سنگھیا کا استعمال کرتے ہیں مگر اس خیال سے نہیں کہ سنگھیا سے ادر باتوں کو فائدہ ہو بلکہ اس خیال سے اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے کہ اثر اسکا خاص جلد ہی پر پیدا ہو۔ لیکن اگرچہ یہ درست ہے کہ بعض جلد کی بیماریوں کو صرف داخلی علاج اور بعض کو صرف خارجی علاج ہی سے فائدہ ہوتا ہے پہر بھی سبات کو نہ ہونا چاہئے کہ تہری جلد کی بیماریاں ایسی ہیں کہ جب تک علاج دونوں طریقوں سے کرنا چاہئے ہے دوا کھلانی چاہئے تاکہ جسم میں کوئی نقص ہو وہ درست ہو جاوے اور دوا کھلانی ہی چاہئے تاکہ جلد کی بیماری کو فائدہ ہو۔

بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی پرانی جلد کی بیماری علاج سے رفع ہوتی ہے تب کوئی عضو اندرونی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اگرچہ یہ بات کہیں کہیں ہو جایا کرتی ہے تاہم ایسی ہی جلد کی بیماری کا علاج خوب توجہ کے ساتھ کہ کے رفع کر دینا چاہئے اسکے کرنے سے اکثر اندیشہ کسی اثر بیماری کے پیدا ہو جانے کا نہیں ہے۔

یہ بھی یاد رہے کہ اگر خارجی علاج سے فائدہ اٹھانا منظور ہو تو دوا کو کسی ترکیب کے ساتھ

ہو شیار آدمی کو نہایت جستجو سے لگنا چاہئے۔ پس دوا کے لگانے کے باب میں بیمار کو چھٹی
طرح ہدایت کرنی چاہئے کہ فلانی ترکیب سے اور فلانی فلانی وقت پر لگنا چاہئے ۛ

جماعت بندہ کی بیماریوں کی

جلد کی مختلف بیماریوں پر جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں اور ان کی طرح طرح کی شکلوں
اور صفتوں کو جب خوب دھیان لگا کر دیکھتے ہیں تب بعض میں تو جلد صرف خشک
پا جاتی ہے اور بعض کی جلد پر چوڑے چوڑے دانے آبی رطوبت سے بہرے ہوئے
اور بعض کی جلد پر پینھیوں کی شکل کے دانے پڑتے ہیں اور کبھی جلد پر ٹھوس دانے اور
کسی پر چھالے پائے جاتے ہیں اور بعض پر چھلکوں کی چٹین اور بعض آدمی کے چمڑے
پر دانے اور بچے ابھار پائے جاتے ہیں اور کبھی جلد کے دانوں میں کرم اور کیسے
اندر جا نہ نیا قی مادہ ہوتا ہے۔ غرض ان خستہ کمالات کے بموجب کھل اراض جلد
خاص خاص جماعتوں میں ہم بخوبی تقسیم کر سکتے ہیں تاکہ انکی تشخیص میں
سہولت ہو ۛ پس جلد کی کھل بیماریاں مفصل ذیل جماعتوں میں بخوبی منقسم
ہو سکتی ہیں ۛ

جماعت اول - اگ - زان - تچے - مے - ٹا -

جماعت دوم - دے - پی - کیو - لی -

جماعت سوم - بل - لی -

جماعت چہارم - پس - ٹیو - لے -

جماعت پنجم - پے - پیو - لے -

جماعت ششم - اس - کو - ا - می -

جماعت ہفتم - ڈاے - پر - ٹر - فی -

جماعت ہشتم - مے - کیو - لی -
 جماعت نہم - پے - رمی - سی - ٹے - سائی -
 جماعت دہم - کن - کراٹھی - ٹوسی -
 جماعت یازدہم - سے - فی - لائی - ٹوس -

جلد کے الحاقات کی بیماریاں

اول - جلد کے غدود دن کے بگڑے ہوئے فعل کی بیماریاں *
 دوم - ناسنوں کی بیماریاں *
 بن مختلف جماعتوں میں امراض ذیل شامل ہیں *

جماعت اول
 رگن - زان - تہ - مے - ٹا
 ار - لے - سکے - ریا
 ار - رمی - او - لا
 ار - تہ - ما -

جماعت دوم
 رمی - سی - کیو - لی
 رگن - رمی - ما -
 ہر - پیر
 سیو - ڈا - مے - نا

جماعت سوم
 بل - لی
 ایم - فے - گس
 رو - پیا

جماعت چہارم
 پن - یو - ٹی
 ام - پے - ٹائی - گو
 رگن - تہ - ما

جماعت چہم
پے - پیو - لی

لائی - کن
پرو - راجی - گو
اس - ٹرا - فو - کن

جماعت ششم
اس - کو - اے

سو - راجی - سس
پے - ٹے - ریا - سس
راکن - تہیو - سس
مو - کن - کم

جماعت ہفتم
ماہی - پرو - فنی

لیٹ - رو - سی
دی - رو - کا
کلے - دس

جماعت ہشتم
ے - کیو - لی

کان - ڈی - لو - ما
دائی - لے - لی - گو
کلیو - آ - ما

جماعت نہم
کن - کرائی - ڈی

لو - پس
رکے - لائیں

جماعت دہم
پے - ری - سی - لے - سائی

ٹے - نیا - فے - ٹو - سا
سر - سے - نے - ٹا
ٹان - شیو - رٹش
سائی - کو - سس
ور - سی - کلر

اسکے - بنر
تے - رے - سس

جماعت یا زدہم
سی - نی - لائی - ڈیز

جلد کی مختلف جماعتوں کی خاصیتیں

جماعت اول - اگ - زان - تھے - مے - ٹا - جلد کے جن جن مقاموں پر اس جماعت کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ ان کی جلد پر انفکامیشن کے آثار پائے جاتے ہیں جس سے وہ مقام سوج ہو کر سقد سوج ہی جاتا ہے - اور جب مرض رفع ہو جاتا ہے تب وہ ان سے جلد کے اوپر کا پرت شل سبوسہ کے چٹہر جاتا ہے *
جماعت دوم - وے - سی - کیو - لی - اس جماعت کی بیماریوں میں فرد فرد دانے مثل موتی کے جھلکد اریدا ہوتے ہیں اور ان میں ایک آبی رطوبت ہوتی ہے جب دانے خشک ہونے لگتے ہیں تب اینر یا تو بار یک بار یک چپکے یا سخت کھرنڈ بندہ جاتا ہے *

جماعت سوم - ٹل - لی - اس جماعت میں چوٹے چوٹے یا بڑے بڑے تباہوں کی شکل کے جہالے پیدا ہوتے ہیں *

جماعت چہارم - پس - ٹو - لے - اس جماعت کی بیماریوں کی پھنسیاں جلد کے نیچے کی فرد تک سرایت کر جاتی ہیں اور انہیں پیپ پڑ جاتی ہے جس کے خارج ہو جانے کے بعد دانوں کے مقام پر دبیر کھرنڈ بندہ جاتا ہے - پھنسیاں چوٹی چوٹی اور گنجان ہوتی ہیں یا بڑی بڑی فرق طور پر چتر سے ہوئے ہوتے ہیں ان میں اور دی - سی - کل کے دانوں میں یہ فرق ہے کہ انکے اوپر کا جلدی پرت دبیر ہوتا ہے جس سے پس - ٹول کے دانے دیر سے پختہ ہوتے ہیں - اور ان دونوں جماعت کے دانوں پر خشک ہو جانے کے بعد کھرنڈ بندہ ہوتا ہے انہیں بھی فرق ہے چانچہ وے سی کل

لے دانوں کے اندر چونکہ مٹی مادی ہوتا ہے اس واسطے اسکا کھرنڈ ہلکے بہو سے رنگ کا ہوتا ہے۔ مگر لیں۔ ٹیول کے دانوں میں پیپ ہوتی ہے۔ پس جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تب انپر دیر سیلے زرد رنگ کا کھرنڈ بندہ جاتا ہے *

جماعتِ پنجم۔ پے۔ پیو۔ لی۔ اس جماعت کی بیماریوں کے اُن پر چوٹے چوٹے اُدھوس ہوتے ہیں اور کبھی تو سُرخ اور کبھی جلد کے رنگ کے ہوتے ہیں۔ نتو انہیں پانی اور نہ پیپ ہوتی ہے۔ اکثر انہیں خارشِ لبشت ہوتی ہے اور لب خشک ہونے کے انپر سے چمکے اُڑ جاتے ہیں۔ اتفاق سے جب یہ دانے مرطوب ہو جاتے ہیں تب انپر سرسہی رنگ کے کھرنڈ بندہ جاتے ہیں اور رخن سے فوجے سے جو قطرہ خون کا نکلتا ہے وہ اُن کھرنڈ پر سوکھ کر چمکا رہتا ہے۔ یہ بڑی جاہلی تھیں۔ پیو کے جماعت کی بیماریوں کی ہے *

جماعتِ ششم۔ اس۔ گو۔ اے۔ جو بیماریاں اس جماعت کی ہیں انپر گول گول طبقہ چمکون کی چٹین پیدا ہوتی ہیں انہیں کسی قسم کی رطوبت نہیں ہوتی جب چمکون کی چٹین جڑ جاتی ہیں تب نہایت جلد اُڑ چٹین پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب جڑ کر اُڑ جاتے ہیں تب وہ مقام چمکا چمکا سرخی مال اور خشک نکل پڑتا ہے *

جماعتِ ہفتم۔ مائی۔ پیر۔ ٹرو۔ فی۔ اس جماعت کی بیماریوں میں ساری جلد یا سر اُسکے اور کافر دیا بال کی جڑیں صحت کی نسبت زیادہ تر موٹی ہو جاتی ہے *

جماعتِ ہشتم۔ مے۔ کیو۔ لی۔ اس جماعت کی بیماریوں میں لے یا پھنسیا ہنہیں پیدا ہوتیں بلکہ اس مقام کی جلد کی رنگت بدل جاتی ہے *

جماعتِ نہم۔ پے۔ ما۔ سی۔ لے۔ سائی۔ ان میں یا تو کرم یا نباتاتی مادہ ہوتا ہے *

جماعتِ دہم۔ کن۔ کرائی۔ ٹومی۔ انہیں تاثیرِ سرطان کی بیماریوں کی ہوتی ہے

اور ایسے زخم پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو خشک ہونے میں نہیں آتے اور خشک بھی ہو جاتے ہیں تو کسی اور مقام پر پھوٹ پڑتے ہیں *
جماعت یا زوہم سی - فی - لائی - ٹوس - انکی خاصیتیں زالی ہوتی ہیں -
جسکا بیان جماعت یا زوہم میں مفصل کیا جائیگا -

جماعت اول اگ - زان - تھے مٹا

اول مرضاری تھو - ما

اس بیماری میں جلد خشک ہو کر سُرخ ہو جاتی ہے یا اسپر سُرخ سُرخ کیسے قدر اونچے اونچے دھبے پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں گرمی اور سُرخس ہوتی ہے - یہ دھبے بعض دفعہ تو یوں ہی رنہ ہو جاتے ہیں مگر بعض اوقات انہیں سے جو سی کے طور پر چمکے پیدا ہو کر جھڑ جاتے ہیں یہی مرض متقارمی نہیں ہے یہ بھی بہتری قسم کی شدید بیماریوں میں جلد پر اکثر پیدا ہونے والا ہے جیسے بخار اور انفلاشن میں اور استقامت میں بھی پیدا ہو جاتی ہے - چڑون اور انوار کے آپس میں دگر گھانے کے سبب اور جب چہرہ اور خاتہ پاؤں پر دھوپ یا گرد لگ جاتی ہے - تب بھی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے - اس مرض کی کسی قسم میں چھانچہ جب یہ بیماری بازو - گلا - چہرہ اور چھاتی پر ہوتی ہے اور اس کے سُرخ دھبے ہوتے ہیں ہی عرصہ تک رہ کر رنہ ہو جاتے ہیں تب اس بیماری کواری تھی - ما - فیو - گلس - بولتے ہیں * گاہے ایسا ہوتا ہے کہ سُرخ دھبوں کے بیچ بیچ میں چھوٹے چھوٹے کیسے قدر اونچے اونچے ٹو - بر - کل پیدا ہو جاتے ہیں تب اس مرض کواری تھی - ما - فیو - برکیو لے - ٹم بولتے ہیں - اس قسم کی بیماری اکثر فرس ہو ا کرتی ہے *

ڈراپ - سی کی بیماری میں جب پاؤں پھول جاتے ہیں تو اس مقام کی جلد پر اکثر گرہے رنگ کے سُرخ دھبے پڑ جاتے ہیں - اس قسم کی میسای کواری تھی - ما - فیو -

کہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بازو گھلے اور چھاتی پر چھکیلے سُرخ رنگ کے بڑے بڑے وہبے پیدا ہو جاتے ہیں اور ان میں چھوٹے چھوٹے دانے بھی ہوتے ہیں اس قسم کی بیماری کو اری کہتے ہیں۔ پے۔ پیو۔ لے۔ ٹم بولتے ہیں۔ اس بیماری میں مریض نہایت کمزور ہو جاتا ہے۔

بعض دفعہ سُرخ وہبے بیضی شکل کے اور کبھی قدر اونچے اور ٹانگوں کی اندر کی جانب پر ہوتے ہیں اور سُرخ ان کی آٹھ یا دس دن کے اندر اودھ ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی بیماری کو اری کہتے ہیں۔ ما۔ نو۔ ڈور۔ زم بولتے ہیں۔ وہبوں کا درمیانہ حصہ بہ نسبت کناروں کے زیادہ تر سُرخ ہوتا ہے۔

یہ بیماری ایک اور قسم کی ہوتی ہے جو متعلقہ کی جلد کے رگڑنے سے پیدا ہوتی ہو مثلاً جھیم عورتوں میں پستانوں کے نیچے اور جھیم بچوں کی نبلوں میں۔ اس قسم کی بیماری کو اری کہتے ہیں۔ ما۔ اڑ۔ ٹرائی۔ گول بولتے ہیں۔

اس بیماری کی ایک اور قسم وہ ہے جس میں وہبوں کے ایک جانب کے کنارے سخت اونچے بلدار اور سُرخ ہوتے ہیں اور دوسری جانب کی سُرخ کی کوئی حد نہیں ہوتی یہ بیماری مسن آدمیوں کے ہاتھ پاؤں اور کمر پر ہوتی ہے۔ اس کو اصطلاح میں اری کہتے ہیں۔ ما۔ مار۔ جی۔ نے۔ ٹم بولتے ہیں۔

تشخیص۔ اس مرض کی تشخیص میں اکثر وقت نہیں پڑتی پر بعض دفعہ خفیف قسم کے اری۔ سی۔ پے۔ لین اور اس میں سُرخ کرنا پڑتا ہے۔ پس یا درہے کہ اری۔ تھو۔ ما کی سُرخ زیادہ گہری ہوتی ہے اور بہ نسبت اری۔ سی۔ پے۔ لین کے کمتر اودھ اور اس مرض میں بیماری کا مقام استعدا پہنچا ہوا نہیں ہوتا جیسے اری۔ سی۔ پے۔ لین میں ہوتا ہے اور نہ تو اس میں مثل اری۔ سی۔ پے۔ لین کے اس قدر جلن۔ حرارت اور دھواں ہوتا ہے اور نہ جیسی تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں اور اس مرض میں بخار بھی کم ہوتا ہے

بعض فہ اری۔ تھو۔ ۱: فیو۔ لکس کو آڑ۔ ٹے۔ کے۔ ریا۔ ای۔ وا۔ نے۔ ٹو۔ سے فوق
 کرنا پڑتا ہے چنانچہ آڑ۔ ٹے۔ کے۔ ریا کے بنجرات بہت جلد رفع ہو جاتے ہیں اور
 یہ اسی مقام پر فوراً ظاہر ہو پڑتے ہیں مگر اری۔ تھو۔ ۲: فیو۔ لکس کے سرخی بھی اگرچہ
 تو آرفع ہو جاتی ہے لیکن پہلے اسی مقام پر لکس ہر نہیں جوتی علاوہ برین اس بیماری
 میں استعد۔ غارش اور چنگ۔ نہیں پڑتی ہے جیسے آڑ۔ ٹے۔ کے۔ ریا میں ہوا کرتی ہے
 اور یہ مرض کسی نو۔ تھو۔ بھی ہوتا ہے کی حالت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر آڑ۔ ٹے۔ کے۔ ریا
 خود ایک مستقل بیماری ہے۔ انجام اس مرض کا بخیر ہے *

علاج۔ جب یہ بیماری بسبب تازت آفتاب یا گرم ہوا کے مسافروں کو ہو جائے تو
 ہے تو مقام مرض پر روغن یا ملائی کی مالش کریں اور اگر کسی شدید مرض کی حالت
 ہو جاوے اور یہ امر اگر مانع نہ ہو تو مریض کو آب گرم میں بٹھا دیں اور جب یہ مرض
 کسی عضو اندرونی کی بیماری کے باعث پیدا ہو جاوے تو اصل مرض کا علاج کرنا چاہئے
 اور کسی رفع ہو چکا ہو اری۔ تھو۔ مکی بجای بھی جاتی رہتی ہے *

اری۔ تھو۔ ما۔ لے۔ وی کا علاج اسطو رہ کر کریں کہ بجای کے مقام کو کو۔ لڈ۔ لو۔ شن سے
 دوہو کر اور اچھے طو پر خشک کر کے اسپر میدا چٹک دیں اور روئی سے اس عضو کو لپیٹ
 دیں اگر مرض پہلیتا جاوے تو لڈ۔ لو۔ شن میں لینٹ کر کے مقام مرض پر لگا دیں
 اور تب اسپر گٹا۔ پرچہ باندھ دیویں۔ بعض فہ آڑ۔ تھو۔ ما۔ انڈر۔ روئی۔ گو ایک
 بڑا ہٹلا مرض ہوتا ہے خاصک جب بچوں کے کانوں کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس مرض کے
 روکنے کے لئے عین ابتدا میں مقام مرض پر باریک میدا یا اراروٹ چھڑکین لیکن
 بیماری اگر پرانی ہو جاوے تو اس مرہم کا استعمال کریں *

فسقو۔ کاربونٹا فہ لڈ۔ ما۔ کریں۔ مرہم سفید موم ایک آونس ۱۰ گلائی۔ سی۔ رین
 نصف ڈرام۔ کچھ ٹائین اور جب بیماری بہت ہی پرانی ہو جاتی ہے تو مرہم باروغن کے

مہم کی چیزوں کے لگانے سے بوض رفع ہونے کے طرہ جاتی ہے اس حالت میں یہ عرق بہت مفید پڑتا ہے چنانچہ :

نسخہ - سلفٹاف کا - پرنیٹے طویل سا گرین - روز - وارٹھ عرق گلاب ایک آونس ۶ دولون
کو ملا کر اس عرق میں لینٹ کر کے مقام مرض پر لگا دین اور لینٹ کو برابر کر کہدین ۶
جب جوان آدمیوں کے چڑون میں یہ مرض ہو جاتا ہے تو کہیر سے کی مرہم سے
اسکو بڑا فائدہ ہوتا ہے -

نسخہ مرہم کہیر - چربی ایک سیر ۶ چربی بہیر کے گردون کی - ایک پاؤ ۶ کہیر سے
کاگو داغ - آونس ۶ پہلے دونوں قسم کی چوبیوں کو آگ پر پگھلا دین اور تب اس میں
کہیر سے کاگو داچھوڑ کر گھوٹ ڈالیں ۶ چڑون کو کپڑا کر کے خوب پونچھ کر اس میں
کو دین تین مرتبہ خوب جاکر لگا دین ۶ اور جو یہ مرہم دستیاب نہ ہو سکے تو نسخہ
مفصلہ ذیل کا استعمال کریں ۶

نسخہ - اسے - ٹٹاف زنک سا گرین ۶ عرق گلاب ایک ڈرام ۶ موم روغن ایک
آونس ۶ سبکو ملا لیں ۶

جبار ۱ - تھو - پے پیو - لے ٹم جو انون کو ہو جاتا ہے تو اسکا علاج انٹو - فلو - ٹیک
دواسے کرنا چاہئے ۱ - خاصکر میں جلاب اس میں مفید پڑتا ہے - اس مرض میں تھو
ہو جاوے اور مریض طاقتور بھی ہو تو اس نسخہ کا استعمال کریں -

نسخہ - ٹار - ٹار - اے ٹکٹ گرین ۶ سلفٹاف - مگ - نے - رشیا م آونس -
پانی م آونس ۶ سبکو ملا لیں ۶ اس عرق کو بمقدار - د آونس کے جھٹک تے اور رت
شروع ہو جاوے دو دو گھنٹہ بعد پلاوین اور جب یہ بیماری سن آدھیوں کو ہو جاتی
ہے تب ادویات معوی سے علاج کرنا چاہئے ٹیکٹاف بارک سمیرا انفیوژن ان کو اشیا
یا کلبا کے دیوین اور اری - تھو - ما تو - ڈو - زم کے علاج کے باب میں یاد رہے - کہ

اس بیماری میں بھی علاوہ لگانے کے دوا پانی بھی چاہئے شکم بیمار کو آب گرم سے دوسرے
تیسرے غسل کروین اور بہت چلنے پہرنے سے باز رکھین اور جب تک بیمار کی
شریت کم نہ ہو لے تب تک غذا ہلکی دیوین اور کیا۔ لو۔ مل اور چلب کا جلاب دیکر
سی۔ لائین۔ انسٹے۔ مو۔ نیل۔ کچر کا اسے تعال کرین چنانچہ یہ نسخہ سی۔ لائین۔ کچر
کا بہت مفید ہے *

نسخہ۔ اسٹڈ۔ ٹار۔ ٹریٹاف۔ پوٹاش۔ پوائس۔ سوڈا۔ ایک۔ ڈرام۔ صاف
شکر۔ ڈرام۔ پانی ۱۲ آونس۔ اس عرق کا دوا آونس چھ چھ گھنٹہ بعد پلاوین *

دوم۔ ار۔ لٹے۔ کے۔ ریا

دوسری بیماری اس جماعت کی وہ ہے جسکو صلیح بین ار۔ لٹے۔ کے۔ ریا انگریزی
میں نے ٹل۔ راش۔ پنجاہی میں چھپا کیا اور اردو میں تونکا نکنا بولتے ہیں *
حالیست اس مرض کی یہ ہے کہ اس میں گول گول اور کب بعد اونچے سفید مایل بڑی
یا زرد مایل سُرخ جکین جسم پر نکل آتے ہیں گرداں کا سُرخ مایل ہوتا ہے اور
جلد پیدا ہو کر اکثر جلد مٹ جاتے ہیں اور ایندین سوزش اور چنک اور شدت کی غارش
ہوتی ہے۔ یہ مرض متعدی نہیں ہے اور اکثر اسکے ہمراہ ہٹوڑا بہت بیمار بھی ہوتا ہے
یہ بیماری شدید یا مرن ہوئی ہے۔ جب شدید ہوتی ہے تو صرف چند ہفتہ تک جیتی ہے
لیکن مرض مزمن مہینوں یا برسوں تکلیف دیتا ہے * یہ مرض چار قسم کا ہوتا ہے *

اول ار۔ لٹے۔ کے۔ ریا نے۔ برائی۔ لسن *

دوم ۔ ۔ ۔ ۔ ان۔ ٹرے۔ ٹرنس *

سوم ۔ ۔ ۔ ۔ ای۔ وارنے۔ ڈا *

چہارم ار۔ لٹے۔ کے۔ ریا ٹیو۔ بے۔ رو۔ ز *

احول - ار - لٹے - کے - ریا - فی - برامی - لسن - اس مرض میں پہلے
 خفیف بخار کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں چنانچہ لوزہ - دوسر - حرارت تشنگی اعضا شکنی
 تھوڑے اور بھوک مر جاتی ہے اگر کھنڈ سے ہر گھنٹہ کے اندر پتین نکل آتے ہیں لیکن میں
 مقاموں میں نکلنے والے ہوتے ہیں تھوڑے عرصہ پر بیشتر و جان پر جن سوزش
 اور خارش ہوتی ہے اور تب پتوں کی چکریں نمودار ہو جاتے ہیں مگر تھوڑے عرصہ
 تک رہ کر منقود ہو جاتے ہیں این میں نہایت شدت سے خارش اور جلن ہوتی ہے
 اور اکثر زور اس مرض کا ایک ہفتہ سے ۱۰ دن تک رہتا ہے اور جب چکریں من
 ہو جاتی ہیں تب ان مقاموں پر سے باریک بہو سکی طور پر جلد کا اچے - ڈر - برست
 جھڑ جاتا ہے *

ووم - ار - لٹے - کے - ریا - ان - ٹر - مے - ٹلین - اس قسم کی بیماری
 مثل پتوبتی کے ثوبت بنوبت ظاہر ہوتی ہے یعنی کہی تو ہر روز اور کہی دوسرے
 تیسرے پیدا ہوتی ہے *

سوم - ار - لٹے - کے - ریا - امی - وا - نے - ڈا - اس قسم کی بیماری
 جزائی ہوتی ہے اور اکثر دسوں تک تکلیف دیتی ہے اور اگرچہ اس میں بخار نہیں
 ہوتا پر جیہ کی جان خارش کی شدت سے غلاب میں رہتی ہے - چکریں اس میں اکثر
 شام کے وقت نمودار ہوتی ہیں اور رات کی وقت اپنی کمال کو پہنچ کر صبح ہوتے منقود
 ہو جاتے ہیں اور شدت انہی ۵ سے ۶ گھنٹہ تک رہتی ہے مگر ادنے خارجی سبب سے
 پھر پیدا ہو جاتے ہیں اور جب یہ مرض عرصہ تک رہتا ہے تب بیمار کی صحت میں
 بھی فرق پڑ جاتا ہے *

چہارم - ار - لٹے - کے - ریا - ٹیو - مے - رو - ز - اس قسم کی بیماری
 بہت شاذ و یکہ میں آتی ہے اس میں سخت اور سرخ رنگ کے گول گول بھاشل چوٹے اخروٹ

کے پیدا ہوتے ہیں مگر درمیانہ حصہ انکا اونچا اور زردی مائل ہوتا ہے یہ مرض ناکمزہ
 ہو کر تاج اور نہایت پٹلا کیونکہ بعض قصہ و یا تین یا کئی سال تک رہتا ہے۔ مگر ہم کہتے
 ہیں اسے عرصہ کے لئے رفع بھی ہو جاتا ہے یہ بیماری عورتوں کو بہت بدمردان
 کے زیادہ ہوا کرتی ہے اور بچوں اور جوانوں کو بہت بڑھونکے۔ اگرچہ جب اس
 بیماری کا اچھے طور پر دریافت نہیں ہو سکتا مگر یہ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرض عمدہ سے
 بڑا تعلق رکھتا ہے یعنی جب ماضی میں کسی طرح کا فوقی پڑتا ہے تب یہ بیماری جلد پر ظاہر ہوتی
 ہے اور بعض اوقات دسویں کو کسی خاص چیز کے کھانے سے یہ مرض ہو جاتا ہے جہاں تک اس سے اور
 مگر کامی کے کھانے سے یہ عیسائی پیدا ہوتی ہے اور بچوں کو دانتوں کے نکلنے وقت
 یہ مرض اکثر ہو جاتا ہے۔

تجسس۔ شدت کی خارش گول گول چکرین اور انکا جلد رفع ہو جانا کافی علامتیں
 ار۔ ٹے۔ کے۔ ریا کے پہچاننے کی ہیں۔ انجام۔ اس مرض کا بغیر ہوتا ہے *

علاج۔ اس مرض کی تہ اول کا علاج بذریعہ نمکین جلاب اور معوقات سے کرنا چاہئے
 اور جب یہ بیماری بسبب تداعل یا کسی ثقیل غذا کے کھانے سے ہو جاوے تو فوراً
 کر اوین چنانچہ صلفٹ لف زنگ یا آپے۔ کے۔ کو انا کا استعمال کریں اور بعد میں
 کے کیا۔ لو۔ مل اور جلاب وین جب یہ مرض نوبت نوبت ظاہر ہو تو کوئین
 مقویات کو کام میں لاویں۔ نوبت سے پیشتر تھے کرانے سے نوبت اکثر ترک جاسکتی
 ہے۔ ار۔ ٹے۔ کے۔ ریا امی۔ وارنے۔ ڈاکا علاج مقویات سے کرنا چاہئے مثلاً
 سامی۔ ٹریٹ اف ایرن اور کوئین کا استعمال کریں اور رات کی وقت ڈو۔ برنس اور
 کہلاوین لیکن اس کے۔ ار۔ ٹے۔ کے۔ ریا کو جیسے بائی۔ کار۔ بونٹ اف سوڈا سے
 فائدہ ہوتا ہے ویسے کسی اور دوا سے نہیں ہوتا مگر اسکو نصف سے ڈرام تک چاہا
 گندھ بعد کھانا چاہئے۔ ار۔ ٹے۔ کے۔ ریا ٹیو۔ بے۔ روز کا علاج بھی مثل اس کے

کمرین لیکن جب بیماری پھیلی ہوتی ہے تب اسے تنک کا استعمال کرنا پڑتا ہے
اور جب این مین سے کسی قسم کا مرض کسی عضو اندرونی کی بیماری کے سبب سے ہوتا ہے
تب اس بیماری کا خاص علاج کرنے سے اس کے ریکی بیماری ہی نفع ہو جاتی ہے *
حلاج خارش کی۔ اس بیماری میں خارش بہت ہوتی ہے تو اسپرٹم گرین۔ بن ایکسپریٹ
ایک پائینٹ پانی میں حل کر کے لگانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور ہمزین ٹیکچراف
بن۔ زرا۔ این اور پانی ملا کر لگانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے * خارش کا علاج دیکھو۔
جماعت پنجم مرض پر۔ رانی۔ ٹینس *

ار۔ لے۔ کے۔ ریائے۔ برائی۔ میں اس عرق کے لگانے سے فائدہ ہوتا ہے *
نسخہ۔ کار۔ بونٹ اف پوٹاش۔ گگرین۔ عرق گلاب۔ آونس۔ ڈیکٹی۔ فاکٹا اسپرٹ
نصف آونس * جس مقام پر خارش ہوتی ہے اسپرٹ کے ٹکڑے اس عرق میں بہا کر
لگا دیں اور جب یہ بیماری پُرانی ہو جاتی ہے تب کھورا۔ فارم کے لگانے سے فائدہ
ہوتا ہے چنانچہ نسخہ۔ کھورا۔ فارم نصف ڈرام۔ سفید مرہم ایک آونس * دو نو
کو ملا لیں * جس مقام پر خارش ہوتی ہے اسپرٹس مرہم کالیپ کر دین۔ عرقیات آؤ
مرہم جنین فاسٹر۔ سیانک اسپرٹ ملا ہوتا ہے وہ بھی اس حکمت کو مفید پڑتے
ہیں۔ جب یہ بیماری بچہ کو ہو جاتی ہے تب انکے شکم کا خیال ضرور رکھیں اور ہر حالت میں
چاہے دانت نکلنے والے ہوں چاہے نہ ہوں مسوڑا بچہ کا ضرور چیر دین اور جب
یہ مرض نہایت چوڑے بچہ شیر خوار کو ہو جاوے تو اس کے مرض کی صحت پر متوجہ ہوا
اس عرق میں خارش نفع کرنے کے لئے کے۔ مو۔ مایل کے گرم انفیوژن کو جسم پر
بذریعہ اسفنج کے لگا دیں *

غدا۔ اس بیماری میں غذا کی نہایت تاکید کرنی چاہیے مثلاً جیالینو تجربہ سے اگر
جانتا ہو کہ غلافی شے مضر ہے تو فوراً اس کو ترک کر دیں اور شدید قسم کی بیماری میں

مریض کی غذا ہلکی ہونی چاہئے لیکن شتم مزمن میں غذا مقوی مگر گرم نہ ہونی چاہئے ۔

سوم رو۔ زیلو۔ لا

یہ بیماری مے۔ زلزل سے بہت مشابہت رکھتی ہے مگر بہ نسبت اسکے بخارات اسکے کم واضح ہوتے ہیں اور بسین تپ اندر کم بھی کم ہوتا ہے صرف کسے قدر رگلا دکھتا ہے۔ بخارات اسکے کسے قدر اونچے اور گلابی رنگ کے ہوتے ہیں شکل انکی بے قاعدہ ہوتی ہے اور تھوڑے ہی عرصہ تک وہ کمرغ ہو جاتے ہیں مگر پھر ظاہر ہو پڑتے ہیں۔ یہ بیماری متعدی نہیں ہے۔ اس مرض کی دو قسمیں ہیں ایک رو۔ زیلو۔ لا اسی۔ ڈیلو۔ پے۔ تھیکا اور دوسری رو۔ زیلو۔ لا سم۔ ٹو۔ مے۔ ٹیکا ۔

قسم اول کی بیماری اس طور سے شروع ہوتی ہے کہ بسین ابتدا کے اندر کسے قدر بخار ہوتا ہے اور جھٹ پر بخارات اچھے طور پر نکل پڑتے ہیں تب شدت بخار کی کم ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں زرد رنگ کے سُرخ خیٹیل بے شمار مہیتے پیدا ہوتے اور تھوڑے عرصہ بعد بالکل سُرخ ہو جاتے ہیں اور پہلے تو چہرہ اور گلو پر نمودار ہوتے ہیں بعد ازاں سینہ اور ماتہ پاؤں پر اور اکثر تھوڑے عرصہ تک رہتے ہیں چنانچہ مہ گھنٹہ سے ۸ گھنٹہ کے اندر بالکل سُرخ ہو جاتے ہیں بعد ازاں بخار کی علامتیں بہر لوٹتی ہیں اور تب اس مرض کے بخارات بھی پھر نمودار ہوتے ہیں۔ یہ بیماری اکثر پانچ روز سے سات روز تک رہتی ہے تب آپے۔ ڈر۔ مس کے چھوٹے چھوٹے جھکے ہوس کے طور پر جنکڑا جاتے ہیں ۔

قسم دوم کی بیماری یعنی رو۔ زیلو۔ لا سم۔ ٹو۔ مے۔ ٹیکا بخار کی بیماریوں میں پیدا ہوتی ہے اور علامات اسکی مثل شتم دوم کے ہوتی ہیں ۔

اسباب۔ یہ بیماری چاہے کسی عمر میں ہو جاوے پرچہ انون کو بہ نسبت بڑھاپے کے

زیادہ تر ہوتی ہے۔ جلد پر کسی تیز خیز کے لگنے سے ہو جاتی ہے اور ایسے سبب
داخلی سے بھی پیدا ہو سکتی ہے جس سے جلد کی رگوں میں خون زیادہ آجاتا ہے
اور گرمیوں میں سبب تہات آفتاب پیدا ہو جاتی ہے اور جاڑے میں مقصور ہاتھ
سے اور اٹھان کو دانت لٹکتے وقت اور نہایت چھوٹے شیر خوارہ کو دانتی کے دودھ
کے ناموافق پڑنے سے۔

تشخیص۔ اس بیماری کو بے زلس سے فرق کرنا پڑتا ہے چنانچہ اس بیماری کے
بخارات کا رنگ مسخ ہوتا ہے۔ مگر بے زلس کا نہیں عکاسہ ازین اسکے دہلے ہلاکی
شکل کے نہیں ہوتے۔ جیسے بے زلس کے سوتے میں اور نہ اس میں شہت کا بخار
اور نہ کام ہوتا ہے۔ انجام اس بخار کا بخیر ہوتا ہے۔

علاج۔ ہلکی غذا غسل آب گرم۔ اور ضرورت ہو تو ایک ہلکا جلاب۔ اور
جو بخار کی شدت زیادہ ہو تو نیورکسچر کا استعمال کریں۔ اگر یہ بیماری نرمن ہو تو بخار
سے اسکا علاج کریں۔ بخارات پر خارش اور گرمی زیادہ ہو تو عرق مفصلہ ذیل کا دین
نسخہ۔ سوہاگہ ۳۰ گرمین + عرق گلاب ۱۲ آونس + اسپرٹ اف وردز۔ میری
لصف آونس + ملائین +

جماعت دوم وے سی۔ کیولے

اس جماعت کی بیماریوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں جلد پر نپیا پیدا ہوتی ہیں۔
یہ نپیاں جلد کے اوپر کے فرد کے اپنے ہو جانے سے جبکہ مہطل میں پلے۔ پورس کہتے
ہیں۔ ابتدا میں انکے اندر ایک شفاف طوبت ہوتی ہے مگر چون جون بیماری بڑھتی
جاتی ہے طوبت مذکور گدلی ہوتی جاتی ہے اور اخیر میں خشک ہو کر شل جیہلگون یا

گہرند کے جھڑ جاتی ہے + اس جماعت میں تین بیماریاں شامل ہیں - ایک
 اگ - زمی - ما + دوم ہر پیر + تیسرے سیو - ڈا - مے - نا + انہیں سے مرض اول
 اور دوم میں اکثر شدید علامتیں پیدا ہوتی ہیں اور سوم ایک مرض خفیف ہے +

اول اگ - زمی - ما

اس بیماری میں چھوٹی چھوٹی شفاف پھنسیاں نہایت گنجان پیدا ہوتی ہیں اور انہیں
 سوزش درد اور شدت کی خارش ہوتی ہے اور جس مقام پر نکلتی ہیں جلد زبان کی سرخ
 ہوتی ہے لیکن یہ متعدی نہیں ہوتی + یہ پھنسیاں اگرچہ ابتدائیں بالکل شفاف ہوتی ہیں
 پر دوسرے یا تیسرے دن مگر رہ جاتی ہیں اور انکے اندر کی رطوبت پیپ کی شکل پکڑ لیتی
 ہے اور اخیر میں خشک ہو کر یا تو بار بار ایک چمکون کے طور پر جھڑ جاتی ہے یا پھنسیوں کے ہونٹ
 جانے سے رطوبت مذکور بار بار ایک بار ایک اور زرد رنگ کے گہرند بن کر چھٹی رہتی ہے تب اس
 گہرند کے نیچے ایک پتلی رطوبت مثل پانی کے پیدا ہونے لگتی ہے + اس مرض کے قسم
 دومین ایک - زمی - ما سم - پکس اور دوسرا اگ - زمی - ما روروم + قسم
 اول میں خفیف علامتیں بخار کی ہو کر پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں مگر قسم دوم میں شدت
 کا بخار ہوتا ہے اور مقام مرض نہایت سرخ اور متورم اور اُس میں نسبت خارش کے
 زیادہ تر ٹیسڈین پڑتی ہیں اگ - زمی - ما کی بیماری شیرخوارہ سے لیکر بوڑھوں تک
 کو ہو جاتی ہے +

تشخیص - اگ - زمی - ما سم - پکس کو ابتدائیں مرض ہر پیر سے فرق کرنا پڑتا ہے
 مگر ہر پیر میں جو پھنسیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بہ نسبت اس بیماری کے کثرت و بڑی
 اور زیادہ متفرق اور اکثر محدود مقاموں پر پیدا ہوتی ہیں اور جب اگ - زمی - ما کی
 پھنسیاں نکلیں تو پر پیدا ہوتی ہیں تب انکو مرض کے - بننے کی بجائے کی پھنسیوں سے

فرق کرنا پڑتا ہے مثلاً کچلی کی جو پھنسی ہوتی ہے وہ بڑی بڑی اور نوکدار ہوتی ہے اور جلد
 اسی میں پیپ پڑ جاتی ہے علاوہ ازیں ارگ۔ زری۔ ماکلی میں اور سوزش شہ ہو ہے مگر
 کیلی کچلی میں شدت سے خارش ہوتی ہے اور اس میں ایک قسم کا گرم بھی پایا
 جاتا ہے جو ارگ۔ زری۔ مایین میں ہوتا +

علاج۔ ایکوٹ بیماری کا علاج اسطور پر کریں کچھنی اجار گرم مصالحہ چار
 کانی اور شراب سے پرینہ کرادین اور اس نسخہ کا استعمال کریں +
 نسخہ۔ سفٹ اف یگنے۔ شیا۔ ۳۰ گرین + بائی۔ کار۔ پونٹ اف سوڈا۔ ۳۰ گرین
 ٹنکچر اف جنجوہ قطرے + پانی ایک آؤش + سبکو ملا کر ایک خوراک کریں اور چار چار
 گھنٹہ بعد پلاوین یا اس نسخہ کو کام میں لاوین +

نسخہ۔ سفٹ اف یگنے۔ شیا۔ ۳۰ گرین + لائیٹ کار۔ پونٹ اف یگنے۔ شیا
 ۳۰ گرین + ٹنکچر اف کال۔ چیکم سیڈس۔ قطرے + بے۔ پر۔ منٹ واٹر ایک آؤش
 سبکو ملا کر ایک خوراک کریں اور چار چار گھنٹہ بعد پلاوین + بچوں کے لئے کیا۔ لو۔ مل
 اور اسکا۔ منی باؤڈر کا استعمال کریں +

خارجی علاج۔ ایکوٹ مرض میں مرہم یا روغن کسی قسم کا نہ لگاویں بلکہ پانی کو
 جوش دیکر جب وہ سرد ہو جائے تب کپڑا تر کر کے مرض کے مقام پر لگاویں ہینین تو
 لڈ۔ لو۔ شن کا استعمال کریں۔ اگر عریات کا گھانا مناسب نہ سمجھیں تو اس سفوف
 کو چھڑک کر پولٹس باندھیں۔

نسخہ۔ رکن۔ سائیڈ اف زنگ۔ ۸۰ گرین + اسٹارچ کاسوف۔ ۸۰ گرین +
 کافور۔ ۳۰ گرین + ریٹی۔ ٹیڈ اسپرٹ صرف اسیتھ۔ جتنے میں کافور سفوف بجائے
 سبکو ملا کر سفوف کر لیں +

علاج کرانک ارگزی۔ ماکا۔ اسیں بھی مہیرون سے پرینہ کرادین جسے

اچار چٹنی شراب وغیرہ ہین۔ منع قبض کیواسطے ہلکے مسہلات کا استعمال کریں۔
 سنکھیا تہ یا یا ہملہ فولاد کے گھلا دین اور جب حارش بہت ہوتی ہے تب اسٹک۔ نیا کے
 استعمال سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ * مریض عورت ہو یا لڑکا یا کمزور تب مقویات مثلاً فولاد
 کا استعمال ضرور کریں چنانچہ۔

نسخہ۔ سلفٹ اف ایرن ایک گرین + سلفٹ اف گنے۔ شیا ۲۰ گریں +
 ڈیٹیلوٹ سلفیورک اسٹڈ ہونڈ + ٹینکراف جوجوہ ہونڈ + بے پریٹنڈ + اٹرا ایک
 آؤنس + ہیکو ملا کر دین تین دفعہ پلا دین + جب بیمار کو نا ہوتا ہے تب دوا پلانے کا ہلکا
 کمی کچھ ضرورت نہیں ہوتی ہے بچوں کو یہ بیماری اکثر شکم میں کرم یا دانتوں کے نکلنے
 سے ہو جاتے ہے پس انکا علاج کریں +

علاج خارجی۔ دوا کے لگانے میں دبا تو نکلی احتیاط چاہئے ایک تو کھرنڈ کو دو کرنا
 دوسرے اچھے طور پر دوا کو لگانا چنانچہ کسی میٹھے تیل میں کپڑا تر کر کے مرض کے مقام پر گھنٹہ دو
 گھنٹہ لگا رکھیں اور تب پسر لوٹس باندھیں۔ اس ترکیب سے جب کھرنڈ طاعن ہو جاوے تب
 انکو ناخنوں سے یا کسی ڈرنچر سے علیحدہ کر دین انہیں بال نہیں جاوے تو قینچی سے تراش
 ڈالیں + تب گرم پانی اور ہابون سے دھو کر کپڑے پر اکائیڈاف رنگ کا مرہم لگا کر
 مرض کے مقام پر چسپان کر دین۔ کسی دغن کو لگانا ہو تو اسکی تیل اور بچنے کا پانی ہوزن
 لیکر اور اس میں چند قطرے کرلو۔ زوٹ کے ملا کر لگا دین +

دوم ہر پسر

اس مرض کی پہنچان گجانب چوٹی چوٹی اور گول گول اکثر خوشن میں پیدا ہوتی ہیں اور
 جلد و دان کی سطح ہوتی ہے اور جس مقام پر یہ پہنچان پیدا ہونیوالی ہوتی ہیں پہلے دوا
 پر گرمی اور پسین پڑتی ہیں اور وہ جگہ سوج کر سطح ہو جاتی ہے لیکن نہیں بخار نہیں ہوتا

پہنسیان ابتدائیں گول اور شفاف ہوتی ہیں لیکن دوسرے یا تیسرے دن کسیدہ چٹنی اور
گدلی اور تھوڑی بہت آلبیمن بجاتی ہیں۔ اس مرض کی پہنسیان اکثر پھوٹی ہندین ٹکڑیوں
ہو کر سیٹھ جاتی ہیں تب ان پر نکلا ہوا زردی یا لکڑی کا تھنڈا بندہ جاتا ہے۔ اس بیماری کے
پہلے قسم میں دل ہر پیر فلک - ٹے - نو - ٹس + دوم ہر پیر زاس - ٹر + سوم
ہر پیر سر سے - نے - ٹس +

قسم اول کی پہنسیان اکثر چوٹی چوٹی ہوتی ہیں مگر ان میں سے چند مٹر کے برابر بھی ہو جاتی ہیں
اور ان کے ابتدائیں خفیف بنجار ہو جاتا ہے۔ زبان میلی ہو کر مر جاتی ہے۔ جی متکا تا جو آرتھریٹک
معلوم ہوتی ہے + اگرچہ ایسٹم کی پہنسیا جاتے کسی حصہ جسم پر پیدا ہو جاوین پر اکثر سینیٹک
اور بازو و پیر غودا ہوتی ہیں لیکن ٹانگوں پر بہت شاذ + مگر جب پہنسیان پوریا نیچے کی لب
یا پاچون پر ہو جاتی ہیں تب ان کو اصطلاح میں ہر پیر لے - بے - انس اور جب خفیف کے چھوٹے
پیدا ہوتی ہیں تب ہر پیر پرے - پیو - شے - انس کہتے ہیں +

قسم دوم یعنی ہر پیر زاس - ٹر اس لفظ کے معنی کمر بند کے ہیں۔ پنجابی میں سچا ری کو کلوٹر
کہتے ہیں۔ اس قسم کی پہنسیوں کے پیدا ہونے سے پشت لرزہ کے ساتھ بنجار آتا ہے اور تے ہوتی
ہے اور جس مقام پر دالے پیدا ہوئے ہوتے ہیں ان پر زردی کی مین پڑتی ہیں گرمی اور
سوریش معلوم ہوتی ہے اور وہ جگہ شروع ہو کر کسیدہ پہون جاتی ہے یہ دالے خوب نمایاں گنیا
اور تین یا چار خوشون میں ہوتے ہیں ہر ایک کے گرد ایک سچ ڈال ہوتا ہے اور یہ ڈال
بتدریج بڑھتا جاتا ہے اس پر اور پہنسیان پیدا ہوتی جاتی ہیں اخیر میں شکل اس انداز ڈال
کی ہلائی ہو جاتی ہے اور چوڑا نصف پنج سے ایک یا دو پنج تک ہوتا ہے اور گلو اور سینیٹک
اور شکم کے ایک ہی جانب پر ہوتا ہے اور اکثر پشت کے درمیانہ خط سے دے ٹریٹل لائن
سائے کے درمیانہ خط تک اس کی حد ہوتی ہے لیکن ہم نے کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا ہے
کہ کمر کے نیچے سے شروع ہو کر زیر ناف تک اس مرض کے دالے پیدا ہوتے ہیں اور

ایک بیماری میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ اس مرض کے دانے بائیں طرف کے گلوتے ال بچیز سے شروع ہو کر ان کے اوپر سے گزر کر چپے کے نیچے ختم ہوئے ہیں + اور سر اور پیشانی پر بھی اس مرض کے دانے پیدا ہو جاتے ہیں اور بعضہ فوجہاں سے سوہرا اور بے گل نرو شروع ہوتا ہے یہ مرض بھی کان سے شروع ہو کر اوپر کی طرف سر کی جلد پر پھیلتا ہے جب یہ مرض آنکھ میں ہو جاتا ہے تب نہایت شدت کا درد ہوتا ہے اور آنکھ سرخ ہو کر بھارت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ سر کے پیچھے اور چہرہ پر اور گردن کے کسی جانب پر بھی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے + اور سینہ کے ان - ٹر - کا س - ٹل - نرو پر جب یہ مرض ہو جاتا ہے تب اس شدت کا درد اور دم لینے میں ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ طبیب کو پلو - رہی - سی کی بیماری کا گمان ہو جاتا ہے + اکثر حکما کی رائے اس بات پر متفق ہے کہ یہ مرض اعصاب سے تعلق رکھتا ہے +

قسم سوم یعنی ہر پیر سر سے - لے - ٹش - انگریزی میں اس منکو رنگ - ر - لم - ہندی میں دا د کہتے ہیں + جس مقام پر اس مرض کی پھینک نکلنے والی ہوتی ہیں پہلے وہاں پر خارش معلوم ہوتی ہے بعد ازاں ایک یا کئی علیحدہ علیحدہ مقام پر گول گول چکرین پیدا ہوتی ہیں گہرے چمکناصف پنج سے ایک انچ تک ہوتا ہے دوسرے یا تیسرے دن اس چکر کے باہر کے کنارہ پر پیشیاں چھوٹے چھوٹے گول گول شفاف پھینک پیدا ہوتی ہیں اس وقت چکر دن کے درمیان میں جو سرخی ہوتی ہے وہ مٹنے لگتی ہے اور بیماری کے اخیر تک درمیانہ حصہ چکر دکاند رست رہتا ہے مگر چکر دن کے جس مقام پر دانے ہوتے ہیں اسکا اندر اور باہر کا کنارہ سرخ ہوتا ہے + پھینک پہلے تو گنجان ہوتی ہیں مگر ہم گننے کے بعد ایک سرے سے لمباتی ہیں اور موتیوں کے طور پر جھلک رہا ہو جاتی ہیں تب اُنکے پہلے جانے سے تھوڑی سی پانی کے طور پر رطوبت خارج ہوتی ہے اور مرض کے آٹھویں یا نویں دن کے بعد اس رطوبت کے خشک ہو جانے سے

یہو سی کے طور پر چمکے اڑ جاتے ہیں پھر اس مقام پر اڑ چمکے عرصہ تک چدا ہوتے رہتے ہیں مگر اکثر نئی بہنیاں اڑ پیدا ہو جاتی ہیں اس طور سے یہ بیماری برسوں تکلیف دیتی ہے ۔ یہ بیماری اکثر چٹڑیوں اور چڈیوں پر ہو جایا کرتی ہے اور بعض دفعہ مکر پر بھی پیدا ہوتی ہے ۔ بعض طبیب کی رائے ہے کہ یہ بیماری نباتی مادہ کے سبب سے پیدا ہو جاتی ہے (دیکھو جاحوت دہم) ۔

علاج - ہر پینر فلک - ٹے - نو - ٹس جب جوان اور موسمی مزاج کو ہو جاوے تو مقام مرض پر جو کین لگا دیں اور کین سلاب سے مصطلح شکم کریں مریض اگر کمزور ہو تو مقویات مثلاً شکوہ - بارک ہر کسی معدنی تیزابوں کے دیویں دیاتین روزانہ لگانے کی ودا کی کچھ ضرورت نہیں تھی مقام مرض کو کھلانا چاہئے اور جو خارش کی شدت ہو تو اس مہم کو لگا دیں نسخہ - اسے - ٹٹ اف - زنگہ - گرین - سکورا - فارم - ابوند - سفید مرہم ایک آونس + اور جو رطوبت زیادہ بہتی ہو تو اسپر میدیا چمک دیں اور جو وقت کہ چٹڑی جہڑ جاوے تو بعض مرہم کے اس عرق کو لگا دیں -

نسخہ روغن نیوہ - ابوند - ریگٹی - فاریڈ - اسپرٹ جو تہائی آونس + عرق کافورہ آونس + ہر پینر کی بیماری میں جو درد ہوتا ہے علاج خارجی سے اسکو اکثر فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس نسخہ مقوی کو پلانا چاہئے -

نسخہ - کنہاوند - ٹیکٹرا - سنکونا ۲ ڈرام + ٹیکٹرا - ہلاک ۲ - ڈرام + ڈیکا کشن اف سنکونا ۴ - آونس + سکولاکر مقبلا - ایک آونس کے دینین چاڑنی ملاوینا جب یہ بیماری لبون پر ظاہر ہو تو او - وی - کلون لگا دیں (یہ ایک شہو عرق ٹو اگر ان کی دوکانوں میں بکتا ہے) اور جب لپچے طور پر ظاہر ہو پڑے اسوقت اسپر کیرے کا مرہم لگا دیں (دیکھو پیچہ) اور جب خشفہ کے چمڑے پر یہ مرض ہونیوالا ہوتا ہے اسوقت درد اور جلن ہوتی ہے غرض ان باتوں کے رفع کرنے کے لئے قضیب کو خوب ہنر بانی میں

ایک یا دو منٹ تک عین دو یا تین مرتبہ ڈبو کر کہیں اور جب دانے غنوا وار ہو جاوے تو پھر
ہرگز کسی قسم کی تیز روانہ لگاوین بلکہ جب ہینیا پہنچ جاوے تب بالاک داکش استعمال کریں ۔

علاج ہر پینر اس - ٹمر کا - اس بیماری کا علاج داخلی اور خارجی دونوں طور پر کیا جاتا ہے چندین
علاج داخلی - کہلانے اور پلانے کی دوا سے اس بیماری کو کم فائدہ ہوتا ہے
مگر بعض طبیب فاس - مائیڈ اف زنگ کی بہت تعریف کرتے ہیں - کہتے ہیں اس دوا
سے درد موقوف ہو جاتا ہے اور دانے ابھرنے نہیں پاتے ۔

خوراک اس دوا کی ایک گرین کا تیسرہ حصہ - مرض کے عین ابتدا سے شروع کر کے تین
تین گھنٹہ بعد کہلاتے جاوین ۔

جب مرض خوب طرح پیدا ہو جاوے تب مناسب طور پر عام مسلاتون کا علاج کرنا چاہیے
مثلاً پہلے درجہ بین ٹیکس بلب سے فائدہ ہو سکتا ہے - سو رو کے سبب نیند نہ آتی ہو تو ان
کا استعمال کریں ۔ بیماری اگر شدید اور مدت تک ہے تو مقویات کا استعمال کرنا چاہئے
جیسے سٹیکیا - فولاد اور ہر روز زیادہ مقدار میں ایک فو کوئین کہلاوین - بعض دفعہ
برو - مائیڈ اف پو - ماسیم سے فائدہ ہوتا ہے ۔

علاج خارجی - پہلے پولٹس باندھیں اور تب اس مقام پر میا جہر کر دیں ۔ بعض دفعہ
مرض کے مقام کوپے - پر منٹ - آئیل سے خوب طرح چھڑوینے سے فائدہ ہوتا ہے -
اور ٹیس اور درو کے رفح کرنے کے واسطے مار - فیا کی سچکا رسی بھی فائدہ مند ہے -
بعض دفعہ کافور اور ہینون کا عرق لگانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور ۱۰ - گرین
کار - بالاک سٹڈ ایک آؤش پانی میں ملا کر لگانا بھی نافع ہے ۔ اور ایک آؤش فکٹ - زئی بل
کو - لو - ڈی - ون مین ۱۰ - گرین مار - فیا ملا کر اون پر دن میں کئی دفعہ لگانے سے
بہت فائدہ ہوتا ہے - مرض کے مقام پر مار بجلی لگانے سے بھی فوراً آرام آ جاتا ہے
ترکیب اس کی یہ ہے کہ رو کے تار کو مرض کے دونوں پردارن عصبی شاخوں پر جو اس مقام

بین پیسہ ہوتے ہیں لگنا چاہئے۔ ہر روز ایک یا دو دفعہ ۱۰ یا ۱۵ منٹ تک لگنا چاہئے۔
 مرض کے ابتدا میں جب بجلی لگائی جاتی ہے تب بیماری رُک جاتی ہے اور
 مرض کے زور و شور کے وقت لگانے سے یہی بیمار کو نہایت آرام آجاتا ہے *
 اور مرض کے رفع ہونے کے بعد جو مبین ہونے لگتی ہیں بجلی کے لگانے سے وہ بھی
 رفع ہو جاتی ہیں *۔

ہر پیئر سر-سی۔ نے۔ ٹس لینے واوکا علاج جب مرض خفیف
 ہوتا ہے تو داخلی علاج کی ضرورت نہیں پڑتی دو انگنا مکی کافی ہوتا ہے مگر مرض فرمن
 میں دو نوٹس کا علاج کام میں لانا چاہئے۔ داخلی علاج کیواسطے مرکب جنہیں آیو۔ ڈین
 پڑتی ہے یا سنہکیا کا استعمال تنہا یا ہمراہ کسی مقوی دوا کے کریں اور لگانے کی دو امین
 بڑا اختلاف ہے چنانچہ کہیں تو یہ بیماری دادر دوز کے پتوں کے ملنے سے رفع ہو جاتی ہے اور
 کہیں سپر عرق آیو۔ ڈین یا یا ٹریٹ اف سلور کے لگانے سے فائدہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ
 اسے۔ ٹریٹ اف زنک کی مرہم یا اس مرہم سے اسکو فائدہ ہوتا ہے چنانچہ۔

نسخہ۔ روغن گلابی۔ سی۔ رین ایکٹ رام * خشک سلفٹ اف ایرن ہر گرن * سفید
 مرہم ایک آونس * اس مرہم کے لگانے کی ترکیب یہ ہے کہ مقام مرض کو پہلے پوٹاش کے
 عرق سے تر کریں۔ بعد ازاں اس مرہم مذکور کی دین تین دفعہ مالش کریں اور ہر دفعہ پوٹاش
 کے عرق سے اسکو تر کریں۔ عرق پوٹاش کا یہ ہے۔ کار۔ بونٹ اف پوٹاش * اگرین *
 عرق گلاب ۱۲۔ آونس * اور جو بیماری بہت ہی فرمن ہو تو بعض مرہم سلفٹ اف ایرن
 کے اس مرہم کا استعمال کریں کہ ایک یا دو ڈرام سٹ۔ رن۔ اینٹ منٹ کا ایک ایک
 آونس سفید مرہم میں ملا لیں * جب یہ بیماری جلد پہلنے والی ہوتی ہے تو اس کے روکنے
 کے لئے ایسا کریں کہ بشر کے پتلے پتلے ٹکڑے کتر کر مرض کے چکڑوں کے
 بیرونی کنارہ پر انفلامیشن کے مقام سے کیسے رنفادت لگائیں اس ترکیب سے

یہ مرض جڑک جاتا ہے + ایک حکیم بعد از ایک اسٹڈ کی بڑی تفریف کرتے ہیں چنانچہ
 ۴۰ گرین بو۔ راسکٹ ایک آونس آب سرد میں حل کر کے دوپرون میں تین یا چار مرتبہ پیتا
 اور اگر بو۔ راسکٹ اسٹڈ دستیاب نہ ہو سکے تو سوہاگہ پانی میں حل کر کے مقام مرض
 پر ملین کیونکہ سوہاگہ میں بھی بو۔ راسکٹ اسٹڈ ہوتا ہے +

سوم سیو۔ ڈا۔ می۔ نا

انکے دانے مثل قطرات شبنم کے گلو سیٹھ اور شکم پر پیدا ہوتے ہیں۔ انکے اندر پینہ کا
 قطرہ ہوتا ہے جو جلد کے اوپر کے فرو سے پھوٹ کر باہر نہیں نکل سکتا۔ ان دانوں کے
 پینہ سے تو سرخ ہوتے ہیں اور نہ انکے گرد کوئی سرخ مالہ ہوتا ہے + بہت سیر شدیدی اور
 مزین بیماریوں میں خاص کہ جب انکا انجام نیک ہو نیوالا ہوتا ہے تب یہ دانے پیدا ہوتے
 ہیں جیسے شدید زور مارٹنرم اور ٹاسی۔ فز اور ٹاسی۔ فایڈ فیور اور اسکار۔ لے۔ لے۔ نا
 وغیرہ امراض میں بھی یہ دانے کہی تو متفرق اور چھترے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کہی
 بہت سارے اکٹھے ملکر پیدا ہوتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعد ۴۰ گھنٹہ کے جب
 دانوں کا ایک غلہ خشک ہو جاتا ہے تب اوپر پیدا ہو جاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ انکے
 اندر کی رطوبت ہمیشہ صاف اور شفاف رہتی ہے گدلی کہی نہیں ہوتی + علاج کی کچھ
 ضرورت نہیں ہوتی دانے اس مرض کے خود بخود رخص ہو جاتے ہیں +

جماعت سوم
 بل۔ لی
 اول پیم۔ فے۔ گس

اس بیماری میں گول گول یا بیضیوں کی شکل کے یا بعض مٹر کے برابر بعض تیسہ کی مقدار کے

یا کبوتر کے اندرون کی شکل کے چہالے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے گرد سرخ مالا ہوتا ہے اور اندر شفاف آبی رطوبت ہوتی ہے جب یہ رطوبت گدلی ہو جاتی ہے تب رنگ لاسکارو می مائل ہو جاتا ہے۔ بعد پھوٹنے کے چہالوں پر باریک زد کے طور کا کثرتِ جیم جاتا ہے یا وہ جگہ جلی ہوئی معلوم ہوتی ہے جس سے تھوڑی بہت آبی رطوبت بہتی ہے یہ چہالے اکثر تو ایک ایک یا دو سے پانچ پانچ تک ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتے ہیں اور چند روز بعد رفع ہو جاتے ہیں تب نئے چہالے پیدا ہوتے ہیں اس طور پر یہ بیماری عرصہ تک جاری رہتی ہے *

یہ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے ایک پیم۔ نفے۔ گس۔ ایکو۔ ٹس۔ * دوسرے پیم۔ نفے۔ گس۔ کرا۔ نفے۔ کس۔ * قسم اول کے ابتدائین جاڑے سے بچا رہتا ہے اور بھوک مر جاتی ہے تب اکثر انون اور شکم کے پیچ کے حصہ پر خوب سُرخ سُرخ داغ جن میں حرارت اور عارضہ شش ہوتی ہے نمودار ہو جاتے ہیں اور یہ داغ جلد بڑھ کر مثل چہالون کے بن جاتے ہیں۔ قسم دوم میں بچا رہتا ہے مگر چہالون کے نکلنے سے کئی روز پیشتر مرض کا جی ملتا ہے اور وہ کمر پر ہو جاتا ہے اور اعضا شکنی ہوتی ہے تب مثل قسم اول پہلے اس میں ہی سُرخ سُرخ داغ پیدا ہو کر چہالے بن جاتے ہیں * سبب قصورِ ماضیہ۔ تمازتِ آفتاب رنج و غم فکر *

پیم۔ نفے۔ گس کی بیماری بعض دفعہ ننھے بچوں کو بھی ہو جاتی ہے چنانچہ ایسا بتا ہے کہ اہون کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر اور کبھی چوڑوں پر بھی چہالے پیدا ہو جاتے ہیں اور جب پھوٹ جاتے ہیں تب اس مقام پر بُری قسم کے زخم رہ جاتے ہیں * نہایت ننھے بچوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر یہ مرض چھوٹے تو دل میں آشکارا گمان ہونا چاہئے۔ اس کا علاج فوراً کرنا چاہئے ورنہ بیماری جلد بڑھ کر مہلک ہو جاتی ہے کیونکہ دست و پاء شروع ہو جاتے ہیں اور بچہ نہایت جلد لاغر اور کمزور ہو کر تلف ہو جاتا ہے ماکا دودہ چھڑا کر بچہ کو کسی تندرست عورت کا دودہ پلاوین اور جو آشکارا ذرا بھی

شک ہو تو سیب یا کلوٹ اف پوٹاش کا استعمال کریں *

علاج قسم شدید میں بیمار کو غذا ہلکی دین اور نمکین سیب سے اصلاح شکم کریں اور چھالون پر میدا چڑھیں تاکہ ٹوٹ نہ جاوے اور جو ٹوٹ جاوے تو کوئی ہلکا مرہم لگا دیں جیسے اسے - ٹٹ اف زہک - آیتھ - منٹ جسکا نسخہ اوپر لکھا گیا ہے یا شوگراف لڈ - آیتھ - منٹ لگا دیں * قسم مزمن کو علاج مقویات سے کرنا چاہیے چنانچہ یہ نسخہ نہایت مفید ہے -

نسخہ ٹیکو آف اوپیم ۵ لوند * کنیاؤنڈ ٹیکو آف سنکوٹا ۵ لوند * پانی ایک آونس * بیسچہ بہ گنٹھ کے جاوے یا کوئین اور فون یا سیکہیا کا استعمال کریں - بعض دفعہ چونے کے یعنی منٹ کے لگانے سے بھی مدد ہوتا ہے - اور آب گرم کا غسل بھی اس مرض کو مفید ہے *

دوم رو - سیا

اس بیماری میں خوب متفرق اور دلیر و ہر چیز سے ہوتے چپے چپے جہاں قریب دوانی کے برابر پیدا ہوتے ہیں اور اینٹ گھرے پورے رنگ کے گہرے جم جاتے ہیں جسکے گرجانے کے بعد اس مقام پر کمزور زخم زد جاتے ہیں - ان جہالون کے اندر ابتدا ہی سے ایک نیم مکہ ریائیز رطوبت ہوتی ہے مگر یہ رطوبت اس قدر نہیں ہوتی جیسے وہ چھالے پر ہو جاوے *

یہ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے ایک رو - سیا سم - پلکس دو سر ہی سیا پر - مے ٹیس * یہ بیماری اکثر ٹانگوں پر اور بعض دفعہ شکم کمر یا سینہ پر نمودار ہوتی ہے *

علاج اس بیماری کا مقویات سے کرنا چاہئے مثلاً کوئین سنکوٹا - بارک مرکبات فولاد وغیرہ اور جب یہ بیماری تشکک کے سبب ہو تو آیوڈائیڈاف پوٹاشیم کا استعمال کریں اور جب اس مرض میں اسکو - فینو - لس مزاج کے بچے مبتلا ہوں تو انکی

علی گڑھ۔ لیور۔ آئیل سے کرنا چاہئے۔ علاج خارجی اس مرض کا یہ ہے کہ نہایت جلد چھالوں کو نکال دین تاکہ گھرنڈ بندھے نہ پڑے تب انٹر لٹ کی گدی بکھیر بیٹھ جائے دین نہیں تو انٹر میڈیا چھڑک دین یا ایسا کر بن کر انٹر کلوڈین نکال دین تاکہ ہوا سے محفوظ رہیں اور جب گھرنڈ بندہ جاوے تو انٹر لٹ سے بائڈ کر علیحدہ کر دین اور چند روز تک زخمیوں پر صرف پانی کی پٹی لگا دین اور جو اس ترکیب سے خشک ہونے میں نہ آوے تو ان پر یا تو سیٹ۔ رن۔ آئیل۔ سنٹ یا جموزن روغن تارین اور سفید مرہم ملا کر لگا دین اور ہر مرہم ناموافق پڑے تو عرق طوطیا یا سلفٹ ان ایرن کا لگا دین چنانچہ ان دونوں میں سے کسی کا ۶ سے ۸ گرین تک لیکر ایک آونز آب مقطر میں حل کر لیں۔

جماعت چھپارم پس۔ ٹیو۔ لے

اس جماعت کی بیماریوں کی خاصیت یہ ہے کہ انہیں یا تو بہت چھوٹے چھوٹے یا یک وقت بڑے بڑے دانے پیدا ہوتے ہیں جنکے اندر پیپ ہوتی ہے اور پینڈا بن جاتا ہے۔ جب یہ دانے چھوٹ جاتے ہیں تب انٹر بلکے رنگ کا دبیز گھرنڈ جم جاتا ہے جسکے جھڑ جانے سے اس مقام پر یا تو غاریا داغ رہ جاتا ہے۔ پس۔ ٹیو۔ لے جماعت کی بیماریاں متعدی نہیں ہیں انہیں تھوڑا بہت انفلمیشن ہے اگر تاہم اور یا تو یہ صرف تھوڑے عرصہ تک ہتی ہیں یا بہت دنوں تک تکلیف دیتی ہیں مگر ان بیماریوں کی نسبت ایک بات قابل ملاحظہ ہے کہ یہ ہے کہ انکے ظاہر ہونے کے وقت مرض کے مقام پر جو انفلمیشن ہوتا ہے وہ جلد کے صرف اوپر ہی کے فرد پر نہیں محدود رہتا بلکہ نیچے تک سرایت کر جاتا ہے جس سبب کہ ان میں پیپ پیدا ہو جاتی ہے برعکس دے۔ سے۔ کیو۔ لی جماعت کے بیماریوں کے چھکنا ابتدائی انفلمیشن صرف اپنے ٹورس ہی تک محدود رہتا ہے

اسی واسطے اس جماعت کی بیماریوں میں سیرم یعنی آبِ خون ہوتا ہے، اس جماعت میں تین بیماریاں شامل ہیں اول رک - نے و دوم ام - پ - ٹائفر - گو - سوم اک - تے - ما -

اول رک - نے

اس بیماری کے دانے چھوٹے چھوٹے کی مقدار نو کیلے اور متفرق لیکن حاجا کشر محمد دو کچھون کے طور پر بھی پیدا ہوتے ہیں اور جس مقام "انون" کے کچھے ہوتے ہیں جلد مان کی سرخ ہوتی ہے اور انون کے پینڈے سخت اور جب بچتے ہو کر پھوٹ جاتے ہیں تب ان سے پیپ نکلا کر خشک ہو کر ہوتے رنگ کے باریک کپڑے بچاتے ہیں، پیپ کا چھوٹا سا قطرہ پہلا انون کی نوکوں پر پیدا ہوتا ہے بعد ازاں جب رفتہ رفتہ مقدار پیپ کی بڑھ جاتی ہے تب دانے مدور اور زردی لے لے جاتے ہیں لیکن انکا پینڈا تب بھی سخت سرخ اور زردناک ہوتا ہے اور گرد اسرچ یہ بیماری خاصہ کمر عہد شباب میں پیدا ہوتی ہے اور اکثر چہرہ کی جلد کی گلیٹوں پر نمودار ہوتی ہے، مرض دو قسم کا ہوتا ہے اول رک - نے سم - پکس دوم اک - نے رو - زشی قسم اول کی بیماری اکثر جوانی میں چہرہ پر پیدا ہوتی ہے اور ان کے اسکے متعد اور متفرق ہوتے ہیں اور جب پھوٹ جاتے ہیں تب ان سے یا تو پیپ یا ایک سخت کیل نکل جاتی ہے یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفیٹانے بالکل ٹوٹتے ہی ہنہیں بلکہ دب جاتے ہیں اسوقت اس مقام پر ایک سیاہ نقطہ سا رہ جاتا ہے، اس قسم کا مرض اکثر چہرہ گردن شانہ اور سینہ پر پیدا ہوا کرتا ہے، اک - نے - رو - زشی یا اکثر زیادہ عمر میں ہوا کرتی ہے، اسکے دانوں میں بہ نسبت اک - نے سم - پکس کے زیادہ تر انفلامیشن ہوتا ہے اس واسطے یہ دانے زیادہ تر دردناک بھی ہوتے ہیں،

اسباب - رک - نے کی بیماری اکثر دھوی مزاج کو ہوا کرتی ہے اور انکو خشک چہرہ پر خون کا غلبہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ مرض موروثی اور ماضی کی خرابی سے بھی پیدا ہوتا ہے

خاکہ کو کر پاؤں، منہ، اور کمر اور سر کا استعمال، درد اور فکر سے بھی یہ بیماری پیدا
ہوتی ہے اور جب کوئی طوبت غرض سے جاری ہو اور وقتاً بہ وقتاً بے مشابہ ہو سہرا کا خون
تب بھی یہ مرض پیدا ہوتا ہے اور ایام حمل میں بھی یہ بیماری ہو جایا کرتی ہے۔
علاج۔ اگر یہ بیمار موی مزاج کو ہو جاوے تو خشکین جلابین اور غذا ہلکی اور صبح اہضم
تجہ نیکرین، جنکو یہ بیمار موی مزاج ہوتا ہے، ہر دو اسکے روکنے کی تدبیر یہ ہے کہ ۲۰ گرین
کار۔ بونٹ اف سوڈا ایک بوتل پانی میں حل کر کے اس عرق سے بیمار کا چہرہ دھوا دیں
اور عرق منصفیہ چہرہ پر لگا دیں۔

لشجہ۔ روغن تیلو، ڈرام، روغن روزمیری، نصف ڈرام، ریگلی، فامیڈ، اسپرٹ ایک
پائینٹ، اور مقام۔ غرض ہر زیادہ انفلامیشن ہو تو اوپر کے عرق میں دگنایا چوکن
عرق گلاب ملاوینے، اگر بے قافیہ گی حیض کے سبب یہ مرض پیدا ہو تو اسکا علاج کرین
مثلاً ایک قلعہ روزغن ساون کا وغینہ دو مرتبہ دوا دیں اور ایک نے۔ روزمیری رشیا
کے علاج میں یہ بات ملحوظ رہے کہ جب تک تپاتی علامات کو ترک نہ کر لیا تب تک بیماری ہرگز
دور نہوگی مثلاً مریض کو لحم دھڑ سے پرہیز کرنا چاہئے اور ایسی باتوں سے بھی سکو محتر نہونا چاہئے
کہ جن سے چہرہ پر خون کا غلبہ ہوتا ہے مثلاً گرم مکان میں رہنا۔ آگ کے سامنے برا۔ غرض
تک سہر کو چھکا رکھنا۔ اور اگر اس بیماری کا نہایت زور و شور ہو تو ہفتہ میں ایک یا
دو مرتبہ کان کے پیچھے دوچار جو کین لگا دیں اور کسی ٹیکہ جن بلا کا استعمال کرین اور جب
انفلامیشن کم ہو جاوے تب دافون پر اس مرہم کو لگا دیں چنانچہ۔

لشجہ۔ اے۔ مو۔ نی۔ ٹیڈ۔ مر۔ کیوری۔ ۲۰ گرین، سفید مرہم ایک اونس،
گلائی۔ سے۔ رین۔ ایک ڈرام، روغن بادام شیرین ۳ بونڈ، سبکو
ملا لیں، رات کے وقت مقام مرض پر اس مرہم کا لیپ کر دیں اور صبح کے
وقت کار۔ بونٹ اف سوڈا کے عرق سے وہوڈ لین اور جل خشک اور سخت ہو تو

عرق مذکور میں شدر سے روغن گلابی - سی - رین طالین - دہانے کے لئے یہ ہے
چند نسخے عرق اور مرہم کے ہی بہت مفید ہیں :

نسخہ - اسپرٹ اف کفرم ڈرام ۴ پری سی - پے - ٹے لے نصف آونس ۴
لایم واٹر ۴ آونس ۴ سبکو ملا کر مرض کے دانوں پر لگا دین ۴

نسخہ - کروسیو - بلی - مرٹ ۱۰ اگرین ۴ سب نائٹریٹ ۱۰ - ۱۰ - گرین ۴

اسپرٹ اف کفرم ۳۰ بوند ۴ پانی ایک پائینٹ ۴ سبکو ملا کر کے مقام پر لگا دین

نسخہ - سب - لائیٹڈ سلفر ۴ گرین ۴ کار - بونٹ اف ۱۰ - ۱۰ - گرین ۴ اکیل اف

روزر - میری ۱۰ - بوند ۴ سنپل - آئینٹ - منٹ ایکس ۴ سبکو ملا لین ۴

نسخہ - ریڈ اکسائیڈ اف مرکری ۴ سگرین ۴ ایموڈ مرکری ۴ گرین ۴ سبکو ملا لین

۴ گرین ۴ سنپل - آئینٹ - منٹ ایک آونس سبکو ملا کر مرض کے مقام

پر لگا دین ۴

نسخہ - سب - لائیٹڈ - سلفر - سگرین ۴ ایموڈ مرکری ۴ گرین - روغن باوم

۴ ڈرام ۴ چربی ۴ ڈرام ۴ کریو - زوٹ ۴ سبکو ملا لین ۴

نسخہ - گلابی - سی - رین ۴ ڈرام ۴ کلرٹ اسڈم ڈرام ۴ کاساف سلفر

۴ ڈرام ۴ ریکیٹی - فائیڈ اسپرٹ ۴ ڈرام سبکو ملا کر مرض کے مقام پر لگا دین

دوم ام - لٹامائی - گو

اس مرض کے دانے چوٹے چوٹے اور شمار ہوتے ہیں ، کبھی تو متفرق طور پر

اور کبھی آپہنٹے جھے پیدا ہوتے ہیں جس مقام پر دانے نمودار ہوتے ہیں ٹان

پر انظار میں اکثر کرم ہی ہوتا ہے ، کمال کو پہنچ کر یہ دانے جلد پک جاتے ہیں

تب ایسے ایک گاڑی پیپ خارج کر نیم شفاف زرویی مائل کھڑک بن جاتے ہیں

تکے نیچے سے سپرستی رہتی ہے۔ انکے جھڑ جانے کے بعد اس مقام پر ایک دافع
رہ جاتا ہے مگر اس کے گرد اور داسے پیدا ہونے لگتے ہیں اُن سے بھی اسیطوہ پر سپر
سید ہو کر اگلے طور کے کھڑنہ بن جاتے ہیں *

یہ بیماری تین قسم کی ہوتی ہے اول ام۔ پے۔ ٹامی۔ گو۔ خے۔ گیو۔ ۔ سے۔ ٹا۔
دوم ام۔ پے۔ ٹامی۔ گو۔ ایں۔ پار۔ سا۔ سوم ام۔ پے۔ ٹامی۔ گو۔ کے۔ پے۔ ٹین۔
تسم اول کی بیماری کے دل کے قدر یا بیضوی شکل کے گچھون میں ہوتے ہیں۔ اور
ان کے ابتدا میں بخار کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں * ام۔ پے۔ ٹامی۔ گو۔ ایں۔ پار۔ سا۔
سے۔ داسے متفرق اور پھر سے ہوتے ہیں ابتدا میں خفیف بخار اور انتہا تک انہر
نہایت گرمی اور جلن معلوم ہوتی ہے یہ دونوں قسم کی بیماریاں بچوں کے چہرہ پر
اکثر ہوا کرتی ہیں *

ام۔ پے۔ ٹامی۔ گو۔ کے۔ پے۔ ۔ صرف بچوں کے سر پر ہوتی ہے اور جب ان کے
کے نکلنے والے ہوتے ہیں تو کئی وقت تک بخار کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اور
بخار کے اکثر قیسمی ہوا کرتی ہیں۔ سر کی گرمی اور درد کرنے لگتی ہے جہاں پر دانے پیدا
ہوئے ہوتے ہیں وہ مقام سرخ ہو جاتا ہے۔ دکانا تو بچہ ٹپے چھوٹے کے برابر اور متفرق ہوتے
ہیں یا کچھوں کے طور پر سرخ۔ بالوں کا کچھ نہیں لگتا مگر بچے پیدا ہونے سے وہ جڑ جاتے ہیں
تسلح۔ بیمار خاقو رہو اور مرض شدید۔ میں جلاب کا استعمال کریں اور مرض کے
مقام کے قرب پر جو کین لگا دیں اور مریض کو توادویات مقوی کا استعمال کریں
شمالی کین لگا دیں اور مریض کو توادویات مقوی کا استعمال کریں
اولس۔ سفوف آف گئے۔ شیمام آؤنس۔ بیکو بمقدار م آؤنس کے ہر روز
صبح کے وقت یا دین * اگر یہ مرض اسکا۔ فیو۔ مزاج کے بچوں یا جوانوں کو ہو جائے
تو کاٹھ۔ لیو۔ نیل کا استعمال کریں * یہ بیماری مزہم ہو جاوے تو اودیات مصفی خون کا

چنانچہ بوقت لڑکا کا ایک ڈرامہ پانی ۱۲ آؤش ۲ انس پر لگا دین اور اسے بطور پیر پوٹش
 دن میں دو دفعہ بد لین اور جب کھڑنڈا چھے طو پر صاف ہو جاوے تب مرہم بالاب
 لگا دین اور جو بیماری بہت پرانی ہو تو ۴ سے ۵ گرین خشک سلفٹاف ایرن ایک آؤش
 سفید جہم میں لگا کر دانوں پر لگا دین اور جو یہ مرہم تیزی کرے تو اس پر اسے ٹٹاف زنگ
 کا مرہم لگانا چاہیے۔ بغیر فوٹو میا بھی ہوتا ہے کہ مرہم یا کچھ خمدات سے بیماری کی
 علامات کو شدت ہوتی ہے انس صورت میں لگانے کے لئے عرقیات تجویز کرنے
 چاہئیں مثلاً اگرین اسے۔ ٹٹاف زنگ یا اگرین اسے۔ ٹٹاف لڈ یا مگرین
 سلفٹاف یا پیریا سلفٹاف ان کا ایک کراہ آؤش عرق گلاب میں حل کر لین
 اگر یہ بیماری سر پر پیدا ہو تو بالوں کے قریب تک چٹو اور بن بیدازان پولیٹھ انڈر
 عقیات سے جیسے اوپر نو کر کیا گیا کرڈ کو دور کر دین اور تب باقی۔ کار۔ بونٹاف سٹو
 کا مرہم اور دودھ اور پانی لگا دین لیکن نسخہ گرین آئیوڈائیڈاف مرکب۔ کیو۔ ری کا پانی
 بیماریا کی غذا میں الحظم مگر گرم نہ ہو کہ ہے اور بچوں میں صرف دودھ اور ساگو دانہ
 اس مرض کو جلد آرام تو جاتا ہے

سوم اکہ تھے۔ ما

اس بیماری کے دانے بڑے بڑے اور کفرق لگتا ہے گا ہے محدود کچھوں کے
 طور پر بھی پیدا ہوتے ہیں اور پیتے۔ ان کا نسخہ ۱۰ ویش شریخ ہوتا ہے اور اخیر میں اینر
 بہو سے مائل بزرہی اور بہت فرمن ق۔ د سے رنگ کے چھلکے یا کھڑنڈا جسم جاتے
 میں جبکہ چھ جاتے کے بعد چھوٹے چھوٹے زخم ہوتے ہیں جب یہ مرض جوان اور
 طاقتور آدمی کو ہوتا ہے تب اس میں انفلمیشن ہے لیکن سن اور کمزور آدمیوں
 میں ابتدا ہی سے کمزوری کی صحت میں پاتی جاتی ہے حالات میں یہ بیماری متعدی